




វិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្ម ព្រែកលៀប

Prek Leap National Institute Of Agriculture



ជំងឺរំលង



រៀបរៀងដោយ: លោក សែម ថា

ជំពូក ១
ការពង្រីកពូជដំណាំលម្អ
PROPAGATION OF ORNAMENTAL PLANT

គោលបំណង

ក្រោយពីបញ្ចប់នូវជំពូកនេះនឹងអាច ៖

- ពន្យល់បានអំពីការពង្រីកពូជដំណាំលម្អតាមរយៈគ្រាប់ (Seeds)
- ពន្យល់បានអំពីការពង្រីកពូជដំណាំលម្អតាមរយៈសរីរាង្គលូតលាស់ (Morphology) ។

១ . សេចក្តីផ្តើម

នៅលើផែនដី រុក្ខជាតិដុះរាត់រាយស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង តាំងពីនៅលើកំពូលភ្នំដែលមានកម្ពស់រាប់ពាន់ម៉ែត្រ រហូតដល់បាតសមុទ្រដែលមានជម្រៅរាប់រយម៉ែត្រ។ ទីកន្លែងដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងនៃតំបន់ត្រូពិក ឬសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ា ក៏មានរុក្ខជាតិធននឹងកំដៅនេះផងដែរ។ នៅលើប៉ូលទាំងពីរនៃផែនដីដែលមានទឹកកកប្រចាំឆ្នាំ ក៏នៅមានរុក្ខជាតិដុះប្រចាំឆ្នាំជាច្រើនដែរ។ ទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាលទ្ធផលនៃការបន្តពូជរបស់មេបាជំនាន់មុនទាំងអស់ ដែលអាចធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិដែលជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយ អាចធននឹងមជ្ឈដ្ឋាននោះបាន។

រុក្ខជាតិដែលដុះនៅលើផែនដី សុទ្ធតែមានការបន្តពូជទាំងអស់ តែរបៀបនៃការបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិទាំងនោះមិនមានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះទេ តែជាសរុបមក គេបានបែងចែករបៀបនៃការបន្តពូជនៃដំណាំលម្អទាំងអស់នោះជាពីរបៀបគឺ ៖

- ការបន្តពូជដោយភេទ (គ្រាប់) (Sexual Propagation)
- ការបន្តពូជដោយសរីរាង្គលូតលាស់ (Asexual Propagation) ។

២ . ការបន្តពូជនៃដំណាំលម្អ

២.១ . ការបន្តពូជដោយភេទ (គ្រាប់) (Sexual Propagation)

ការបន្តពូជដោយភេទ ឬដំណុះដំណាលដោយគ្រាប់ គេឃើញមានដំណាំលម្អជាច្រើន ដែលធ្វើការបន្តពូជដោយសារគ្រាប់។ ដំណាំលម្អដែលបន្តពូជដោយគ្រាប់ មានទាំងក្រុមដំណាំដែលមានអាយុកាលខ្លី ឬដំណាំប្រចាំរដូវ (Annual plant) ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ (Biannual Plant) និងដំណាំយូរឆ្នាំ (Perennials Plant)

ឧទាហរណ៍ដំណាំលម្អមួយចំនួនក្នុងក្រុមដំណាំប្រចាំរដូវ (Annual plant) មានដូចជា ៖

- ផ្កាស្បែង (TAGETES erecta)
- ផ្កាកំពឹងព្យួរ (CATHARATUS roseus)
- ផ្កាឈូកវត្ត (Helianthus)
- ផ្កាត្រកួន (Petunias multiflora)
- ផ្កាសេម៉ាន់ (Celosia)។



ផ្កាស្បៀង (TAGETES erecta)



ផ្កាកំពុងពួយ (CATHARATUS roseus)



ផ្កាត្រកួន (Petunias multiflora)



២.១.១. ការជ្រើសរើសពូជ

គ្រាប់ពូជដែលមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នមានច្រើនសណ្ឋានណាស់ ដូចជាគ្រាប់ពូជខ្លះដាក់ក្នុងថង់ប្លាស្ទិច (គ្រាប់រាយ) ខ្លះដាក់ក្នុងកញ្ចប់អាលុយមីញ៉ូម រីឯគ្រាប់ពូជខ្លះទៀតនោះផលិតករបានរក្សាទុកដោយខ្លួនឯង។ ដូច្នេះជាការល្អទោះបីគ្រាប់ពូជនោះមានប្រភពមកពីណាក៏ដោយ មុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការដាំដុះដំណាំលម្អណាមួយ យើងគប្បីត្រូវសាកល្បងពិនិត្យមើលគុណភាពគ្រាប់ពូជជាមុនសិន (រកថាមពលដំណុះ) ដើម្បីឱ្យដឹងប្រាកដថា ដំណុះគ្រាប់មានបញ្ហា ឬអត់? ក្នុងករណីគ្រាប់ពូជមានដំណុះធំជាង៨៥ភាគរយ យើងសន្មតថា គ្រាប់ពូជនោះអាចយកមកប្រើប្រាស់បាន។

គោលបំណងនៃការជ្រើសរើសពូជ ៖

- ចំណេញពេលវេលា
- ចំណេញថវិកា
- ចំណេញកម្លាំងពលកម្ម។

២.១.២ . ការត្រៀមសម្ភារៈ

- ថាសបណ្តុះ (Plastique plaques)
- កំប៉ុស្ត (Composts)
- រោងបណ្តុះ (Green house)
- ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព (Sprinkler)



២.១.៣. ការបណ្តុះ

ក្រោយពីបានត្រៀមរៀបចំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់ហើយ យើងត្រូវចាប់ផ្តើមនូវតួការបណ្តុះគ្រាប់តែម្តង។

- ជាដំបូងត្រូវយកកំប៉ុស្តិ៍មកព្រាចពង្រាយលើថាសឱ្យបានពេញរន្ធ និងសង្កត់ថ្មមៗ
- ស្រោចទឹកឱ្យជោកល្មមទៅលើថាសដែលបានដាក់កំប៉ុស្តិ៍ហើយនោះ
- ដាក់គ្រាប់ពូជចូលក្នុងរន្ធ (១រន្ធមួយគ្រាប់)
- ស្រោចទឹកម្តងទៀតឱ្យបានជោក និងសព្វល្អ
- លើកថាសយកទៅរក្សាទុកក្នុងរោងម្លប់ (Greenhouse)
- ពិនិត្យថែទាំ (ទឹក, សត្វល្អិត) ជាប្រចាំ។

២.២. ការបន្តពូជដោយសរីរាង្គលូតលាស់ (Asexual Propagation)

ដំណាំលម្អជាច្រើនប្រភេទដែលគេបានប្រទះឃើញ ហើយពុំមានគ្រាប់សម្រាប់ធ្វើការបន្តពូជនោះ ដូចជាដំណាំលម្អក្នុងអំបូរត្រាស៊ីណា (*Dracaena*), ស៊ែម (*EHAPIS excelsa*)



ត្រាស៊ីណា/ហុងកុង (*Dracaena fragrans*)



ស៊ែម (*EHAPIS excelsa*)

ជួនកាលក៏មានដំណាំលម្អប្រភេទខ្លះមានផ្កាដែរ តែពុំមានគ្រាប់សម្រាប់ធ្វើការបន្តពូជទេ (ផ្កាមិនពេញលេញ) ដូចជាផ្ការំយោល (*Hibiscus*), ផ្កា អមតៈ (*Kalanchoe*), ផ្កាដកខឹម (*Ixora*)...។



រំយោល (Hibiscus)



ផ្កាអមតៈ (Kalanchoe)



ផ្កាដកខឹម (Ixora)

ដូច្នេះការពង្រីកពូជក្រុមដំណាំលម្អទាំងនេះនេះ គេអាចធ្វើបានដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសំខាន់ៗ មួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

- វិធីសាស្ត្រកាត់បណ្តុះ (Propagation by stem cutting method)
- វិធីសាស្ត្របំបៅ និង (Propagation by grafting method)
- វិធីសាស្ត្រសាកមែក (Propagation by Air layer method) ។

ក្រៅពីវិធីសាស្ត្រសំខាន់ៗខាងលើនេះ គេក៏អាចធ្វើការពង្រីកពូជដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗមួយ ចំនួនទៀតដូចជា ការញែកគុម្ព (អនុវត្តចំពោះផ្កាអ័កគីដេរ, ផ្កាសេប្រា) ការបែងមើម (អនុវត្តចំពោះផ្កា ចន្ទ) ផងដែរ។

២.២.១. វិធីសាស្ត្រកាត់បណ្តុះ (Propagation by stem cutting method)

ការកាត់បណ្តុះ គឺប្រព្រឹត្តទៅដោយការកាត់ផ្នែកលូតលាស់ណាមួយរបស់ដំណាំ ហើយយកទៅដោត ក្នុងល្បាយដីរហូតដល់វាដុះឬស។ សរីរាង្គលូតលាស់នេះមានដូចជា ដើម, មែក, ស្លឹក...។ ការកាត់បណ្តុះគេ អាចអនុវត្តបានទៅលើដំណាំលម្អមួយចំនួនដូចជា ផ្កាក្រដាស់, ផ្ការំយោល, ផ្កាមាតី...។ វិធីនេះវាចំណេញ ដើម ឬមែក ដោយគេប្រើប្រាស់វាតែបន្តិចបន្តួច គេនឹងទទួលបានដើមថ្មីជាច្រើន និងឆាប់ទទួលបានផល ទៀតផង។

ក ការត្រៀមសម្ភារៈប្រើប្រាស់

- ខ្សាច់គ្រើម ឬកម្ទេចស្រកីដូង ឬកំប៉ុស្តិ៍ ឬផេះអង្កាម
- កាំបិតមុត/កន្ត្រៃ/រណា
- ថ្នាលបណ្តុះ
- រោងម្លប់
- ថ្នាំបណ្តុះឬស

- ប៉ោតស្រោចទឹក។

ខ ការអនុវត្ត

- ជ្រើសរើសមែក ឬដើមដែលល្អ (មែកមិនប្រេះស្រាំ គ្មានសត្វល្អិតបំផ្លាញ)
- កាត់មែក/ដើមជាកង់ៗ (ប្រវែងប្រែប្រួលទៅតាមទំហំដើម/មែក)
- ជ្រលក់ផ្នែកខាងចុងទៅនឹងទឹកកំបោរ ផ្នែកគល់ទៅនឹងទឹកថ្នាំបណ្តុះឬស
- ដោតកំណាត់បណ្តុះទៅក្នុងថង់ ឬថ្នាលបណ្តុះ
- ស្រោចទឹកឱ្យជោគល្អ
- យកកៅស៊ូប្លាស្ទិចមកគ្របពីលើកំណាត់បណ្តុះឱ្យជិតល្អ។

រយៈពេលពី៣០ទៅ៤០ថ្ងៃ វានឹងដុះឬស យើងអាចដកវាយក
កំណាត់បណ្តុះនោះទៅផ្សំក្នុងថង់។ លុះវាបានដុះឬសស្រួលបួលហើយ
យើងអាចយកវាទៅដាំបាន។



វិធីសាស្ត្រកាត់បណ្តុះ

២.២.២. វិធីសាស្ត្របំបៅ (Propagation by Grafting method)

មានដំណាំលម្អជាច្រើនប្រភេទដែលគេអាចធ្វើការពង្រីកពូជដោយវិធីសាស្ត្របំបៅនេះ។ លើសពីនេះ
ទៅទៀត ការបំបៅក៏ថែមទាំងបានធ្វើឱ្យដំណាំមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញផងដែរ ដោយធ្វើឱ្យ
មានប្រភេទ ពូជលាយចម្រុះពណ៌គ្នានៅលើដើមតែមួយ។ ការធ្វើបែបនេះវាតម្រូវឱ្យអ្នកអនុវត្តមានចំណេះដឹង
បទពិសោធន៍ និងទេពកោសល្យច្បាស់លាស់ ទើបអនុវត្តទៅទទួលបានផលល្អ។ គេអាចបំបៅមានច្រើនវិធី
សាស្ត្រដែលនឹងពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម ៖

ក ការបំបៅរាងជាអក្សរតេ (T)

ការបំបៅរាងជាអក្សរតេ(T) ឬការភ្ជាប់ភ្នែក ជាវិធីពង្រីកពូជនៃដំណាំផ្កាកូលាបដែលបាននាំយកភ្នែកពូជពីមែកពូជល្អមួយ (ពណ៌ផ្សេង) ទៅភ្ជាប់ជាមួយដើមទម្រ (ពណ៌ផ្សេង) ដើម្បីឱ្យបានពូជថ្មីមានពីរ ឬបីពណ៌ទៅតាមតម្រូវការ ហើយអាចដុះលូតលាស់ធំធាត់ និងផ្តល់ផលបានឆាប់រហ័ស។


ការត្រៀមសម្ភារៈប្រើប្រាស់

- កូនកាំបិត
- ខ្សែចំណង។

ការអនុវត្ត

ជំហានទី១ ៖

ឆ្លុតដើមទម្រជារៀងអក្សរតេ (T) រួចប្រើកាំបិតដើម្បីផ្អែបើកមុខចៀរនោះ។



ជំហានទី២ ៖

ជ្រើសរើសភ្នែកដែលកំពុងរីកចំរើន ពីមែកពូជល្អ ជៀសវាងភ្នែកពូជឱ្យដោយសាច់ឈើ តែបកយកសាច់ឈើនោះចេញមុននឹងដាក់សៀតចូលក្នុងដើមទម្រដែលបានបម្រុងទុកជាស្រេចហើយនោះ។



ជំហានទី៣ ៖

យកពន្លកភ្នែកដែលបានផ្អែបសាច់ឈើចេញទុកហើយនោះ ទៅស៊កចូលក្នុងរន្ធដែលបានបើកសំបកទុកនៅដើមទម្រនោះតាមទិសពីលើចុកមកក្រោម។



ជំហានទី៤ ៖

បន្ទាប់ពីស៊កសម្រកពន្លកភ្នែកបានរៀបរយហើយ ត្រូវយកខ្សែចំណងប្លាស្ទិចមករុំឱ្យបានជិត និងមាំល្អ ដើម្បីការពារការជ្រាបទឹកចូល។ ការរុំនេះធ្វើឡើងរយៈពេល៤-៥ថ្ងៃ ទើបយើងស្រាយខ្សែចំណងចេញដើម្បីពិនិត្យមើលពន្លកភ្នែក កាលបើពិនិត្យទៅឃើញពន្លកភ្នែកនោះមានសភាពស្រស់ដ៏ដែល ត្រូវរុំឡើងវិញដោយជៀសកុំឱ្យប៉ះពន្លកភ្នែកដែលរៀបនឹងដុះចេញ។ ការរុំលើកនេះមានរយៈពេលប្រមាណពី១៥-២០ថ្ងៃ

ពន្លកភ្នែកនឹងរីកចម្រើនភ្ជាប់ជាមួយនឹងដើមទម្រ។
ចោល ដើម្បីឱ្យពន្លកពូជថ្មីដុះលូតលាស់ល្អ។

បន្ទាប់មកត្រូវកាត់ដើមទម្រផ្នែកខាងលើនៃផ្នែកបំបៅ



ខ ការបំបៅរាងជាអក្សរវ៉េ (V)

ការបំបៅរាងជាអក្សរវ៉េ (V) ឬការបំបៅតាមរង្វង់ដើមទម្រ ជាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតនៃវិធីសាស្ត្របំបៅ។
គេច្រើនអនុវត្តទៅលើផ្កាមួយចំនួនដូចជា ផ្កាក្រដាស, ផ្ការំយោល, ផ្កាចំប៉ីក្រហម...។

- ការត្រៀមពន្លកពូជ ៖

សម្រាប់ពន្លកពូជដែលល្អ ហើយនឹងនាំយកមកធ្វើការបំបៅនោះ ត្រូវជ្រើសរើសយកពន្លកពូជណា
ដែលមានទំហំប៉ុនគ្នានឹងដើមទម្រ តែក៏អាចយកពន្លកពូជដែលមានទំហំខុសគ្នានឹងដើមទម្របានផងដែរ។
ប្រ វែងពន្លកពូជគឺពី៨ទៅ១០ស.ម ឬមានពន្លកខាងពី៤ទៅ៦។ ក្រោយពីបានជ្រើសរើសរួចរាល់ហើយ
គួរបាប ផ្ដើមអនុវត្តភ្លាម។

ការត្រៀមសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ៖

- កូនកាំបិតមុត
- ថង់ប្លាស្ទិច
- ខ្សែចំណង។

ការអនុវត្ត

១-ត្រូវរៀបចំ និងជ្រើសរើសរកខ្លែងបំបៅណាដែលមានសុខភាពល្អ និងរឹងមាំល្អ។ ត្រូវដឹងឱ្យប្រាកដថា
ពន្លកភ្នែកនឹងអាចដុះត្រូវបានជាច្រើនបន្ទាប់ពីបានផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងដើមទម្រ និងផ្នែកបំបៅហើយនោះ

២-ត្រូវរកដើមទម្រណាដែលជាពូជបង្កាត់

៣-ពុះដើមទម្រជាដាងអក្សរ V

៤-យកចំណែកនៃដើមទម្រដែលបានពុះនោះចេញ


៥-បិតពន្លកពូជជាដាងកន្ទុយអន្ទង់

៦-ស៊ីកខ្លែងបំបៅចូលក្នុងរង្វង់នៃដើមទម្រ

៧-យកខ្សែចំណងមករុំចងត្រង់មុខតំណនោះឱ្យតឹងនឹងជាប់ល្អ

៨-យកចង់ប្លាស្ទិចមកច្រកពីលើពន្លកពូជនឹងចងឱ្យជិត។

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការងាររួចរាល់ហើយ ត្រូវយកផ្ទាំងបំបៅនោះទៅរក្សាទុកនៅក្នុងរោងម្ជប់រយៈពេល ៥ទៅ៧ថ្ងៃ បន្ទាប់មកត្រូវស្រាយមកចង់ប្លាស្ទិចនោះចេញពីត្រួយបំបៅ ហើយបន្តរក្សាទុកនៅក្នុងរោងម្ជប់ ដ៏ដែល។



ការបំបៅរោងជាអក្សរវ៉េ (v)

កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលដល់បន្តរក្សាបំបៅដើមទម្រ និងខ្ពែងបំបៅ

បន្តរក្សាបំបៅដើមទម្រ និងខ្ពែងបំបៅ អាចធ្វើបានអាស្រ័យឡើងដោយកត្តាសំខាន់ៗចំនួន៤គឺ ៖

- **ប្រភេទ និងពូជ** ៖ ប្រភេទ និងពូជនៃរុក្ខជាតិខ្លះ មិនអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភេទ និងពូជរុក្ខជាតិមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានទេ ដូច្នេះមុននឹងធ្វើការបំបៅ យើងគួរគប្បីធ្វើការកត់សម្គាល់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ថាតើរុក្ខជាតិទាំងពីរដែលនឹងត្រូវធ្វើការបំបៅវាស្ថិតនៅក្នុងអំបូរដូចគ្នា ឬខុសគ្នា។ គេអាចធ្វើការបំបៅបាននៅលើរុក្ខជាតិដែលមានពូជខុសគ្នាឱ្យតែស្ថិតនៅក្នុងអំបូរជាមួយគ្នាបាន ខ. ប៉េងប៉ោះបំបៅជាមួយគ្រប់ល្អៅបំបៅជាមួយឪឡឹក ក្រូចបំបៅជាមួយក្រសាំង ពីព្រោះពូជទាំងនេះវាខុសគ្នាមែនពិត តែវាស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារជាមួយគ្នា...។

- **សារធាតុបម្រុងក្នុងដើមទម្រ** ៖ តាមធម្មតាដើមទម្រ និងខ្ពែងបំបៅដែលមានសារធាតុបម្រុងគ្រប់គ្រាន់ អាចផ្សារភ្ជាប់មុខដំណើរបានលឿន ហើយរឹងមាំទៀតផង ដោយសារវាមានសមត្ថភាពបញ្ចេញទឹកអំពិល (រុក្ខរស់) សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដំណើរនោះ។ ហេតុនេះដើមទម្រ និងខ្ពែងបំបៅណាមិនមានសុខភាពល្អ ឬមានការបំផ្លាញពីជំងឺ សត្វល្អិត មិនគួរជ្រើសរើសយកមកសម្រាប់ធ្វើការបំបៅឡើយ។ សម្រាប់ដើមទម្រក្នុងកំឡុងពេលបំបៅត្រូវស្រោចទឹក ដាក់ជីបំប៉នឱ្យបានទៀងទាត់ បើមិនដូច្នោះទេ មុខដំណើរក៏មិនអាចផ្សារភ្ជាប់គ្នាបានដែរ។

- **លក្ខណៈអាកាសធាតុ** ៖ កត្តាដែលធ្វើឱ្យមានការបញ្ចេញទឹកអំពិល (រុក្ខរស់) បានល្អ ហើយធានាឱ្យមុខដំណើរផ្សារភ្ជាប់គ្នាបានរឹងមាំ គឺមានកត្តាជាច្រើនដូចជា សំណើមបរិយាកាស, សីតុណ្ហភាព, ទឹក

ភ្លៀង...។ កាលណាបើសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់រហូតដល់៤០អង្សាសេ នោះវាធ្វើឱ្យមុខដំណាំមិនអាចផ្សាភ្ជាប់គ្នាបានទេ តែបើសីតុណ្ហភាពចុះទាបពេកក៏មុខដំណាំមិនអាចផ្សាភ្ជាប់គ្នាបានដែរ ហេតុនេះគួរជ្រើសរើសរករដូវកាលណា ឬពេលវេលាណាសមស្របសម្រាប់ធ្វើការបំបៅ នោះទើបទទួលបានផលល្អ ដូចជានៅចុងរដូវប្រាំង ឬដើមរដូវវស្សា ឬនៅពេលព្រឹកព្រលឹម និងពេលរសៀល។

- **សម្ភារៈប្រើប្រាស់** ៖ ជាការពិត បើសម្ភារៈប្រើប្រាស់មិនស្អាត គ្មានអនាម័យ រាប់ទាំងកាំបិត ខ្សែចំណង វាធ្វើឱ្យការបំបៅពេញការងាររបស់យើងមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយ ព្រោះវាឆ្លងរោគពីសម្ភារៈទាំងនោះ។ ជាការល្អ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការងារបំបៅ គប្បីត្រូវលាងសម្អាត ជាមួយនឹងសាប៊ូ ឬអាល់កុលបន្ទាប់ពីបានលាងសម្អាតហើយ ត្រូវហាលថ្ងៃឱ្យបានស្ងួតល្អមុននឹងប្រើ។

២.២.៣. វិធីសាស្ត្រសាកមែក (Propagation by Air layer method)

ការសាកមែកជាវិធីសាស្ត្រពង្រីកពូជមួយរបៀបទៀត។ ការសាកមែកនេះ ជាវិធីដែលធ្វើឱ្យដំណាំដុះឬសនៅលើដើមមេជាមុនសិន មុននឹងកាត់ចេញពីដើមមេយកទៅដាំដុះ។ គេអាចអនុវត្តស្ទើរគ្រប់មុខដំណាំដូចជា ផ្ការំយោល ផ្កាជកខ្ទឹម ផ្កាយិតចូ...។ ការសាកមែកគេអនុវត្តនៅក្នុងរដូវវស្សា ព្រោះនៅរដូវនេះមានសំណើមខ្ពស់ ដែលអាចឱ្យដំណាំឆាប់ដុះឬសថ្មី។

ក- ការត្រៀមវត្ថុសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ៖

ចង់ប្លាស្ទិច, ខ្សែចំណង, កំទេចស្រកីដូង ឬអាចម៍រណាចាស់ៗ, កូនកាំបិតមុត, ថ្នាំបណ្តុះឬស (ប្រសិនបើមាន)។

ខ-ការអនុវត្តន៍ ៖


- ជ្រើសរើសមែកណាស្ថិតនៅក្នុងពេលកំពុងលូតលាស់ គ្មានសត្វល្អិតស៊ីបំផ្លាញស្លឹកមានមែកសាខាល្អ
- លាក់ ឬក្រឡឹងមែកឱ្យដល់សាច់ឈើ ផ្នែកខាងលើ និងក្រោមស្នាមក្រឡឹងប្រវែង២ធ្នាប់ដៃ
- ប្រើកូនកាំបិតឆ្អឹងបកសំបកចេញ និងកោសសម្អាតកំបីយ៉ូម (Cambium)
- លាបថ្នាំបណ្តុះឬសត្រង់មុខកាត់ផ្នែកខាងលើ
- យកចង់ល្បាយដឹមកុំត្រង់មុខជៀ និងចងឱ្យជាប់ល្អ ។



ជំហានទី១



ជំហានទី២



ជំហានទី៣

ក្រោយពីអនុវត្តបានប្រមាណពី៣-៤សប្តាហ៍មក ឬសថ្មីនឹងដុះចេញមក តែមិនត្រូវប្រញាប់កាត់ ចេញពីដើមមេនោះទេ លុះណាបើពិនិត្យឃើញឬសនោះមានពណ៌ត្នោត ទើបអាចកាត់បាន។



វិធីសាស្ត្រសាកមែក (Air layer)

ជំពូក ២

ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពី វិទ្យាសាស្ត្រនៃដំណាំលម្អ

វិទ្យាសាស្ត្រដំណាំលម្អ = វិទ្យាសាស្ត្រ (Science) + ដំណាំ (Crop) + លម្អ (Beauty)

វិទ្យាសាស្ត្រ (Science) ៖ វិធីបង្កើត និងប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាស្រាវជ្រាវ ទំនាក់ទំនងទូទៅមួយក្នុងគោលបំណងមួយកំណត់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ វិធីបង្កើត និងប្រមូលទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍បីសំខាន់ៗគឺ ៖

- ការអង្កេត (Survey) ៖ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងក្នុងការកំណត់ស្ថានភាព ឬបញ្ហាផ្សេងៗដើម្បីប្រមូលនូវទិន្នន័យ (Data)។ ដូច្នេះ បើគ្មានការអង្កេតដោយមត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នទេ នោះ វានឹងអាចធ្វើឱ្យមានលទ្ធផលខុសគ្នារវាងអ្នកស្រាវជ្រាវពីរ ឬច្រើនអ្នកដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើ បញ្ហាតែមួយនោះ។

- សម្មតិកម្ម (Hypothesis) ៖ បន្ទាប់មកគេព្យាយាមពន្យល់ទំនាក់ទំនងរវាងទិន្នន័យ។ ការពន្យល់ នេះ គឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការទទួលបាននូវសម្មតិកម្ម។

- ការពិសោធន៍ (Experimentation) ៖ បន្ទាប់ពីបានសម្មតិកម្មរួចមក គេក៏បានចាប់ផ្តើមធ្វើការ ពិសោធន៍ ដោយប្រៀបធៀបលទ្ធផលរបស់វាទៅនឹងកត្តាផ្សេងៗ ដើម្បីឱ្យលទ្ធផលនោះមានកម្រិតលម្អៀង តិចតួចបំផុត បើពុំដូច្នោះទេ គេនឹងត្រូវធ្វើការពិសោធន៍ឡើងនោះវិញជាថ្មីម្តងទៀត។

ដំណាំ (Crops or Plants) ៖ ពពួកសរីរាង្គមានជីវិត ដែលអាចផលិតជាអាហារបានដោយខ្លួនឯង និង បំបែកពីសារធាតុអសរីរាង្គ ព្រមទាំងបង្កើតបានជាសារធាតុម៉ូលេគុលសំបូរមួយ ដោយដំណើរការមួយដែល គេបានឱ្យឈ្មោះថា ជាដំណើរស្វ័យយោគ (Photosynthesis)។ ដំណើរការប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺដែលត្រូវ បានស្រូបយកដោយសារធាតុឱ្យពណ៌ម្យ៉ាងឈ្មោះថា ក្លរូភីល (Chlorophyll) ហើយដែលបានកើតឡើងនៅ គ្រប់ប្រភេទនៃរុក្ខជាតិ លើកលែងតែសត្វ និងមនុស្ស។

លម្អ (Beauty) ៖ លម្អ មកពីពាក្យល្អ (good)។ ល្អ ពាក្យថ្នាក់គុណនាម មិនអាក្រក់ ៖ គឺឥតមាន ហ្មង, មិនមានទាស់, មិនឆ្គង, ត្រឹមត្រូវ, ប្រពៃ ៖ ចិត្តល្អ, រូបល្អ, អំពើល្អ, សម្តីល្អ។ កិ. វិ. ដោយប្រពៃ, ត្រឹម ត្រូវ, ស្រួលល្អ, ប្រព្រឹត្តល្អ, និយាយល្អ, ធ្វើការល្អ, ល្អជា ស្លូត, ត្រង់, មនុស្សល្អជា, សម្តីល្អជា, និយាយល្អ ជា។ ល្អមើល ៖ ល្អគួរឱ្យចង់មើល, ល្អស្រួលមើល (វចនានុក្រម សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួនណាត)។

និយមន័យដំណាំលម្អ ៖

ដំណាំលម្អ គឺជាដំណាំទាំងឡាយណាដែលគេប្រើសម្រស់របស់វាដើម្បីលម្អ។ ក្នុងនោះរួមមានដំណាំ យកស្លឹក ដំណាំយកផ្កា ដំណាំយកផ្លែ និងដំណាំយកដើម ព្រមទាំងដំណាំយកក្លិនផងដែរ។

១ - ប្រភេទ និងស្ថានភាពនៃដំណាំលម្អ

ដំណាំលម្អ គឺជាដំណាំមួយនៃដំណាំកសិកម្ម បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ក៏ដូចជាការជួយទប់នឹងបម្រែបម្រួលអាកាស

ធាតុ និងរក្សាលំនឹងបរិស្ថាន។ ដំណាំលម្អមានលក្ខណៈខុសគ្នាបីប្រភេទដូចគ្នាទៅនឹងដំណាំទូទៅផងដែរ គឺ ដំណាំប្រចាំរដូវ (Annuals Plant) ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ (Biannual Plant) និងដំណាំយូរឆ្នាំ (Perennials Plant)

- ដំណាំប្រចាំរដូវ (Annuals Plant) ៖ ដំណាំប្រចាំរដូវរួមមានដំណាំមួយចំនួនដូចជា

- ផ្កាដំណាក់ទឹកភ្លៀង (Alyssum)
- ផ្កាត្រីហ្សង់តែម (Chrysanthemum)...។



ផ្កាដំណាក់ទឹកភ្លៀង (Alyssum)



ផ្កាត្រីហ្សង់តែម (Chrysanthemum)

- ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ (Biannual Plant) ៖ ដំណាំប្រចាំឆ្នាំរួមមានដំណាំមួយចំនួនដូចជា

- ផ្កាមិប៉ូនា (Dianthus)...។



ផ្កាមិប៉ូនា (Dianthus chinensis)

- ដំណាំយូរឆ្នាំ (Perennials Plant) ៖ ដំណាំប្រចាំយូរឆ្នាំរួមមានដំណាំមួយចំនួនដូចជា
 - ផ្កាដាក់លាត់ (Gladiolus)
 - ផ្កាសេប្រា (Gerbera)...។



ផ្កាដាក់លាត់ (Gladiolus)



ផ្កាសេប្រា (Gerbera)

មុខវិជ្ជាដំណាំលម្អ គឺជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលនឹងសិក្សាអំពីទម្រង់ដំណុះដំណាល ការដុះលូតលាស់ ការរីកចម្រើននិងអំពីរបៀបដាំដុះ និងការថែរក្សានៃក្រុមដំណាំទាំងនេះ។ មុខវិជ្ជានេះក៏សិក្សាផងដែរអំពីលក្ខណៈពិសេសៗនៃដំណាំលម្អនីមួយៗ ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងលក្ខណៈអាកាសធាតុដែលនៅជុំវិញវា និងរីកចម្រើនបាយដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ដំណាំ ដើម្បីនឹងទទួលបានផលជាអតិបរមា និងមានគុណភាពល្អស្របតាមតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់។

ដំណាំលម្អមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនានាដូចជា រុក្ខវិទ្យា ជីវវិទ្យា ជីវវិទ្យា និងការបង្កើនទិន្នផល ព្រមទាំងមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំដី ការងារថែទាំដំណាំ។ ភាពចាំបាច់បំផុតរបស់អ្នកបច្ចេកទេស គឺត្រូវដឹងពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់ដំណាំលម្អ ជាពិសេសតម្រូវការរបស់វាតាមដំណាក់កាលលូតលាស់នីមួយៗ ដូចជាដី និងជីជាតិដី ទឹក លក្ខណៈបរិស្ថានចំពោះដំណាំ និងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតចំពោះសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។

២ - អត្ថប្រយោជន៍ និងស្ថានភាពដំណាំលម្អលើពិភពលោក

២.១ - អត្ថប្រយោជន៍

ដំណាំលម្អ គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះជីវិតមនុស្ស និងបរិស្ថាន វាមិនខុសគ្នាអ្វីពីដំណាំកសិ-ឧស្សាហ៍កម្មនោះទេ។ វាបានផ្តល់ជាចំណីអាហារ ចំណីអាម្មណ៍ដល់មនុស្ស ព្រមទាំងផ្តល់នូវវត្ថុធាតុ

ដើម ផ្តល់នូវឌីសថ ផ្តល់នូវអុកស៊ីសែន និងធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៅលើផែនដី។ល។ ដូច្នេះដើម្បីឱ្យមានតុល្យភាពរវាងជីវិតរស់នៅលើផែនដីកាន់តែប្រសើរ ជាការចាំបាច់ណាស់ គឺត្រូវបង្កើនការដាំដុះ និងការថែទាំនៃក្រុមដំណាំនេះ។ ក្រៅពីមានសារៈប្រយោជន៍ខាងបរិស្ថាន និងសង្គម ដំណាំលម្អនៅមានសារៈប្រយោជន៍មួយ ឬពីរផ្សេងទៀត ដូចជាបង្កើតឱ្យមានការងារធ្វើជាច្រើនតាមរយៈការពង្រីកពូជ, ការដាំដុះ, ការថែទាំ, ការដឹកជញ្ជូន, ការលក់ដូរដើម្បីបានប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចូលរួមលើក កម្ពស់ប្រាក់ចំណូលជាតិ។

២.២ - ស្ថានភាពដំណាំលម្អលើពិភពលោក

នៅបរទេស ជាពិសេសប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប ដំណាំលម្អសម្រាប់ពួកគេ គេបានឱ្យតម្លៃខ្ពស់ណាស់។ គេស្ទើរតែចាត់ទុកដំណាំលម្អ គឺជាដំណាំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេផង ដោយពួកគេបានខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងការបង្កាត់ពូជ ការពង្រីកពូជ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យបានពូជថ្មីៗ ប្លែកៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងធ្វើអាជីវកម្ម។

ដំណាំលម្អគេបានប្រើប្រាស់ដូចជា ដំណាំលម្អក្នុងសួនតាមគេហដ្ឋាន (Home Garden) តាមទីសាធារណៈ (Public Garden) ដើម្បីបង្កើនភាពស្រស់ស្អាត និងការទាក់ទាញ។ ក្រៅពីនេះគេនៅបានរៀបចំជាកន្លែក ជាបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាការដូរទៅឱ្យអ្នកណាម្នាក់នៅពេលមានពិធីអ្វីមួយ ដូចជាពិធីខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍ រាត្រីសមោសរ...។ ដោយមានតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ដំណាំលម្អនេះច្រើនឡើងៗ ទើបផលិតករបានបង្កើនផ្ទៃដីដាំដុះរាប់សិបហិកតាក្នុងកសិដ្ឋាននីមួយៗ។

២.៣ - ស្ថានភាពដំណាំលម្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ន ការនិយមចូលចិត្ត និងការប្រើប្រាស់ដំណាំលម្អនៅមានកម្រិតនៅឡើយ នេះអាស្រ័យដោយកត្តាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

២.៣.១ - កត្តាធនធានមនុស្ស ៖

ធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសមួយប្រកបដោយសក្តានុពល គឺជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមប្រកបដោយចីរភាព។ ដោយឡែកបើយើងពិនិត្យមកមើលធនធានមនុស្សរបស់យើងលើវិស័យដំណាំលម្អ គឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយ ទាំងអ្នកបច្ចេកទេស ទាំងផលិតករ។ ទាក់ទងទៅនឹងអ្នកជំនាញក្នុងការបង្កាត់ពូជរុក្ខជាតិ (Plant Breeding) ការពង្រីកពូជ (Plant Propagation) យើងពុំទាន់មានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ រីឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងបង្កាត់ពូជរុក្ខជាតិ ក៏នៅមានចំនួនតិចតួច និងមានកម្រិត។ ទាំងនេះហើយដែលធ្វើឱ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំបង្កើនចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើខាងវិស័យនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឱ្យដូចជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនានា។

២.៣.២ - កត្តាជីវភាព ៖

គេតែងសង្កេតឃើញថា ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ ចាប់ពីកម្រិតទាបឡើងគឺគេបានបង្កើនការចំណាយទៅលើអាហាររូបចកប្រចាំថ្ងៃជាមូលដ្ឋាន បន្ទាប់ពីនោះគេបានចំណាយទៅលើឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងរបស់របរជាច្រើនផ្សេងទៀត ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យជីវិតរស់នៅរបស់គេ មានសុភមង្គល

ជាពិសេសការចំណាយលើការទិញដំណាំលម្អករៀបចំតុបតែងគេហដ្ឋានឱ្យបានស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញ ទោះបីការចំណាយនោះខ្ពស់បន្តិចក៏ដោយក្តី។ ដោយឡែកចំពោះប្រទេសដែលមាន ប្រាក់ចំណូលទាប កម្រិតមធ្យម ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើង គឺគេមិនសូវចំណាយទៅលើរបស់អ្វីដែលមិន ចាំបាច់ដូចជាដំណាំ លម្អនេះនោះទេ ប្រការនេះ គឺមិនមែនមានន័យថា ប្រជាជនកម្ពុជាមិនចូលចិត្ត និងមិនស្រឡាញ់ដំណាំលម្អ នោះទេ តែដោយសារប្រាក់ចំណូល និងបញ្ហាជីវភាព ទើបដំណាំលម្អមិនត្រូវបាន គេប្រើប្រាស់ឱ្យបានទូលំ ទូលាយនៅឡើយ គឺគេឃើញមានការប្រើប្រាស់ម្តងម្កាលក្នុងពិធីផ្សេងៗ ហើយ សម្រាប់តែអ្នកដែលមានជីវ ភាពធូរធានៅតាមទីប្រជុំជនមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។

២.៣.៣ - កត្តាការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ៖

ស្ទើរតែជាង៩០ភាគរយនៃផ្ទៃដីកសិកម្ម បានប្រើប្រាស់ដោយផ្តោតសំខាន់តែទៅលើដំណាំយុទ្ធ សាស្ត្រដែលរួមមានដំណាំស្រូវ ដំណាំឧស្សាហកម្ម ដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងដំណាំរួមផ្សំមួយចំនួនទៀត ដូចជាដំណាំបន្លែបង្ការនានា...។ ដោយការប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ដាំដុះដំណាំលម្អ គឺនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅ ឡើយ។ តំបន់ដែលគេច្រើនជួបប្រទះមានការដាំដុះដំណាំលម្អ គឺស្ថិតនៅជិតទីប្រជុំជនរាជធានីខេត្ត នៅលើ ផ្ទៃដីតូចៗនៅជុំវិញផ្ទះ ជាលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះ។ ផលិតករចេះដាំដុះដំណាំលម្អ គឺពុំបានឆ្លងកាត់ការ បណ្តុះបណ្តាលពីសាលាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺពួកគាត់ចេះដាំដុះតាមរយៈការសាកសួរ និងមើលអ្នកជិត ខាងតែប៉ុណ្ណោះ។

៣ - ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ដំណាំលម្អ (Classification of Ornamental Plant)

ដំណាំលម្អមានច្រើនប្រភេទ ហើយការប្រើប្រាស់ក៏មានលក្ខណៈខុសៗគ្នា ដែលមានប្រភពនៅក្នុង ធម្មជាតិ ជាពិសេសនៅលើភ្នំ ក្នុងព្រៃជ្រៅៗ ហើយត្រូវបានគេនាំយកមកដាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ រីឯដំណាំ លម្អខ្លះទៀតជាភេទដំណាំដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ជាអាហារ និងឧស្សាហកម្ម។ យោង ទៅតាមលក្ខណៈខាងលើបណ្តាដំណាំលម្អទាំងអស់ត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ជាលំដាប់ដូចខាងក្រោម ៖

៣.១ - ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់តាមរាងរូប (Morphology)

៣.១.១ - ដំណាំលម្អដោយសរីរាង្គស្លឹក

ដំណាំលម្អប្រើប្រាស់ដោយសរីរាង្គស្លឹក គឺជាប្រភេទដំណាំដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ស្លឹកសម្រាប់ លម្អ តែជួនកាលក្រុមនៃដំណាំលម្អនេះ ក៏អាចមានផ្កា និងផ្លែដែរ ហើយវាមានរូបរាង ពណ៌សប្បុរសភាពខុសគ្នា តែអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់លម្អបានដូចគ្នា។ ដំណាំលម្អក្នុងក្រុមនេះភាគ ច្រើនជាប្រភេទដំណាំដែល មានអាយុកាលវែង ក្នុងមួយខួបជីវិតរបស់វា វាអាចផ្តល់ផលបានច្រើនដង។

ឧទាហរណ៍ ៖ ការីយ៉ា (Araucaria heterophylla), ជើងដំរី (Beaucarnea recurvate/Elephant-foot tree), ដូងតាំង (Dypsis lutescens), ជ្រៃស្លឹកលឿង (Ficus microcarpa golden leaves), សុភមង្គល (Heteropanax fragrans), ប្រៀង (Cycas revoluta)...។



កាវីយ៉ា (Araucaria heterophylla)



ជើងជំរី (Beaucarnea recurvate)



ដូងតាំង (Dypsis lutescens)



ផ្លែ (Ficus bejamina)



សុភមង្គល (Heteropanax chinensis)



ប្រុង (Cycas revoluta)

៣.១.២ - ដំណាំលម្អដោយសរីរាង្គផ្កា

ដំណាំលម្អដោយសរីរាង្គផ្កា គឺជាប្រភេទដំណាំទាំងឡាយណាដែលលម្អដោយផ្កា។ លក្ខណៈរូបរាង ពណ៌សម្បុរ ទ្រង់ទ្រាយមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងសម្រាប់ជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការក្នុង គោលបំណងខុសៗគ្នា។ ផ្កាខ្លះមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ និងខ្លះទៀតមិនមានក្លិនទេ។

ឧទាហរណ៍ ៖ ផ្កាកង, ផ្កាស្ពឺចនាគ, ផ្កាជើងបង្កង, ផ្កាដកខឹម...។



ផ្កាកង (Lantana camara)



ស្ពឺចនាគក្រហម (Anthurium crystallinum)



ផ្កាជើងបង្កង (Ruellia simplex)



ផ្កាដកខឹម (IXORA javanica)

៣.១.៣ ដំណាំលម្អដោយសរីរាង្គផ្លែ

ដំណាំលម្អដោយសរីរាង្គផ្លែ គឺជាប្រភេទដំណាំដែលមានផ្លែសម្រាប់លម្អ។ ដំណាំលម្អក្នុងក្រុមនេះ ភាគច្រើនគេដាំលម្អនៅក្នុងសួនជុំវិញគេហដ្ឋាន រមណីយដ្ឋាន ឬសួនកម្សាន្តសារធារណៈនានា។

ឧទាហរណ៍ ដំណាំក្រូចក្វិច (citrus), ស្ពី (Averrhoa carambola) star fruit,



ក្រូចក្វិច (Citrus)



ស្ពី (Averrhoa carambola) star fruit

៣.១.៤ ដំណាំលម្អដោយសរីរាង្គដើម

ក្រៅពីលម្អដោយសរីរាង្គផ្លែស្លឹក, ផ្កា, ផ្លែ, ដំណាំលម្អនៅមានមួយក្រុមទៀតដែលលម្អដោយសរីរាង្គដើម។ ដំណាំលម្អក្នុងក្រុមនេះ គ្មានស្លឹក គ្មានផ្កាសម្រាប់លម្អទេ តែក៏មានប្រភេទខ្លះមានផ្កាស្រស់ស្អាតដែរ តែងាយនឹងរោយទៅវិញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ដើមរបស់វាសម្រាប់លម្អតាមទីកន្លែងផ្សេងៗបានយ៉ាងល្អ។ ឧទាហរណ៍ ដំណាំលម្អក្នុងអំបូរដើមជបងយក្ស (CACTI)។



អំបូរដើមដំបងយក្ស (CACTI)

៣.២ - ចំណាត់ថ្នាក់តាមការបន្តពូជ (Reproduction)

ដំណាំលម្អទាំងអស់សុទ្ធតែមានការបន្តពូជទាំងអស់ តែរបៀបនៃការបន្តពូជរបស់ពួកវា គឺមិនដូចគ្នា នោះទេ។ ចំណាត់ថ្នាក់តាមការបន្តពូជ គេអាចបែងចែករបៀបនៃការបន្តពូជរបស់ដំណាំលម្អមានពីរបៀប គឺ ការបន្តពូជដោយភេទ និងការបន្តពូជដោយឥតភេទ។

- ការបន្តពូជដោយភេទ ៖ គឺជាការបន្តពូជដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយសរីរាង្គផ្កា (កេសញី, កេស ឈ្មោល) បង្កើតបានជាផ្លែ និងគ្រាប់។ អ្នកលក់ក្នុងអូរដែលបិតបាំងដោយស្រទាប់ផ្កា រីឯអ្នកលក់លាស់ទៅ ជាផ្លែ ក្នុងផ្លែមានគ្រាប់ វានឹងដុះបានជារុក្ខជាតិថ្មី។

- ការបន្តពូជដោយឥតភេទ ៖ ការបន្តពូជប្រព្រឹត្តឡើងដោយសរីរាង្គលូតលាស់។ របៀបនៃការបន្តពូជ នេះ គេបានជួបប្រទះទាំងនៅលើរុក្ខជាតិថ្នាក់ទាប និងរុក្ខជាតិថ្នាក់ខ្ពស់ទាំងអស់។ ការបន្តពូជនៃក្រុមដំណាំ លម្អនេះមានមូលដ្ឋានលើអំណាចនៃការដុះឡើងវិញរបស់រុក្ខជាតិ ពោលគឺជួសជុលនូវផ្នែកដែលបាត់បង់(សរី រាង្គបន្តពូជ) ។

គេបែងចែកការបន្តពូជរបស់ដំណាំដោយឥតភេទ ឬដំណុះដំណាលដោយឥតគ្រាប់ជាពីរផ្នែកគឺ ដំ ណុះដំណាលដោយធម្មជាតិ និងដំណុះដំណាលដោយនុស្ស។

៣.៣ ចំណាត់ថ្នាក់តាមទីកន្លែងដុះលូតលាស់

ដំណាំលម្អទាំងអស់មានការដុះលូតលាស់តាមទឹកនៃឧស្សា គឺការដុះលូតលាស់ និងរីកចម្រើន ធំធាត់នៅលើគោក មានដូចជាដំណាំផ្កាក្រដាស់, ផ្កាចន្ទ, ផ្កាកូលាប... និងការដុះលូតលាស់ និងរីកចម្រើន ធំធាត់នៅក្នុងទឹក មានដូចជាផ្កាលំចង់, ចក, ស្លាបច្រវ៉ា, កំប្លោក...។



ស្លាបច្រវ៉ា (*Sagittaria latifolia*)



កំប្លោក (*Eichhornia crassipes*)



លំបង់ (Nymphaea)

៣.៤ ចំណាត់ថ្នាក់តាមអាយុកាល

ប្រសិនបើគេយកអាយុកាលរបស់ដំណាំមកធ្វើជាសូចនាករ នោះគេឃើញដំណាំមួយមានបីក្រុម ធំៗគឺ ៖

- ដំណាំប្រចាំរដូវ (Annual Plant) វាមានអាយុកាលមិនលើសពីមួយរដូវ (៦ខែ)
- ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ (Biannual Plant) វាមានអាយុកាលមិនលើសពីមួយឆ្នាំ (១២ខែ)
- ដំណាំយូរឆ្នាំ (Perennials Plant) វាមានអាយុកាលចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ ហើយវាផ្តល់ផ្កា ផ្លែ ច្រើនដងក្នុងមួយអាយុកាលរបស់វា។

ជំពូក ៣
ដំណាំលម្អមួយចំនួន
ដំណាំអំបូរត្រាស៊ីណា/ហុនគុន (DRACAENA)

១ - ប្រភព និងស្ថានភាពទូទៅ

ដំណាំក្នុងអំបូរត្រាស៊ីណា (Dracaena) មានដើមកំណើតនៅនៅក្នុងតំបន់ក្តៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអាហ្វ្រិក។ ដោយសារដំណាំនេះមានស្លឹកច្រើនប្រភេទ និងទ្រង់ទ្រាយគុម្ពមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាត ព្រមទាំងមានចំណុចល្អដ៏ទៃជាច្រើនប្រការ ទើបមានការនិយមដាំ និងប្រើប្រាស់នៃក្រុមដំណាំនេះច្រើនឡើងៗ ព្រោះគេអាចយកវាមករៀបចំតុបតែងបាននៅគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ទម្រង់។ ដំណាំនេះបានរីកសាយភាយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា និងនៅប្រទេស ជាពិសេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុប អាមេរិក ជប៉ុន...។ ចំណុចល្អៗរបស់ដំណាំក្នុងអំបូរត្រាស៊ីណានេះមានដូចខាងក្រោម ៖

- មានភាពស្រស់ស្អាត ពណ៌សម្បុរ និងទ្រង់ទ្រាយស្លឹក ដើមមានច្រើនប្រភេទអាចជ្រើសរើសបាន
- មានប្រភេទ, ពូជឱ្យជ្រើសរើសបានច្រើន មានទាំងពួកត្រូវការពន្លឺថ្ងៃចាំងចំ និងមិនសូវត្រូវការពន្លឺថ្ងៃចាំងចំ
- មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសបានល្អ
- ប្រើជាប្រយោជន៍បានច្រើនយ៉ាង
- ងាយស្រួលក្នុងការពង្រីកពូជ
- មិនពិបាកក្នុងការដាំដុះ និងប្រតិបត្តិថែទាំ។

២ - ប្រភេទ និងពូជ

រុក្ខជាតិក្នុងអំបូរត្រាស៊ីណានេះមានមិនតិចជាង៤០ប្រភេទទេ តែបច្ចុប្បន្នការនិយមដាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍នោះ គឺមានត្រឹមតែ១០ប្រភេទប៉ុណ្ណោះ ហើយក្នុង១០ប្រភេទនេះ គឺមានតែ៣ទៅ៤ប្រភេទប៉ុណ្ណោះដែលគេដាំដុះសម្រាប់ធ្វើជំនួញ។

២.១ - វាសនា (Dracaena fragrans)

វាសនា ឬអ្នកខ្លះបានហៅថា នាគរាជ ជារុក្ខជាតិដែលមានដើមកំណើតនៅណែដីប (ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក) វាជាប្រភេទដែលបានជួបច្រើនបំផុត និងមានដើមធំជាងគេនៃអំបូរត្រាស៊ីណា។ ដើមមានកម្ពស់ពី៥ទៅ៦ម៉ែត្រ ដើមចាស់គ្មានស្លឹក ហើយមានពណ៌ប្រផេះទៅត្នោត។ ស្លឹកធំវែង ស្រួចចុងកោងចុះមកក្រោម មានពណ៌បៃតងខ្ចីទៅបៃតងចាស់។

វាសនា/នាគរាជ រីកចម្រើនធំធាត់បានល្អនៅលើដីស្ទើរគ្រប់ប្រភេទ វាត្រូវការទឹកច្រើន តែមិនចូលចិត្តទឹកដក់នៅនឹងគល់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេ។ ការរីកចម្រើនបានល្អនៅក្នុងម្លប់ល្ងម និងនៅកណ្តាលថ្ងៃ ទើបមានការនិយមដាំដំណាំលម្អក្នុងគេហដ្ឋាន និងក្នុងសួននៅបរិវេណជុំវិញផ្ទះ។ វាសនា/នាគរាជមានភាពស្រស់ស្អាតទាំងនៅក្នុងសភាពជាដើមទាល និងជាគុម្ព (ដើមជាគុម្ព កាត់យកត្រួយចេញ ហើយទុកឱ្យដុះចេញដើមថ្មី)។



វាសនា (*Dracaena fragrans*)

វាសនា/នាគរាជនៅមានពូជជាច្រើនទៀតដូចជា ៖

២.១.១ *D. fragrans massangeana* ៖

អ្នកខ្លះបានឱ្យឈ្មោះពូជនេះថា វាសនាអធិបាទ។ វាមានកិនភាគប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងវាសនាដែរ តែខុសប្លែកបន្តិចត្រង់ចំណុចស្លឹកមានឆ្នុតពណ៌លឿងមួយរត់តាមបណ្តោយស្លឹក តែរឹមស្លឹកសងខាមានពណ៌បៃតងធម្មតា។ ការលូតលាស់ និងការប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍ ក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងវាសនា/នាគរាជដែរ។



D. fragrans massangeana

២.១.២ D. fragrans lindenii ៖

មានឈ្មោះថា វាសនាស្ប៉ាយថង វាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីវាសនា តែប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងវាសនាអធិប៉ាន (Massangeana) តែខុសត្រង់ប្លែកពីពណ៌លឿងនៅចំកណ្តាលស្លឹក មកនៅតែមសងខាងស្លឹកវិញ រីឯនៅចំកណ្តាលស្លឹកមកជាពណ៌បៃតងវិញ។ ការរីកចម្រើនលូតលាស់ និងការប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ ដូចគ្នាជានឹងវាសនាអធិប៉ានដែរ។ ដោយសារស្លឹករបស់វា មានពណ៌លឿងច្រើន (ខ្វះជាតិក្លរ៉ូហ្វីល) ជាងពូជវាសនាអធិប៉ាន និងពូជវាសនា (Dracaena fragrans) នោះគេអាចយកវាដាំលក្ខណៈគេហដ្ឋានបានយ៉ាងល្អ។



D. fragrans lindenii



២.១.៣ D. fragrans victoriae ៖

ពូជនេះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត មានស្លឹកវែង និងកោងជាងពូជដ៏ទៃទៀត ជាយស្លឹកមានពណ៌លឿងស្រាលជាងពូជ lindenii និងទ្រនុងកណ្តាលមានពណ៌បៃតង។ ការដុះលូតលាស់ និងការប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ដូចគ្នាជានឹងវាសនាស្ប៉ាយថង (lindenii) តែស្លឹកមិនធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងបានទេ។



D. fragrans victoriae



២.២ វាសនាអធិដ្ឋាន (*Dracaena deremensis*)

ត្រាស៊ីណាក្នុងប្រភេទនេះ ស្រដៀងគ្នានឹងប្រភេទវាសនាដែរ។ មានអ្នកកសិកម្មខ្លះបានធ្វើការប្រៀបធៀប និងបានសាកល្បងរាងវាសនា និងប្រភេទនេះ។ លក្ខណៈដែលមានភាពខុសប្លែកពីវាសនាគឺមានជាងញឹក ស្រទប់ស្លឹកវែងវិញដើមច្រើន ស្លឹកតូច និងខ្លីជាងពួកវាសនា។



Dracaena deremensis



វាសនាអធិដ្ឋាននេះ មានដើមកំណើតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក ហើយបាននាំមកដាំដុះស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេស ទើបមានការក្លាយពូជមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

២.២.១ *D. deremensis warneckii*

អ្នកខ្លះគេនិយមហៅថាប្រាក់។ គេមិនចាត់ជាពូជដែលមានការនិយមខ្លាំងបំផុតនោះទេ លក្ខណៈដែលល្អនោះគឺថា នៅជាយស្លឹកមានជាសសៃពណ៌ស តែនៅរឹមស្លឹកនៅមានពណ៌បៃតងនៅឡើយ ចំណែកផ្សេងៗទៀតនៃស្លឹកអាចមានសសៃពណ៌សតូចៗស្ទើរពេញស្លឹក ដែលធ្វើឱ្យមានពណ៌ស្រស់ស្អាត។



D. deremensis warneckii



២.២.២ D. deremensis busei

ជាពូជមួយដែលមានភាពស្រស់ស្អាត ព្រោះស្លឹកវាមានពណ៌សឆ្លាស់គ្នាជាមួយនឹងពណ៌បៃតង (ត្រង់ ជាយ និងកណ្តាលស្លឹក)។ ខ្នាតរបស់ស្លឹកគឺខុសគ្នា ស្លឹកខ្លះមានពណ៌បៃតងច្រើន ហើយស្លឹកខ្លះ មានពណ៌ សច្ចើន ដោយភាគច្រើនរបស់ស្លឹកមានក្បូរហ្វូល ទើបពិបាកដាំក្រដាម បើត្រូវពន្លឺថ្ងៃចាំងចំ ស្លឹកអាចស្លោក តែ បើដាំនៅក្នុងម្លប់ គ្រាន់តែដាក់ឱ្យត្រូវពន្លឺខ្លះៗនោះ និងមានការស្រោចស្រពសមល្មម នោះវានឹងមានភាព ស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញ។



D. deremensis bausei

២.២.៣ D. deremensis compacta

ជាពូជដែលមានស្លឹកញឹកស្មើ មើលទៅហាក់ដូចជាស្លឹកដុះជាប់ៗគ្នា ស្លឹកមានពណ៌បៃតងចាស់។ ដោយការដាំដុះក្រដាម ទើបគេនិយមដាំដុះនៅក្នុងផ្ទាំងដាំដុះផ្ទាល់ដី។ ពួកនេះត្រូវការពន្លឺថ្ងៃតិច។



D. deremensis compacta

២.៣ ត្រាស៊ីណាមូល (*Dracaena marginata*)

ប្រភេទនេះ វាមានស្លឹកតូចវែង ស្រួចចុង ទើបបានជាគេហៅថា មូល នៅលើស្លឹកមានឆ្នុតក្រហមបី រត់តាមបណ្តោយនោះទើបគេហៅថា មូលបីពណ៌។ ការដាំដុះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅទីវាល ទើបពណ៌របស់ស្លឹក ស្រស់ស្អាត តែគេក៏អាចដាំវានៅក្នុងផ្ទះ ហើយយកមកតាំងលម្អនៅក្នុងគេហដ្ឋានបានម្តងម្កាលផងដែរ។



ត្រាស៊ីណាមូល (*Dracaena marginata*)

ត្រាស៊ីណាប្រភេទនេះ គឺមានពូជជាច្រើនដូចជា ពូជ Bicolor, Tricolor, Magenta, Sunset, Coloma និង Tigea។

២.៣.១ មូលមីពណ៌ (*D. marginata* Tricolor)

ដោយហេតុថា ពូជនេះមានស្លឹកស្រួចវែង និងមានពណ៌បីនៅតាមបណ្តោយស្លឹក គឺពណ៌ប្រហមនៅ ជាប់នឹងជ្វាស្លឹក បន្ទាប់មកគឺមានពណ៌លឿង ហើយនៅទ្រនុងកណ្តាលមានពណ៌បៃតង។ ការដាំដុះដាក់ ចំពង្រីច្នៃចាំងចំ នោះស្លឹកនឹងមានពណ៌ស្រស់ល្អណាស់ ទើបគេនិយមដាំនៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានដើម្បីលម្អ ក្នុងសួន។



មូលបីពណ៌ (*D. marginata* Tricolor)

២.៣.២ មូលបីពណ៌ចាស់ (D. marginata sunset)

ពូជមូលបីពណ៌ចាស់ (D. marginata Sunset) នេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពូជមូលបីពណ៌តែខុសគ្នាត្រង់ស្លឹកមានពណ៌ចាស់ជាងពូជមូលបីពណ៌ (D. marginata Tricolor) ។



មូលបីពណ៌ចាស់ (D. marginata sunset)

២.៤ រាសី ឬគួនអ៊ឹម (Draceana sanderiana)

ជាប្រភេទត្រាស៊ីណាខ្នាតតូច មានដើមកំណើតនៅប្រទេសកាំម៉ារូន និងកុងហ្គោក្នុងទ្វីបអាមេរិកកណ្តាល។ គេនិយមកាត់ដើមយកមកត្រាំក្នុងកែវ ឬថ្មីកអាចរក្សាសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាំងលម្អនៅលើតុ លើសាឡុង និងទីដ៏ទៃទៀតក្នុងគេហដ្ឋាន។ ត្រាស៊ីណាប្រភេទនេះ មានទម្រង់ដើមតូចទន់ អាចបត់បែនបានស្លឹកខ្លីរាងប៉ោងកណ្តាល ចុងស្លឹកស្រួច។



រាសី ឬគួនអ៊ឹម (Draceana sanderiana)

ប្រភេទរាស់ ឬគួនអ៊ីម (Draceana sanderiana) គេឃើញមានបីពូជដែលគេនិយមដាំដុះនោះគឺ ៖

២.៤.១ រាសីពណ៌លឿង (D. sanderiana Yellow) ៖

ពូជនេះមានស្លឹកពណ៌លឿង រាងប៉ោងកណ្តាល និងមានចុងស្រួច។



រាសីពណ៌លឿង (D. sanderiana Yellow)

២.៤.២ រាសីពណ៌មាស (D. sanderiana Gold)

ពូជនេះមានស្លឹកពណ៌មាស វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងរាសីពណ៌លឿង។ ស្លឹករាងប៉ោងកណ្តាល និងមានចុងស្រួច។



គួនអ៊ីម ឬរាសីពណ៌មាស (D. sanderiana Gold)

២.៤.៣ រាសីពណ៌ប្រាក់ (D. sanderiana Silver)

ពូជនេះស្លឹកមានឆ្នុតពណ៌សនៅអមសងស្លឹកពណ៌បៃតង។ វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងរាសីពណ៌លឿង និងពណ៌មាសដែរ។ ស្លឹករាងប៉ោងកណ្តាល និងមានចុងស្រួច។



រាសីពណ៌ប្រាក់ (D. sanderiana silver)

៣ កត្តារីកចម្រើនដំណាច់សម្រាប់ត្រាស៊ីណា

ដើម្បីឱ្យដំណាំផ្កាក្នុងអំបូរត្រាស៊ីណាដុះលូតលាស់ និងឆាប់ដុះបានល្អនោះ យើងគួរគប្បីត្រូវបំពេញតម្រូវការរបស់វាមួយចំនួនដូចខាងក្រោមគឺ ៖

៣.១ ជីជាតិ (Fertilization)

ទោះបីជាត្រាស៊ីណាមានច្រើនប្រភេទ និងច្រើនពូជយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់ការដុះលូតលាស់ និងដំណាច់របស់វា វាមិនជាសូត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនណាស់ណានោះទេ គឺពួកវាអាចដុះលូតលាស់នៅលើដីស្ទើរគ្រប់ប្រភេទ (ជៀសវាងដីជាំទឹក) តែចំពោះពួករាសី ឬគួនអ៊ឹម (Draceana sanderiana) វាអាចដុះលូតលាស់ដំណាច់ល្អទាំងនៅលើដី និងទាំងនៅក្នុងទឹក (កាត់យកដើមទៅត្រាំទឹកក្នុងថង់)។

ដីសមស្របសម្រាប់ការដាំដុះត្រាស៊ីណានៅក្នុងផ្ទះ គឺដីល្បាយល្បាប់ មានវត្ថុសរីរាង្គច្រើន ដែលគេហៅថាដីផ្សំ ដូចជាស្រកីដូង ស្មៅស្លឹក លាក់មកសត្វពុកផុយ ផេះអង្កាម ឬអាចលាយជីគីមី ១៥.១៥.១៥ ប្រមាណ១ទៅ២ស្លាបកាហ្វេក្នុង៨ផ្ទាំង។

៣.២ ទឹក (Water)

ត្រាស៊ីណាត្រូវការទឹកជាប្រចាំ តែមិនច្រើនទេ ភាពសើមក្នុងបរិយាកាស ក៏ជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការលូតលាស់របស់ត្រាស៊ីណាដែរ ប្រភេទខ្លះក៏មិនអាចធនទៅនឹងបរិយាកាសត្រជាក់ខ្លាំងបាន។ ការស្រោចស្រពគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃ លើកលែងតែថ្ងៃណាមានភ្លៀង គឺមិនចាំបាច់ស្រោចទេ។ ក្នុងករណីនៅលើស្លឹកមានសភាពកខ្វក់ យើងត្រូវយកទឹកមកលាងសម្អាតស្លឹកជាមួយនឹងអេប៉ុង ហើយស្រោចទឹកឱ្យចំស្លឹក។

៣.៣ ពន្លឺ (Light)

ត្រាស៊ីណាកាគច្រើនចូលចិត្តពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចំ រីឯពពួកខ្លះទៀតត្រូវការពន្លឺត្រឹមតែស្រមោល ដូចជាពពួករាសី។ ដូចនេះត្រាស៊ីណាប្រភេទនេះគួរត្រូវបានដាក់ជាំនៅក្នុងផ្ទាំង ហើយយកមកតាំងលម្អនៅ ក្នុងផ្ទះ។

៣.៤ សីតុណ្ហភាព (Temperature)

ដោយសារអំបូរនេះមានដើមកំណើតមកពីតំបន់ក្តៅ ហេតុនេះទើបស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ពួក វាអាចធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុក្តៅបានយ៉ាងល្អ។

ផ្កាចំប៉ីក្រហម (ADENIUM)

១ - សេចក្តីផ្តើម

ផ្កាចំប៉ីក្រហម (Adenium) គឺជាដំណាំមួយក្នុងចំណោមដំណាំល្អដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់លម្អតាមការនិយមបំផុតតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ជាពិសេសនៅប្រទេសក្នុងតំបន់ត្រូពិក។ ផ្កាចំប៉ីក្រហមត្រូវបានបង្កើត និងបានធ្វើការដាំដុះនៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាង៧០ឆ្នាំមកហើយ ហើយបានរីកសាយភាយមកដល់ប្រទេសយើងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។ ដោយសារតែភាពស្រស់ស្អាត និងភាពងាយស្រួលក្នុងការដាំដុះ រួមជាមួយនឹងការពង្រីកពូជបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ទើបពួកវាត្រូវបានគេដាំដុះធ្វើពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាការនាំចេញផងដែរ។ ផ្កាចំប៉ីក្រហមអាចចេញផ្កាបានស្ទើរតែគ្រប់ខែទាំងអស់ពេញមួយឆ្នាំ ជាពិសេសនៅក្នុងរដូវប្រាំង។ ពួកវាត្រូវបានគេដាំដុះនៅក្នុងដើងបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ឱ្យវាចេញផ្កាបានយ៉ាងស្អាតអស្ចារ្យរបស់ខ្លួន ព្រោះពួកវាជាប្រភេទដើមហើម (Swollen stem)។ ផ្កាចំប៉ីក្រហម ជាផ្កាមានពណ៌ចម្រុះ គឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការបង្កាត់ពូជពី៧ទៅ៩ពូជនៅលើដើម។

ទីផ្សារសម្រាប់ផ្កាចំប៉ីក្រហមពូជបង្កាត់នេះ មានវិសាលភាពធំ បើសិនជាមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រកបដោយគុណភាពអាចត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ នោះអតិថិជនគឺទទួលបានដំណាំនេះយកទៅប្រើប្រាស់ក៏ពេញចិត្តផងដែរ។ ទីផ្សារនៃដំណាំនេះ គឺមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ូណ្ណេនទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុបទៀតផង។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៃដំណាំនេះ មានទស្សនៈជាច្រើនថា ប្រសិនបើផ្កានេះដាំដុះទៅហើយ មានផ្កាច្រើននោះគឺជាក្លែងតិរិះ "សំណាង" គឺសំណាងល្អ ជាពិសេសសម្រាប់ផ្កាដែលមានពណ៌ក្រហម មានការពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិចិន។ ផ្កាចំប៉ីក្រហមលូតលាស់ល្អនៅក្នុងដើង ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពេញលេញ ត្រូវបានដាក់លក់ ឬជាអំណោយ និងជាការទាក់ទាញសំណាងល្អដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

២ - ប្រភពដើម និងចែកចាយ (Origin and distribution)

ផ្កាចំប៉ីក្រហម គឺជាអំបូរមួយដែលគួរឱ្យចង់គយគន់ គឺដោយសារសម្រស់ដ៏អស្ចារ្យរបស់វា។ ផ្កានេះមានប្រភពកំណើតមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូង និងប្រទេសអាហ្វ្រិក។ ដោយសារតែប្រជាប្រិយភាព និងភាពងាយស្រួលនៃការដាំដុះរបស់ពួកវានេះហើយ ទើបផ្កាចំប៉ីក្រហមត្រូវបានគេណែនាំឱ្យបានស្គាល់ ចែកចាយប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ត្រូពិក និងនៅតំបន់ទាំងអស់នៃពិភពលោក រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ។

៣ - ប្រភេទផ្កាចំប៉ីក្រហម និងការរីកចម្រើន

មិនមានការកត់ត្រាណាមួយឱ្យបានច្បាស់លាស់ នៅពេលដែលផ្កាចំប៉ីក្រហមនេះត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានគេដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសយើងនោះទេ។ តែគេដឹងថា ផ្កានេះវាត្រូវបានរាជវង្សនៃប្រទេសថៃបាននាំយកពូជ Adeniums obesum ជាលើកដំបូងក្នុងរង្វង់ពេលប្រហែល៧០ឆ្នាំកន្លងមកហើយ។ ដោយសារតែភាពងាយស្រួលក្នុងការដាំដុះ ផ្កានេះត្រូវបានរីកលូតលាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសួនច្បារដោយដាំដុះនៅក្នុងដើង។ ពួកវាមានផ្កាស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ ជាពិសេសនៅក្នុងរដូវប្រាំង។ មិនច្រើនជាង១០ឆ្នាំមកនេះ ពួកវាត្រូវបានគេណែនាំបន្ថែមទៀតនៃពូជបង្កាត់ជាច្រើនពីបណ្តាប្រទេសជាច្រើនដែលនិយមប្រើ

ប្រាស់វា។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ការដាំដុះផ្កាចំប៉ីក្រហមនេះបានក្លាយជាការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងក្នុង ចំណោមប្រជាជនថៃ។ គេបានចេះអំពីរបៀបនៃការពង្រីកពូជរបស់ពួកវាបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ពួកគេជាអ្នក គ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសជំនាញក្នុងការបង្កាត់ពូជ ដើម្បីផលិតកូនកាត់ថ្មីមួយដែលសមរម្យសម្រាប់ទីផ្សារ។ ការ រៀបចំតាំងពិពណ៌ និងការប្រកួតប្រជែងនៃផ្កាចំប៉ីក្រហម ត្រូវបានរៀបចំដោយមានឈ្មោះថា វេទិកានៃផ្កាចំ ក្រហមនៅក្នុងប្រទេសថៃ។

៤ - ប្រភេទនៃផ្កាចំប៉ីក្រហម (Adenium Species)

ផ្កាចំប៉ីក្រហមរួមមានប្រាំបួនប្រភេទនៃប្រភេទផ្កាចំប៉ីក្រហមនេះ។ ពួកវាត្រូវបានគេពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម ៖

៤.១ - Adenium arabicum

ជាប្រភេទដំណាំដែលងាយផ្តល់ផលហើយអាចដុះលូតលាស់នៅកន្លែងស្ងួតសោះក្រោះ និងនៅក្នុង កន្លែងសើម។ វាមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ៤ម៉ែត្រ។ ស្លឹកមានទំហំធំ និងមានភាពងាយស្រួលថែទាំនៅពេលធំ។ ផ្កានេះវាមានផ្កាច្រើននៅក្នុងទំហំពី៤-៨សង់ទីម៉ែត្រ នៅពេលធំពេញវ័យ។ ស្រទាប់ផ្កា គឺមានពណ៌ផ្កាឈូកភ្លឺ ឆ្ពោះទៅរកបំពង់កេសដែលមានក្រពេញទឹកដមមួយក្នុងស្រទាប់ផ្កា។



Adenium arabicum

៤.២ - Adenium boehmianum

ជារុក្ខជាតិដែលមានដើមឈរត្រង់ ជាប្រភេទចូលព្រឹក្សដែលមានបែកមែកសាខា និងអាចមានកម្ពស់ ដល់ទៅ៩ម៉ែត្រនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា។ ចំប៉ីក្រហមប្រភេទនេះវាមានស្លឹកធំ និងប្រវែងបណ្តោយស្លឹកវែង។ ផ្កាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រភេទ Adenium swazicum ប៉ុន្តែជាធម្មតាវាមានទំហំតូចជាង។



Adenium boehmianum

៤.៣ - Adenium crispum

រុក្ខជាតិនេះ គឺជាប្រភេទដើមភ្លើង។ ស្លឹកតូច ស្រួយ នៅតាមរឹមស្លឹកមានជាតិក្រមួន។ ផ្កាមានរាងជាបំពង់វែងធំ ហើយរាវតូចចុះមកក្រោម មានពណ៌ពីសទៅផ្កាឈូកស្រាល។ តែមត្របកផ្កាខាងចុងមានសភាពរួញពីលើចុះមកក្រោម។



Adenium crispum

៤.៤ - Adenium multiflorum

រុក្ខជាតិនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Sabi Star, គឺខ្ពស់ជាចូលព្រឹកដែលមានមែកច្រើន។ ស្លឹកមានទំហំធំទូលាយ។ ផ្កាមានច្រើនខណៈពេលដែលអវត្តមានស្លឹក។ ស្រទាប់ផ្កាមានពណ៌សនៅកណ្តាល និងនៅដោយជុំវិញមានមានពណ៌ក្រហមយ៉ាងខ្លាំង។ ប្លោកលំអង (anther) ស្មើ ឬលើសពីត្របកផ្កា។ អង្កត់ផ្ចិតផ្កាមានប្រវែងពី៦-៧សង់ទីម៉ែត្រ។ ស្រទាប់ផ្កាគឺមានចំណុចច្រើនដូចគ្នាទៅនឹង Adenium obesum។



Adenium multiflorum

៤.៥ - *Adenium obesum*

រុក្ខជាតិនេះត្រូវបានគេស្គាល់ និងប្រសិទ្ធនាមឱ្យផងដែរថា វាលខ្សាច់ក្រហម (Desert Rose) ពួកវាគឺជាចូល្លព្រឹកសម្រាប់លម្អ ។ *Adenium obesum* មានបែកមែកច្រើនស្រួចឡើងលើ និងរឹងមាំ។ ស្លឹកចាប់ពីតូចទៅធំទូលាយមានពណ៌ពីបៃតងខ្ចីទៅបៃតងចាស់។ ផ្កាមានពណ៌ផ្កាឈូកស្រាលទៅក្រហមជាំ។



Adenium obesum

៤.៦ - *Adenium oleifolium*

ដំណាំនៅក្នុងពួកនេះគឺមានលក្ខណៈតូច, ការដុះលូតលាស់យឺត, ទាំងដើម និងឫសដុះលូតលាស់តែនៅជិតៗនៃផ្ទៃដីខាងលើ។ តាមការកត់សម្គាល់បានឱ្យដឹងថា ដើមមិនត្រូវបានដុះខ្ពស់ជាង៦០សង់ទីម៉ែត្រ

ឡើយ។ ស្លឹកវែង តូច រមួលទៅចំហៀង។ ផ្កាតូច, មានអង្កត់ផ្ចិតពី២-៣សង់ទីម៉ែត្ររាងវែងចុះមកក្រោម។ ស្រទាប់ផ្កាមានពណ៌ផ្កាឈូក។



Adenium oleifolium

៤.៧-Adenium socotranum

Adenium socotranum គឺជាអំបូរមួយធំជាងគេដើមមានទ្រង់ទ្រាយជាសាជី ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់រាប់ម៉ែត្រ។ ស្លឹកគឺមានប្រវែង១២សង់ទីម៉ែត្រ និងទទឹងប្រវែង៤សង់ទីម៉ែត្រស្រួចទៅចុង ហើយមានពណ៌បៃតងចាស់។ ផ្កាមានពណ៌ផ្កាឈូកស្រស់ មានអង្កត់ផ្ចិតពី១០-១៣សង់ទីម៉ែត្រ។



Adenium socotranum

៤.៨ - Adenium somalense

ពួកវាគឺជាប្រភេទដើមតូច ដែលមានកម្ពស់ដល់ទៅ៥ម៉ែត្រ មានបែកមែកសាខា។ ផ្កានៅលើមែក គឺមានភាពស្លើង និងរីកសាយមិនងាយផ្ទុះ។ ស្លឹកមានប្រវែង៥-១០សង់ទីម៉ែត្រ ហើយទទឹងពី២ទៅ៣សង់ទី ម៉ែត្រដែលមានពណ៌បៃតងខ្ចី ហើយមានសរសៃវែនពណ៌ស។ ផ្កាគឺមានទំហំតូចជាងពួក *Adenium obesum* ជាធម្មតាមានអង្កត់ផ្ចិតតូចជាង៥ស.មស្រទាប់ផ្កាស្រួចចុង ហើយមានលយចេញមកនូវកែសញ្ជីមកក្រៅ។



Adenium somalense

៤.៩-Adenium swazicum

ពួកនេះគឺជារុក្ខជាតិចូល្លព្រឹក ការដុះលូតលាស់យឺត និងមានមែកសាខាជាង *Adenium obesum* និង *Adenium multiflorum* ។ ដើមនៅពេលធំមានឫស និងគល់ប៉ោងយ៉ាងធំ។ ស្លឹកវែង និងតូចស្រួចចុងមាន ពណ៌បៃតងស្រស់។ ស្រទាប់ផ្កាមានលក្ខណៈធំទូលាយ មានពណ៌ជាងកសណ្ឋានតែមួយនៅលើផ្កាមួយ។ អង្កត់ផ្ចិតផ្កាមានពី៦-៧សង់ទីម៉ែត្រ។ ទងលំអងកេសគឺខ្លី ផ្កាមានពណ៌ផ្កាឈូក។



Adenium swazicum

៥ - តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យផ្កាចំប៉ីក្រហមមានភាពអស្ចារ្យនោះ ?

មូលហេតុដែលនាំឱ្យផ្កាចំប៉ីក្រហមមានភាពអស្ចារ្យនោះ គឺមានដូចខាងក្រោម ៖

- ជាប្រភេទដំណាំដែលមានអាយុកាលតាំងពីយូរយាមកហើយ (An Old-time Plant)

ផ្កាចំប៉ីក្រហមត្រូវបាននាំយកមកកាន់ប្រទេសថៃ និងកម្ពុជាជាយូរមកហើយ ពួកវាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកដាំដំណាំផ្កាចំប៉ីក្រហមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចេះដាំដុះកាន់តែកើនឡើងៗ។ ផ្កាចំប៉ីក្រហម ជាប្រភេទផ្កាដែលមានសក្តានុពលអាចដុះលូតលាស់ល្អនៅក្នុងដីសម្រាប់ការលក់ដូរ និងសម្រាប់ការការតុបតែងលម្អទេសភាពនានា។

- លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុសមរម្យ (Suitable Climatic Condition)

ប្រទេសកម្ពុជាយើង មានលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុសមស្របសម្រាប់ការរីកលូតលាស់នៃផ្កាចំប៉ីក្រហម ហេតុដូច្នេះនេះគេបានបង្កើនការដាំដុះសម្រាប់ធ្វើផលិតកម្មប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាសម្រាប់ទីផ្សារនាំចេញក្នុងទិសដៅបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងជាតិ។

៦ - ការស្រោចស្រព

ការស្រោចទឹកទៅលើដំណាំនេះ គឺតម្រូវឱ្យស្រោចតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីរក្សាសំណើមដី ហើយការស្រោចទឹកនេះទៀតសោធន៍ គឺគ្រាន់តែដើម្បីរក្សាដីនេះកុំឱ្យស្ងួតហួតហែងតែប៉ុណ្ណោះ។ ការស្រោចទឹកត្រូវធ្វើនៅពេលព្រឹករៀងរាល់ពីរទៅបីថ្ងៃម្តង។ ដំណាំប្រភេទធំតម្រូវឱ្យមានការទឹកជាញឹកញាប់ តែតិចតួច។ ចំពោះដើមណាដែលកំពុងចេញផ្កា ការស្រោចទឹកគឺចាក់ឱ្យចំគល់ មិនត្រូវស្រោចពីលើឱ្យចំផ្កានោះទេ ព្រោះធ្វើឱ្យផ្ការីកមិនបានយូរ។

៧ - ការប្រើប្រាស់ដី

ដំណាំផ្កាចំប៉ីក្រហមនៅតូច ត្រូវអនុវត្តប្រើដីតាមកម្រិតណែនាំ១៥-៥-៥ ឬ១៥-១៥-១៥ នៅរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តង។ សម្រាប់នៅពេលធំមានចេញផ្កា គឺត្រូវអនុវត្តការប្រើដីតាមកម្រិតណែនាំ៨-២៤-២៤។ ការប្រើប្រាស់ដី គឺត្រូវយកដីកូរលាយជាមួយទឹកជាមុនឱ្យដ៏រលាយជាស្រួលស្បែក ទឹកស្រោចឱ្យចំគល់។

ដំណាំផ្កា អំគីដេ (ORCHID PLANT)

១ - ប្រវត្តិ និងស្ថានភាពទូទៅ

អំគីដេស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដ៏ធំក្នុងចំណោមគ្រួសារមួយនៃរុក្ខជាតិមានផ្កា។ ជារួមអំគីដេមានជាង ៦០០០ ពូជ។ នៅក្នុងធម្មជាតិអំគីដេមានប្រហែល ២០០០ ពូជ។ ទំនាក់ទំនងរវាងអំគីដេនឹងមនុស្សបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ ១៧០០ និងដើមឆ្នាំ ១៨០០។

ការដាំដុះដំណាំផ្កាអំគីដេ និងការធ្វើជំនួញយ៉ាងខ្លាំង គឺនៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩២០ ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានដាំដុះសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម។

១.១ - ប្រវត្តិ និងស្ថានភាពផ្កាអំគីដេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងអំពីការបរិច្ឆេទជាក់លាក់ អំពីការដាំដុះជាលើកដំបូងនៃផ្កាអំគីដេនៅក្នុងប្រទេសយើងនោះទេ ប៉ុន្តែតាមការសង្កេតកន្លងកម ដំណាំនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានគេចាប់ផ្តើមដាំតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ តាមរយៈមិត្តភក្តិដែលជាជនជាតិភូមា បានចែកជូនបងប្អូនយើងនៅតំបន់ប៉ៃលិនដាំដុះ។ ពួកគេដាំផ្កាអំគីដេតាមលក្ខណៈជាសាប្រូហ្វីត (Saprophyte) នៅក្នុងបរិយាកាសព្រៃឈើ ដោយចង់ភ្ជាប់វាទៅនឹងមែកឈើក្នុងសួនច្បារ។ ផ្កាអំគីដេក្នុងប្រទេសយើង ទើបតែត្រូវបានទទួលការនិយាយខ្លាំងក្នុងទស្សវត្តទី ៦០ គឺក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមតែប៉ុណ្ណោះ។

១.២ - សារៈប្រយោជន៍

ផ្កាអំគីដេមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ពីរគឺ សារៈប្រយោជន៍ខាងតុងតែងលម្អ និងសារៈប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។ ព្រោះថា ក្នុងពេលមានពិធីធំដុំអ្វីមួយ ដូចជាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសស្រី គេតែងឃើញមានការប្រើប្រាស់ផ្កានេះជាដរាបសម្រាប់លើកមុខមាត់ លើករាសីនៃម្ចាស់កម្មវិធីដូចជាអ្នកដែលបានមកចូលរួម។ ក្រៅពីមានតម្លៃខាងផ្នែកតុងតែងលម្អ ផ្កាអំគីដេក៏នៅមានតម្លៃខាងមុខជំនួញជួញដូរដែលអាចរកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរ។

២ - លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ

២.១ - ឫស

ដំណាំផ្កាអំគីដេ ជារុក្ខជាតិដែលមិនមានឫសកែវទេ គឺមានតែឫសស្វែរ ឬឫសអាកាសតែប៉ុណ្ណោះ។ ឫសទាំងនេះវាពុំទូតាមដើមឈើ បង្គោលឈើ ឬមានតួនាទីពង្រឹងដើម និងស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមមកចិញ្ចឹមដងដើមរបស់វា។

២.២ - ដើម

ដើមមានលក្ខណៈខ្លាំង មានសណ្ឋានដូចជាដើមឫស្សី។ នៅលើដើមមានថ្នាំង និងចន្លោះថ្នាំង ហើយនៅតាមថ្នាំងនីមួយៗមានដុះនូវស្លឹក និងផ្កា។

ដើមអំគីដេចែកជា ៖

- ដើមមានលក្ខណៈធម្មតា (Monopodial) ៖ ដើមប្រភេទនេះតួដើមមានលក្ខណៈធម្មតា មានខ្លែង និងថ្នាំងនៅផ្នែកខាងលើនៃថ្នាំងមានពន្លកក្អែក។

- ដើមមានលក្ខណៈមិនធម្មតា (Sympodial)៖ ជាប្រភេទដើម ដែលមានតួដើមប្តូរសភាព (មានភាពខុសប្លែកពីធម្មតា) តួដើមរបស់ប្រភេទនេះគឺស្ថិតនៅរាបនឹងដី ឬដុះជាប់នឹងឧបករណ៍ដាំ ដោយខ្លែង និងថ្នាំងគឺមានក្លៀង (Rhizome) ដែលបំបែកខ្លែងឆាងជារយោងៗ។ ខ្លែង និងថ្នាំងរីកចម្រើនទៅតាមជួរជេក ឬបណ្តោយ។

២.៣ - ស្លឹក

ស្លឹកអំគីដេមានសសៃទ្រនុងតាមបណ្តោយស្លឹក។ ស្លឹកប្រភេទខ្លះមានរាងជាស៊ីឡាំង សណ្ឋានដូចស្លឹកឬស្សី ឬស្លឹកផ្កាចន្ទ ប្រភេទខ្លះទៀតមានស្លឹកសំប៉ែតវែង ដែលមានមុខកាត់រាងដូចអក្សរវេ (V)។

២.៤ - ផ្កា

ផ្កាអំគីដេជាផ្ការួមភេទ គឺកេសសឈ្មោល និងកេសសញីស្ថិតនៅលើទងទម្រផ្កាតែមួយ។ ស្រទាប់ផ្កានៅផ្នែកលើនៃសំបកស៊ីត។ លក្ខណៈផ្ការបៀបនេះមានឈ្មោះថា Epigenous flower ស្រទាប់ផ្កាក្រៅក្នុងមាត់កេស និងចំណែកផ្សេងៗទៀតនៅលើកេសទាំងអស់។



២.៥ - ផ្លែ

អំគីដេមានគ្រាប់ក្នុងផ្លែដូចជារុក្ខជាតិដ៏ទៃទៀតដែរ ដែលកើតមកពីការបង្កាត់ពូជនៃកេសសទាំងពីរ អាយុរបស់ផ្លែមានភាពខុសគ្នាតាមប្រភេទនីមួយៗ។ អំគីដេប្រភេទខ្លះអាចនឹងទុំក្នុងរយៈពេលតែមួយខែ និងប្រភេទខ្លះ គឺរហូតដល់ទៅមួយឆ្នាំ។ ក្នុងមួយផ្លែមានគ្រាប់រហូតដល់ទៅ១០០០០ទៅ១០០០០០ គ្រាប់។

៣ - លក្ខណៈអាកាសធាតុ

៣.១ - សីតុណ្ហភាព (Temperature)

សីតុណ្ហភាព ជាកត្តាមួយសំខាន់ និងចាំបាច់សម្រាប់រុក្ខជាតិក្នុងបាតុភូតរស្មីសំយោគ និងដំណកដង្ហើម។ ការដកដង្ហើម និងការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិមានល្បឿនលឿន និងយឺតពេលមានសីតុណ្ហភាពទាប។ អ័រគីដេប្រភេទខ្លះត្រូវការសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ទើបចេញផ្កា។ សីតុណ្ហភាពជួយឱ្យក្នុងការធ្វើបដិវិវាទផ្នែកគីមីខាងក្នុងរាងកាយរបស់វា ដូចជាការបង្កើតអង្គធាតុស្ករ ការបឺតអាហារ និងការបង្កើតផ្នែកផ្សេងៗរបស់សរីរាង្គ។ សរុបសេចក្តីមក ផ្កាអ័រគីដេគឺអាស្រ័យទៅលើសីតុណ្ហភាពសមស្របមួយសម្រាប់ការដុះលូតលាស់ និងឱ្យវាចេញផ្កាបានល្អ។

៣.២ - សំណើម (Humidity)

សំណើមដែលផ្កាអ័រគីដេត្រូវការសម្រាប់ការដុះលូតលាស់ មានដូចជាសំណើមក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបរិយាកាសជុំវិញដើមផ្កាអ័រគីដេ និងសំណើមរបស់គ្រឿងដាំ។ ប្រសិនបើរោងដាំមានសំណើមខ្ពស់ នោះវាអនុគ្រោះដល់ការដុះលូតលាស់ និងការចេញផ្កា។

៣.៣ - ខ្យល់ (Wind)

ខ្យល់ជាប្រភពនៃឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសាយ (CO_2) ដែលជាសារធាតុចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើរស្មីសំយោគ និងជាប្រភពផ្តល់អុកស៊ីសែនដែលជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់រុក្ខជាតិដកដង្ហើម និងសត្វមានជីវិត។ នៅក្នុងតំបន់ត្រូពិកកម្រិតកាបូនឌីអុកសាយ និងអុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្យល់អាកាស និងក្នុងរោងផ្កាអ័រគីដេមានបរិមាណជាធម្មតាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដុះលូតលាស់ ដូចនេះយើងមិនត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើសមភាពនៃខ្យល់អាកាសនោះទេ។

៣.៤ - ពន្លឺ (Light)

ពន្លឺជាប្រភពនៃថាពល ដែលផ្កាអ័រគីដេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើរស្មីសំយោគ។ ផ្កាអ័រគីដេនីមួយៗត្រូវការបរិមាណពន្លឺផ្សេងៗពីគ្នា។ ប្រភពពន្លឺខ្លាំង ធ្វើឱ្យផ្កាមានពណ៌លឿង ជួនកាលស្លឹកព្យាបាត ឬខ្លោចក៏មាន។ តែបើពន្លឺមានកម្រិតទាបពេកនោះ វាធ្វើឱ្យស្លឹកមានពណ៌លឿងចាស់ ហើយនឹងដុះលូតលាស់ហួសប្រមាណ។

៣.៥ - ទឹក (Water)

ផ្កាអ័រគីដេជាប្រភេទ Epiphytic មិនត្រូវការទឹកច្រើនពេកទេ ជួនកាលចាប់ផ្តើមសម្លាប់ផ្កាអ័រគីដេដោយការផ្តល់ទឹកច្រើនហួសកម្រិត។ ដូច្នេះត្រូវមានការសង្កេតមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្តល់ទឹកទៅលើផ្កាអ័រគីដេឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ផ្កាអ័រគីដេប្រភេទខ្លះ មិនត្រូវបានគេស្រោចទឹកទាល់តែសោះ គឺនៅរដូវប្រាំងគេចាក់ទឹកនៅលើផ្ទៃដីក្នុងរោងផ្កា ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានសំណើម នោះគឺសមល្មមសម្រាប់វាហើយ។

៣.៦ - ជីជាតិ (Fertilizer)

តាំងតែពីដើមរាងមកគេបាននិយាយតៗគ្នាថា ផ្កាអ័រគីដេរស់នៅអាស្រ័យដោយការតោងទៅនឹងដើមឈើ វាមិនត្រូវការអាហារ (ជី) ឡើយ គឺវាត្រូវបានស្រង់ស្រូបអាហារពីក្នុងបរិយាកាសល្មមគ្រប់គ្រាន់បាន។ មិននឹកស្មានថា កាលដែលផ្កាអ័រគីដេតោងនៅតាមដើមឈើនោះ ពេលសំបកឈើពុកផុយ ឬក៏កំទេចឈើ

ពុក ហើយធ្លាក់ចុះតាមទឹកនឹងបានជាដីម្យ៉ាងសម្រាប់អំគីដេ។ ក្រោយពីបានឃើញនូវហេតុការណ៍នេះ គេបានចាប់ផ្តើមដាក់ដីឱ្យផ្កាអំគីដេតាមតែចិត្តនឹកឃើញ ដើម្បីធានាដល់ការលូតលាស់របស់វា។

តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ផ្កាអំគីដេត្រូវការជាចាំបាច់នូវធាតុចំនួន១០ដូចជា C, H, O, N, P, K, Ca, Fe, Mg, S ចំពោះអាហារធាតុផ្សេងទៀតដូចជា B និង Mo អាចមានវត្តមានក្នុងដីសមាសគ្រប់គ្រាន់ហើយ។

ដីដែលប្រើ ហើយឱ្យត្រូវនឹងផ្កាអំគីដេសម្រាប់ការដុះលូតលាស់ដងដើម និងការចេញផ្កា គឺជាដីប្រភេទទឹក ឬដីដែលប្រើលាយជាមួយទឹកមានដូចខាងក្រោម ៖

- ដីប៉ូតាស្យូមនីត្រាត (KNO_3) បរិមាណ២០០ក្រាម
- ដីម៉ាញ៉េស្យូមសុលផាត ($MgSO_4$) បរិមាណ៥០ក្រាម
- ដីអាម៉ូនីញ៉ូមសុលផាត (NH_4) SO_4 បរិមាណ៧៥ក្រាម
- ដីអ៊ុយរ៉េ (៤៦.០.០) បរិមាណ២៥ក្រាម
- ដីហ្សូស្ទ្រិកអាស៊ីត បរិមាណ១២ CC។

ដីទាំងអស់នេះយើងត្រូវយកវាដាក់ទៅក្នុងធុង ហើយលាយទឹកចំនួន១០លីត្រ ក្នុងប្រមាណ៥នាទី ទុកចោលមួយថ្ងៃ ស្តែកឡើងក្នុងទៀត រួចហើយទុកវាឱ្យរងល្អ ដើម្បីដងយកទឹកថ្លាផ្នែកខាងលើមកប្រើប្រាស់ចំណែកកាកដែលកកនៅខាងក្រោមបាតធុង យើងអាចយកមកដាក់តាមគល់ឈើហូបផ្លែបានជាប្រយោជន៍។

ការប្រើដីទឹកដែលបានផ្សំរួចដូចបានរៀបរាប់មកពីខាងលើ គឺយើងយកប្រមាណ១០CC មកលាយជាមួយទឹក១០លីត្របន្តទៀត ឬ២០CC ដាក់ទឹកមួយប៉ោត ក្នុងសព្វរួចបាញ់ទៅលើដើម និងឫសតែម្តង គឺធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹក។

៤ - អំបូរផ្សេងៗរបស់អំគីដេ

៤.១ - អំបូរ DENDROBIUM

អំបូរ DENDROBIUM ជាអំបូរមួយធំជាងគេបំផុតដែលមានរូបរាង លក្ខណៈផ្កា ស្លឹក តួក្នុងខុសៗគ្នា ដាច់ចេញពីគ្នាយ៉ាងឆ្ងាយ។ ផ្កាអំគីដេអំបូរធំៗដែលមានដើម និងស្លឹកខុសៗគ្នាច្រើនយ៉ាង រមែងច្របូកប្របល់គ្នាជាមួយអំបូរដ៏ទៃទៀតដែលមានរូបរាងស្រដៀងគ្នា។ អំបូរ DENDROBIUM មានប្រមាណ១០០០ ប្រភេទ ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងកសិកម្មបានបែងចែកអំបូរ DENDROBIUM ចេញជា២០ប្រភេទទៀត។



៤.២ - អំបូរ CATTLEYA

អំគីដេក្នុងអំបូរនេះ មានដើមកំណើតនៅម្តុំតំបន់ក្តៅនៃទ្វីបអាមេរិក។ ក្នុងអំបូរជាមួយគ្នានេះ គេចាត់ទុកវាជាផ្កាអំគីដេក្នុងអំបូរខ្នាតធំ ហើយស្អាតបំផុត។ ផ្ការបស់វាមានសម្រស់ស្រស់ឆើតឆាយ មានច្រើនពណ៌ ដូចជាពណ៌ទឹកក្រូច ពណ៌កូលាប ពណ៌ត្របែកព្រៃ...។

យោងតាមការនិយមចូលចិត្ត វាជាផ្កាដែលមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ការកាត់ផ្កាមកទៅប្រើប្រាស់។ ផ្កាអំគីដេក្នុងអំបូរនេះមានរូបរាងផ្សេងៗគ្នា ខ្លះវែងតូចមានសន្លឹកនៅជាប់នឹងដើមច្រើន ខ្លះទៀតខ្លីធំ ហើយមានស្លឹកនៅជាប់ត្រឹមតែមួយ ឬពីរសន្លឹកប៉ុណ្ណោះ។ ស្លឹកមូលទម្រង់ជាស៊ីឡាំង ជួនកាលមាន ឬអត់មានធាង ឯត្រួយមានចេញផ្កាទោល ឬចេញផ្កាជាកញ្ចុំ។ ស្រទាប់ផ្កាក្នុងចង្អៀត ឬស្រទាប់ផ្កាខាងក្រៅទូលាយមានខ្នាតធំជាងផ្កាដីទេ។ បណ្តាលកេសរបស់ផ្កាវែងៗ ទ្រកេសឈ្មោលដែលមានទងលម្អង៤ទៅ៨។



CATTLEYA

៤.៣ - អំបូរ VANDA

ផ្កាអំគីដេក្នុងអំបូរនេះ មានកញ្ចុំផ្កាបញ្ឈរទៅលើ ឬបញ្ឈរត្រង់ ផ្កាបញ្ឈររីកធំ ស្រទាប់ផ្កាថ្នាក់ៗ(ជាន់) ក្រៅ និងថ្នាក់ក្នុង មានខ្នាតប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ផ្ទាំងស្រទាប់ផ្កាធំ នៅគល់ស្រទាប់មាត់ផ្កាមានខ្លាយខ្លីៗ។ គេជួបប្រទះនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិប្រមាណ៤០ប្រភេទ ដែលពង្រីកពូជនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីតាំងពីប្រទេសឥណ្ឌា សិង្ហបុរី លីវ៉ង់កា ភូមា ថៃ ឥណ្ឌូណេស៊ីរហូតដល់ហ្វីលីពីន។ អំបូរ **VANDA** ចាត់ទុកថា ជាដើមគំរូរបស់ផ្កាអំគីដេដែលមានការរីកចម្រើនធំធេងយ៉ាងរហ័ស។ **VANDA** ត្រូវបានបែងចែកអាស្រ័យលើលក្ខណៈរូបរាងរបស់ស្លឹកដូចខាងក្រោម ៖

- **VANDA** ស្លឹកមូល ៖ មានស្លឹកមូលវែងរាងជាស៊ីឡាំង ដើមខ្ពស់ មានថ្នាំងវែង មានផ្កាជាកញ្ចុំ។ កន្សោមផ្កាមានពីរ ឬបីប៉ុណ្ណោះ ពេលផ្កាខាងចុងទងរីកបន្ថែមឡើង ផ្កាខាងគល់ទងនឹងរោយ ដូច្នេះការកាត់ផ្កាយកមកប្រើប្រាស់ គេនិយមប្រឡេះច្រើនជាងកាត់ផ្កាទាំងទង។

- **VANDA** ស្លឹកសំប៉ែត ៖ មានស្លឹករាងសំប៉ែត ប្រសិនបើជាគេកាត់វាយកមកមើលមុខកាត់ គេនឹងឃើញស្លឹករាងជាអក្សរវេ (V)។ ដើមមានថ្នាំងញឹក ស្លឹកត្រួតជិតគ្នា ចុងស្លឹកកោងចុះហើយឆែក។

- **VANDA** ស្លឹកជ្រុង ៖ មានទម្រង់ស្លឹក និងតួដើមពាក់កណ្តាលនឹង **VANDA** ស្លឹកមូល ពាក់កណ្តាល។ **VANDA** ស្លឹកសំប៉ែត គេច្រើនជួបប្រទះនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិ។

- **VANDA** ស្លឹកអង្ករ ៖ មានទម្រង់ស្លឹក និងតួដើមស្រដៀងគ្នានឹង **VANDA** ស្លឹកសំប៉ែតច្រើនជាង **VANDA** ស្លឹកមូល។ មិនដែលឃើញមានជួបក្នុងព្រៃធម្មជាតិទេ គេដាំវាជាបន្តៗជាកូនកាត់ (បង្កាត់ដោយមនុស្ស) ដោយយក **VANDA** ស្លឹកជ្រុង បង្កាត់ជាមួយ **VANDA** ស្លឹកសំប៉ែត។



៤.៤ - ទំនួរ PAPHIOPEDILUM ឬ CYPRIPEDIUM

ផ្កាអំគីដេក្នុងអំបូរនេះ បែកគុម្ពដូចគ្នានឹងអំបូរ Dendrobium, Cattleya និង Cymbidium។ ពន្លកថ្មីដុះចេញពីគល់នៃដើមចាស់។ តួដើមខ្លីមានស្លឹកវែងបញ្ឈរត្រង់ឡើង ស្លឹកមានក្រឡា តែប្រភេទខ្លះមានស្លឹកពណ៌ខៀវរាបស្មើមិនមានក្រឡាទេ។ ឫសចេញជាកញ្ចុំនៅគល់ដើម ផ្កាចេញនៅខាងចុងត្រួយ។ ទងតែមួយហើយបែកជាកញ្ចុំ ស្រទាប់ផ្កានៅផ្នែកខាងលើធំ។

ផ្កាអំគីដេអំបូរនេះ ភាគច្រើនជាពពួកដុះឡើងតាមផ្ទៃដី ឬប្រវែកថ្មដែលមានដើមឈើ ហើយស្លឹកជ្រុះរលួយក្លាយជាជីសម្រាប់ចិញ្ចឹមដើម។ ប្រភេទខ្លះទៀតដុះរៀតរៀងតាមដើមឈើ ពួកវានេះមានអំណោយផលល្អក្នុងការដាំដុះក្នុងផ្ទះ។ Paphiopedilum ឃើញមាននៅអាស៊ី អាហ្វ្រិក និងឥណ្ឌូណេស៊ី ជាផ្កាមានស្លឹកទ្រុបទ្រុល ហើយមានរូបរាងស្រដៀងនឹងស្បែកជើង។ ផ្កានេះមានពណ៌ផ្កាឈូក ក្រហមជាំ ត្នោត បៃតង...។ គេដាំវានៅកន្លែងត្រជាក់ល្មម។





PAPHIOPEDILUM ឬ CYPRIPEDIUM

៤.៥ អំបូរ CYMBIDIUM

អំបូរនេះអាចដុះលូតលាស់ និងផ្តល់ផលបានល្អនៅលើដីបាន ឬដុះតាមប្រហោងដើមឈើ។ ផ្កាអំបូរគឺដេកក្នុងអំបូរនេះមានឫសជាប្រភេទឫសស្មៅ និងឫសប្រយោង ការបែកគុម្ពល្អ ដើមរបស់វាអាចទ្រផ្កាបានពី១២ ទៅ២០ផ្កា។ ស្លឹកវែងហើយតូច ប្រភេទខ្លះមានស្លឹកដុះបញ្ឈរ ប្រភេទខ្លះមានស្លឹកកោងចុះមកក្រោមប្រវែង ប្រហែល១ម៉ែត្រ។ កញ្ចប់ផ្កាចេញនៅឯគល់របស់គូដើម គូដ្កាដុះបញ្ឈរ និងកញ្ចប់ផ្ការីកសាយ ជួនកាលទៀតតូច ចង្អៀត ស្រទាប់ផ្កាក្នុង និងក្រៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមានពណ៌ផ្កាឈូក ត្របែកព្រៃ លឿង ត្នោត និងបៃតង។

ជាទូទៅផ្កាចេញនៅរដូវត្រជាក់ និងនិទាយរដូវ។ គេឃើញអំបូរនេះមានដុះនៅម៉ាឡេស៊ី ជ្រោយ ឥណ្ឌូចិន អូស្ត្រាលី។ បច្ចុប្បន្ននេះមានការបង្កាត់ពូជ Cymbidium ដើម្បីផលិតកូនកាត់ និងដាំកាត់យកផ្កា។



៤.៦ អំបូរ DORITIS

អំបូរ Doritis ជាអំបូរមួយដែលដុះនៅលើដី ឬប្រភេទដុះដែលមានវត្ថុគ្របសង្កត់ត្រួតគ្នាគ្រាស់។ ពួកវាមានស្លឹកសំប៉ែតពណ៌បៃតងខ្ចី ឬបៃតងចាស់។ កញ្ចប់ផ្កាបញ្ឈរ ផ្កាមានពណ៌ក្រហមជាំរហូតដល់ពណ៌ឈាមជ្រូក។ លក្ខណៈរីករស់ផ្កាជាជួរដង្ហែរគ្នាឡើងរាងជាកញ្ចប់វែង ផ្កាខាងលើចាប់រីកស្របគ្នានឹងផ្កាខាងក្រោមចាប់រោយ។ ផ្កាអំបូរគឺដើម្បីប្រភេទនេះអាចដាំដុះនៅក្នុងផែនដីជុត ដោយប្រើជួង អំបែងឥដ្ឋ និងស្រកីដូង...។

អំបូរ Doritis មានដូចជា ៖ *Doritis pulcherrima*, *Doritis pulcherrima* var *buyssoniana*, *Doritis Pulcherrima* var *alba*



Doritis Pulcherrima

៤.៧ អំបូរ ONCIDIUMM

ផ្កាអំបូរគឺក្នុងអំបូរនេះគេច្រើនជួបប្រទះឃើញមាននៅក្នុងតំបន់ក្តៅនៃទ្វីបអាមេរិក ទម្រង់របស់ដើមមានពីរបែបគឺ ដើមមានកូន និងអត់កូន ពពួកទំហំដើមតូចខ្លីមានជាងស្លឹកព័ទ្ធជុំវិញស្លឹកស្ពាន់ ស្លឹកមានពពួកស្លឹកធំក្រាស់ ពពួកខ្លះមានស្លឹកមូលវែង។ ផ្កាមានពណ៌លឿង មានឆ្លុតពណ៌ត្នោត ទងកេសលយចេញទាំងពីរខាង។ អំបូរ **ONCIDIUMM** មាន ៖ *Oncidium ornithorhynchum*, *Oncidium papilio*, *Oncidium kukoo*



៤.៨ - អំបូរ PLALAENOPSIS

ផ្កាអំបូរគឺជាក្នុងអំបូរនេះ គេនិយមដាំដុះក្នុងកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពសមស្រប (ក្ដៅសើម) វាជាប្រភេទដែលបានដុះនៅលើដើមរុក្ខជាតិផ្សេងៗ។ ពួកនេះមានដើមកំណើតនៅតំបន់អាស៊ីត្រូពិក និងមាននៅអូសេអានី។ ទង និងផ្កាខ្លី ស្លឹកទូលាយ ហើយក្រាស់ វាសំបូរផ្កាណាស់ មានផ្កាជាចង្កោមៗ បណ្ដោយមានប្រវែងលើសពីមួយម៉ែត្រ។ ផ្កាវិកច្រើនបំផុតនៅរដូវធ្លាក់ព្រិល និងអាចរីកម្ដៅនៅនិទាយរដូវ។ គេនិយមដាំដុះនូវប្រភេទកូនកាត់ ដែលផ្កាមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយដូចជា ពណ៌កូលាប ពណ៌ស និងត្របែកព្រៃ។

អំបូរ Phalaenopsis មាន ៖

Phalaenopsis cronucervi

Phalaenopsis decumdens

Phalaenopsis equestris

Phalaenopsis lueddomanniana

Phalaenopsis schillerana

Phalaenopsis amabilis។



ផ្កាក្រដាស (BOUGAINVILLEA)

១ . ប្រវត្តិ និងប្រភពដើម

ផ្កាក្រដាស ជាពូជឈើមានផ្កាចម្រុះពណ៌ល្អឆើតឆាយនាបច្ចុប្បន្ននេះ មានដើមកំណើតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង។ នៅពេលដែលអ្នកដើរនាវាម្នាក់ជនជាតិបារាំងឈ្មោះ Luis Antoine de Bougainville បានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៧៦៦-១៧៦៩ ព្រមជាមួយអ្នកភូតកាមសាស្ត្រម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Philibert Commerson រួមដំណើរជាមួយផង លោកក៏បានកាត់យកផ្កានេះមកពីទីក្រុង Rio de Janeiro ដែលតាំងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសប្រេស៊ីល។ ក្រោយមកគេក៏បានដាក់ឈ្មោះឱ្យផ្កានេះថាBougainville ដើម្បីជាការរំលឹកដល់អ្នកដើរនាវារូបនោះ។ ផ្កាក្រដាសត្រូវបាននាំមកដាំនៅតាមសួនផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកចាប់ផ្តើមពីទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង ហើយត្រូវបានជនជាតិអឺរ៉ុបនាំមកដាំនៅតាមប្រទេសក្រោមអាណានិគមក្នុងទ្វីបអាស៊ី។ បន្ទាប់មកមានអ្នកនាំយកផ្កាក្រដាសពីប្រទេសសាំងកាឡូចូលមកដាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។

២ . អំពីប្រភេទផ្កាក្រដាស

ផ្កាក្រដាសឈ្មោះជាភាសាបារាំង Bougainville ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Bougainvillea ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bougainvillea glabra* ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារ Nyctagiaceae ។ ផ្កាក្រដាសមានបីប្រភេទសំខាន់ៗគឺ ៖

- Bougainvillea glabra
- Bougainvillea peruviana
- Bougainvillea spectabilis

ផ្កាក្រដាសដែលមានដាំនៅក្នុងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នមានប្រភេទ *Bougainvillea glabra* និងប្រភេទដែលគេបង្កាត់រវាងប្រភេទ *Bougainvillea glabra* និងប្រភេទផ្សេងទៀត។ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្កាក្រដាសមានមិនតិចជាង៥០ពូជទេ ហើយពូជខ្លះគេដាំដុះក្នុងដើង និងលើដីផ្ទាល់។

២.១ - ប្រភេទ *Bougainvillea glabra*

ជាប្រភេទដែលមានបន្លាតិច អាចចេញផ្កាតាំងពីដើមនៅតូច អាចដុះលូតលាស់ទាំងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានម្តប់ និងក្តៅ។ ទ្រង់ទ្រាយដើមទ្រុបទ្រុល មានមែកសាខាត្រសុំត្រាសាយ។ សន្លឹកលម្អមានរាងពងក្រពើពណ៌ក្រម ពណ៌ផ្កាឈូក...។ ផ្កាមានពណ៌លឿងមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងបំពង់ ផ្នែកខាងចុងរីកតិចៗ ផ្កានេះស្ថិតនៅចំណុចកណ្តាលនៃស្លឹកលម្អ (មានបីក្លែប)។ ជាទូទៅវាមានកម្ពស់ប្រហែល៣ម៉ែត្រ។ ពូជខ្លះមានពណ៌ស ទើបយើងហៅថា Snow White ។



Bougainvillea glabra

២.២ . ប្រភេទ **Bougainvillea Peruvian**

ជាពូជបង្កាត់របស់ *Bougainvillea glabra* ដែលគេជួបប្រទះច្រើននៅតំបន់ឥសាន្តនៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង។ ស្លឹកលម្អមានពណ៌ក្រហម កូលាប ទឹកក្រូច លឿង ស្វាយ...។



ប្រភេទ *Bougainvillea peruviana* មានពូជ ៖

- *Bougainvillea peruviana sanderiana variegated* ជាពូជស្លឹកពពាណាយលឿង។
- *Bougainvillea peruviana salmonella* ស្លឹកលម្អមានពណ៌ទឹកក្រូចខ្ចី

- Bougainvillea peruvian paper flower ស្លឹកលម្អមានពណ៌ស៊ីជម្ពូចាស់។



Bougainvillea peruvian sanderiana variegated



Bougainvillea peruvian salmonella



Bougainvillea peruvian paper flower

២.៣ . ប្រភេទ *Bougainvillea spectabilis*

ប្រភេទនេះមានដើមកំណើតនៅតំបន់ក្តៅ អាចដុះលូតលាស់នៅក្នុងលក្ខណៈអាកាសធាតុរាំងស្ងួត ដើមមានទំហំធំ ចង្កោមផ្កាមានទំហំធំ រីឯសន្លឹកលម្អក៏ធំដែរ។ មានពណ៌ស្រស់ល្អ ដូចជាពណ៌ស៊ីជុំពូ ក្រហម ស្រស់។ *Bougainvillea spectabilis* មានពូជមួយចំនួនគឺ ៖

- *Bougainvillea spectabilis* var *lateritia* ស្លឹកលម្អមានពណ៌ក្រហម និងទឹកក្រូច
- *Bougainvillea spectabilis* var *pavilora* ស្លឹកលម្អមានពណ៌ស្វាយ
- *Bougainvillea spectabilis* *alba plena* ពូជនេះស្លឹកលម្អមានលក្ខណៈជាចង្កោម ហើយតូចនៅត្រួតស៊ីគ្នាយ៉ាងច្រើន ស្លឹកមានពណ៌សលាយខៀវ តែមស្លឹកស៊ីជុំពូ។



Bougainvillea spectabilis

៣ - លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ

ផ្កាក្រដាស ជារុក្ខជាតិដែលមានសាច់ឈើរឹង ស្លឹក សំបកស្លឹក មានមែករវាងរុក្ខជាតិសំបុកចុះមកដី។ ទំហំដើម និងកាតព្រទុបទ្រុលមានតាំងពីនៅតូចរហូតដល់កម្ពស់៣០ម៉ែត្រ។ វាជារុក្ខជាតិដែលមានអាយុវែង។

៣.១ - ដើម ៖

ដើមមានជាតិឈើរឹង មានបន្លាខាងលើនៃគល់ទងស្លឹក។ លក្ខណៈរបស់ដើមផ្កាក្រដាសត្រូវបានចាត់ជាប្រភេទពាក់កណ្តាលឈរ និងពាក់កណ្តាលរៀ។

៣.២. ស្លឹក ៖

ស្លឹករបស់ផ្កាក្រដាស ជាស្លឹកដែលមានតែមួយប្រភេទ មានរោមតិចតួចសម្រាប់ការពារស្លឹក។ ការដុះស្លឹកគឺវាដុះធ្លាក់គ្នា មានរាងពងក្រពើ ស្រួចចុងមានប្រវែង៤ទៅ៦សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង២ទៅ៣សង់ទីម៉ែត្រ។

៣.៣. ស្លឹកលម្អ ៖

ស្លឹកលម្អរបស់ផ្កាក្រដាសមានរាងស្រដៀងនឹងបេះដូង ស្ថិតនៅជាក្រុម (៣សន្លឹក)។ អាស្រ័យទៅតាមពូជរបស់វា ផ្កាក្រដាសមានស្លឹកលម្អច្រើនពណ៌ ដូចជាពណ៌ស្វាយ ក្រហម លឿង ស ...។ មនុស្សភាគច្រើនតែងច្រឡំថា ស្លឹកលម្អគឺជាផ្កា តាមពិតវាមិនមែនជាផ្កាទេ គឺជាស្លឹកលម្អ។ ស្លឹកលម្អមានប្រវែង២.៥សង់ទីម៉ែត្រ។ ពូជខ្លះស្លឹកលម្អមានរហូតដល់ទៅពីរពណ៌ (ពណ៌សលាយនឹងផ្កាឈូក) ដែលមើលទៅដូចជាការតុបតែងរបស់មនុស្ស។

៣.៤ ផ្កា ៖

ផ្កាក្រដាសមានទំហំតូចវែង ដុះជាប់ជាមួយនឹងស្លឹកលម្អ (៣ផ្កា) មើលទៅមិនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេ មនុស្សភាគច្រើនតែងយល់ថា ផ្ការបស់ផ្កាក្រដាសគឺជាកេសទៅវិញ។ ផ្កានេះមានប្រវែង១-២សង់ទីម៉ែត្រមានផ្កាចំនួនបីក្នុងមួយឈុតស្លឹកលម្អ។

៤. ការចម្រុញផ្កាក្រដាសឱ្យចេញផ្កា ៖

៤.១ ទឹក ៖

ការរីកចម្រើនលូតលាស់គ្រប់ចំណុច គឺសុទ្ធតែត្រូវការទឹក រុក្ខជាតិខ្លះត្រូវការទឹករហូតឃ្លាតពីទឹកស្ទើរមិនបាន ឯពូជខ្លះទៀតត្រូវការទឹកតិចតួច ខ្លះទៀតអាចធន់ទ្រាំនឹងអាកាសធាតុស្ងួតបានទៀតផង។ ចំពោះដំណាំផ្កាក្រដាសដើម្បីឱ្យវាចេញផ្កា គឺវាមិនត្រូវការទឹកច្រើនលើសលប់ទេ ហេតុនេះត្រូវបង្កត់ទឹកវាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលវាអាចទ្រាំទ្របាន។

៤.២ ការតាក់តែងមែក (Prunning)

ការតាក់តែងមែក ត្រូវធ្វើទន្ទឹមគ្នានឹងការប្តូរដីថ្មី និងជើង។ ការកាត់តាក់តែងមែកក្រៅពីធ្វើឱ្យដើមមានទ្រង់ទ្រាយសមរម្យតាមតម្រូវការនោះ វាក៏អាចធ្វើឱ្យចេញផ្កាបានល្អដែរ ព្រោះការចេញផ្កាវាកើតឡើងនៅបរិវេណចុងមែក ឬតាមគន្លាក់ស្លឹកផ្សេងៗ។ បើយើងបណ្តោយឱ្យមែកលូតលាស់ដោយសេរីនោះ ការចេញផ្កាកើតឡើងនៅតែចុងត្រួយប៉ុណ្ណោះ គឺមិនបានរីកស្ទុះស្តាយពេញទាំងដើមទេ។ ការតាក់តែងមែក គឺធ្វើស្របគ្នានឹងការប្រលេះស្លឹកចេញផងដែរ យើងគួរអនុវត្តវិធីទាំងនេះនៅក្រោយពេលផ្ការោយអស់។

៤.៣ ការដាក់ថ្លៃ ៖

ដីមានទំនាក់ទំនងជាមួយទឹកជានិច្ច បើយើងប្រើដីហើយ យើងមិនប្រើទឹកក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែរ។ ដីដែលត្រូវប្រើគឺជាដីដែលមានលេខកណ្តាលធំ ដូចជា ១៦.២០.០ ឬ ១៨.៤៦.០។ ដោយលាយជាមួយទឹក ស្រោចឱ្យចំគល់បន្ទាប់ពីប្តូរដី ផ្ទឹង និងការតាក់តែងមែករួច ស្រោចរយៈពេល១៥ថ្ងៃម្តង។

ជំពូក ៤

ការដាំដុះដំណាំលម្អ

១ - ការរៀបចំដីសម្រាប់ដំណាំ

១.១ - ការរៀបចំដីសម្រាប់ដាំដុះដំណាំលម្អលើដីថ្នាល

ការរៀបចំដី គឺជាការងារមុនដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការដាំដុះដំណាំលម្អ។ ការងាររៀបចំដី គឺជាវិធានការនៃបច្ចេកទេសកសិកម្ម ក្នុងគោលដៅរក្សាសមាសធាតុគីមី និងបង្កើនជីជាតិដី ដើម្បីឱ្យដំណាំដាំដុះមានស្លឹកផ្កា ផ្លែជានិច្ចកាល។ ប្រព័ន្ធចែករក្សា និងការរៀបចំដីសម្រាប់ដំណាំនេះ គឺជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នៃការងារកសិកម្មដែលចាំបាច់នៅក្នុងការរៀបចំដីសម្រាប់ដំណាំលម្អមានដូចជា ៖

- ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងស្មៅចង្រៃ សត្វល្អិតចង្រៃ និងជំងឺ
- ការកែទម្រង់រូប គីមីនៃសារធាតុក្នុងដីបានឱ្យល្អ
- ការការពារទៅនឹងការហូរច្រោះនៃដី
- បង្កើនមមាគឺ
- មធ្យោបាយបង្កើនសំណើម និងសារធាតុចិញ្ចឹមចំពោះដំណាំ។

ក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំដីដែលគេអនុវត្តចំពោះដំណាំ គឺត្រូវរិះរកគ្រប់វិធានការណ៍ និងគិតគូរអំពីទិសដៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សា និងបង្កើនជីជាតិដីសម្រាប់ការដុះលូតលាស់ល្អរបស់ដំណាំ។ ការប្រែប្រួលនៃវិធីរៀបចំដី ពុំត្រឹមតែអាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងអាស្រ័យទៅលើការចែករក្សាដីទម្រង់ដី ប្រភេទពូជ អាយុកាលដំណាំ ដំណុះស្មៅចង្រៃ និងកត្តាចង្រៃផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ ការរៀបចំដីគឺក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងទប់ទល់ទៅនឹងស្មៅចង្រៃ ជំងឺ ព្រមទាំងធ្វើឱ្យដីធូរ បង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរចំពោះការផ្តល់របបខ្យល់ របបទឹក និងសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ដំណាំ។

នាពេលបច្ចុប្បន្ន ការរៀបចំដីដែលគេច្រើនអនុវត្តនោះគឺ ៖

- ការភ្ជួរ
- ការជ្រួយដីឱ្យធូរ ដោយគាស់រំលើងស្មៅ និងគល់រុក្ខជាតិផ្សេងៗ
- ការជ្រួយគល់ដំណាំដោយភ្ជួរ
- ការរាស់បំបែកដី និង
- ធ្វើដីឱ្យរាបស្មើជាដើម។

ក្នុងករណីដីមិនសូវមានជីជាតិ ក្រោយពីការភ្ជួររាស់ហាលដីរួចហើយ គេចាំបាច់ត្រូវប្រើជីធម្មជាតិដូចជាជីលាមកសត្វពុកផុយល្អចន្លង១០តោនក្នុងមួយហិកតា (១គីឡូក្រាម/ម^២) និងជីគីមីប្រភេទ១៥.១៥.១៥ (កែង កែង កែង) ចន្លង១០ក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ ដោយលាយប្របល់ជាមួយដីឱ្យបានសព្វល្អទើបធ្វើការដាំដុះ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ដីដែលមានជីជាតិស្រាប់ ដូចជាដីតាមមាត់ទន្លេ គឺពុំចាំបាច់ប្រើជីក៏សឹងបាន។

១.២ - ការរៀបចំវិប្បាសដ៏សម្រាប់ដាំដុះដំណាំលម្អក្នុងផ្ទះ

ការរៀបចំល្អាយដីសម្រាប់ដាំដុះដំណាំលម្អក្នុងផ្ទះ គឺជាការងារមួយដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យដីនោះមានគុណភាពល្អ ដីធូរ មានជីជាតិ ដែលធានាដល់ការដុះលូតលាស់របស់កូនដំណាំ។ ដីដែលនឹងត្រូវយកមកប្រើ គឺជាដីដែលត្រូវបានលាយផ្សំជាមួយវត្ថុធាតុផ្សេងៗដែលរួមមានដូចប្រភេទខាងក្រោម ៖

ប្រភេទទី១ ៖

- ដីធម្មតា៣ភាគ
- ដីខ្សាច់ត្រឹម១ភាគ
- ដីលាមកសត្វ ឬដីកំប៉ុស្ត៍២ភាគ។

ប្រភេទទី២ ៖

- ដីធម្មតា៣ភាគ
- ផេះអង្កាម១ភាគ
- ដីលាមកសត្វ ឬដីកំប៉ុស្ត៍១ភាគ។

ប្រភេទទី៣ ៖

- ដីធម្មតា៣ភាគ
- ស្រកីដូងចិត្រា១ភាគ
- ដីលាមកសត្វ ឬដីកំប៉ុស្ត៍១ភាគ។

ប្រភេទទី៤ ៖

- ដីធម្មតា២ភាគ
- សំបកសណ្តែកដី១ភាគ
- ដីលាមកសត្វ ឬដីកំប៉ុស្ត៍១ភាគ
- ផេះអង្កាម១ភាគ។

ប្រភេទទី៥ ៖

- ដីក្រោមដើមអំពិលបារាំង២ភាគ
- ស្រកីដូងចិត្រា១.៥ភាគ
- ដីលាមកសត្វ ឬដីកំប៉ុស្ត៍១.៥ភាគ
- ផេះអង្កាម១.៤ភាគ
- សំបកសណ្តែកដី១.៤ភាគ។

ប្រភេទទី៦ ៖

- ដីចំការ ២ ភាគ
- ស្រកីដូងចិត្រា១ភាគ
- ដីលាមកសត្វ ឬដីកំប៉ុស្ត៍១ភាគ
- ផេះអង្កាម១ភាគ

- សំបកសណ្តែកដី១ភាគ
- ស្លឹកអំពិលបារាំង៥ភាគ។

ប្រភេទទី៧ ៖

- ដីចំការ២ភាគ
- ស្រកីដូងចិញ្ច្រាំ១ភាគ
- ដីលាមកសត្វ ឬដីកំប៉ុស្ត៍១ភាគ
- សំបកសណ្តែកដី១ភាគ។

ប្រភេទទី៨ ៖

- ដីចំការ២ភាគ
- ស្រកីដូងចិញ្ច្រាំ១ភាគ
- ដីលាមកសត្វ ឬដីកំប៉ុស្ត៍១ភាគ
- កំទេចស្មៅងាប់ៗ១ភាគ។

ប្រភេទទី៩ ៖

- ដីចំការ២ភាគ
- ស្រកីដូងចិញ្ច្រាំ១ភាគ
- ដីលាមកមាន់១ភាគ។

ប្រភេទទី១០ ៖

- ដីចំការ២ភាគ
- ស្រកីដូងចិញ្ច្រាំ១ភាគ
- ដីលាមកមាន់១ភាគ
- ស្បូវកាប់កង់ៗខ្លី១ភាគ។


យកដីដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ (ប្រភេទណាមួយ) មកលាយច្របល់ចូលគ្នាក្នុងប្រភេទមួយៗ និង រំងាយកំទេចកំទី ចេញមុននឹងប្រើប្រាស់។ ត្រូវជ្រើសរើសយកខ្នាតរបស់កន្លែងប្លាស្ទិច ឬជើងឱ្យបានទំហំ សមស្របសម្រាប់ច្រកល្អាយដី ដោយប្រើប្រដាប់ច្រក ដូចជាកំប៉ុងទឹកដោះគោពុះជាចំណិត ហើយច្រកឱ្យ ពេញកន្លែង ឬជើងឱ្យបានពេញ និងណែនល្មម។



ដីធម្មតា៣ភាគ

ដីលាមកសត្វ២ភាគ

ដីខ្សាច់១ភាគ



២ - ការដាំដុះដំណាំលម្អ

បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំ មានគោលដៅជួយដល់ការដុះលូតលាស់ និងការរីកចម្រើននៃដំណាំដើម្បីទទួលបានផលជាអតិបរមា។ បច្ចេកទេសទាំងនោះទាក់ទិនទៅនឹងដងដើមដំណាំផ្ទាល់តែម្តង (មាឌរបស់ដើមឈើ) ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនោះច្រើនតែមានឥទ្ធិពលទៅលើទីកន្លែងដាំដុះ ដូចជាការរៀបចំដី (ភ្នំ, រាស់, លើករង) និងការថែទាំ។ ការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសនីមួយៗ និងថ្ងៃខែដែលត្រូវផ្ដើមអនុវត្តត្រូវបានកំណត់ដោយ ៖

- អង្គធាតុផ្សេងៗដែលដំណាំត្រូវការ និងទាមទារ
- លទ្ធភាពនៃទីកន្លែងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទាំងនោះ
- គោលដៅនៃផលិតផលរបស់កសិករកំណត់ដោយប្រព័ន្ធផលិតកម្ម និងបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសសំដៅទៅលើការប្រមូលផលិតផលដោយយោងទៅតាមគុណភាព និងតាមថ្ងៃខែ។


ជាទូទៅការដាំដុះដំណាំលម្អ ត្រូវបានគេអនុវត្តឡើងដោយពីរបៀបគឺ ការដាំដុះដំណាំលម្អផ្ទាល់ដី និងការដាំដុះដំណាំលម្អក្នុងឆើង។

២.១ - ការដាំដុះដំណាំលម្អផ្ទាល់ដី

២.១.១ - ការដាំដុះដំណាំលម្អប្រភេទតូចៗ

ក្រោយពីរៀបចំដីបានល្អរួចរាល់ហើយនោះ គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមការដាំដុះទៅតាមប្លង់ដែលបានកំណត់រួចនោះ។ ការដាំដុះគឺត្រូវអនុវត្តនៅពេលព្រឹកព្រលឹម និងពេលរសៀល។ មុននឹងចាប់ផ្ដើមដាំ យើងយកកូនដំណាំលម្អដែលបានមកពីការបំបៅ, សាក, កាត់បណ្តុះ ឬការបណ្តុះគ្រាប់នៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិច យកមកដាក់

នៅក្បែររណ្តៅៗដាំដែលបានត្រៀមរួចជាស្រេចហើយនោះ។ បន្ទាប់មកយើងយកកូនកាំបិតមកវះចង់ប្លាស្ទិច នោះចេញ រួចលើកកូនដំណាំដាក់ក្នុងរណ្តៅថ្មីៗឱ្យចំកណ្តាលរណ្តៅ។ ដៃម្ខាងទប់កូនដំណាំ និងដៃម្ខាង ទៀតកាយដើមកលប់ ហើយសង្កត់ឱ្យបានណែនល្អជុំវិញគល់ យកចំបើង ឬកំទេចកំទីស្លឹកក្រូចជាតិមកគ្របជុំ វិញក្បែរគល់ដំណាំ ហើយស្រោចទឹកឱ្យបានជោគល្អជាការស្រេច។



២.១.២ - ការដាំដុះដំណាំលម្អប្រភេទមធ្យម និងធំ

មុននឹងធ្វើការដាំដុះដំណាំលម្អប្រភេទធំ គឺត្រូវធ្វើការវាស់វែងចន្លោះគុម្ព និងចន្លោះជួរសម្រាប់ដឹក រណ្តៅទៅតាមប្រភេទពូជដំណាំដូចបានពោលខាងលើជាមុនសិន។

ទំហំរណ្តៅដែលត្រូវដឹកមានខ្នាតដូចខាងក្រោម ៖


- ដំណាំប្រភេទមធ្យម ៖ ៣០ស.មx៣០ស.ម x៣០ស.ម ឬ៤០ស.មx៤០ស.មx៤០ស.ម
- ដំណាំប្រភេទធំ ៖ ៦០ស.មx៨០ស.មx៨០ស.ម ឬ៨០ស.មx១២០ស.មx១២០ស.ម។

របៀបដឹករណ្តៅ ៖


ត្រូវដឹកយកដីស្រទាប់លើដាក់នៅក្បែរមាត់រណ្តៅម្ខាង និងដឹកយកដីស្រទាប់ក្រោមដាក់នៅក្បែរមាត់ រណ្តៅម្ខាងផ្សេងទៀត។ នៅបាតរណ្តៅត្រូវជ្រុំដី និងដាក់ចំបើង ឬកន្ទ្រាងខែត្រចិត្រព្រំ បន្ទាប់មកដាក់ដីកំប៉ុស្ត ពីលើបន្ថែម។

មុននឹងដាក់ដើមឈើចូលក្នុងរណ្តៅ គេចាំបាច់ត្រូវបាច់កំបោរ (CaO_2) ក្នុងបាតរណ្តៅប្រមាណ១ ស្លាបត្រាក្នុងមួយរណ្តៅដើម្បីកែប្រែដី។ យកដីស្រទាប់ក្រោមមកលាយជាមួយដីលាមកគោពី៥ទៅ១០គ.ក្រ/ រណ្តៅ និងជ័រ១៥.១៥.១៥ចំនួន១០០ក្រ/រណ្តៅ។ ក្រោយពីលាយល្អយជ័ររួចរាល់ហើយ ត្រូវយកល្អាយជ័រ នោះទៅដាក់នៅបាតរណ្តៅ ហើយលើកដើមឈើមកដាក់ក្នុងរណ្តៅនោះ រួចហើយបំពេញដីបន្ថែមពីនោះ

ទៀតលុះពេញរណ្តៅ។ បន្ទាប់មកត្រូវសង្កត់ដីនៅជុំវិញដើមឈើឱ្យណែន និងយកបង្គោលឬស្បូវមកចងជ្រុងដើម្បីការពារការលំដួល។ ពេលដាំ និងចងបង្គោលរួចត្រូវស្រោចទឹកដោយលាយថ្នាំ សម្រាប់ជំនួយឬសឱ្យឬសថ្មីចាប់ដុះ ដូចជាវីតាមីនបេអេង (Vit B₁ សម្រាប់រុក្ខជាតិ) ។



ការដាំដុះដំណាំប្រភេទមធ្យម



ការដាំដុះដំណាំប្រភេទធំ

២.២ - ការដាំដុះដំណាំលម្អក្នុងដី/កន្លែង

ក្រោយពីបានលាយល្អាយដីរួចរាល់ហើយ គេអាចអនុវត្តការដាំដុះតែម្តង ដោយគ្រាន់តែធ្វើការជ្រើសរើសខ្នាតរបស់ដើង/កន្លែងឱ្យសមជាមួយខ្នាតរបស់ដំណាំលម្អតែប៉ុណ្ណោះ។ ការដាំដុះត្រូវអនុវត្តតាមលំដាប់លំដោយដូចខាងក្រោម ៖

យកកំទេចស្រកីដូង ឬអំបែងក្បឿងមកបិទរន្ធរបស់ដើងបន្តិច រួចដាក់ល្អាយដីប្រមាណ១/៣ បន្ទាប់មកដាក់ដើមដំណាំលម្អចូលទៅក្នុងដើង លែយ៉ាងណាដាក់ឱ្យចំកណ្តាលដើង បន្ទាប់មកបន្ថែមដីជុំវិញគុម្ពផ្កា ហើយសង្កត់ដីឱ្យបានណែនទើបស្រោចទឹកជាការស្រេច។

ក្រោយពីដាំរួចរាល់ហើយ ត្រូវយកដើង/កន្លែងទៅទុកដាក់នៅក្នុងរោងម្លប់ (Green house) ដោយលែយ៉ាងណាឱ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃត្រឹមតែ៥០ភាគរយបាន។ ការរក្សានៅក្នុងរោងម្លប់រហូតដំណាំបានដុះសរីរាង្គថ្មីទើបដាក់វាឱ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃធម្មតាបាន។

៣ - ការថែទាំ

៣.១ - ការស្រោចស្រព

ដំណាំក៏ដូចជាសារពាង្គកាយមនុស្ស និងសត្វដែរ គឺត្រូវការជាចាំបាច់ខានមិនបាននៃធាតុមួយគឺទឹក។ ឧទាហរណ៍ ៖ ស្លឹករបស់ប៉ោមមានជាតិទឹកប្រហែល៦០ភាគរយ មែកមាន៥០ភាគរយ ផ្លែមាន៨០-៩០ភាគរយ និងគ្រាប់មាន៤០ភាគរយ ។

ទឹកមានអំពើលើគ្រប់បាតុភូតទាំងអស់ ជាអង្គធាតុរំលាយអង្គធាតុរ៉ែ និងជាមធ្យោបាយសម្រាប់ដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់រុក្ខជាតិ និងការស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមតាមស្លឹក និងឫសដើម្បីផ្តល់ទៅឱ្យសរីរាង្គផ្សេងៗ សម្រាប់សម្រួលរបបកំដៅនៅក្នុងដី និងនៅក្នុងរុក្ខជាតិ។ ដូចនេះក្នុងករណីខ្វះទឹក យើងត្រូវធ្វើការស្រោចស្រពដែលជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពទឹកនៅក្នុងដី។

ការស្រោចស្រពត្រូវធ្វើឡើងជាអទិភាពនៅតំបន់ណាដែលមានទឹកភ្លៀងទាបជាង៧០០ម.ម ដែលអាចធានានូវស្ថេរភាពនៃសំណើមដីក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ។ ការខ្វះទឹក និងការកើនឡើងនូវសីតុណ្ហភាពក្នុងបរិយាកាស ធ្វើឱ្យស្លឹក ដើមរបស់ដំណាំឆាប់ចាស់ ហើយបន្ថយសកម្មភាពរស្មីសំយោគ បំប្លែងរយៈពេលឱ្យផលពី ២-៣ដងក្នុងមួយខួបជីវិតរបស់ដំណាំ។ ដូចនេះការខ្វះទឹកវានឹងនាំមកឱ្យដំណាំទទួលនូវគុណភាពផ្សេង តែបើបរិមាណទឹកច្រើនហួសហេតុពេក នោះនឹងនាំឱ្យបាត់បង់ឧស្ម័នអុកស៊ីសែន និងបង្កើនឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតក្នុងដី ធ្វើឱ្យឫសឈូក់ទឹក មិនអាចដកដង្ហើមបាន និងធ្វើឱ្យឫសរលួយ ដើមក៏ងាប់។

នៅក្នុងសួន បន្ទាប់ពីបានដាំដុះរួចរាល់ហើយ គេត្រូវស្រោចទឹកជាប្រចាំដើម្បីឱ្យឫសដំណាំមានលទ្ធភាពស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីក្នុងដីមកចិញ្ចឹមសរីរាង្គទាំងមូល។ ការស្រោចស្រពមានបីវិធីគឺ ៖

- ការស្រោចស្រពដោយប៉ោតផ្កាឈូក ៖ ជាប៉ោតដែលមានចំពូជដូចផ្កាឈូក មានរន្ធតូចៗដើម្បីឱ្យទឹកចេញតិចៗ និងស្មើល្អ។ ការស្រោចស្រពរបៀបនេះ គឺគេច្រើនអនុវត្តចំពោះតែចំពោះដំណាំលម្អប្រភេទតូចៗដែលត្រូវបានដាំក្នុងដើង/កន្លែងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះនៅពេលគេស្រោចទឹកម្តងៗ គេបានពិនិត្យមើលដំណាំបានជិតដល់ល្អ ដូចជាអាចបញ្ចៀសទឹកមិនឱ្យចំផ្កា ដីមិនខ្ចាតចេញពីដើង និងនៅពេលឃើញមានរុក្ខជាតិចង្រៃដុះលាយឡំនឹងដំណាំ គេអាចដកវាចេញយកបានដោយស្រួល។

- ការស្រោចស្រពដោយប្រើទុរយោបាញ់ ៖ គេអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការស្រោចស្រពទៅលើដំណាំស្មៅ និងដំណាំលម្អផ្សេងៗទៀតដែលដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីជំទូលាយ។
- ការស្រោចស្រពដោយទុរយោកប់ក្នុងដី ៖ មានភាពងាយស្រួល ដោយវាមិនធ្វើឱ្យដីខ្ចាតចេញមកខាងលើ ចំណាយពេលកម្មតិច តែចំណាយទឹកច្រើន។

៣.២ - ការកម្ចាត់ស្មៅ

ស្មៅជាកត្តាចង្រៃមួយក្នុងចំណោមកត្តាចង្រៃទាំងបី (ស្មៅ, ដំងី, សត្វល្អិត) ដោយវាបានបង្កឱ្យដំណាំចុះអស់ថយនូវគុណភាពផលិតផល។ ស្មៅវាបានជណ្តើមពីដំណាំនូវពន្លឺ ទឹក និងដីជាតិដែលធ្វើឱ្យដំណាំបាត់បង់នូវទិន្នផលប្រមាណពី៣៩-៩៧ភាគរយ។

គេមានវិធីជាច្រើនក្នុងការកម្ចាត់ស្មៅចង្រៃដែលវាបានដុះប្រជែងជាមួយដំណាំ ក្នុងនោះមានដូចជា ៖

- ការកម្ចាត់ដោយដៃ (ប្រើចកជម្រះ ដកដោយដៃ...)
- កម្ចាត់ដោយប្រើគ្រឿងចក្រ (ប្រើម៉ាស៊ីនកាត់) និង
- ការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមី (Herbicide) កម្ចាត់។

បច្ចុប្បន្ននេះ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅចង្រៃ គឺមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដោយចំណាយពេលវេលាខ្លីទទួលបានផលខ្ពស់។ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនៅក្នុងចំការដែលជាកន្លែងមានការពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងស្មៅចង្រៃ ដូចជាវាដុះនៅជាប់នឹងគល់ដំណាំ និងតាមចន្លោះរងតូចៗជាដើម ។

៣.៣ - ការប្រើប្រាស់ដី

ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ និងប្រកបដោយគុណភាពផលិតផល គេចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់ដីដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពនៃការដុះលូតលាស់របស់ដំណាំដោយខានមិនបាន។ ដីដែលគេត្រូវប្រើប្រាស់នោះមានដូចជា ដីគីមី និងដីធម្មជាតិ។ ក្នុងការអនុវត្តនូវបច្ចេកទេសកសិកម្មក្នុងការដាំដុះដំណាំលម្អ បើគេដាក់ដីបន្ថែម វាអាចកើនទិន្នផលរហូតដល់៣០-៥០ភាគរយ។ ដីធម្មជាតិផ្តល់នូវលក្ខណៈល្អប្រសើរចំពោះទម្រង់ដីបង្កើនសកម្មភាពពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយក្នុងដី ធ្វើឱ្យដំណាំមានស្លឹក, ផ្កា, ផ្លែល្អ។ កម្រិតល្អប្រសើរនៃការប្រើប្រាស់ដី អាស្រ័យលើលក្ខណៈអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់នីមួយៗ អាស្រ័យទៅតាមលក្ខណៈជីវៈនៃរុក្ខជាតិ និងអាស្រ័យតាមប្រភេទដំណាំនីមួយៗ ។

នៅតំបន់ដីដែលមានដីជាតិ គេត្រូវបន្ថយកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ដី ហើយនៅតំបន់ដែលមានដីមិនសូវមានដីជាតិ គេត្រូវបង្កើនកម្រិតប្រើប្រាស់ដី។ នៅលើដីដែលមានទម្រង់ជាតិដ្ឋាន់បូរជាតិ K ចាំបាច់ត្រូវបន្ថយដីដែលមានសមាសធាតុ K ហើយចំពោះដីល្បាយខ្សាច់ គេត្រូវប្រើដីដែលសំបូរដោយ K ។

អាស្រ័យទៅតាមលក្ខណៈរបស់ដី និងការទាមទាររបស់ដំណាំ ត្រូវជ្រើសរើសដីទៅតាមតម្រូវការទាំងនោះ ទៅលើដីអាស៊ីតខ្សោយ និងបាស គេបាចប្រភេទដីដែលមានជាតិអាស៊ីត ដូចជាដី Ammonium sulphate $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (AS=20.0.0) ដី Super phosphate ។ គេបាចដីអាស៊ីតទៅតាមចន្លោះគុម្ពរបស់ដំណាំបន្ទាប់មកគេត្រូវលប់ដីជាបន្ទាន់ក្នុងជម្រៅ៦-៨សង់ទីម៉ែត្រ។ គេបាចដីផូស្វ័រ និងប៉ូតាស្យូមនៅតំបន់ដែល

មានប្រព័ន្ធបុសលូតលាស់ខ្លាំង ក្នុងករណីមិនបានកប់ដីទៅក្នុងដី គឺពុំទទួលបានផលល្អទេ ដូចនេះគេត្រូវ កប់វាក្នុងជម្រៅ៣០ទៅ៤០សង់ទីម៉ែត្រ។ ប្រសិទ្ធភាពដីទាំងពីរនេះអាចមានការបន្តរហូតដល់២ទៅ៣ឆ្នាំ ដូច នេះក្នុងអំឡុងពេលពី៣-៤ឆ្នាំបន្ទាប់ ទើបយើងបាចដីនេះបន្ថែមម្តងទៀតដើម្បីបង្កើនដីជាតិដី។

ដីសរីរាង្គ ៖

- ដីលាមកគោ ៖ គឺជាប្រភពនៃអង្គធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់រុក្ខជាតិ ដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់រក្សា និងបង្កើនដីជាតិដី
- ដីលាមកគោក្នុងភាពជាល្បាយ ឬទឹកមាន N ពី០,៤-១,៣ភាគរយ P ០,១ភាគរយ និង K ពី០,៥- ២,៣ភាគរយ
- ដីលាមកគោរឹងមាន N ពី០,៣-០,៦ភាគរយ P ពី០,១៧-០,៤១ភាគរយ និង K ពី០,១-០,៣ ភាគរយ។


ការបាចដីសរីរាង្គមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់ទម្រង់ដី ធ្វើឱ្យដីធូរ បង្កើនពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយ និង បង្កើនទម្រង់ដីបានយូរឆ្នាំ។

ការប្រើប្រាស់ដីទៅលើដំណាំលម្អក្នុងសួនវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ គឺដើម្បីកុំឱ្យខូចសោភ័ណភាព របស់ដំណាំ ដែលជាប្រការមួយនាំឱ្យខូចខាត ឬបាត់បង់តម្លៃរបស់ដំណាំក្នុងសួនយើង។ ការប្រើប្រាស់ដីនេះ គេតែងតែប្រើទៅលើដំណាំលម្អដែលអស់ ឬខ្សោយដូចខាងក្រោម ៖

- ចំពោះដំណាំយកផ្កា ឬចុល្លព្រឹក្សក្នុងផ្ទះ ៖ ក្រោយពីដាំបានពី៣ទៅ៤ខែ គេចាំបាច់ត្រូវបន្ថែមដី ដើម្បីជំនួយដល់ការដុះលូតលាស់របស់សរីរាង្គខាងលើ និងខាងក្រោមដី។ ដីដែលគេបន្ថែមមានដីធម្មជាតិ (ដី លាមកសត្វ, ដីអុកឈើ, ដីកំប៉ុស្ត) និងដីគីមីទៅតាមតម្រូវណែនាំ (Recommendation Rate) ។ ការប្រើ ប្រាស់ដីគីមី គេចាំបាច់ត្រូវលាយដីជាមួយទឹកដើម្បីស្រោច ឬបាញ់ទៅលើស្លឹក ឬគល់។ ពេលវេលាប្រើគួរ អនុវត្តនៅពេលព្រឹកព្រលឹម ព្រោះពេលវេលានេះដំណាំកំពុងធ្វើស្ទឹងសំយោគ ដែលជាភាពងាយស្រួលក្នុងការ ស្រូបយកដីទាំងនោះ។

- ចំពោះដំណាំស្មៅលម្អ ៖ ក្រោយពីធ្វើការដាំដុះបានរយៈពេល៧ទៅ១០ថ្ងៃ គេត្រូវស្រោចដីអ៊ុយរ៉េ បរិមាណ២ក្រាមក្នុងទឹក១លីត្រ ដើម្បីជំរុញដល់ការដុះលូតលាស់របស់ស្មៅ។ រយៈពេល៣ទៅ៦ខែបន្ទាប់ គេ ប្រើដីអាចម៍ប្រដៀវមួយភាគលាយជាមួយដីខ្សាច់ម៉ត់ ឬដីល្បប់៥ភាគបាចទៅលើស្មៅឱ្យសព្វ រួចស្រោចទឹក។

- ចំពោះដំណាំប្រភេទមធ្យម និងធំ ៖ ដីដែលត្រូវប្រើ គឺមានដីធម្មជាតិ និងដីគីមី។ ក្នុងការប្រើប្រាស់ ដី គេចាំបាច់ត្រូវដីករណ្តៅនៅជុំវិញគល់ដំណាំជម្រៅពី១៥ទៅ២០សង់ទីម៉ែត្រ ចំពោះដំណាំប្រភេទមធ្យម និងជម្រៅពី៣០ទៅ៥០សង់ទីម៉ែត្រ ចំពោះដំណាំប្រភេទធំ គម្លាតពីរណ្តៅមួយទៅរណ្តៅមួយ៥០សង់ទី ម៉ែត្រ។ ពេលដីករណ្តៅរួចរាល់ហើយ ត្រូវដាក់ដីគីមីនៅខាងក្រោម ដីធម្មជាតិនៅលើ បន្ទាប់មកត្រូវលប់ ដីឱ្យជិតល្អ។



វិធីដករណ្តៅ និងការដាក់ដីប្រភេទមធ្យម

- ពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់ដី ៖
- ចំពោះកូនឈើធំ និងមធ្យម ដែលមានអាយុចាប់ពី១-៣ឆ្នាំ ពេលវេលាដាក់មានបីលើកគឺ ៖
- នៅដើមរដូវភ្លៀង
- ក្រោយរដូវភ្លៀង និង
- ក្រោយរដូវប្រមូលផល។
- ចំពោះឈើដែលបានផ្តល់ផលហើយមានអាយុ៤-១០ឆ្នាំ ពេលវេលាដាក់ដីមានបីលើកគឺ ៖
- ក្រោយពេលប្រមូលផល
- ដំណាក់កាលចេញផ្កា
- ដំណាក់កាលផ្លែ។

៣.៤ - ការកាត់មែក និងធ្វើទ្រង់ទ្រាយដើមឈើ (Pruning and Shaping)

ការកាត់មែក និងពត់មែកឈើជារូបរាងផ្សេងៗ គឺជាសិល្បៈមួយដែលចូលរួមក្នុងការកែលម្អសម្រស់របស់ដំណាំ និងតែងតែធ្វើឱ្យទាក់ទាញភ្នែកទាក់ចិត្តចំណីមួយកម្រិតទៀត។

- ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយរុក្ខជាតិ (Shaping) ៖ សំដៅទៅលើការកាត់ចេញដល់កម្រិតជាក់លាក់មួយនៃរុក្ខជាតិ ដើម្បីសម្រេចបាននូវរចនាសម្ព័ន្ធ និងរូបរាងដើមឈើដែលត្រូវការដោយអ្នកដាំដុះ និងពិបាកក្នុងការបង្កើតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌលូតលាស់ធម្មជាតិ។

- ការកាត់តែង (Pruning) ៖ សំដៅទៅលើការកាត់យកចេញឬបំផ្លាញសរីរាង្គមួយចំនួនរបស់មែកធាង (ដូចជាដើម មែក ស្លឹក ផ្កា ផ្លែ ដើម ឬស។ល។) ដោយអនុលោមតាមតម្រូវការនៃការធ្វើទ្រង់ទ្រាយ។

ការធ្វើរុក្ខជាតិឱ្យមានទ្រង់ទ្រាយល្អស្អាត គឺជាគោលបំណង ហើយការកាត់ចេញ គឺជាមធ្យោបាយ។ ការកាត់ចេញត្រូវបានអនុវត្តនៅលើមូលដ្ឋាននៃរូបរាងដើមឈើជាក់លាក់ ដូច្នេះការធ្វើទ្រង់ទ្រាយ និងកាត់

ចេញ គឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាបានទេ។ ការកាត់ចេញ គឺជាបច្ចេកទេសដាក់លាក់មេកានិច រូបវិទ្យា និងគីមី សម្រាប់កំណត់ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍដើមឈើ។

គោលបំណង និងសារៈសំខាន់នៃការធ្វើទ្រង់ទ្រាយ និងកាត់ចេញ

- លើកកម្ពស់ ឬរារាំងការលូតលាស់របស់មែកធាងដើម្បីគ្រប់គ្រងរូបរាងដើមឈើតាមការចង់បាន
- បង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធមែកធាងសមហេតុផល ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពបញ្ជូនពន្លឺរបស់ដើម

ឈើ

- គ្រប់គ្រងដំណើរការសរីរវិទ្យា ជីវគីមីវិទ្យា និងចាប់យកចង្វាក់នៃការលូតលាស់ និងចេញផ្កា
- អនុវត្តការស្ដារឡើងវិញនៃដើមឈើចាស់ដើម្បីស្ដារភាពរឹងមាំឡើងវិញ
- បង្កើតរូបសណ្ឋានសិល្បៈស្រស់ស្អាតដើម្បីបង្កើនតម្លៃដើមឈើដើម្បីលក់។

បទប្បញ្ញត្តិនៃទំនាក់ទំនងរវាងការលូតលាស់ និងការលូតលាស់បន្តពូជ ៖

- ការកាត់ចេញត្រឹមត្រូវដោយរក្សាគុណភាពរវាងការលូតលាស់ និងការលូតលាស់បន្តពូជ
- ពង្រឹងការលូតលាស់ ទុកឱ្យដើមឈើដុះមែកវែង (កាត់មធ្យមនិងខ្លី) កាត់បន្ថយពន្លកខ្លី និងលើកកម្ពស់មែកឈើវែងមាំដើម្បីបង្កើតសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ការបង្កើតផ្កា។
- ពង្រឹងការលូតលាស់បន្តពូជ ទុកឱ្យដើមឈើមានមែកធាងមធ្យម និងខ្លីច្រើន ដើម្បីប្រមូលផ្តុំសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សុខភាពនៃផ្កា។

៣.៤.១ - វិធីក្នុងការកាត់តែងលម្អរុក្ខជាតិខ្នាតកណ្តាល និងធំ


- កាត់មែកដែលនៅទាបៗចោល ដើម្បីឱ្យផ្នែកខាងក្រោមមើលមើលទៅឃើញស្រឡះល្អ
- លម្អទ្រង់ទ្រាយដើមឈើដោយការកាត់មែកដែលសំយុងធ្លាក់ចុះ និងមែកដែលមើលទៅធ្វើឱ្យខូច

សម្រស់

- កាត់មែកដែលងាប់ចេញ។

ចំពោះរុក្ខជាតិខ្នាតតូចដែលមើលទៅហាក់ប្រវែងប្រដាងមិនល្អ ត្រូវកាត់ត្រូវវាចោលខ្លះ ដើម្បីឱ្យមែកលាស់ត្រូវឡើងវិញ ធ្វើឱ្យទ្រង់ទ្រាយដើមមានសោភ័ណភាពល្អស្អាត និងអាចកាត់លម្អទ្រង់ទ្រាយឱ្យទៅជារូបរាងផ្សេងៗបាន ដូចជាដាំឱ្យវាដុះជាជួរ ឬកាត់ឱ្យមានទ្រង់ទ្រាយមូល ឬជ្រុង...។


វិធីកាត់មែកឈើធំៗ ៖ មែកឈើធំៗ ប្រសិនបើអារ ឬកាត់ភ្ញៀវដើម វាគឺអាចត្រូវទម្ងន់របស់មែកទាញសង្កត់ចុះមកក្រោមរហូតអាចបណ្តាលឱ្យរយះមែក ហើយកើតមានការបែកសំបករបស់ដើម។ ជាការល្អគួរកាត់ឱ្យឃ្លាតពីដើមវាបន្តិច។ ការកាត់គ្រាដំបូង យើងត្រូវកាត់ចេញពីផ្នែកខាងក្រោមមែកឡើងទៅពាក់កណ្តាលសាច់មែក។ ការកាត់លើកទីពីរ អារពីផ្នែកខាងលើឃ្លាតចេញពីស្នាមកាត់គ្រាដំបូងបន្តិច តែត្រូវឱ្យឃ្លាតឡើងទៅផ្នែកខាងចុងមែកបន្តិច ហើយអារពាក់កណ្តាលសាច់មែក។ មែកឈើនឹងអាចបាក់ធ្លាក់ចុះដោយមិនធ្វើឱ្យរយះមែក ដោយសារស្នាមដែលយើងអារទាំងពីរដងនោះ។ កាត់លើកចុងក្រោយ ជាការកាត់ឱ្យភ្ញៀវនឹងដើមដើម្បីយកមែកដែលនៅសេសសល់ចេញ។ បន្ទាប់មកត្រូវរកកាំបិតមុតចៀរស្នាមកាត់ឱ្យស្មើ ហើយលាបស្នាមកាត់ដោយថ្នាំកំប៉ុងពណ៌ខ្មៅ ឬខៀវ ដើម្បីការពារការដុះផ្សិតចង្រៃដែលអាចកើតឡើងនៅពេលត្រូវទឹក ។




៣.៤.២ - ការកាត់ដើមដាច់ដូចៗ

វិធីសាមញ្ញៗដែលគេនិយមប្រើសម្រាប់ពុត ឬកែប្រែរាងរបស់ដើមឈើលម្អផ្សេងៗគឺ ៖

- ដំបូងត្រូវជ្រើសរើសរកដើមដែលមានកម្ពស់ពីរម៉ែត្រ
- ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យដើមឈើចេញជារាងអក្សរអេស (S) ដោយប្រើបង្គោល និងខ្សែចំណង
- ត្រូវកាត់ស្លឹកនៅមែកនីមួយៗឱ្យមានរាងដូចជាបាត ដើម្បីឱ្យមានតុល្យភាពទាំងខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំ និងទាំងខាងលើ និងខាងក្រោម
- កាត់មែកខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំចោលខ្លះដើម្បីកុំឱ្យមានមែកច្រើននៅពេលដុះ
- កែទម្រង់របស់មែកដោយប្រើខ្សែចងក្លាប់ជាមួយដើម ឬខ្សែជាមួយបង្គោល ហើយត្រូវប្រើចង់ប្លាស្ទិចជុំវិញកន្លែងចង ដើម្បីការពារកុំឱ្យខ្សែចងជាប់សំបកឈើនៅពេលដើមលូតលាស់ធំ
- ទាញមែកបន្តិចម្តងៗទៅមុខ និងទៅក្រោយ ដោយលែយ៉ាងណាឱ្យមែកនោះនៅជុំវិញដើម និងមើលទៅមិនស៊ីមេទ្រីនឹងគ្នា
- កាត់មែកតូចៗនៅគល់របស់មែកធំៗដើម្បីឱ្យរាងមែកមូល ឬចង្កោម
- ត្រូវរក្សាបង្គោល និងខ្សែចំណងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ដើម្បីឱ្យដើមឈើងាប់សាច់លែងរំលោភទៅរកសភាពដើម
- ត្រូវលាបថ្នាំកំប៉ុងទៅលើស្នាមកាត់ដើម្បីកុំឱ្យស្នាមនោះរលួយ។



កាត់មែកឱ្យមានតុល្យភាពទាំងឆ្វេង ទាំងស្តាំ ពុតដើមឱ្យមានរាងជាអក្សរ S




កាត់មែកឱ្យសម និងមានតុល្យភាព

៣.៥ - ការបូជី និងបូជើង

គឺអនុវត្តតែចំពោះការដាំដុះដំណាំលម្អក្នុងផ្ទាំង/កន្លែងតែប៉ុណ្ណោះ។ ការងារនេះ គឺត្រូវអនុវត្តជាមួយគ្នានឹងការបូជើង គឺនៅបន្ទាប់ពីដំណាំដាំបានរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយមក ពីព្រោះដីដែលបានដាំជាយូរមកហើយនោះ វាខ្វះអស់ជីជាតិ បើយើងប្រើដីគឺមីវាកាន់តែធ្វើឱ្យដីក្នុងផ្ទាំងនោះកាន់តែរឹង ចរន្តទឹកហូរកាត់មិនល្អ។ ក្នុងពេលដែលយើងបូជី/ផ្ទាំងនោះ យើងគួរប្រើផ្ទាំងដែលមានទំហំធំជាងមុន លែងយ៉ាងណាឱ្យសមល្មមទៅនឹងទំហំដំណាំ។

ការបូជី/ផ្ទាំង ដំណាក់កាលដំបូងត្រូវកាត់យកដីចាស់នៅផ្នែកខាងលើ ផ្ទៃលំដាប់វិញ និងផ្នែកខាងក្រោមចេញខ្លះ ដោយបន្ទុកទុកតែដីដែលជាប់នឹងឫសបន្តិចនៅកណ្តាលដើមតែប៉ុណ្ណោះ។ បើសិនមើលទៅនៅមានឫសច្រើនពេកនោះ យើងអាចកាត់ឫសចេញខ្លះទៀតបាន ដោយមិនបាច់បារម្ភណ៍លំអៀងការងាប់របស់ដំណាំលម្អយើងនោះទេ។ ចំណែកឯមែកខាងលើ ក៏យើងកាត់ចេញខ្លះៗដែរ។ បន្ទាប់ពីបូជី/ផ្ទាំងហើយ គួរយកវាទៅដាក់នៅក្នុងរោងម្ជប់ ហើយស្រោចទឹកជាប្រចាំ។



ការបូជី និងបូជើង

៤ - ជំងឺ និងសត្វល្អិតលើដំណាំលម្អ

ដំណាំលម្អ ជាទូទៅមិនសូវទទួលរងនូវការឈាបសាត់ពីបណ្តាជំងឺ និងសត្វល្អិតឱ្យខ្លាំងក្លាប៉ុន្មាននោះទេ តែក៏មិនអាចនិយាយថា គ្មានជំងឺ និងសត្វល្អិតមកបំផ្លាញនោះដែរ។ ជាទូទៅដំណាំលម្អគេបានជួបប្រទះឃើញមានជំងឺ និងសត្វល្អិតខ្លះៗមកបំផ្លាញគឺ ៖

៤.១ - ជំងឺ

៤.១.១ - ជំងឺមន្ទុកដោយផ្សិត (Fungi)

ផ្សិត គឺជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេ គឺមានរហូតដល់ទៅ១០០០០ប្រភេទ។ ផ្សិតជាក្រុមសារពាង្គកាយដែលប្រជាប្រលូតលាស់របស់វាមានទម្រង់ជាសរសៃឆ្មាៗ ដុះយ៉ាងញឹកដូចសរសៃអំបោះ

ដែលគេហៅថា មីសេលីយ៉ូម (Mycelium)។ វាបែកមែកសាខាយ៉ាងច្រើន ដែលមែកនីមួយៗរបស់វាហៅថា អ៊ីហ្វា (hyphae)។ កោសិការបស់វាគ្មានក្លរូប៊ីលទេ វារស់នៅដោយប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គដែលមានស្រាប់ គឺថា វាជាក្រុមរុក្ខជាតិអេតេរ៉ូត្រូហ្វ (heterotroph)។ ផ្សិតជាសាប្រូកីតមានដុះនៅលើបន្លែ ផ្លែឈើដែលស្អុយរលួយ និងវត្ថុសរីរាង្គដ៏ទៃទៀត។ ផ្សិតខុសពីរុក្ខជាតិថ្នាក់ខ្ពស់ មិនគ្រាន់តែរបៀបរបបប្រើប្រាស់អាហារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែទម្រង់កោសិកា និងចំណែកកោសិការបស់វា ក៏ខុសគ្នាដែរ។ ផ្សិតភាគច្រើនមានក្លាសកោសិកាដែលផ្សំឡើងពីជាតិគីទីន (chitins) និងអ៊ីមីសេលុយឡូស (hemicellulose) វាខុសប្លែកពីក្លាសកោសិការុក្ខជាតិដទៃ ដែលផ្សំឡើងពីជាតិសេលុយឡូស (cellulose) តែមួយមុខ។ ផ្សិតធ្វើចំណែកកោសិកាបានយ៉ាងងាយ ហើយមានបែបផែនជីវិតជាសាប្រូកីត (saprophyte) និងជាបរាសិត (parasite) ។

មុខងារសំខាន់របស់ផ្សិតក្នុងធម្មជាតិ គឺវាធ្វើឧស្ម័និដកម្ម (Mineralize) សមាសធាតុសរីរាង្គ ផ្សិតខ្លះមានសារៈសំខាន់ដល់មនុស្ស ដោយបង្កើតនូវសារធាតុមានប្រយោជន៍ដូចជា Antibiotics ជាដើម។ ផ្សិតខ្លះបង្កឱ្យមានការឡើងមេ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងចំណីអាហារមនុស្ស ដូចជាមេនំប៉័ង ជំបែ...។ ទន្ទឹមនឹងគុណប្រយោជន៍នេះ ក៏មានផ្សិតជាច្រើនដែលបង្កមហន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ច ដែលធ្វើឱ្យខូចខាតនូវផលិតផលកសិកម្ម ទាំងក្នុងពេលកំពុងដាំដុះ និងពេលថែរក្សាទុក ដោយបង្កឱ្យមានជំងឺច្រើនយ៉ាងដល់រុក្ខជាតិ និងផលិតផលដែលគេស្តុកទុក។

ជំងឺដែលបង្កដោយផ្សិតមកលើដំណាំលម្អ មានសញ្ញាណទូទៅរួមទាំងជំងឺ ស្នាមអុចនៅលើស្លឹក, ជំងឺខ្វះពណ៌, ជំងឺដំបៅ, ជំងឺរលួយ, ជំងឺរលួយកូនសំណាប, ជំងឺក្រៀម/ក្រម៉ែ, ជំងឺពកឬស, ជំងឺពក, ជំងឺប្រជ្រុយ, ជំងឺរញ្ជស្លឹក, ជំងឺស្រពោន ជំងឺផ្សិត...។ល។ ជំងឺនេះអាចរីករាលដាលដោយខ្យល់ ទឹក សត្វល្អិត និងដោយសារមនុស្ស។



ជំងឺអុចលើស្លឹក (Leaf spots)



ជំងឺ Mosaic



ជំងឺប្រេតណ៍ទៅជាលឿង (Yellowing)



ជំងឺស្រពោន (Wilting)

វិធានការគ្រប់គ្រងទូទៅលើជំងឺផ្សិត (General control measures for fungal diseases)

- ប្រើប្រាស់ពូជធន់
- ប្រើប្រាស់ពូជដែលគ្មានភ្នាក់ងារបង្ករោគ
- បំផ្លាញរុក្ខជាតិ ឬជម្រកដែលជាកន្លែងរបស់ភ្នាក់ងារបង្ករោគ និងដាំដំណាំបង្វិល
- ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលបានសម្អាតស្អាត
- ត្រូវបង្ហូរទឹកចេញពីក្នុងចំការឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងដាំដុះដំណាំឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់
- ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពេលអនុវត្តក្នុងការបាញ់ ឬរោយថ្នាំគីមីលើដំណាំ ឬគ្រាប់ពូជ ឬលើដីខណៈពេលដំណាំកំពុងលូតលាស់
- ធ្វើអនាម័យចំការ ត្រូវរៀបចំពូជ និងដាំដុះឱ្យបានស្អាតល្អ
- ផលិតកូនសំណាប/គ្រាប់ពូជឱ្យមានសុខភាពល្អ
- ប្រើប្រាស់កំបោរដើម្បីគ្រប់គ្រងជីដែលកើតជំងឺ
- ដកយកដើមដំណាំដែលកើតជំងឺចេញ
- ប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីកម្ចាត់ផ្សិត។

ក-ជំងឺ Fusarium wilt

រោគសញ្ញា និងលក្ខណៈកំណត់ (Symptoms and Characteristics)

ដំណាំដែលបានទទួលផលប៉ះពាល់ ៖ ផ្កាផាត់សំឡី, ប៉េងប៉ោះ, ឌីឡើក ...

- ដំបូង ៖ ស្លឹកនៅពីខាងក្រោមបានបង្ហាញសញ្ញាស្រពោន និងលឿង
- បន្ទាប់ ៖ សញ្ញាពណ៌លឿងមានការរីករាលដាលលើស្លឹកផ្នែកខាងលើ ទីបំផុតដំណាំនឹងស្រពោន និងចុងបញ្ចប់វានឹងងាប់ នៅចុងបញ្ចប់ឬសមានពណ៌ត្នោត និងរលួយ
- កើតឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រជាក់
- កើតឡើងតាមការផ្ទេរគ្រាប់ពូជ។

ការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង (Control and Management)

- ត្រូវប្រើប្រាស់ពូជធន់ទៅនឹងជំងឺផ្សិត

- សម្លាប់មេរោគតាមរយៈការហាលគ្រាប់ពូជដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ
- ការកែប្រែដីឱ្យល្អតាមរយៈការដាក់ដី Ca, P, K
- ត្រាំគ្រាប់ពូជជាមួយថ្នាំ benomyl/carbendazim
- ត្រាំគ្រាប់ពូជជាមួយទឹកខ្ទឹមសរ។



ជំងឺ **Fusarium wilt** លើដំណាំផ្កាផាត់លំឡើ

ខ - ជំងឺរលួយដើម (Stem Rot/Southern Blight (*Sclerotium rolfsii*))

រោគសញ្ញា និងលក្ខណៈកំណត់ (Symptoms and Characteristics)

ដំណាំដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ ៖ ផ្កាអ៊ីកតីដេ, ដំណាំប៉េងប៉ោះ, ដំណាំម្ទេស, ពពួកសណ្តែក។

- មានដុះផ្សិតជាសរសៃស្មារៗនៅនឹងគល់ដំណាំ
- មានដុំមូលពណ៌ត្នោត, ទំហំគឺប្រហែលគ្រាប់រ៉ាឌី
- នៅទីបំផុតដំណាំដែលបានទទួលរងនូវជំងឺនេះគឺស្រពោន និងងាប់

ការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង (Control and Management)

- ត្រូវធ្វើអនាម័យចំការ និងដាំដំណាំបង្វិល
- ក្អួតដីឱ្យជ្រៅ
- ត្រាំគ្រាប់ពូជជាមួយថ្នាំ mancozeb/metalaxyl/carbendazim ។



ជំងឺរលួយដើម (Stem Rot) លើដំណាំផ្កាអ័រគីដេ

គ - ជំងឺក្រាស្លីក (Late Blight *phytophthora infestans*)

រោគសញ្ញា និងលក្ខណៈកំណត់ (Symptoms and Characteristics)

ដំណាំដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ ៖ ផ្កាស្ពៃចនាគ ផ្កាចន្ទ ផ្កាសេប្រា ប៉េងប៉ោះ...

- ស្លឹក, ដើម, ផ្លែ, និងឫសសុទ្ធតែត្រូវបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់
- ជាដំបូងទឹកក្នុងស្លឹកមានលក្ខណៈធម្មតា បន្ទាប់មកជាលិកាស្លឹកប្រែទៅជាពណ៌ប្រផេះក្រមៅ
- កន្លែងរលួយប្រែក្លាយជាស្លឹកបន្តិចម្តងៗ មានពណ៌ក្រមៅនៅលើផ្លែ ស្លឹកទីបំផុតគឺរលួយ
- ជំងឺនេះរាតត្បាតនៅកំឡុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់ មានអាកាសធាតុត្រជាក់ និងមានសំណើមបរិយាកាសខ្ពស់

ការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង (Control and Management)

- ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជ/មើមដែលមានសុខភាពល្អ
- ជៀសវាងការព្យាកគុម្ព និងធ្វើឱ្យជ្រុះស្លឹកក្នុងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់
- អនុវត្តនូវប្រព័ន្ធនៃការបង្ការជាមុនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សិត។



ជំងឺក្រាស្លីក (Late blight) លើដំណាំផ្កាស្ពៃចនាគ និងផ្កាចន្ទ

ឃ - ជំងឺក្រាផៈ (Powdery Mildew) (*Erysiphe* sp.; *Leveillula* sp.; *Sphaerotheca* sp.; *Oidium* sp.)

រោគសញ្ញា និងលក្ខណៈកិនភាគ (Symptoms & Characteristics)

ដំណាំដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ ៖ ផ្ការឺយ៉េឡូតា ផ្កាកូលាប សេប្រា...

- ការកើតមានឡើងនៃផ្សិតពណ៌សនៅផ្ទៃខាងលើនៃស្លឹក
- ជាលិកាស្លឹកគឺមានពណ៌ក្រហមស្រគាំនៅផ្ទៃខាងក្រោមនៃស្លឹក ហើយផ្ទៃខាងលើមានពណ៌លឿងរួមទាំងផ្សិតពណ៌សតូចៗជាច្រើន

ការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង (Control and Management)

- ត្រូវអនាម័យចំការ, ដាំដំណាំបង្វិល, និងបង្កើនប្រពលភាពនៃពន្លឺ
- ប្រើប្រាស់ថ្នាំការពារផ្សិតដើម្បីបាញ់លើស្លឹកដំណាំដូចជាថ្នាំ Mancozeb, chlorothalonil ។



ជំងឺក្រាផៈលើផ្ការឺយ៉េឡូតា ផ្កាកូលាប (Powdery Mildew)




FIGURE 11-50 Disease cycle of powdery mildew of roses caused by *Sphaerotheca pannosa* f. sp. *rosae*.

ខ - ជំងឺស្លាកស្លឹកពណ៌លឿង (Downy Mildew) (*Pseudoperonospora cubensis*)

រោគសញ្ញា និងលក្ខណៈកំណត់ (Symptoms & Characteristics)

ដំណាំដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ ៖ ផ្កាចំប៉ីក្រហម, ផ្កាកូលាប និងដំណាំហូបផ្លាមួយចំនួនទៀត

- រោគសញ្ញាកើតមានឡើងនៅលើស្លឹក
- ជាដំបូងស្នាមរបួលមានពណ៌លឿងស្រាល
- បន្ទាប់មកស្នាមនោះបានប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយប្រផេះរហូត
- សីតុណ្ហភាពចុះទាប និងសំណើមខ្ពស់ជាការអនុគ្រោះដល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ

ការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រង (Control and Management)

- ត្រូវអនាម័យចំការ
- ប្រើប្រាស់ថ្នាំការពារផ្សិតដូចជា Metalaxyl, Maneb, propineb, Mancozeb
- ត្រូវប្រើប្រាស់ពូជធន់



ជំងឺស្លាកស្លឹកពណ៌លឿង (Downy Mildew)

ច - ជំងឺរលួយកូនសំណាម (Damping-Off) (*Pythium spp.*; *Phytophthora spp*)


រោគសញ្ញា និងលក្ខណៈកំណត់ (Symptoms & Characteristics)

ដំណាំដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ ៖ ផ្កាចំប៉ីក្រហម វីយោឡេតា និងដំណាំបន្លែមួយចំនួនទៀតដូចជា ឡឺក ម្រះ ឃ្លោក ប៉េងប៉ោះ គ្រប់ ខ្លឹមបារាំង...

- កើតឡើងនៅក្នុងថ្នាល ដើម សំណាមរងការបំផ្លាញក្លាយទៅជាទឹកត្រាំ ទន់និងបន្ទាប់មកធ្លាក់បាក់
- ឫសដែលរងផលប៉ះពាល់បានក្លាយជាពណ៌ត្នោតហើយបន្ទាប់មកក៏រលួយ
- នៅពេលកាត់ដើមនៅជិតឫសបានបង្ហាញសញ្ញាណសំគាល់ពណ៌ត្នោតតិច ឬច្រើន
- ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺនេះអាចរស់បាននៅក្នុងដីដូចជា saprophytes លើសារធាតុសរីរាង្គដែលពុកផុយ

ការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងជំងឺ (Control and Management)

- មុនការបណ្តុះកូនសំណាបលើថ្នាលត្រូវដាក់ថ្នាំសម្លាប់ផ្សិត Captan fungicide ឬគ្រាំគ្រាប់ពូជជាមួយថ្នាំ Captan 0.2 ទៅ 0.4%
- សម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់នូវថាសសំណាប ជើង និងប្រើទឹកថ្នាំក្លរីន ១០មីលីក្រាម/L
- ការស្រោចទឹកលើសកម្រិត ឬមានសំណើមខ្ពស់ត្រូវបានជៀសវាង
- ថ្នាំសម្លាប់ផ្សិតដូចជា propamocarb hydrochloride និង metalaxyl អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្លាប់ពពួកផ្សិត។



ជំងឺរលួយកូនសំណាប (Damping-Off)

៤.១.២ - ជំងឺបង្កដោយបាក់តេរី

នៅក្នុងផ្នែករបស់បាក់តេរីនេះ រួមមានប្រហែល ៣០០ប្រភេទ។ បាក់តេរីជាក្រុមអតិសុខុមកាយ (micro-organism) ដែលចាត់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋ: Prokaryote ស្ថិតនៅក្នុងផ្នែក Bacteriophyta។ មានជំងឺរុក្ខជាតិជាង ២០០ ប្រភេទដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី ក្នុងនោះជំងឺជាង ១០ប្រភេទដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណាំកសិកម្មដូចជា ដំណាំស្រូវ ដំណាំកសិកម្មសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។ បាក់តេរីមាននៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងដូចជានៅក្នុងទឹក ដី ខ្យល់ ម្ហូបអាហារ និងបន្លែផ្លែឈើជាដើម។ នៅក្នុងទឹកចំនុះ ១cc អាចមានបាក់តេរីរាប់ពាន់ ឯក្នុងដី១ក្រាមមានរហូតដល់រាប់លាន។ មានបណ្តាបាក់តេរីខ្លះទៀតរស់នៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់រុក្ខជាតិ និងសត្វ។

រោគសញ្ញា និងលក្ខណៈកំណត់ (Symptoms and Characteristics)

- ជាទូទៅសរីរាង្គតូចៗនៃបាក់តេរី គឺជាសរីរាង្គឯកកោសិកា
- អាចរស់នៅបាននៅលើកាកសំណល់ដំណាំ, មើម, គ្រាប់ពូជរុក្ខជាតិ និងអាចរស់នៅក្នុងដី ឬក្នុងទឹក
- អាចត្រូវបានរីករាលដាលតាមរយៈសត្វល្អិត ទឹក ឬតាមរយៈសម្ភារៈដាំដុះ
- បណ្តាលឱ្យស្លឹមមានស្នាមអុចៗពណ៌ខ្មៅ, ស្រពោន, រលួយរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស

វិធានការគ្រប់គ្រងទូទៅលើជំងឺបាក់តេរី (General control measures for bacterial diseases)

- ប្រើប្រាស់ពូជធន់

- ដាំដុះពូជដែលមានសុខភាពល្អ
- ប្រមូល និងដុតចោលនូវដំណាំដែលបានកើតជំងឺ
- សម្លាប់មេរោគដែលនៅជាប់ជាមួយឧបករណ៍ និងដៃបន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរុក្ខជាតិមានជំងឺ រួចមក
- លែងកយ៉ាងណាក្នុងការស្រោចទឹក និងការដាក់ជីឱ្យបានសមស្រប
- អនុវត្តការដាំដំណាំបង្វិលដោយមិនឱ្យមានរុក្ខជាតិជាជម្រក
- ប្រើប្រាស់ថ្នាំបាញ់ទៅលើដំណាំឱ្យសព្វទាំងដើមដូចជាថ្នាំ zineb, maneb, or mancozeb លាយជាមួយ សមាសធាតុទង់ដែង

ក - ជំងឺបាក់តេរីស្រពោន (Bacterial wilt) (*Ralstonia solanacearum*)

រោគសញ្ញា និងលក្ខណៈកិនភាគ (Symptoms and Characteristics)

- ដំណាំដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ ៖ ផ្កាកូលាប, ផ្កា Geranium, ប៉េងប៉ោះ, ត្រប់, ម្ទេស, ជំឡូងបារាំង, ននោង ល្អៅ, ថ្នាំជក់
- ការស្រពោននៃរុក្ខជាតិទាំងមូល
- មានវត្តមានពណ៌ស្រអាប់ ឬពណ៌សព្វៀងៗនៃបាក់តេរីហូរជ្រាបចេញ

ការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងជំងឺ (Control and Management)

- អនុវត្តការដាំដុះដំណាំបង្វិលយ៉ាងហោចបំផុតឱ្យបាន៣-៥ឆ្នាំម្តង
- ប្រើប្រាស់ពូជធន់



ជំងឺបាក់តេរីស្រពោនលើដំណាំផ្កា Geranium

ខ - ជំងឺបាក់តេរីអុប (Bacterial Spot) (Xanthomonas sp)

រោគសញ្ញា និងលក្ខណៈកំណត់ (Symptoms and Characteristics)

- ដំណាំដែលបានប៉ះពាល់ ៖ ផ្កាកូលាប, ផ្ការីយ៉ោឡូតា, ផ្ការីយ៉ោល, ប៉េងប៉ោះ, ម្ទេស, ពោត...
- រោគសញ្ញាដំបូង គេឃើញមានស្នាមរាងជារង្វង់ពណ៌ត្នោតខ្មៅ ទៅជាមានរាងធម្មតាមានចំណុចតូចមួយ (ស្លឹក) និងពណ៌លឿងនៅតែមស្លឹក

ការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងជំងឺ (Control and Management)

- ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មពូជ (seed treatment)
- អនុវត្តការបាញ់ថ្នាំការពារដោយលាយជាមួយម្សៅទង់ដែង ដូចជា Mancozeb
- ប្រើពូជជន់។



ជំងឺបាក់តេរីអុប (Bacterial Spot) លើផ្កាកូលាប និងផ្ការីយ៉ោឡូតា

៤.១.៣ - ជំងឺបង្កដោយបាក់តេរីអុប ឬវីរុស

ពាក្យវីរុសកើតមកពីភាសាឡាតាំង “Virus” ដែលមានន័យថាពុល។ វីរុស គឺជាសរីរាង្គដ៏តូចបំផុតដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដោយមីក្រូទស្សន៍ធម្មតាបានទេ។ វត្តមានរបស់វាត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលដែលវាបង្កើតជំងឺនៅលើរុក្ខជាតិ ឬសត្វ។ ជំងឺនេះអាចកើតមានឡើងនៅលើគ្រាប់ ស្លឹក ឬដើម។

អាការៈ និងការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយវីរុសទាំងអស់ គឺវាបង្កឡើងដោយមិនមានភាពដូចគ្នាទេ ភាពមិនប្រក្រតីនៃការលូតលាស់ និងតួនាទី (function) របស់រុក្ខជាតិ។ រោគសញ្ញានៃជំងឺរុក្ខជាតិដែលបង្កឡើងដោយវីរុសមានដូចខាងក្រោម ៖

- ការបាត់បង់ពណ៌នៃស្លឹកឈើ : ឧ. Tobacco mosaic
- ភាពម្ទេរ ឬញញើតនៃស្លឹក : ឧ. Ragged stunt
- ស្លឹកឡើងក្រាស់ : ឧ. Grassy stunt


- ភាពតឿ ឬដុះយឺតៗ : ឧ. Yellow dwarf disease
- ភាពខ្វះខាតផ្លែឈើដោយមានស្នាម និងដំបៅពក
- ភាពស្លូតស្រពោន និងស្នាមជាំៗនៅលើស្លឹក ។

វិធានការគ្រប់គ្រងទូទៅលើជំងឺវីរុស (General control measures for virus diseases)

- ប្រើប្រាស់ពូជធន់
- ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជ, មើម, ក្លៀងដែលគ្មានមេរោគ
- ការពាររុក្ខជាតិពីការភ្ជាក់ងារចម្លងរោគ (ឧទាហរណ៍ ការប្រើប្រាស់គម្របប្លាស្ទិច, គួរឱ្យទាក់ទាញ, ដាក់អន្ទាក់ សត្វល្អិត, ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត)
- សម្អាតស្មៅពីចំណីដែលជាជម្រកសត្វល្អិត។



Yellow Leaf Curl Virus on Orchid



Ringspot Virus



ជំងឺ Rose mosaic virus

៤.២ - សត្វល្អិតលើដំណាំលម្អ

សត្វល្អិតចង្រៃ គឺជាការវាស់ទាំងឡាយណាដែលយើងមិនត្រូវការ ហើយវាបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កោតផលដំណាំដែលកសិករបានដាំដុះ។ ប្រសិនបើសត្វល្អិតមានការកើនឡើងជារឿយៗពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ខណៈពេលដែលយើងគ្មានការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតទេ នោះទំហំនៃការវិនាសអន្តរាយនឹងកើនឡើងជាមិនខាន ដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដែលជាតម្រូវការរបស់មនុស្ស។

៤.២.១ - កណ្តូបបៃតង (Green grasshopper)

Oxya chinensis (Thunberg), សណ្តាន Acrididae, លំដាប់ Orthoptera (ស្លាបត្រង់)

ក ទីតាំងរស់នៅ និងតំបន់ជ្រក

កណ្តូបបៃតង មានវត្តមាននៅបណ្តាប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោក ហើយវាអាចរស់នៅ និងបំផ្លាញរុក្ខជាតិបានយ៉ាងច្រើនប្រភេទ។ កណ្តូបបៃតងស៊ីបំផ្លាញ ផ្ការំយោល ផ្កាកូឡាប ពោត អំពៅ សណ្តែក បន្លែ ផ្លែ ផ្សៅ...។

ខ លក្ខណៈរូបរាង និងលក្ខណៈជីវសាស្ត្រ

កណ្តូបបៃតងពេញវ័យមានប្រវែងពី៣០ទៅ៤៥មីលីម៉ែត្រ មានពណ៌ត្នោតខ្ចីលាយទុំជាមួយលឿងខៀវ និងមានឆ្នុតពណ៌ត្នោតចាស់ចេញពីក្បាលដល់ចុងស្លាប។ ព្រុយក្បាល (Antenna) មានរាងជាសរសៃអំបោះ និងមានថ្នាំងពី២៣ទៅ២៤កង់តភ្ជាប់គ្នា។ ចាប់ពីក្រោយភ្នែកសមាសរហូតដល់ខាងក្រោយនៃផ្នែកទ្រូង មានឆ្នុតពណ៌ត្នោតចាស់នៅខាងខ្នង។ ជើងក្រោយធំពណ៌ខ្មៅ និងមានបន្ទាស្រួចៗជាច្រើន។ កណ្តូបបៃតងញីពេញវ័យអាចរស់បានពី២ទៅ៣ខែ និងអាចពងបានពី២ទៅ៣កញ្ចប់ពង ដែលក្នុងកញ្ចប់ពងនីមួយៗមានពង ប្រមាណពី២០ទៅ១០០ពង។

ពងកណ្តូបបៃតងមានពណ៌លឿងចាស់ មានរាងជាបំពង់ រាងកោងបន្តិចនៅចំពាក់កណ្តាលពង និងមានចុងម្ខាងរីកធំ។ កញ្ចប់ពងមានរាងដូចស្បែងដែលក្នុងនោះពងត្រូវបានទម្លាក់តម្រៀបជាពីរជួរ។ រយៈពេលលូតលាស់នៃពងមានប្រមាណ៦សប្តាហ៍។

កូនកណ្តូបមានពណ៌បៃតង ហើយព្រុយក្បាលរាងជាខ្សែអំបោះ។ ផ្នែកទ្រូងមុខមានប្រវែងវែងជាងក្បាល ហើយពន្លកស្លាបវែងលាតសន្ធឹងដល់កង់ទីបីនៃផ្នែកពោះ។

កូនកណ្តូបសកម្មស្បែកថ្មីពី៥ទៅ៩ដង។ រយៈពេលរីកធំធាត់ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ (សកម្មភាព) គឺពី១០ទៅ១៦ថ្ងៃ។ កូនកណ្តូបរីកធំធាត់ក្នុងរយៈពេលពី៧ទៅ១០ សប្តាហ៍។



កណ្តុបបៃតង (Green grasshopper)

គ - ការរស់នៅ និងការបំផ្លាញ

ក្រោយពេលក្លាយជាកណ្តុបពេញវ័យពី៥ទៅ១០ថ្ងៃ អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ និងចំណីអាហារ។ កណ្តុបបៃតងពេញវ័យចាប់ផ្តើមដោយឈ្មោល និងក្រោយមកប្រមាណពី១០ទៅ៤០ថ្ងៃ វាចាប់ផ្តើមទម្លាក់ពង។ ពងកណ្តុបត្រូវបានទម្លាក់ជាកញ្ចុះនៅក្នុងដី នៅភ្លឺស្រែ ឬនៅវាលស្មៅ។ កណ្តុបបៃតងចូលចិត្តទម្លាក់ពងនៅទីតាំងដីសើមល្អាយខ្សាច់ជាងតំបន់ដីឥដ្ឋ។

កណ្តុបបៃតងពេញវ័យបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងនៅពេលព្រឹក និងពេលល្ងាចត្រជាក់។ វាមានទំនោរហើរចូលអណ្តាតភ្លើង និងត្រូវបានទាក់ទាញដោយពន្លឺការ៉ាស៊ី Ultra violet ។ កណ្តុបបៃតងអាចហែលទឹកនៅពេលវាធ្លាក់ចូលទឹក។ ទាំងសត្វពពេញវ័យ និងកូនកណ្តុប ស៊ីដាច់ស្លឹកស្រូវនៅខ្ចី ឬសំណាបដែលបន្សល់ទុកនូវទ្រនុងស្លឹក និងជាយស្លឹកសងខាងបន្តិច។

ឃ - វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ និងកម្ចាត់

- ត្រូវសម្អាតស្មៅក្នុងចំការដើម្បីបំបាត់ជម្រក
- ប្រើកន្ត្រៃបក់ចាប់កណ្តុបបៃតង
- កណ្តុបបៃតងមានសត្រូវធម្មជាតិដូចជា រុយស៊ីសាច់ Nematode និងដំងីប៉ារ៉ាស៊ីត។ ក្រៅពីនេះមានសត្វចាប ពពួកកង្កែប ហ៊ីង គីងគក់ ពីងពាង ដែលសុទ្ធសឹងជាប្រភេទស៊ីកណ្តុបបៃតង
- អាចប្រើប្រាស់ផ្ទាក់ចំណី ៖ កន្ទក់+ទឹកអំបិល+ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជាក់នៅទីដែលកណ្តុបបៃតងចូលចិត្តពងជាក់ដើម្បីប្រមូលកណ្តុបពេញវ័យ។
- បាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅពេលមានកណ្តុបបៃតងបំផ្លាញខ្លាំង។

៤.២.២ - ថែ (Aphid)

សណ្តាន Aphididae លំដាប់ Homoptera

ជាសត្វល្អិតមានខ្លួនទុន ពណ៌ស លឿង ស្ករចាស់ បៃតង ឬប្រផេះក្រមៅអា ស្រ័យទៅតាមប្រភេទ រុក្ខជាតិដ៏ម្រក (Host)។ ពោះរបស់វាមានបំពង់ពីរលយចេញមក បំពង់នេះសម្រាប់បង្កើតទឹកស្អិតៗ ថ្លា សម្រាប់បញ្ជាក់សត្វស្រមោចឲ្យជួយបន្សាយពូជរបស់វា។ យូរៗទៅទឹកថ្លាៗ ស្អិតៗនេះនឹងក្លាយទៅជាពណ៌ ខ្មៅស្រដៀងនឹងផ្សែងភ្លើងរោលនៅលើស្លឹកដំណាំដែលធ្វើឲ្យដំណើរស្នើសំយោគប្រព្រឹត្តទៅមិនប្រក្រតី។

ការបំផ្លាញរបស់វា គឺប្រើមាត់ចាក់បីតយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីស្លឹក និងត្រួយមែក ដើមនៅខ្លីៗ ដែលធ្វើ ឲ្យស្លឹកម្សៅខ្លួរ ហើយដំណាំក៏ផ្អាកការលូតលាស់ ឬលូតលាស់ យឺត។

ក - តំបន់រស់នៅ និងដំណាំជ្រមក

ចៃបានបំផ្លាញដំណាំមានដូចជា ផ្កាកូលាប ផ្ការំយោល ស្រូវ អំពៅ និងស្មៅចំណីសត្វមួយចំនួនផង ដែរ។ ចៃមានតំបន់រស់នៅយ៉ាងទូលំទូលាយ និងបំផ្លាញទាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាហ្វ្រិក អ៊ីបអាមេរិក និងទ្វីប អាស៊ី។


ខ - លក្ខណៈរូបរាង និងលក្ខណៈជីវសាស្ត្រ

- ចៃប្រភេទ *Myzus persicae* (Sulzer)


- ប្រភេទគ្មានស្លាប ៖ ដងខ្លួនមានរាងដូចពងមាន់ មានពណ៌បៃតង ឬពណ៌ក្រហម ឬពណ៌លឿង ស្រាល និងដងខ្លួនមានប្រវែង១.៣ទៅ១.៩មីលីម៉ែត្រ និងមានបំពង់បីតពណ៌ខ្មៅវែងៗ ព្រុយក្បាលមាន៦ ថ្នាំង ហើយមានពណ៌ខ្មៅ និងពោះមានពណ៌ខ្មៅ។

- ប្រភេទមានស្លាប ៖ ដងខ្លួនមានប្រវែង១.៦ទៅ២មីលីម៉ែត្រ ក្បាល និងផ្នែកទ្រូងមានពណ៌ត្នោត ក្រមៅ រីឯនៅផ្នែកពោះមានពណ៌លឿង ឬបៃតង និងជួនកាលមានពណ៌ក្រហម។ នៅកណ្តាលផ្នែកខាងលើ នៃពោះមានស្នាមខ្មៅធំមួយ។ ព្រុយក្បាលមាន៦ថ្នាំងចំនួន៦ពណ៌ខ្មៅ មានបំពង់បីតវែងដល់ដើមនៃជើង កណ្តាល និងមានពោះពណ៌ខ្មៅ។

កូនចៃពេលធំអតិបរមាមានប្រវែងដងខ្លួនពី១០ទៅ២០មីលីម៉ែត្រ និងមានខ្លួនពណ៌ស ឬពណ៌លឿង ស្រាល មានទ្រូងរាងធំ និងមានក្បាលពណ៌ត្នោត។



ចៃប្រភេទគ្មានស្លាប



ចៃប្រភេទមានស្លាប





ចៃប្រភេទ *Myzus persicae* (Sulzer)

- ចៃប្រភេទ *Rhopalosiphum pseudobrassicae* Davis

ចៃពេញវ័យដែលមានស្លាបមានប្រវែងដងខ្លួនពី១.៦ទៅ២.២មីលីម៉ែត្រ។ ក្បាល និងទ្រូងមានពណ៌ខ្មៅ ពោះពណ៌លឿង ឬពណ៌បៃតង និងមានភ្នែកសមាសពណ៌ត្នោតក្រហម។ ព្រួយក្បាលខ្លីជាងបើប្រៀបធៀបនឹងដងខ្លួន ហើយនៅសងខាងនៃផ្នែកទ្រូងមានអុចខ្មៅល្អិតៗចំនួន៥ម្ខាងៗ។ នៅពេលខ្លះគេសង្កេតឃើញលើដងខ្លួនចៃហាក់បីដូចជាមានដណ្តប់ទៅដោយស្រទាប់ម៉្យាពណ៌ស។

ចៃពេញវ័យដែលជាប្រភេទគ្មានស្លាប មានដងខ្លួនប្រវែង១.៨មីលីម៉ែត្រ ហើយដងខ្លួនមានពណ៌បៃតងលឿង និងនៅលើខ្នងមានឆ្មាតទទឹងច្រើន។



ចៃប្រភេទ *Rhopalosiphum pseudobrassicae* Davis


- ប្រភេទ *Brevicoryne brassicae* Linnaeus

- ប្រភេទមានស្លាប ៖ ចែញពេញវ័យមានដងខ្លួនពី១.៤ទៅ១.៥មីលីម៉ែត្រ។ ផ្នែកទ្រូង និងក្បាលមានពណ៌ខ្មៅ ហើយពោះមានពណ៌បៃតង លឿងបៃតង ឬបៃតងប្រផេះ។ នៅសងខាងដងខ្លួនមានអុចខ្មៅចំនួន៥ ហើយដងខ្លួន គ្របដណ្តប់ទៅដោយស្រទាប់ម្សៅពណ៌ស។


- ប្រភេទគ្មានស្លាប ៖ ចែញពេញវ័យមានដងខ្លួនពី១.៧ទៅ២.២មីលីម៉ែត្រ ដងខ្លួនមានពណ៌បៃតង ត្នោត និងនៅលើដងខ្លួនក៏មានគ្របដណ្តប់ទៅដោយស្រទាប់ម្សៅដែរ។



ចែប្រភេទគ្មានស្លាប



ចែប្រភេទមានស្លាប



ចែប្រភេទ *Brevicoryne brassicae* Linnaeus

គ - ទម្លាប់នៃការរស់នៅ និងការបំផ្លាញ

ចៃពេញវ័យ និងកូនសុទ្ធតែចូលចិត្តប្រមូលផ្តុំចុបបីតម្លែកខ្លីៗនៃដំណាំ ដែលធ្វើឱ្យដំណាំដុះរុញកោង និងលូតលាស់យឺតខុសធម្មតា។ នៅពេលលក្ខខណ្ឌចំណីអាហារខ្សត់ខ្សោយ ដូចជាបរិមាណទឹកក្នុងដំណាំ ជម្រកចម្រុះទាប ឬលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុក្តៅស្ងួត ចៃនឹងកើតប្រភេទមានស្លាបច្រើន។

ចំពោះចៃប្រភេទ *Myzus persicae* បើទោះជាសមត្ថភាពបន្តពូជរបស់វាខ្ពស់ រីកសាយភាយលឿន ក៏ប៉ុន្តែកម្រសង្កេតឃើញវាកើតច្រើនលើដំណាំស្ពៃណាស់ ពីព្រោះវាមានប្រភេទដំណាំជម្រកច្រើន និងអាចបែកខ្ញែកផ្លាស់ទីទៅបំផ្លាញលើរុក្ខជាតិដទៃទៀត។

ក្រៅពីការបំផ្លាញដោយផ្ទាល់ដូចខាងលើ ចៃនៅបានចម្លងជំងឺវីរុស (ពពាសស្លឹក) ដល់ដំណាំទៀតដោយធ្វើឱ្យដំណាំរមួល ឬរុញស្លឹក ដែលបណ្តាលឱ្យដំណាំមិនអាចលូតលាស់ និងអាចបណ្តាលឱ្យងាប់តែម្តង។

ឃ - វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ និងកម្ចាត់

- មុនពេលដាំដុះ ត្រូវសម្អាតស្មៅក្នុងចម្ការ និងក្បែរៗចម្ការ ដើម្បីកាត់បន្ថយប្រភពចៃពីរុក្ខជាតិជម្រកដទៃទៀតដែលហើរចូលបំផ្លាញដំណាំ។

- ដាំដំណាំបង្វិល (Rotation Crop) និងដំណាំឆ្លាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណចៃ

- ប្រើផ្លាស្ទិចគ្របគល់ដំណាំ ដើម្បីឱ្យដំណាំដុះលូតលាស់ល្អដែលអាចធន់ទ្រាំទៅនឹងការបំផ្លាញរបស់ចៃបានមួយកម្រិត

- ប្រើដីអាស៊ូតឱ្យបានសមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់ដំណាំ

- បេះស្លឹក កាត់មែកដំណាំដែលមានចៃកម្ទេចចោល

- គួរដាំដំណាំឱ្យស្របពេលឆ្នាំក្នុងតំបន់ ព្រោះចៃរីកដុះដាលលឿន

- ជៀសវាងការដាំដំណាំញឹកពេក ដើម្បីកាត់បន្ថយសំណើមក្នុងចម្ការដែលជាលក្ខខណ្ឌល្អចំពោះចៃក្នុងការលូតលាស់

- ប្រើប្រេងឆាពីរស្លាបព្រាបាយ សាប៊ូមួយស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយទឹកចំនួនប្រាំលីត្របាញ់កន្លែងកើតចៃ

- ប្រើស្លឹកទាបពីរគីឡូក្រាម ស្លឹកប្រេងខ្យល់ពីរគីឡូក្រាមបុកឱ្យម៉ដ្ឋប្របល់ជាមួយទឹក១០លីត្រ រួចបោះឱ្យស្អាតហើយបាញ់កន្លែងដែលកើតចៃ

- បើដង់ស៊ីតេចៃទាប មិនគួរប្រើថ្នាំគីមីឡើយ ព្រោះចៃមានសត្រូវធម្មជាតិច្រើន។ តែបើមានការបំផ្លាញច្រើនត្រូវប្រញាប់បាញ់ថ្នាំគីមីសម្លាប់ចៃដូចជាប្រើថ្នាំ Oshin (Denotefuran) ឬថ្នាំផ្សេងទៀតដោយពិភាក្សាជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងពិនិត្យមើលការណាំនាំនៅលើស្លាកសញ្ញារបស់ថ្នាំឱ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តប្រើ។

REFERENT

- Amazing Thai Adenium Royal Flora Ratchaphruek 2006
- Crop Science, Ek Sopheap, 2009
- Entomology, KHUN kimkhuy, 2011
- The Flower Expert, Dr. D.G. Hessayon, 1998
- The House Plant Expert, Dr. D.G. Hessayon, 1980
- Insect Pest on Main Crop in Cambodia, Dr. Cheng Hong 2014
- Ornamental Plant Cultivation and Garden Management in Cambodia, CHHEA PHENG, 1996
- Pathology Vegetable, NGIN CHHAY, 1994
- La Plant de la Maison, Jenny Rawort et Val Bradley, 1998
- Les Productions Florales, Dominique MAPPA, 2001