

សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង National University of Management



មូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិតិអាជីវកម្ម

បណ្ឌិត សេវ ឡាយ

បណ្ឌិត នាយ ផាង

សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង National University of Management



មូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិតិអាជីវកម្ម

បណ្ឌិត សៅ ឡាយ

បណ្ឌិត នាយ ផាង

២០២១

មព្វកថា

ដំណើរអភិវឌ្ឍន៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ ជាមេរៀនដ៏ជោគជ័យ បំផុតមួយដែលចាប់បួសគល់ចេញពីការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ការបញ្ចប់សង្គ្រាម ការផ្សះផ្សារជាតិ ការកសាងមូលដ្ឋានរឹងមាំនៃសន្តិភាពនិងស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្រោយពេលដែលសន្តិភាពត្រូវបានកើតឡើងដោយបរិបូណ៌នៅឆ្នាំ១៩៩៨ កម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គឺប្រមាណ ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀត អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពីប្រមាណ ៥៣% នៅឆ្នាំ ២០០៤ មកនៅទាបជាង ១០% នៅឆ្នាំ២០១៩។ ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជាតិជាសកម្មភាពដែលបន្តទៅមុខជាប់ជានិច្ច ហើយគោលនយោបាយថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈអន្តរវិស័យគ្របដណ្តប់ ក៏កំពុងលេចរូបរាងឡើង ដើម្បីតម្រង់ទិសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងឈានឡើងជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០។ ការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនៃនិម្មាបនកម្មពិភពលោកនិងតំបន់ រួមទាំងទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាននិងកំពុងបន្តពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅរកការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ឱ្យស្របទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំម៉ូដែលធុរកិច្ចថ្មីៗ។ ដើម្បីចាប់យកកាលានុវត្តភាពពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងផុសផុលឡើង ប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្សីដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មី នវានុវត្តន៍ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវតែមានការកែលម្អ។

បណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងនាំមុខក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ដោយមានភាគហ៊ុនប្រមាណ ៤៤% នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក។ ប្រទេសចិនកំពុងបន្តកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅវិញប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង និងអាហ្វ្រិក កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការវិនិយោគនេះ ហើយជាលទ្ធផលប្រទេសទាំងនោះក៏ពុំមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែរ។ ទុនវិនិយោគសរុបលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង និងអាហ្វ្រិក មានប្រមាណ ៥% នៃការវិនិយោគ ទាំងមូលរបស់ពិភពលោក ក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំង ២ នេះមានប្រជាជនប្រមាណ ២០% នៃប្រជាជន ពិភពលោក។ ប្រទេសចំនួន ៦ ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ឥណ្ឌា និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលស្មើនឹងប្រមាណ ៧០% នៃទុនវិនិយោគសរុបរបស់ពិភពលោក។

តើចំណេះដឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីទាំងនេះកើតឡើងពីអ្វី? ហើយកើតឡើងដោយរបៀបណា? ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែកសាងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទទួល និងប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើពុទ្ធិ ហើយដែលប្រការនេះចាំបាច់តម្រូវ

ឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា ត្រូវក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋឌីជីថល ពលរដ្ឋសកល និងពលរដ្ឋដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធវិទ្យាដើម្បីទទួលបានមនុស្សធន និងរួមចំណែកក្នុងកំណើន។ ធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់តាំងពីឆ្នាំ២០០២ នូវបម្លាស់ប្តូរនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច ពីសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម និងធនធានអតិកម្ម (Labour and Resource Based Economy) ទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធវិទ្យា (Knowledge Based-Economy) ដែលក្នុងន័យនេះ ពុទ្ធវិទ្យាគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅលើគន្លងដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សង្គមកម្ពុជាត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ជ្រើសរើស បន្សុំ បង្កើតមុខរបរ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធវិទ្យា ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃកំណើន និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅ។ សមត្ថភាពទាំងនេះ អាចកើតឡើងនៅពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការស្រាវជ្រាវ ការបណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិត និងការស្វែងរកនវានុវត្តន៍។

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ គឺជាការត្រួសត្រាយមាត់សម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធវិទ្យា និងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពរស់រវើក។ តាមរយៈមូលដ្ឋានអប់រំ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធវិទ្យានឹងប្រមូលផ្តុំ បង្កើត និងចែករំលែក ទៅកាន់សមាជិកក្នុងសង្គមនូវសម្បទាអប់រំ ពិសេសគឺពុទ្ធវិទ្យាសម្បទា ក្នុងបុព្វហេតុនៃមនុស្សជាតិនិងឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេស។ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធវិទ្យា គឺពុំគ្រាន់តែជាសង្គមដែលសម្បូរព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ តែជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបរិវត្តកម្មព័ត៌មានទៅជា មូលធនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់នៃបច្ចេកវិទ្យានិងតំណភ្ជាប់ បានពង្រីកព្រំដែននៃការចូលទៅកាន់ និងការទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ហើយដែលក្នុងន័យនេះ ការអប់រំនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខនិងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ សង្គមមួយដែលមានអំណាន និងរបាប់ជាបុរេលក្ខខណ្ឌនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាពលរដ្ឋ ពេលនោះបំណិននៃអំណាន និពន្ធ និងការគណនាលេខនព្វន្ត គឺជាចលករនៃការរៀនរបស់សិស្ស។ ធាតុដ៏ចម្បងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការកសាងសង្គមដែលប្រកបដោយ ពុទ្ធវិទ្យាគឺសៀវភៅសិក្សា ហើយការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សាជាប្រចាំ គឺជានវានុវត្តន៍នៃវិស័យអប់រំដែលនាំទៅរកការសិក្សាពេញមួយជីវិត ការអភិវឌ្ឍសម្បទាអប់រំ និងការចែករំលែកចំណេះដឹង។ មូលដ្ឋានអប់រំ ជាពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវមានតួនាទីដែលប្រកបដោយការឆ្លើយតប ចំពោះតម្រូវការខាងលើនេះ។ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំត្រូវបន្តសិក្សាជាប់ជានិច្ច តាមរយៈការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ហើយដែលសៀវភៅសិក្សាទាំងនេះនឹងក្លាយជា ស្ថាននៃទំនាក់ទំនងរវាងនវានុវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា និងការរៀននិងបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

សង្គមដែលប្រកបពុទ្ធវិទ្យា ក៏ជាសង្គមដែលបណ្តុះឱ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធទន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធវិទ្យាដែរ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃបែបផែននេះរួមមាន Silicon Valley នៃសហរដ្ឋអាមេរិក សួនឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសយានយន្តនិងយានយន្តនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ តំបន់ជីវបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌា តំបន់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងសារគមនាគមន៍ ឌីជីថលនៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក៏ដូចជាសួនឧស្សាហកម្មថាមពល និងឥន្ធនគីមីសាស្ត្រនៃប្រទេស

ប្រសើរ ហើយក៏នៅមានទីក្រុងនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃទីក្រុងទាំងនេះគឺការប្រើប្រាស់និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញ និងតម្រង់ទិសដោយចំណេះ ដឹង ហើយដែលចំណេះដឹងទាំងនោះកើតចេញជាជំហាន ពីការវិនិយោគទៅលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃជំនាញជាន់ខ្ពស់ ការប្រកួតប្រជែងដោយគុណាធិបតេយ្យ និង ជាពិសេស គឺការបណ្តុះបណ្តាលអំណាននិងនិស្សិតសៀវភៅ។ ល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែកពុទ្ធិ និងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងមានសន្ទុះលឿនជាងអ្វីដែលសិស្ស និងនិស្សិតអាចទទួលបានពីគ្រូនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលធ្វើឱ្យគោលដៅនៃការអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានការប្រឈមខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយឆ្នាំ មានសៀវភៅជាង ២,២លានចំណងជើង ត្រូវបានសរសេរនិងបោះពុម្ព ដែលក្នុងនោះប្រទេសចិនមាន ៤៤០ ពាន់ ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមាន ៣០៥ពាន់ និងប្រទេសរុស្ស៊ីមាន ១២០ពាន់ចំណងជើង។

ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ មធ្យោបាយសម្រាប់អំណានក៏មានច្រើន ជម្រើសសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជន រួមមានការអានសៀវភៅ ការអានលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ការអានដោយប្រើទូរសព្ទវីដេអូ និងការអានលើកុំព្យូទ័រ ដែលសុទ្ធសឹងជាមធ្យោបាយសំខាន់ៗដែលនាំអ្នកអានទាំងឡាយឱ្យសម្រេចគោលបំណងអានរបស់ខ្លួន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អំណានដោយប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ចំណាយពេលតិច ងាយស្រួលអាន និងជួយដល់បរិស្ថានមួយកម្រិតទៀត។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់អំណានកំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអំណានទាំងនេះ។ បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសជឿនលឿន ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណា អំណានតាមរយៈសៀវភៅនៅតែមានសន្ទុះដដែល។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បច្ចេកវិទ្យាអានបែបទំនើបតាមរយៈឧបករណ៍ទំនើប អាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃធនធានអប់រំឌីជីថល និងមាតិកាឌីជីថលគ្រប់គ្រាន់ដែលបានផលិត និងបង្ហាត់ចែកបាយសម្រាប់អំណាន។

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងបរិការណ៍នៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជំរុញឱ្យមានបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងអេកូស៊ីស្តេមនៃការអប់រំ ជាពិសេសការអប់រំ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការអប់រំពីចម្ងាយដើម្បីលើកកម្ពស់អំណាន តាមរយៈការផលិតមាតិកាឌីជីថលដែលមានភាពចំរុះ ការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកតំណភ្ជាប់និងវេទិកាឌីជីថល ការពង្រីកវិសាលភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផលិតធនធានអប់រំឌីជីថល គួបផ្សំ ជាមួយការចែកសន្លឹកកិច្ចការឱ្យសិស្សយកទៅរៀននៅផ្ទះ និងការចុះទៅជួបជាមួយសិស្សជាបណ្តុំនៅតាមសហគមន៍។ ក្នុងន័យលើកកម្ពស់អំណាន និងភាពសម្បូរបែបនៃធនធានសៀវភៅសិក្សា ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពសក្តិសិទ្ធិ និងផ្តល់ឱកាសអំណានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាលើកទឹកចិត្តនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

1. សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំ សូមបន្តនិងបង្កើនការបោះពុម្ពស្នាដៃបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យធនធានសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប ជាពិសេសធនធានអំណានជាខេមរភាសា

2. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សូមផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចចូលរួមអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមគ្រប់លទ្ធភាពជាមួយធនធានអំណាន ជាពិសេសការរៀបចំឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់សហសិក្សា និងអំណានក្នុងបណ្ណាល័យ
3. សាស្ត្រាចារ្យតាមមុខវិជ្ជា និងអ្នកស្រាវជ្រាវតាមជំនាញឬវិស័យ ត្រូវរៀបចំដំណើរការរៀន បង្រៀន និងស្រាវជ្រាវដែលមានដាក់បញ្ចូលកិច្ចការស្វ័យសិក្សា សហសិក្សា ឬការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យដែលតម្រូវឱ្យនិស្សិត ត្រូវអាននិងស្រាវជ្រាវជាមួយធនធានអំណាន
4. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតបណ្ណាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាឯកសារ ឬមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឌីជីថល ជាដើម ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សា អាចទទួលបាន និងស្វែងរកប្រភពសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប និងមានភាពបត់បែន ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអ្នកអាន
5. និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សា ត្រូវខិតខំនិងចំណាយពេលវេលាអាន និងចាត់ទុកវប្បធម៌ និងអកប្បកិរិយា អំណានជាផ្នែកមួយ នៃពេលវេលានិងភាពស៊ីវិល័យនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
6. បងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលជាមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល សូមជួយជំរុញនិងបង្កលក្ខណៈកាន់តែច្រើនថែមទៀត ជាពិសេសការលែងកំណាយនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ការទិញសម្ភារៈសិក្សា សៀវភៅអាន និងឧបករណ៍ សម្រាប់អំណានដល់កូនៗ ដែលចាត់ទុកជាការ វិនិយោគមួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់បង្កើនចំណេះដឹង និងអនាគតរបស់ពួកគេ។

ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលហៅកាត់ថា “មូលនិធិ ស.គ.ន” និងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The Research Creativity and Innovation Fund ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា “RCI Fund”។ គោលដៅចម្បងនៃមូលនិធិនេះ គឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្តន៍ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលភារូបនីយកម្ម។ មូលនិធិ ស.គ.ន បានសម្រេចកំណត់ប្រធានបទ ជាអាទិភាពសម្រាប់ការគាំទ្រដោយមូលនិធិចំនួន៣ រួមមាន ឌីជីថលនីយកម្មសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ (Digitalization for IR.4.0) ការស្រាវជ្រាវអនុវត្តលើវិស័យកសិកម្ម (Applied Agricultural Research) និងការស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យសតវត្សទី២១ (21st Century Pedagogy Research)។

ដោយមានការធ្វើអាទិភាពរូបនីយកម្មទៅលើទិសដៅនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការ

រៀបរៀង និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សា (Text book) ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ គោលបំណងនៃការរៀបរៀង និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា គឺដើម្បីបង្កើន បរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូនដល់និស្សិតដែល កំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ លើសពីនេះទៀត ការរៀបរៀង និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា មានគោលដៅដូចខាងក្រោម ៖

- ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិតនៅកម្រិត ឧត្តមសិក្សា
- លើកកម្ពស់ទំនើបការបន្ថែម និងឧត្តមានុវត្តន៍នៃការរៀននិងបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវនៅលើ មុខវិជ្ជា កម្មវិធីសិក្សា ឬមុខជំនាញជាក់លាក់
- បង្កើនភាពស៊ីជម្រៅក្នុងការកសាងវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យ និងអ្នក ស្រាវជ្រាវ
- រួមចំណែកដល់ការកសាងភាពជាសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងវប្បធម៌នៃ ការរៀបរៀង និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបោះជំហាន ប្រកបដោយមនសិការវិជ្ជា ជីវៈនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំ រៀបរៀង និងកែលម្អសៀវភៅ សិក្សា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូន និស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សាជា ផ្នែកមួយនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងជាធនធានសិក្សាដែលជាមូលដ្ឋាន មួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់ការបង្រៀន និងរៀន ហើយត្រូវមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ ឆ្លើយតបទៅនឹង កម្មវិធីអប់រំ និងតម្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាគោលការណ៍ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ ត្រូវមាន សៀវភៅសិក្សាដែលប្រើជាគោលសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ។ ចំនួនសៀវភៅសិក្សាដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សារបស់និស្សិត ត្រូវមានយ៉ាងតិចមួយចំណងជើងក្នុងមួយមុខវិជ្ជា ហើយត្រូវ តម្កល់យ៉ាងតិច ២ច្បាប់ នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ឬអាចរកបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតជូនដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន ដែលបានស្នើសុំថវិកាមូល និធិរួច សូមចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនចំណងជើងសៀវភៅ។ ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនដែលពុំទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំ សូមចូលរួម ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់តម្រូវការដ៏ទទួច និងថ្លៃថ្លានៃនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

សេចក្តីបញ្ជាក់
នៃមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍

សៀវភៅសិក្សានេះជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំអនុវត្តវិកាមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងគម្រោងរៀបរៀង និងនិងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបរៀង និងនិង ឬកែលម្អដោយមានការធានាអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នក និងនិងផ្ទាល់ និងបានឆ្លងកាត់ត្រួតពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងវាយតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សាអប់រំ ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ឬក្រុមប្រឹក្សាដែលមានតម្លៃស្មើនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងតាមរយៈកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើង និងដែលបានតម្កល់ទុកនៅមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។ រាល់ខ្លឹមសារ ការបកស្រាយ និងរូបភាព គឺជាជំហរនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ ហើយ ពុំឆ្លុះបញ្ចាំង ឬជាតំណាងដល់មូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឡើយ។

លេខកថា

សៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិតិនៃអាជីវកម្មនេះ ត្រូវបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬថ្នាក់ប្រហាក់ប្រហែល។ វាគ្របដណ្តប់ទៅលើផ្នែកសំខាន់ជាច្រើននៃស្ថិតិដែលអនុវត្តលើផ្នែកអាជីវកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច។ វាត្រូវបានរៀបរាងឡើងដោយមានលំដាប់លំដោយច្បាស់លាស់ ដោយចាប់ផ្តើមពីការបែងចែកប្រភេទអថេរ ឬទិន្នន័យ វិធីវាស់វែង គណនា បង្ហាញ ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្ម និង ការសន្និដ្ឋាន ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងអាជីវកម្ម ហើយលើសពីនេះទៅទៀត សៀវភៅនេះក៏បានបញ្ចូលផ្នែកព្យាករណ៍ខ្លះផងដែរ។ ផ្នែកនីមួយៗមានបញ្ចូលឧទាហរណ៍ច្បាស់លាស់ ដោយចាប់ផ្តើមពី បង្ហាញរូបមន្ត បន្ទាប់មកការអនុវត្តរូបមន្តតាមរយៈការគណនាដោយដៃ ព្រមទាំងការអនុវត្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ តាមរយៈកម្មវិធី Excel និង SPSS ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀប ឬផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលជាមួយគ្នា ហើយនៅចុងជំពូកនីមួយៗគឺមានសំណួរ និងលំហាត់អនុវត្តដើម្បីឲ្យនិស្សិតរៀនគ្រាប់ធ្វើតាម។

ក្រោយពីបានអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិតិនៃអាជីវកម្មនេះរួច អ្នកសិក្សាមានចំណេះចេះដឹងអាចធ្វើការអនុវត្តដោយផ្ទាល់ តាមរយៈការប្រមូលទិន្នន័យរួចធ្វើតេស្តលើគោលនយោបាយ សរសេរសារណា ឬសរសេរអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗ និងអាចចេះព្យាករណ៍នៅពេលអនាគតថែមទៀតដែរ។

ទោះបីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិតិនៃអាជីវកម្មនេះ រៀបចំឡើងដោយសំរិតសំរាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ រមែងតែមានចំណុចខ្លះខាតខ្លះពិតជាមិនខាន ហើយអ្នកចង់ច្រងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា វាអាចបំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការរបស់និស្សិត និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនធំ ក៏ដូចជាអ្នកអានជាច្រើនទៀតផងដែរ។ អាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកចងក្រងស្នាដៃសៀវភៅនេះឡើង រង់ចាំទទួលនូវមតិវិចិត្រស្ថាបនាពីសំណាក់អ្នកអាន ក៏ដូចជាគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ គ្រប់ពេលវេលានិងដោយក្តីរីករាយបំផុត ដើម្បីកែលំអរសៀវភៅនេះឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងនាពេលអនាគត។

សៀវភៅនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយគំនិតផ្តួចផ្តើម ជំនួយស្មារតីនិងហិរញ្ញវត្ថុពីប្រភពផ្សេងៗ ដូច្នេះយើងខ្ញុំគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហោ ប៉េង សកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និង ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ដែលជាស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា ព្រមទាំងម្ចាស់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទៃទៀត។ ហើយលើសពីនេះទៅទៀត ក៏សូមថ្លែងចំពោះ ភរិយា ស៊ីម វិច្ឆិកា និង ចន្ទា សូដានី ដែលបានគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តក្នុងរៀបរៀងនិងនិពន្ធសៀវភៅនេះ។

ថ្ងៃចន្ទ ១៤រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

អំពីអ្នកនិពន្ធ



បណ្ឌិត **នាយ ឆាន** បច្ចុប្បន្នជាព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មានវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។ លោកបាននិងកំពុងបង្រៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង នូវមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជា Applied Statistics for Business and Economics, Management Information Technology, Quantitative Analysis, Inventory Management, Introduction to Statistics, និង Mathematical Analysis។ លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាក្រុងហាណូយ វៀតណាម ឆ្នាំ ១៩៩៧ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យ Universiti Utara Malaysia (UUM) សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០១ និងសញ្ញាបត្របណ្ឌិត ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០១៧។ លើសពីនេះ លោកក៏បានសរសេរអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយនៅ NUM Research Series បានចំនួន ៧ អត្ថបទ ។ ក្រៅពីការងារបង្រៀនជាង ២៣ឆ្នាំ និងការងារសរសេរបោះពុម្ពផ្សាយ លោកក៏បានចូលរួមដឹកនាំនិស្សិតក្នុងការសរសេរសារណាសម្រាប់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិតថែមទៀតផង។



បណ្ឌិត **សៅ ឡាយ** បច្ចុប្បន្នជាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ច្បាប់សាធារណៈ នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។ លោកកំពុងបង្រៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង នូវមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជា Econometrics for Finance, Econometrics, Applied Statistics for Business and Economics, Investment Analysis and Portfolio Management, និង Financial Risk Management។ លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ ១៩៩៧ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ Universiti Utara Malaysia (UUM) សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០១ និងសញ្ញាបត្របណ្ឌិត ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០១២។ លោកបានសរសេរសៀវភៅ “លំនាំដើមនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ” (បោះពុម្ព ៧លើក ចេញនៅឆ្នាំ២០០៦ និងចុងក្រោយគឺឆ្នាំ ២០២១) សម្រាប់បង្រៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។ ក្រៅពីនេះលោកក៏បានសរសេរអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយនៅ NUM Research Series បានចំនួន ៨ អត្ថបទ និងមួយអត្ថបទទៀត គឺបានបោះពុម្ពជាអន្តរជាតិ ជាទម្រង់ “Working Paper” នៅឆ្នាំ ១៩១៨។ ក្រៅពីការងារបង្រៀនជាង ២៣ឆ្នាំ និងការងារសរសេរបោះពុម្ពផ្សាយ លោកក៏បានចូលរួមដឹកនាំនិស្សិតក្នុងការសរសេរសារណាថ្នាក់បណ្ឌិតបានចំនួន ៣នាក់ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀត។

តារាងមាតិកា

ជំពូកទី 1 លំនាំដើមនៃស្ថិតិ	1
គោលបំណង	1
1.1 ស្ថិតិគឺជាអ្វី?	1
1.2 ហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវការរៀនស្ថិតិ?	1
1.3 វាក្យសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននៃស្ថិតិ	2
1.4 ប្រភេទនៃអថេរ	3
1.5 រង្វាស់អថេរ	4
1.6 កម្មវិធីសម្រាប់គណនាស្ថិតិ	6
1.7 របៀបប្រើប្រាស់សៀងកៅនេ:	6
ជំពូកទី 2 ការរៀបបំប៉នទិន្នន័យ	8
គោលបំណង	8
2.1 ទិន្នន័យនិងប្រភពទិន្នន័យ.....	8
2.2 ការរៀបចំទិន្នន័យអថេរប្រភេទ ឬជាចំ	8
2.3 អថេរប្រភេទដែលមានមួយអថេរ	9
2.2.2 អថេរប្រភេទដែលមានពីរប្រើនអថេរ.....	11
2.3 ការរៀបចំទិន្នន័យជាលេខ	14
2.3.1 លំដាប់លំដោយ និងបំណែងចែកក្រោយកង់ចំពោះទិន្នន័យជាលេខ.....	14
2.4 គំនូសតាងអថេរជាលេខ.....	17
a. គំនូសតាងដើមនិងសន្លឹក	17
b. គំនូសតាងហ៊ីស្តូក្រាម.....	18
c. គំនូសតាងប៉ូលីហ្គុន	18
d. គំនូសតាងហាយ-ឡូ-ខូស	20
e. គំនូសតាង ស្មាត្រីផ្គុំត	22

f. គំនូសតាងជាស៊េរី	23
ជំពូកទី 3 ស្ថិតិបរិយាយ	29
គោលបំណង	29
3.1. ស្ថិតិបរិយាយ	29
3.2 រង្វាស់កណ្តាល.....	29
3.2.1 មធ្យមពិជគណិត.....	30
3.2.2 មធ្យមទម្ងន់	30
3.2.3 មធ្យមធរណីមាត្រ.....	31
3.2.4 មេដ្យាន	31
3.2.5 ម៉ូដ.....	32
3.3 រង្វាស់ភាពរាយប៉ាយ	33
3.3.2 វ៉ារីយ៉ង់និងគម្លាតស្តង់ដារ	33
3.3.3 មេគុណនៃភាពរាយប៉ាយ	37
3.3.4 សតភាគ ចតុភាគ ចន្លោះចតុភាគ និង គំនូសប្រអប់	37
3.4 បំណែងចែកទម្រង់ទិន្នន័យ.....	41
3.5 កូរ៉េវីយ៉ង់និង មេគុណទំនាក់ទំនង	44
ជំពូកទី 4 បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរដាច់.....	49
4.1 បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរដាច់	49
4.1.1 តម្លៃរំពឹងទុកនៃបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេរបស់អថេរដាច់	50
4.1.2 វ៉ារីយ៉ង់និងគម្លាតស្តង់ដារនៃអថេរដាច់.....	50
4.2 កូរ៉េវីយ៉ង់ និងការអនុវត្តក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ.....	51
4.2.1 កូរ៉េវីយ៉ង់	51
4.2.2 អត្រារំពឹងទុកនិងហានិភ័យនៃសម្លៀកវិនិយោគ.....	53
4.3 បំណែងចែកទ្វេធា	54

4.3.1 ប្រៀបធៀបប្រភេទនៃបំណែងចែកទ្វេធានិងវិបាក	54
4.3.2 តម្លៃមធ្យម វ៉ារីយ៉ង់ និងគម្លាតស្តង់ដារនៃបំណែងចែកទ្វេធា	56
4.4 បំណែងចែកព័រសុង	56
4.5 បំណែងចែកអ៊ីពែកែហ្សូនមីទ្រីស	57
4.6 បំណែងធម្មតា	59
4.6.1 បំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ.....	61
4.6.2 គណនាប្រៀបធៀបប្រភេទនៃបំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ.....	62
4.6.3 ការវាយតម្លៃ ន័រម៉ាល់លីតធី	64
4.7 បំណែងចែកឯកសណ្ឋាន	68
4.8 បំណែងចែកអេចស្ត្រូណង់ស្យែល	69
ជំពូកទី 5 ការប្រមូលទិន្នន័យនិងបំណែងចែកប៉ាន់គំរូ	74
5.1 វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូ.....	74
5.1.1 វិធីសាស្ត្រចៃដន្យ	75
5.1.2 វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូជាប្រព័ន្ធ	75
5.1.3 វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមកូតា	76
5.1.4 វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមក្រុម	77
5.2 វិធីសាស្ត្រមិនមែនប្រៀបធៀបប្រភេទ	78
5.2.1 វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមបែបវិនិច្ឆ័យ	78
5.2.2 វិធីសាស្ត្រវិដាយស្រួល.....	79
5.3 ការវាយតម្លៃលើការប្រមូលប៉ាន់គំរូក្នុងករណីស្ទង់មតិ.....	79
5.3.1 កំហុសក្នុងការស្ទង់មតិ	79
5.3.2 បញ្ហាក្រុមសីលធម៌.....	80
5.4 បំណែងចែកតម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូ.....	80
5.5 ភាពមិនលំអៀងនៃបំណែងចែកតម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូ.....	83

5.6 បំណែងចែកប៉ាន់គំរូនៃសមមាត្រ.....	85
ជំពូកទី 6 ការប៉ាន់ស្មានលើចន្លោះជឿជាក់.....	90
6.1 ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមពេលគម្លាតស្តង់ដារដឹង	90
6.2 ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមពេលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង	92
6.2.1 វិធាននៃបំណែងចែកអក្សរធី.....	92
6.2.2 ចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមពេលដែលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង	93
6.3 ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់សមមាត្រ.....	94
6.4 ការកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូ	95
6.4.1 ការកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូសម្រាប់តម្លៃមធ្យម	95
6.4.2 ការកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូសម្រាប់សមមាត្រ.....	96
6.5 ការអនុវត្តន៍ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់ទៅលើសាវនកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យគុណភាព	97
6.5.1 ការប៉ាន់ស្មានលើបរិមាណសរុបនៃចំនួនសកល	97
6.5.2 ការប៉ាន់ស្មានលើភាពខុសគ្នា.....	99
6.5.3 ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់កន្ទុយម្ខាង	100
6.6 ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់និងបញ្ហាសីលធម៌	101
ជំពូកទី 7 ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មសម្រាប់ប៉ាន់គំរូតែមួយ.....	104
7.1 នីតិវិធីសំខាន់នៃការធ្វើតេស្តសម្មតិកម្ម.....	104
7.2 ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មកន្ទុយសងខាង	107
7.2.1 ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មកន្ទុយសងខាងពេលគម្លាតស្តង់ដារដឹង	107
7.2.2 ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មកន្ទុយសងខាងពេលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង	111
7.3 ការធ្វើតេស្តកន្ទុយម្ខាង	113
ជំពូកទី 8 ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មលើប៉ាន់គំរូពីរ.....	122
8.1 ការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសកលពីរដែលឯករាជ្យ	122
8.1.1 តេស្តរកភាពខុសគ្នានៃតម្លៃសកលពីរដែលមានវ៉ារីយ៉ង់ស្មើគ្នា	122

8.1.2 ជីវិតស្ថានភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសកលពីរដែលមានវ៉ារីយ៉ង់មិនស្មើ.....	125
8.2 ការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកលពីរដែលទាក់ទងគ្នា.....	127
8.2.1 ជីវិតស្ថាន្យន័យជាគូរ	127
8.2.2 ប្រើតម្លៃក៏វែលយូ	129
8.2.3 ប្រើចន្លោះជឿជាក់.....	129
8.3 ការប្រៀបធៀបតម្លៃខុសគ្នារបស់សមាមាត្រ.....	130
8.3.1 ការប្រើតេស្តស្ថិតិ	131
8.3.2 ការប្រើតម្លៃក៏វែលយូ.....	132
8.3.3 ការប្រើចន្លោះជឿជាក់.....	132
8.4 ការធ្វើតេស្តលើវ៉ារីយ៉ង់	133
8.4.1 ការប្រើតេស្តស្ថិតិ	135
8.4.2 ការប្រើតម្លៃក៏វែលយូ.....	135
ជំពូកទី 9: ឆាយវិញ្ញូតេស្តនិងតេស្តដទៃទៀតដែលមិនមែនជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្ត	141
9.1 ឆាយវិញ្ញូតេស្តចំពោះភាពអនុលោមតាម.....	141
9.2 ឆាយវិញ្ញូតេស្តសម្រាប់តារាងខ្វែង	144
9.2.1 ឆាយវិញ្ញូតេស្តរកតម្លៃខុសគ្នារវាងសមាមាត្រពីរ	144
9.2.2 ឆាយវិញ្ញូតេស្តរកភាពខុសគ្នារវាងសមាមាត្រលើសពីពីរ.....	148
9.3 ឆាយវិញ្ញូតេស្តរកភាពឯករាជ្យ	152
9.4 ម៉ាកណេម៉ាតេស្ត	155
9.5 វីក្យូសុនតេស្តលើចំនួនសកលពីរឯករាជ្យ	160
9.5.1 វីក្យូសុនតេស្តលើចំនួនសកលពីរឯករាជ្យ: ប៉ាន់គំរូតូច.....	161
9.5.2 វីក្យូសុនតេស្តលើប៉ាន់គំរូពីរឯករាជ្យ: ប៉ាន់គំរូធំ	163
9.5.3 វីក្យូសុនតេស្តលើប៉ាន់គំរូពីរមិនឯករាជ្យ: ប៉ាន់គំរូធំ	166
9.6 គ្រួសារលំហូរលីសតេស្ត.....	169

ជំពូកទី 10 សមីការលីនេអ៊ែរ.....	177
10.1 ការវិភាគសមីការលីនេអ៊ែរ.....	177
10.2 សមីការលីនេអ៊ែរ.....	178
10.3 ការកំណត់ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ.....	179
10.3.1 វិធីសាស្ត្រអឌ្ឍនណារីលីសស្វ៊ែរ.....	180
10.3.2 ការវាស់វែងបម្រែបម្រួល.....	186
10.3.3 ការគណនាបម្រែបម្រួល.....	187
10.3.4 គណនាអ៊ែកាវ៉េ.....	188
10.3.5 អ៊ែរីស្តង់ដារ.....	189
10.4 ការសន្និដ្ឋានអំពីមេគុណប្រាប់ទិស.....	190
10.5 អ៊ែហ្វតេស្តសម្រាប់ម៉ូដែលទាំងមូល.....	192
10.5 លក្ខខណ្ឌនៃសមីការលីនេអ៊ែរ.....	192
10.5.1 ការវាយតម្លៃទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់.....	193
10.5.2 ការវាយតម្លៃលើភាពឯករាជ្យ.....	196
10.5.3 ការវាយតម្លៃភាពថេរនៃវ៉ារីយ៉ង់និងដំណោះស្រាយ.....	202
10.6 ដំណោះស្រាយពេលវ៉ារីយ៉ង់មិនថេរ.....	205
10.7 ការព្យាករណ៍.....	211
ឯកសារយោង.....	216
ឧបសម្ព័ន្ធ.....	218

ជំពូកទី 1

លំនាំដើមនៃស្ថិតិ

(Introduction to Statistics)

គោលបំណង

- កំណត់និយមន័យស្ថិតិ
- ពន្យល់មូលហេតុដែលនាំអោយរៀនពីស្ថិតិ
- ពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃស្ថិតិនៅក្នុងជំនួញ
- ពន្យល់អំពីប្រភេទនៃស្ថិតិ
- ពន្យល់អំពីកំហុសនៃការប្រើប្រាស់ស្ថិតិ

1.1 ស្ថិតិគឺជាអ្វី?

ស្ថិតិគឺផ្នែកមួយនៃគណិតវិទ្យាដែលបានប្រើ(អនុវត្ត)ក្នុងការប្រមូល រៀបចំ បង្ហាញ ឬពិពណ៌នា វិភាគនិង បកស្រាយទិន្នន័យចេញពីតំណាងប៉ាន់គំរូ ដែលមានបរិមាណតិច ដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានទៅលើសកល ដែលមានបរិមាណច្រើន¹។

ផ្អែកតាមនិយមន័យខាងលើ ស្ថិតិត្រូវបានចែកជាពីរផ្នែក៖

- ស្ថិតិបែបពិពណ៌នា ឬ វិយាយ (descriptive statistics) ៖ សិក្សាអំពីការប្រមូល រៀបចំ បង្ហាញ វិភាគទៅលើសំណុំទិន្នន័យណាមួយ។
- ស្ថិតិបែបសន្និដ្ឋាន (inferential statistics) ៖ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានប្រមូលពីក្រុមតូច ឬប៉ាន់គំរូ ដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីក្រុមធំ ឬហៅថាចំនួនសកល (population) ។

ឧទាហរណ៍1.1 និស្សិតមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង នៅឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 មានចំនួនទាំងអស់ 500នាក់។ អ្នកស្ថិតិម្នាក់ចង់ដឹងថានិស្សិតទាំង500នាក់ចំណាយជាមធ្យម ក្នុងមួយឆ្នាំអស់ប៉ុន្មានដុល្លា? គាត់សំរេចចិត្តសាកសួរនិស្សិតចំនួន 50នាក់អំពីចំណាយរបស់ពួកគេ ដោយសាកសួរម្តងម្នាក់ៗ រួចធ្វើការកត់ត្រា ប្រមូល រៀបចំ សង្ខេបទិន្នន័យទាំងនេះយកមកធ្វើបទបង្ហាញ ហៅថាស្ថិតិបែបពិពណ៌នា និងធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីការចំណាយជាមធ្យមរបស់និស្សិតទាំងអស់(500 នាក់) ដោយផ្អែកលើប៉ាន់គំរូចំនួន 50នាក់ ហៅថាស្ថិតិបែបសន្និដ្ឋាន។

1.2 ហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវការរៀនស្ថិតិ?

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ មនុស្សយើងត្រូវការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោះស្រាយការងារដូច្នេះស្ថិតិគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ចាប់ពីអ្នកសិក្សា រហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ។ ជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនចង់បានការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលត្រឹមត្រូវ ហើយដើម្បីឲ្យការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះកើត វាតម្រូវអោយធ្វើតាមក្បួនខ្នាតបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិង ប្រាកដនិយម មិនមែនតាមបែបអោយរាយការនោះទេ។

¹ និយមន័យដកស្រង់ចេញពី (1/5/2021) <https://www.investopedia.com/terms/s/statistics.asp>

ការធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្តតាមបែបប្រាកដនិយមគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យ ហើយទិន្នន័យនោះទៀតសោត មានគ្រប់ទីកន្លែង បើមិនយល់ដឹងអំពីស្ថិតិ របៀបរបបក្នុងការប្រមូល រៀបចំ បកស្រាយនោះទេ យើងមិនអាចបំប្លែងទិន្នន័យទាំងនេះទៅជាព័ត៌មាន ដើម្បីជំនួយដល់ការធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានឡើយ។ លើសពីនេះទៅទៀត ស្ថិតិអាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើការការប្រមូលទិន្នន័យដែលកើតមាននៅអតីតកាល ដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋាន កែលំអរពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងអាចព្យាករណ៍អំពីអនាគតកាលទៀតផង។

1.3 វាក្យស័ព្ទមូលដ្ឋាននៃស្ថិតិ

- អថេរ (variable) គឺជាចរិតលក្ខណៈនៃវត្ថុ ឬបុគ្គលដែលអ្នកចង់វិភាគ ឧទាហរណ៍ អថេរចំណាយទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម អាយុ ឬពិន្ទុរបស់និស្សិត។ល។
- ទិន្នន័យ (data) គឺជាតម្លៃដែលទាក់ទង ឬនៅជាប់ជាមួយអថេរ។ ឧទាហរណ៍ ការចំណាយទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (ជាអថេរ ហើយមានតែជាឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះ) គិតជាដុល្លារប្រចាំខែ (ទិន្នន័យជាខែ) អាយុគិតជាឆ្នាំ ទម្ងន់គិតជាគីឡូក្រាម។ល។
- និយមន័យប្រតិបត្តិការរបស់អថេរ (operational variable definition) សំដៅទៅលើវិធីដែលអ្នកកំណត់អត្ថន័យ និងវាស់វែងអថេរជាក់លាក់ណាមួយដែលអ្នកយកមកប្រើក្នុងការសិក្សារបស់អ្នក។ បើពុំមានកំណត់និយមន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេ វាអាចធ្វើអោយមានការយល់ច្រឡំអំពីអត្ថន័យរបស់អថេរមួយ ទៅអថេរមួយទៀត ពីព្រោះអថេរមួយអាចមានន័យលើសពីមួយ ឬពាក្យនោះមានន័យមិនច្បាស់លាស់ ។ ឧទាហរណ៍ កូនក្មេងចង់សំដៅលើមនុស្សដែលមានអាយុចន្លោះពី 6-12 ឆ្នាំ ហើយអ្នកមានការងារធ្វើគឺជាអ្នកដែលមានការងារធ្វើជាប់លាប់ 8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ 48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍យ៉ាងតិច។ល។
- ចំនួនសកល (population) សំដៅទៅលើក្រុមមនុស្សទាំងមូល វត្ថុទាំងអស់ ឬព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូល។ វាគឺជាក្រុមធំដែលអ្នកសិក្សាចង់សន្និដ្ឋាន ឬប៉ាន់ស្មាន។ ឧទាហរណ៍ និស្សិតMBAថ្នាក់ស៊េរី អាទិត្យទាំងអស់នៅ NUM មានចំនួន 800នាក់នៅឆ្នាំសិក្សា 2020-2021។ ពាណិជ្ជករទាំងអស់នៅភ្នំពេញនៅឆ្នាំ 2021 មាន1លាននាក់។ល។
- ប៉ាន់គំរូ ឬ សំណាក(sample) គឺជាផ្នែកមួយរបស់ចំនួនសកលដែលជ្រើសរើសមកធ្វើការវិភាគ ។ វាតំណាងអោយក្រុមតូច ឧទាហរណ៍ និស្សិតMBAថ្នាក់ស៊េរី អាទិត្យទាំងអស់នៅ NUMមានចំនួន 800នាក់នៅឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 យើងសាកសួរចំនួន100នាក់ធ្វើជាប៉ាន់គំរូ។
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (parameter) គឺជាវង្វាស់ជាលេខដែលបរិយាយអំពីចំនួនសកល
- ស្ថិតិ (statistics) គឺវាវាស់ជាលេខដែលបរិយាយអំពីប៉ាន់គំរូ។

ឧទាហរណ៍ 1.2 យើងចង់សិក្សា ចំណូល (income) របស់ CEO ធនាគារទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជា នៅឆ្នាំ 2020 ដែលមានចំនួន 26 នាក់ មានឈ្មោះ A, B, C ដល់ Z (ជាចំនួនសកល) ហើយយើងសម្ភាសតែ 10នាក់(ជាប៉ាន់គំរូ) ដោយចៃដន្យ។ ចំណូលជាមធ្យមរបស់CEOទាំង26នាក់វាស់ដោយ (μ) ហើយចំណូលរបស់ប៉ាន់គំរូ 10នាក់វាស់ដោយ x ។ តារាង 1.1 បង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍ រង្វាស់ផ្សេងៗនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រនិងស្ថិតិ។

តារាង 1.1 រង្វាស់ផ្សេងៗនៃចំនួនសកលនិងស្ថិតិ

Population	Sample
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z	A D G H K O R T W Y
រង្វាស់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	រង្វាស់ស្ថិតិ
មធ្យម (μ)	មធ្យម ($\bar{x}$)
វ៉ារីយ៉ង់ (σ^2)	វ៉ារីយ៉ង់ (S^2)
គម្លាតស្តង់ដារ (σ)	គម្លាតស្តង់ដារ (S)

1.4 ប្រភេទនៃអថេរ

ជាទូទៅអថេរត្រូវបានចែកចេញជាពីរប្រភេទ៖ អថេរគុណវិស័យ និងអថេរបរិមាណវិស័យ ។

- អថេរប្រភេទ ឬគុណវិស័យ (categorical or qualitative variable) គឺជាអថេរដែលមិនមានតម្លៃជាលេខ ឧទាហរណ៍ អថេរភេទ (gender variable) គឺមាន ស្រី/ប្រុស អថេរចម្លើយ (answer variable) មាន៖ yes/no។
- អថេរបរិមាណវិស័យ (numerical or quantitative variable) គឺជាអថេរដែលមានតម្លៃជាលេខ ហើយអថេរនេះត្រូវបានបែងចែកជាពីរគឺ៖ លេខចំនួនគត់ឬអថេរជាប់ និងលេខដែលមានក្បៀសឬអថេរដាច់។
 - អថេរជាប់ ឬជាលេខចំនួនគត់ (discrete variable) ឧទាហរណ៍ ចំនួនកូននៅក្នុងបន្ទុក ឬចំនួនទូរស័ព្ទ ចំនួនបន្ទប់កេងរបស់សណ្ឋាគារ។
 - អថេរដាច់ ឬជាលេខដែលអាចមានក្បៀស (continuous variable) ឧទាហរណ៍ ចំណូលរបស់គ្រូបង្រៀនគឺ \$6.8/ម៉ោង ត្រីមានទម្ងន់ 2.5គីឡូ ឬចំងាយ 3.0 គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះទៅសាលារៀន។

1.5 រង្វាស់អថេរ

ជាទូទៅរង្វាស់អថេរគឺអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទនៃអថេរ៖

- បើសិនជាអថេរនោះជាអថេរដាច់ឬប្រភេទ (categorical variable) យើងអាចប្រើរង្វាស់ ល្អមីណាម៉ាល់ស្តែល (nominal scale) ឬប្រើរង្វាស់អរឌីណាល់ស្តែល (ordinal scale)
 - បើសិនជាអថេរជាប់ឬជាលេខ (continuous variable) យើងអាចប្រើរង្វាស់ ចន្លោះ (interval) ឬ អនុបាត (ratio) (មើលឧទាហរណ៍ក្នុងតារាង 1.4)
1. ល្អមីណាម៉ាល់ស្តែល (nominal scale) គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់វែងទៅលើអថេរប្រភេទ (categorical variable) ហើយវាបែងចែកទិន្នន័យជាប្រភេទ មិនមានលំដាប់លំដោយ ឧទាហរណ៍ ប្រុស/ ស្រី ឬ ស្រី ប្រុស ក៏បាន មិនប្រកាន់លំដាប់លំដោយនោះទេ។ ល្អមីណាម៉ាល់ស្តែល ត្រូវបាន

ចាត់ទុកថាជារង្វាស់ខ្សោយជាងគេក្នុងចំណោមរង្វាស់ទាំងបួន (មើលឧទាហរណ៍បន្ថែមនៅ តារាង 1.2)។

តារាង 1.2 ឧទាហរណ៍ រង្វាស់ណូមីណាល់ស្តែល

អថេរដាច់ប្រភេទ	រង្វាស់ ណូមីណាល់ស្តែល
ភេទ	ប្រុស / ស្រី
បោះឆ្នោត	គាំទ្រ/ ប្រឆាំង
ចម្រៀង	សម័យ/បុរាណ
សាសនា	ពុទ្ធ/ គ្រីស/អ៊ីស្លាម
សាំង	ធម្មតា / ស៊ីបែរ

- 2 អរឌីណាលស្តែល (ordinal scale) បានបែបចែកទិន្នន័យទៅតាមប្រភេទដូច ណូមីណាល់ស្តែលដែរ តែមាន ប្រកាន់លំដាប់លំដោយ។ រង្វាស់នេះខ្លាំងជាងរង្វាស់ ណូមីណាល់ស្តែល ក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាទម្រង់ខ្សោយ ដដែល ពីព្រោះថាតម្លៃខុសគ្នារវាងលំដាប់នីមួយៗគឺគ្មានន័យ ឧទាហរណ៍ ការឲ្យពិន្ទុលើផលិតផលមានបី កំរិត៖ អន់/ ល្អម/ ល្អ តម្លៃខុសគ្នារវាង អន់ និងល្អម គឺមិនអាចបកស្រាយបាន ឬគ្មានន័យ (មើល ឧទាហរណ៍បន្ថែមនៅក្នុង តារាង 1.3)។

តារាង 1.3 ឧទាហរណ៍ រង្វាស់តាមលំដាប់លំដោយ

អថេរប្រភេទ	រង្វាស់តាមលំដាប់លំដោយ
និទ្ទេស	A / B/ C/ D/ E/ F
សារៈសំខាន់	មិនសំខាន់/ សំខាន់/ សំខាន់ណាស់
និស្សិតឆ្នាំទី	1/ 2/ 3/ 4
ពេញចិត្តចំពោះផលិតផល	មិនពេញចិត្ត/ គ្មានចំណី/ពេញចិត្ត
ការអោយពិន្ទុលើផលិតផល	អន់/ ល្អម/ ល្អ

- 3 រង្វាស់ជាចន្លោះ (interval scale) គឺជារង្វាស់ជាលេខដែលមានលំដាប់លំដោយ និងមានចន្លោះថេរឬស្មើ គ្នា ហើយតម្លៃខុសគ្នារវាងលំដាប់នីមួយៗគឺមានន័យពេញលេញ ប៉ុន្តែមិនមានតម្លៃសូន្យនោះទេ ឬសូន្យ មានន័យមិនពិត។ ឧទាហរណ៍ សីតុណ្ហភាពខុសគ្នារវាង 30អង្សានិង 40អង្សា គឺមិនដូចគ្នារវាងសីតុណ្ហ ភាព 50អង្សា និង60អង្សា ពីព្រោះថាចន្លោះ 10អង្សាខុសគ្នានោះ គឺមានន័យខុសគ្នាក្នុងករណីទាំងពីរ។ បើបើចន្លោះ 10 អង្សាដូចគ្នាតែ10 អង្សានៅចន្លោះពី50ទៅ60អង្សាគឺក្តៅជាង ។ រង្វាស់ជាចន្លោះ មិនមែន ថាល្អឥតខ្ចោះនោះទេ ពីព្រោះលេខសូន្យគឺនៅតែគ្មានន័យ ឧទាហរណ៍ 0អង្សាមិនមែនមានន័យថា មិន មានសីតុណ្ហភាព ឬទេរនោះទេ នេះជាចំណុចសខ្សោយរបស់រង្វាស់ជាចន្លោះ។ ជាកំរិតសំណាងល្អ ដែល នៅមានរង្វាស់មួយទៀតមកបំពេញ ដូចជារង្វាស់ជាលេខឬអនុបាត (ratio) ដែលក្នុងនោះលេខសូន្យមាន

ន័យពេញលេញ សូន្យមានន័យថា គ្មាន ឬទេរ ឧទាហរណ៍ ចំណូលស្មើសូន្យ មានន័យ គ្មានលុយ ដែល វាខុសពីសីតុណ្ហភាពសូន្យ ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

- 4 រង្វាស់ជាលេខអនុបាត (ratio) គឺរង្វាស់មានលំដាប់លំដោយ ខ្លាំងជាងរង្វាស់ផ្សេងៗទាំងអស់ហើយ រង្វាស់ខុសគ្នាគឺមានលេខសូន្យ ឬលេខសូន្យមានន័យពិតប្រាកដ ឧទាហរណ៍ ចំណាយប្រចាំឆ្នាំរបស់ និស្សិតគិតជាមធ្យមគឺ 300ដុល្លា បើចំណាយស្មើសូន្យគឺមានន័យថា គ្មានចំណាយ (មើលឧទាហរណ៍ បន្ថែមនៅក្នុងតារាង 1.4)។

តារាង 1.4 ឧទាហរណ៍ រង្វាស់ចន្លោះ (interval) និង លេខ (ratio)

អថេរជាប់ ឬជាលេខ (numerical variable)	រង្វាស់ (measurement)
សីតុណ្ហភាព	ចន្លោះ (interval)
ពិន្ទុ (និទ្ទេស) ឧ. 95-100=A	ចន្លោះ (interval)
ប្រាក់ខែ	ដុល្លា (ratio)
អាយុ	ឆ្នាំ (ratio)
ចំងាយ	ម៉ែត្រ ឬគីឡូម៉ែត្រ (ratio)
ទម្ងន់	គីឡូក្រាម (ratio)

1.6 កម្មវិធីសម្រាប់គណនាស្ថិតិ

រយៈពេល 5ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយមានកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (software) ជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំនួយ ដល់ការអនុវត្តស្ថិតិ។ ក្នុងចំណោមកញ្ចប់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាច្រើនដូចជា Minitab, SAS, Eviews, R, Stata, SPSS និង កម្មវិធីកុំព្យូទ័រដទៃទៀត គេអង្កេតឃើញថា Minitab ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាងគេនៅតាមមហា វិទ្យាល័យ។ សម្រាប់សៀវភៅនេះ កម្មវិធី Excel, Eviews, និង SPSS ត្រូវបានយកមកជាឧបករណ៍ជំនួយដល់ លើការអនុវត្តស្ថិតិ។

1.7 របៀបប្រើប្រាស់សៀវភៅនេះ

សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាបួនផ្នែក។ ផ្នែកទីមួយមានជំពូកទី2 និង ទី3 បង្ហាញអំពីការបរិយាយ និងសង្ខេបទិន្នន័យ ផ្នែកទី2 មានជំពូកទី4 និង ទី5 បង្ហាញអំពីការប្រមូលទិន្នន័យ ផ្នែកទី3 ចាប់ពីជំពូកទី6 ដល់ទី9 បង្ហាញអំពីការធ្វើត្រួតពិនិត្យសម្មតិកម្ម និងផ្នែកទី4 ឬជំពូកទី 10 បង្ហាញអំពីការព្យាករណ៍។

ដោយហេតុថា សៀវភៅនេះជាសៀវភៅបែបអនុវត្ត នៅបញ្ចប់នៃជំពូកនីមួយៗគឺមានលំហាត់អនុវត្តន៍ និងមានចំណុចខ្លីៗដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់និស្សិតក្នុងការសិក្សា។

ការសិក្សាស្ថិតិត្រូវចាប់ផ្តើមពីការសិក្សាពាក្យបច្ចេកទេសជាមុន។ ពាក្យទាំងនោះអាចឲ្យអ្នកសិក្សាងាយ យល់អំពីស្ថិតិនិងអាចជួយឲ្យអ្នកធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្តអោយកាន់តែប្រសើរឡើង។ អាជីវកម្មប្រើប្រាស់ស្ថិតិ ដើម្បីសង្ខេប ធ្វើសន្និដ្ឋានចេញពីទិន្នន័យ ដើម្បីកែលំអរលើនីតិវិធីជំនួញ និងដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍ដែលអាច ទុកចិត្តបាន។ នៅពីជំពូកបន្ទាប់នេះ អ្នកនិងសិក្សាអំពីដំណើរការរៀបចំ និងស្ថិតិបែបបរិយាយ។

សំណួរនិងលំហាត់

I. សំណួរ

1. អ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងប៉ាន់គំរូនិងចំនួនសកល?
2. អ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងស្ថិតិនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ?
3. អ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងស្ថិតិបែបបរិយាយនិងបែបសន្និដ្ឋាន?
4. អ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងអថេរប្រភេទនិងអថេរជាលេខ?
5. អ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងអថេរជាចំនួននិងអថេរជាប់?
6. អ្វីទៅជានិយមន័យប្រតិបត្តិការ? ហេតុអ្វីបានជានិយមន័យប្រតិបត្តិការមានសារៈសំខាន់?
7. រង្វាស់ទាំងបួនមានអ្វីខ្លះ?

II. សំណួរជ្រើសរើស (multiple choice)

8. ចូលកំណត់អថេរនីមួយៗខាងក្រោមតើជាអថេរប្រភេទឬជាលេខ? ប្រសិនបើជាលេខចូលកំណត់ថាជាលេខគត់ឬមានក្បៀស។ លើសពីនេះទៅទៀតចូលកំណត់ថាជារង្វាស់ជាស្តែល (scale)។

- a. ទូរស័ព្ទក្នុងមួយគ្រួសារ
- b. រយៈពេលហៅទូរស័ព្ទ (គិតជានាទី) ក្នុងមួយខែ។
- c. ចំនួនផ្ទះមាន វ៉ាយហ្វាយ
- d. ល្បឿនអ៊ិនធឺណែត

9. ចំពោះអថេរខាងក្រោម ចូលកំណត់ថាតើជាអថេរប្រភេទ ឬជាលេខ? បើជាលេខចូលកំណត់ថាជាលេខគត់ឬលេខមានក្បៀស ហើយលើសពីនេះទៅទៀត ចូលកំណត់ថាជារង្វាស់ស្តែល (scale) ចំពោះអថេរនីមួយៗ។

- a. ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អ៊ិនធឺណែត
- b. រយៈពេល(ម៉ោង) ចំណាយក្នុងការប្រើអ៊ីនធឺណែតក្នុងមួយសប្តាហ៍
- c. ចំនួនសារអេលិចត្រូនិចទទួលបានក្នុងមួយសប្តាហ៍
- d. ចំនួនដងទិញទំនិញលើបណ្តាញក្នុងមួយខែ

10. សន្មត់ថាព័ត៌មានខាងក្រោមគឺត្រូវបានប្រមូលពីពូជសុខក្នុងការដាក់ពាក្យសុំខ្ចីលុយទិញផ្ទះជាមួយធនាគារ អេស៊ីលីដា។

- a. សងប្រាក់ប្រចាំខែគឺ 500 ដុល្លា
- b. ចំនួនការងារដែលបានធ្វើរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយ: 1
- c. ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រួសារ: 16,000 ដុល្លា
- d. ស្ថានភាពគ្រួសារ: រៀបការ

ជំពូកទី 2

ការរៀបចំទិន្នន័យ

(Organizing Data)

គោលបំណង

- វិស្វកម្មប្រភពទិន្នន័យដែលប្រើប្រាស់ក្នុងជំនួញនិងសេដ្ឋកិច្ច
- បង្កើតគំនូសតាង និងតារាងចំពោះអថេរជាប់ឬជាលេខ
- បង្កើតគំនូសតាង និងតារាងចំពោះអថេរប្រភេទ ឬអថេរជាប់
- ពន្យល់អំពីគំនូសតាងនីមួយៗ
- ពន្យល់អំពីគោលការណ៍ក្នុងការប្រើគំនូសតាង

2.1 ទិន្នន័យនិងប្រភពទិន្នន័យ

ទិន្នន័យគឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយអង្គហេតុដែលអាចចេញមកពីប្រភពពីរ ៖ ប្រភពទីមួយ (primary data) និងប្រភពទីពីរ (secondary data) ។

- ប្រភពទីមួយ អាចប្រមូលតាមរយៈធ្វើការសម្ភាស (interview) ការស្ទង់មតិ (survey) ការធ្វើពិសោធន៍ ឬការធ្វើការសាកល្បង (experiment) ឬអង្កេត (observation) ជាដើម។
- ប្រភពទីពីរ ជាប្រភេទទិន្នន័យដែលគេបានចងក្រង ឬ បានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទស្សនាវដ្តី ការស្រាវជ្រាវ ឬ អ៊ីនធឺណិតជាដើម ឧទាហរណ៍ ទិន្នន័យពីការធ្វើជំរឿន តម្លៃភាគហ៊ុន ឬ GDP ជាដើម។

ចំណុចដែលខុសគ្នារវាងប្រភពទីមួយនិងប្រភពទីពីរគឺថា៖ ប្រភពទីមួយគឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អង្គហេតុ និងដោយផ្ទាល់ ហើយប្រភពទីពីរគឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយអតីតកាលហើយមានលក្ខណៈប្រយោលទៅនឹងប្រភពដើមនៃទិន្នន័យ។

2.2 ការរៀបចំទិន្នន័យអថេរប្រភេទ ឬជាប់

ជាទូទៅអថេរបានចែកចេញជាពីរប្រភេទ (1) អថេរគុណភាព (qualitative variable) មិនមែនជាលេខ ឬជាអថេរប្រភេទឬជាប់ (categorical variable) និង (2) អថេរបរិមាណ (quantitative variable) ឬ អថេរជាលេខ ហើយអថេរនេះត្រូវបានបែងចែកជាពីរបន្ថែមទៀត គឺ អថេរលេខគត់ (discrete variable) និង អថេរជាប់ (continuous variable) ឬអថេរបន្ត។ ជាគោលការណ៍ក្នុងការរៀបចំទិន្នន័យប្រភេទត្រូវបានចែកចេញជាពីរ អាស្រ័យទៅនឹងចំនួនអថេរ។ បើសិន ទិន្នន័យមានតែមួយអថេរប្រភេទ (one categorical variable) យើងអាចរៀបចំទិន្នន័យជាតារាងសង្ខេប (summary table) ហើយបើអថេរមានចំនួនពីរឬច្រើន យើងត្រូវរៀបចំជាតារាងខ្វែង (contingency or cross table) ។

2.3 អថេរប្រភេទដែលមានមួយអថេរ (one categorical variable)

អថេរប្រភេទដែលមានមួយអថេរ ត្រូវបានរៀបចំជាតារាងសង្ខេប ដែលបង្ហាញអំពីបរិមាណចំនួនប្រភេទ និងភាគរយនៃប្រភេទនីមួយៗ ហើយធ្វើអោយយើងអាចញែកអោយដាច់ពីគ្នាថាប្រភេទនីមួយៗមានចំនួនប្រភេទប៉ុន្មាន និងភាគរយប៉ុន្មាន ។

ឧទាហរណ៍ 2.1 អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើអតិថិជន 100 នាក់ ដោយចង់ដឹងអំពី ចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារអេស៊ីលីដា។ ហើយបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

តារាង 2.1 ទិន្នន័យចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងប្រើប្រាស់សេវាធនាគារ

អថេរប្រភេទ	ចំនួនអតិថិជន
អេធីអ៊ីម	30
ទូរស័ព្ទ	50
ទៅធនាគារដោយផ្ទាល់	15
ផ្សេងៗ	5
សរុប	100

នេះជាអថេរប្រភេទ យើងមិនអាចបូកប្រភេទនីមួយៗចូលគ្នាជាមួយនោះទេ ពីព្រោះផលបូកអ ថេរប្រភេទពិបាកបកស្រាយ យើងអាចវិភាគតាមរយៈប្រភេទនៃអថេរនីមួយៗ និងភាគរយតែប៉ុណ្ណោះ ។

ចំនួនអតិថិជនប្រើប្រាស់ ATM មាន 30 នាក់ ឬស្មើនឹង 30% ($= \frac{30}{100} = 30\%$) និងចំនួនអតិថិជនប្រើ ប្រាស់ ទូរស័ព្ទ មាន 50 នាក់ ឬស្មើនឹង 50% ($= \frac{50}{100} = 50\%$) ហើយអ្នកទៅធនាគារដោយផ្ទាល់មាន 15% និងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាផ្សេងៗមាន 5%។ តារាង 2.2 បង្ហាញអំពីលទ្ធផលសង្ខេបរបស់ SPSS នៃការគណនា នេះ។

តារាង 2.2 ប្រភេទចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះសេវាធនាគារ


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
ATM	30	30.0	30.0	30.0
Phone	50	50.0	50.0	80.0
In person at bank	15	15.0	15.0	95.0
Others	5	5.0	5.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

គួរគិតសំគាល់ថា អតិថិជនចូលចិត្តសេវាធនាគារតាមរយៈទូរស័ព្ទ ច្រើនជាងគេរហូត ដល់ 50% ហើយបន្ទាប់មកគឺសេវា ATM ដែលតំណាង 30%។ សេវាទាំងពីរនេះតំណាងអោយ 80% នៃសេវាធនាគារទាំងអស់ (សូមមើលកូឡេនប្រភេទត្រួត “Column cumulative frequency” នៃ តារាង 2.2)។

តារាងសង្ខេប 2.2 អាចស្មុគស្មាញ ពិបាកមើលបន្តិច ដំរើសមួយទៀតយើងអាចយក លទ្ធផលនេះដាក់បង្ហាញលើគំនូសតាងក្រាហ្វិកម្តង។ ហើយគំនូសតាងក្រាហ្វិកដែលប្រើប្រាស់


សម្រាប់អថេរប្រភេទដែលមានមួយអថេរនេះ (one categorical variable) គឺមានដូចជា បាធាតុ (Bar Chart) ផាយធាតុ (Pie Chart) និង ប៉ារ៉ាតូធាតុ (Pareto Chart) ជាដើម។

រូបភាព 2.1 បាធាតុ (Bar Chart) តំណាងចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះសេវាធនាគារ




ចរិតលក្ខណៈនៃគំនូសតាង បាធាតុ (រូប 2.1) គឺ អ័ក្ស Y តំណាងអោយចំនួនប្រៀបធៀប និងអ័ក្ស X តំណាងអោយប្រភេទសេវា ហើយបន្ទះនីមួយៗមិនជាប់គ្នានោះទេ។ បាធាតុធ្វើអោយអ្នកអានងាយយល់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតារាងសង្ខេប 2.2 ខាងលើ។ ដោយសារតែវាជាអថេរប្រភេទដែលមានមួយអថេរ យើងអាចប្រើ ផាយធាតុ (Pie Chart) មកប្រើជំនួស បាធាតុក៏បានដែរ (មើលរូប 2.2) ចំណែកការបកស្រាយគំនូសទាំងពីរគឺដូចជាមួយការបកស្រាយតាមតារាងសង្ខេប 2.2 ដែរ។

រូបភាព 2.3 Pie Chart តំណាងចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះសេវាធនាគារ



រូបភាព 2.4 ប៉ារ៉ាតូ (Pareto Chart) តំណាងចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើសេវាធនាគារ



បើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគំនូសតាងទាំងបី ប៉ារ៉ាតូឆាត មានលក្ខណៈពេញលេញជាងបាធាត និង ជាយធាត ។ ប៉ារ៉ាតូឆាត មានលក្ខណៈដូចទៅនឹង បាធាត ច្រើន តែខុសបន្តិច ត្រង់ថា ប៉ារ៉ាតូឆាត មាន បញ្ជាក់អំពី ប្រភេទត្រួត។

ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង អ្នកអាចជ្រើសរើសយកគំនូសតាងណាមួយក៏បាន ប៉ុន្តែត្រូវគូបផ្សំនឹង តារាងសង្ខេបពីព្រោះតារាងសង្ខេបមានបង្ហាញអំពីព័ត៌មានលំអិតជាងគំនូសតាងក្រាហ្វិកទាំងបីខាងលើ។

2.2.2 អថេរប្រភេទដែលមានពីរឬច្រើនអថេរ

ការសិក្សាមួយចំនួនអាចទាក់ទងជាមួយអថេរប្រភេទពីរ ឬ ច្រើន។ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ យើង ត្រូវប្រើប្រាស់តារាងខ្វែង ឬតារាង2អថេរ(cross or contingency table)។ តារាងនេះតំណាងឲ្យចំឡើយ រួមគ្នារវាងអថេរប្រភេទនីមួយៗ។ អថេរមួយស្ថិតនៅជួរដេក (row) និងអថេរមួយទៀតស្ថិតនៅជួរឈរ (column) ហើយកន្លែងប្រសព្វរវាងជួរទាំងពីរហៅថាសែល (cell) គឺតំណាងឲ្យចំឡើយរួម។

ឧទាហរណ៍ 2.2 កសិករម្នាក់បានជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូកូនស្វាយចំនួន400ដើម ដោយមានមួយ ចំនួននៅរស់ ហើយមួយចំនួនក៏ងាប់ ឬបាត់ បន្ទាប់ពីជំងឺរួចបានមួយឆ្នាំ ហើយគាត់ចង់ដឹងភាគរយនៃកូន ស្វាយដែលនៅរស់ និងបាត់បង់។ ឧបមាថា គាត់ធ្វើការបែងចែកកូនស្វាយ ជាបីប្រភេទទៅតាមអាយុ៖

- តិចជាងកន្លះឆ្នាំ មានសរុបចំនួន190 ដើម នៅរស់170ដើម ហើយងាប់ឬបាត់បង់ 20ដើម
- ធំជាងកន្លះឆ្នាំ តែតិចជាងមួយឆ្នាំ មានសរុបចំនួន140 ដើម នៅរស់100ដើម ហើយងាប់ឬបាត់បង់ 40ដើម

- ជំងឺជាងមួយឆ្នាំ តែតិចជាងមួយឆ្នាំកន្លះ មានសរុបចំនួន65 ដើម នៅរស់60ដើម ហើយងាប់ឬបាត់បង់5 ដើម។

ទិន្នន័យទាំងនេះបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង 2.3។ ជួរដេក (row) តំណាងអោយអាយុ កូនស្វាយ រីឯជួរឈរ (column) តំណាងអោយចំនួនដើមស្វាយដែលនៅរស់និងងាប់។

តារាង 2.3 ចំនួនកូនស្វាយដែលនៅរស់ឬបាត់ និងអាយុកូនស្វាយ

កូនស្វាយ	នៅរស់	ងាប់ ឬបាត់	សរុប
អាយុ < 0.5 ឆ្នាំ	170	20	190
0.5 <=អាយុ<1.0 ឆ្នាំ	100	40	140
1.0<= អាយុ<1.5 ឆ្នាំ	65	5	70
សរុប	335	65	400

តារាង 2.3 ហៅថាតារាងខ្វែង (cross or contingency table) វាតំណាងឲ្យអថេរ ប្រភេទដែលមានពីរអថេរ។ លទ្ធផលនៃការគណនាកាតរយក្នុងឧទាហរណ៍នេះត្រូវបានបង្ហាញនៅ ក្នុងតារាង2.4 និងរូបភាព2.4 ខ្លាស់ស្ទើបាធាតុ (Clustered Bar Chart)។

តារាង 2.4 តារាងខ្វែងបង្ហាញកាតរយនៃដើមស្វាយដែលរស់និងបាត់

Age of Tree * Survival or loss of Tree Cross Tabulation					
			Survival or loss		Total
			Lost	Survival	
Age	Age<0.50 year	Count	20	170	190
		% of Total	5.0%	42.5%	47.5%
	0.50<=Age<1.0 year	Count	40	100	140
		% of Total	10.0%	25.0%	35.0%
	1.0<= Age <1.5 year	Count	5	65	70
		% of Total	1.2%	16.2%	17.5%
Total		Count	65	335	400
		% of Total	16.2%	83.8%	100.0%


តារាង 2.4 បង្ហាញលទ្ធផលដូចតទៅ៖

- កូនស្វាយដែលមានអាយុតិចជាង 0.50 ឆ្នាំដែលនៅរស់មានចំនួន 170 ដើម ក្នុងចំណោម ដើមស្វាយសរុបចំនួន 400ដើម ឬ ស្មើ $170/400=42.5\%$
- កូនស្វាយដែលមានអាយុតិចជា 0.50ឆ្នាំដែលបាត់ ស្មើ $20/400 =20\%$

ចំណែកឯភាគរយនៃកូនស្វាយដ៏ទៃទៀតត្រូវបានគណនាដោយវិធីសាស្ត្រដូចគ្នាដោយយក ចំនួនកូនស្វាយនៅក្នុងប្រអប់ខ្វែងរវាងជួរដេកនិងជួរឈរចែកនឹងចំនួនសរុប 400 ដើម។

គួរកត់សំគាល់ថា បរិមាណដើមស្វាយដែលនៅរស់សរុបមាន 83.8% ហើយដើមស្វាយដែល បាត់ឬងាប់មាន 16.2%។ កូនស្វាយដែលងាប់ច្រើនជាងគេគឺមានអាយុចន្លោះចាប់ពី 0.50 ទៅដល់ 1.0 ឆ្នាំ ហើយមានរហូតដល់ 10% ឬ 40 ដើម ហើយកូនស្វាយដែលជារស់ច្រើនជាងគេគឺមានអាយុតិចជាង 0.50 ឆ្នាំ ហើយមានរហូតដល់ 42.5% ឬ 170 ដើម។ ដើម្បីឲ្យងាយយល់ជាងនេះ យើងអាចយកទិន្នន័យទាំងអស់ ដាក់ បង្ហាញលើតំនូសតាង ខ្លាស់ស្ទើរបាធាត ឬសាយបាយសាយបាធាត (Clustered or Side-by Side Bar Chart) ដូចនៅក្នុងរូប 2.4។

រូប 2.4 ខ្លាស់ស្ទើរបាធាត បង្ហាញភាគរយនៃដើមស្វាយដែលរស់និងបាត់



2.3 ការរៀបចំទិន្នន័យជាលេខ

ដើម្បីចាត់ចែងទិន្នន័យជាលេខ យើងអាចរៀបចំទិន្នន័យនោះតាមលំដាប់លំដោយ (ordered array) ហើយរួចរៀបចំជាបំណែងចែកប្រេកង់ (frequency distribution) និងបំណែងចែកប្រេកង់ត្រួត (cumulative frequency distribution)។

2.3.1 លំដាប់លំដោយ និងបំណែងចែកប្រេកង់ចំពោះទិន្នន័យជាលេខ

សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យជាលេខ ក៏អាចធ្វើការបែងចែកជាប្រេកង់បានដែរ តែយើងត្រូវរៀបចំ ទិន្នន័យនោះទៅតាមលំដាប់លំដោយជាមុនសិន។

ឧទាហរណ៍ 2.3 អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ផ្សារអ៊ីអន2 ចង់ធ្វើការសិក្សាលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ អតិថិជនចំពោះផលិតផលមួយប្រភេទ ហើយអ្នកស្រាវជ្រាវជឿជាក់ថា ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សគឺមាន ទំនាក់ទំនងទៅនឹងអាយុ។ ក្មេងអាចមានចំណង់ចំណូលចិត្តខុសពីមនុស្សចាស់។ គាត់បានប្រមូលទិន្នន័យ អតិថិជនចំនួន 20 នាក់ដែលមានអាយុដូចខាងក្រោម៖

24, 35, 17, 21, 24, 37, 26, 46, 57, 31, 33, 14, 10, 38, 41, 43, 44, 27, 53, 23

ដើម្បីគណនាប្រេកង់យើងត្រូវធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖

- ជំហានទី១៖ រៀងចំណុចទិន្នន័យទៅតាមលំដាប់ពីតូចទៅធំ (ascending order) ឬ តាមលំដាប់ពីធំទៅតូច (descending order)
10, 14, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 57
- ជំហានទី២៖ គណនារង្វង់ (range) គឺស្មើចំនួនធាតុអតិបរមាដកធាតុអប្បបរមា $57-10=47$
- ជំហានទី៣៖ កំណត់ចំនួនថ្នាក់ ឬក្រុម តាមទំនាក់ទំនង $2^c \geq n$ ដែល c ជាចំនួនថ្នាក់ (ចំនួនគត់) n ជាចំនួនអង្កេត (number of observations) ដូចនេះយើងទទួលបានចំនួនថ្នាក់ស្មើ 5 ថ្នាក់៖
$$C = \frac{\ln(n)}{\ln(2)} = \frac{\ln(20)}{\ln(2)} = 4.32 \approx 5$$
- ជំហានទី៤៖ គណនាទំហំចន្លោះនៃថ្នាក់នីមួយៗ $= 47/5 = 9.4$ (បង្កត់ទៅជា 10 ដើម្បីងាយស្រួល)
- ជំហានទី៥៖ កំណត់អំពីដែនកំណត់របស់ថ្នាក់នីមួយៗ ដូចតារាង 2.5 ខាងក្រោម៖

តារាង 2.5 ដែននៃការកំណត់ថ្នាក់

ចំនួនថ្នាក់	ចន្លោះទិន្នន័យ
ថ្នាក់ទី 1	10 និងក្រោម 20 ឆ្នាំ
ថ្នាក់ទី 2	20 និងក្រោម 30 ឆ្នាំ
ថ្នាក់ទី 3	30 និងក្រោម 40 ឆ្នាំ
ថ្នាក់ទី 4	40 និងក្រោម 50 ឆ្នាំ
ថ្នាក់ទី 5	50 និងក្រោម 60 ឆ្នាំ

- ជំហានទី៦៖ គណនាចំណុចកណ្តាល (midpoint) នៃថ្នាក់នីមួយៗ៖ 15, 25, 35, 45, 55
- ជំហានទី៧៖ រាប់ចំនួនលេខខាងលើរួចដាក់បញ្ចូលតាមថ្នាក់នីមួយៗ
- ជំហានទី៨៖ គណនាកាតរយនិងភាគរយនៃប្រេកង់ត្រួត

ទិន្នន័យសង្ខេបជំហានទាំង 7 បានដាក់បង្ហាញក្នុងតារាង 2.6

តារាង 2.6 ចំណុចកណ្តាលនិងប្រេកង់នៃអាយុអតិថិជន

ចំនួនថ្នាក់	ចន្លោះទិន្នន័យ	ចំណុចកណ្តាល (Midpoint)	ប្រេកង់ (frequency)
ថ្នាក់ទី 1	10 និងក្រោម 20 ឆ្នាំ	15	3
ថ្នាក់ទី 2	20 និងក្រោម 30 ឆ្នាំ	25	5
ថ្នាក់ទី 3	30 និងក្រោម 40 ឆ្នាំ	35	6
ថ្នាក់ទី 4	40 និងក្រោម 50 ឆ្នាំ	45	4
ថ្នាក់ទី 5	50 និងក្រោម 60 ឆ្នាំ	55	2

តារាង 2.7 បង្ហាញលទ្ធផលប្រៀបធៀបនិងប្រភេទអតិថិជនដែលមានអាយុចន្លោះពី 30 និង 40 ឆ្នាំ គឺច្រើនជាងគេ មានបុគ្គល 30% ហើយបន្ទាប់មកគឺអាយុពី 20 និង 30 ឆ្នាំមាន 25% ហើយទាំងពីរក្រុមគឺតំណាងឲ្យ 55% នៃអតិថិជនសរុប។ ចំណែកអតិថិជនដែលមានអាយុលើសពី 50 ឆ្នាំគឺតិចជាងគេ មានតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះ។

តារាង 2.7 ប្រភេទ ភាគរយនិងផលបូកតាងនៃភាគរយ


class interval		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10 but less than 20	3	15.0	15.0	15.0
	20 but less than 30	5	25.0	25.0	40.0
	30 but less than 40	6	30.0	30.0	70.0
	40 but less than 50	4	20.0	20.0	90.0
	50 or more	2	10.0	10.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

2.4 គំនូសតាងអថេរជាលេខ

a. គំនូសតាងដើមនិងសន្លឹក

គំនូសតាងដើមនិងសន្លឹក (Stem-leaf) នេះអាចឲ្យយើងអង្កេត ឬកត់សំគាល់បំណែងចែក ទិន្នន័យថា តើទិន្នន័យប្រមូលផ្តុំនៅត្រង់ណា?។

រូប 2.5 ដើមនិងសន្លឹក (Stem-leaf) តំណាងឲ្យអាយុអតិថិជនទាំងប្រាំក្រុម




ជំហានដំបូង ទិន្នន័យត្រូវបានបាត់ជាក្រុម ហៅថា ដើម (stem) ហើយក្នុងក្រុមមានធាតុ ទិន្នន័យ ហៅថា សន្លឹក (leaf) ដែលស្ថិតនៅខាងស្តាំដៃ។ ឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលឧទាហរណ៍ 2.3 ដែលទាក់ទងជាមួយអាយុអតិថិជន 20នាក់ យើងបានគំនូសតាងដើមនិងសន្លឹក ដូចក្នុងរូបភាព 2.5 ។ រូប 2.5 ជាលទ្ធផល SPSS បង្ហាញឲ្យឃើញថា អតិថិជនដែលមានអាយុចន្លោះពី 10 និងក្រោម 20ឆ្នាំ មាន 3នាក់ គឺអាយុ 10 14 និង អាយុ 17ឆ្នាំ ហើយអាយុចន្លោះពី 30 និងក្រោម 40ឆ្នាំ គឺច្រើន ជាងគេ មានរហូតដល់ 6នាក់ គឺអាយុ 31 33 34 35 37 និងអាយុ 38។ ចំណែកលេខដ៏ទៃទៀតគឺ មានការបកស្រាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។

b. គំនូសតាងហ៊ីស្តូក្រាម

ហ៊ីស្តូក្រាមឆាត (Histogram Chart) គឺជាប្រភេទ បាធាត ដែលអ័ក្សដេកតំណាងឲ្យក្រុម (bin) ហើយកំពស់តំណាងឲ្យប្រេកង់។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង អាយុ (មាន 5 ក្រុម) ហើយ អ័ក្សឈរកំពស់តំណាងឲ្យចំនួនអតិថិជនក្នុងក្រុមនីមួយៗ ឬប្រេកង់។ សូមរំលឹកឡើងវិញថា ហ៊ីស្តូក្រាមឆាត ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង បាធាត តែខុសគ្នាត្រង់ ហ៊ីស្តូក្រាមឆាត មិនមានចន្លោះដូច បាធាត នោះទេ។ ហើយ ហ៊ីស្តូក្រាមឆាត គេប្រើសម្រាប់អថេរជាលេខ ចំណែក បាធាត ប្រើសម្រាប់អថេរប្រភេទ។

ឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលឧទាហរណ៍ 2.3 ខាងលើ យើងបានគំនូសតាង ហ៊ីស្តូក្រាមឆាត ដូច ក្នុងរូបភាព 2.6 ខាងក្រោម។

រូប 2.5 ហ៊ីស្តូក្រាមឆាត អាយុអតិថិជនទាំងប្រាំក្រុម




តាមរូប 2.5 ហ៊ីស្តូក្រាមឆាតខាងលើយើងអាចបកស្រាយតាមប្រេកង់។ ហើយការបកស្រាយ គឺដូចទៅនឹងការបកស្រាយប្រេកង់មុនៗដែរ។

c. គំនូសតាងប៉ូលីហ្គនជាភាគរយ

- 1) គំនូសតាងប៉ូលីហ្គនជាភាគរយឬជាប្រេកង់ (percentage or frequency Polygon) ដែលមានមួយអថេរ (one numerical variable) ដូចទៅនឹងគំនូសតាងហ៊ីស្តូក្រាមជាភាគរយឬប្រេកង់ដែរ (percentage or frequency Histogram) ។ គំនូសតាងប៉ូលីហ្គនគូសភ្ជាប់ពីចំណុច midpoint នៃប្រេកង់នីមួយៗទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃប្រេកង់មួយទៀត។ ចំណុចល្អរបស់ គំនូសតាងប៉ូលីហ្គនលើស ហ៊ីស្តូក្រាម ត្រង់អាចបង្ហាញប្រេកង់ត្រួត (cumulative frequency polygon) ឬផលបូកភាគរយនៃប្រេកង់ត្រួត (cumulative percentage Polygon) ដែលហ៊ីស្តូក្រាម មិនបានបង្ហាញ។

ឧទាហរណ៍ អាយុអតិថិជន 20នាក់ខាងលើ យើងអាចបង្ហាញជាផលបូលជាភាគរយរបស់ប្រេកង់តាមរយៈ គំនូសតាងប៉ូលីហ្គនជាភាគរយត្រួត (cumulative percentage Polygon) ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបទី2.6។

រូបទី2.6 ប៉ូលីហ្គនជាភាគរយប្រេកង់ត្រួត នៃអាយុរបស់អតិថិជន



តាមរយៈរូបទី2.6 បង្ហាញឲ្យឃើញថា របស់អតិថិជនដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំមាន40% ហើយ អាយុក្រោម40ឆ្នាំមាន 70% និង អាយុក្រោម50 ឆ្នាំមាន 90% ។

- 2) គំនូសតាងប៉ូលីហ្គនដែលមានពីរ ឬច្រើនអថេរលេខ (two or more numerical variables)

ក្នុងករណីដែលអ្នកចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបពីរក្រុមឡើងទៅដោយប្រើ ហ៊ីស្តូក្រាម នោះអាចជាន់គ្នា ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើគំនូសតាង ប៉ូលីហ្គនជាភាគរយជំនួសវិញ។ ប៉ូលីហ្គនជាភាគរយ ឬហៅថា អូហ្គីវ (Ogive) ប្រើចំណុចកណ្តាល (midpoint) របស់ចន្លោះថ្នាក់នីមួយៗតំណាងឲ្យក្រុមឬថ្នាក់នីមួយៗ។


ឧទាហរណ៍ 2.4 អ្នកសិក្សាម្នាក់ចង់ប្រៀបធៀបពិន្ទុរបស់និស្សិតពីរក្រុម គឺវេនត្រីកនិងវេនយប់។ គាត់ធ្វើការជ្រើសរើសពិន្ទុគណិតវិទ្យាថ្នាក់ត្រីកចំនួន20នាក់និងថ្នាក់យប់ចំនួន14នាក់។

ពិន្ទុទាំងពីរវេនបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង 2.8 និងគំនូស ប៉ូលីហ្គុន គិតជាភាគរយគឺត្រូវបានដាក់បង្ហាញក្នុងរូប 2.6។

តារាង 2.8 ពិន្ទុគណិតវិទ្យារបស់និស្សិតវេនព្រឹកនិងវេនយប់

វេនយប់	15	17	17	18	18	18	19	19	20	20
	21	22	22	25	25	27	32	37	38	42
វេនព្រឹក	17	18	19	19	20	21	23	28	32	33
	35	41	43	44						

រូប 2.6 គំនូសតាងប៉ូលីហ្គុនជាភាគរយនៃពិន្ទុរបស់និស្សិតទាំងពីរវេន



ដើម្បីធ្វើការវិភាគថា ក្រុមណាមួយសំបូរនិស្សិតមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាច្រើនជាង ឥឡូវយើងសន្មត់ថា ពិន្ទុអតិបរមាគឺ 50 ហើយជាមធ្យមគឺ 25 ពិន្ទុ។ តាមរយៈរូប 2.6 បង្ហាញឲ្យឃើញថានៅត្រង់ 20 ពិន្ទុក្រុបវេនព្រឹកមានរហូតដល់ 6% ចំណែកវេនយប់មានតែ 3% តែប៉ុណ្ណោះ ហើយចាប់ពីពិន្ទុ 25 ឡើងទៅ ក្រុមវេនយប់មានចំនួនច្រើនជាងវេនព្រឹក ដូច្នេះនិស្សិតវេនព្រឹកសំបូរនិស្សិតខ្សោយមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ច្រើនជាងវេនយប់។

d. គំនូសតាងខ្ពស់-ទាប-បិទទ្វារ


គំនូសតាង ខ្ពស់-ទាប-បិទទ្វារ (High-low-close chart) ជាប្រភេទគំនូសតាងដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីដំណើរប្រែប្រួលនៃតម្លៃមូលបត្រហិរញ្ញវត្ថុជៀបទៅនឹងពេលវេលា។ វាគឺជាប្រភេទ បាធាតុដែលមានអក្សរឈរឲ្យតម្លៃខ្ពស់ ទាប និងបិទទ្វារ ក្នុងគ្រាណាមួយ (ភាគច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃ)។ តម្លៃបិទទ្វារ (closing price) គឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីអោយអ្នកវិភាគសិក្សាតម្លៃនៅពេលអនាគត។ ឧទាហរណ៍ 2.5

អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់បានធ្វើការកត់ត្រាតម្លៃមូលបត្រ ABC នៅសប្តាហ៍ទីមួយនៃខែកុម្ភៈ 2021 ដូចតារាង 2.9។

តារាង 2.9 តម្លៃភាគហ៊ុន (ដុល្លារ) ABC នៅសប្តាហ៍ទីមួយនៃខែកុម្ភៈ 2021

ថ្ងៃ	ខ្ពស់	ទាប	បិទទ្វារ
Feb-1	181.07	178.17	178.88
Feb-2	180.65	178.28	179.11
Feb-3	180.24	178.17	179.35
Feb-4	182.79	179.82	181.37
Feb-5	182.14	179.53	181.31

រូប 2.7 គំនូសតាង ខ្ពស់-ទាប-បិទទ្វារ តម្លៃភាគហ៊ុន (\$) ABC



រូប 2.7 បង្ហាញថា កំពូលនៃអង្កត់នីមួយៗតំណាងតម្លៃខ្ពស់ជាងគេនៅថ្ងៃនេះ (high) ហើយ ចុងអង្កត់តំណាងតម្លៃទាបជាងគេ (low) និងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ គឺតំណាងតម្លៃបិទទ្វារ (closing price) នៅថ្ងៃនេះ។ គំនូសតាង ខ្ពស់-ទាប-បិទទ្វារ មានសារៈសំខាន់ដើម្បីអោយព្យាករណ៍តម្លៃ ភាគហ៊ុននៅថ្ងៃស្អែក តែមិនបានវិភាគនៅក្នុងសៀវភៅនេះទេ។ បើសិនជានិស្សិតមានការចាប់អារម្មណ៍នូវការ ប្រើប្រាស់គំនូសនេះសូមអានសៀវភៅ Financial Behavioral Analysis។

e. គំនូសតាងស្កាតត្រីផ្លុត

គំនូសតាងស្កាតត្រីផ្លុត (the scatter plot) ជាគំនូសតាងដែលបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងអថេរជា លេខដែលមានពីរអថេរ។ អថេរមួយស្ថិតនៅលើអ័ក្ស Y និងអថេរមួយទៀតស្ថិតនៅលើអ័ក្ស X។ ជាទូទៅ គំនូស តាងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាជំហានទីមួយនៃការវិភាគសមីការលីនេអ៊ែរ។

ឧទាហរណ៍ 2.6 អ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារម្នាក់ចង់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនង ឬប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់កង់ ABC គាត់ធ្វើការកត់ត្រាលើចំណាយនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការលក់កង់ចំនួន 9 ត្រីមាស ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង 2.9។


តារាង 2.9 ចំណាយនិងការលក់ចំនួន៩ត្រីមាសរបស់ក្រុមហ៊ុនABC

ត្រីមាស	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ការលក់ (ឯកតា)	23	26	29	33	38	42	50	55	60
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(\$)	130	140	146	150	167	170	188	195	210

ដើម្បីពិនិត្យថាតើការលក់និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងណា គំនូសតាងស្កាតត្រីផ្លុត នឹងអាចត្រូវបានគេប្រើ។ លទ្ធផលនៃ គំនូសតាងស្កាតត្រីផ្លុត ដូចបានបង្ហាញក្នុងរូប 2.8។

រូប 2.8 បង្ហាញអោយឃើញថា ការលក់ហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម បើចំណាយនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកើនឡើង ការលក់ក៏កើនឡើងដែរ ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ការលក់ប្រែប្រួលជាមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ បើក្នុងករណីដែលយើងចង់ដឹងថាកំរិតនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើការលក់ លុះត្រាតែយើងធ្វើការវិភាគសមីការលីនេអ៊ែរ ។ ករណីនេះយើងនឹងសិក្សានៅជំពូកទី10។

រូប 2.8 ស្កាតត្រីផ្លុតតាងទំនាក់ទំនងរវាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការលក់




f. គំនូសតាងជាស៊េរី

គំនូសតាងពេលវេលាជាស៊េរីស្រដៀងទៅនឹងស្កាតត្រីផ្លុតដែរ វាបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងអថេរមួយទៅនឹងពេលវេលា។ អថេរមួយជាលេខស្ថិតនៅលើអ័ក្សY និងអថេរមួយទៀតជាពេលវេលាស្ថិតនៅលើអ័ក្សX។ ជាទូទៅ គំនូសតាងប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាដំណោះស្រាយនៃការធ្វើវិភាគលីនេអ៊ែរ ដោយយកពេលវេលា (time or trend) ជំនួសអោយ X។ ឧបមាថា យើងចង់ដឹងថាតើការលក់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗកើនឡើងប៉ុន្មាន យើងអាចយកទិន្នន័យទាំងនេះដាក់លើ ស្កាតត្រីផ្លុត តាមពេលវេលា (the time-scatter plot)

ដោយយកបរិមាណលក់ដាក់នៅលើអ័ក្ស Y ហើយពេលវេលា (ត្រីមាស) ដាក់លើអ័ក្ស X ។ បើយើងយកទិន្នន័យក្នុងតារាង2.9 មកដាក់លើគំនូសតាងជាស៊េរី យើងបានរូបទី2.9។

រូប2.9 គំនូសតាងទំនាក់ទំនងការលក់នឹងពេលវេលា



រូប2.9 បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា ការលក់ពីត្រីមាសមួយទៅត្រីមាសមួយទៀត ហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងពិតប្រាកដមែន។ ហើយដើម្បីចង់ដឹងថា មួយត្រីមាសកើនជាមធ្យមប៉ុន្មាន លុះត្រាតែយើងធ្វើ ការវិភាគតាមលីនេអ៊ែរ ដោយយក បរិមាណលក់តំណាងឲ្យ Y និងពេលវេលាត្រីមាស(quarter)តំណាងឲ្យ X ការវិភាគនេះនឹងលំអិតនៅជំពូកទី10។

សេក្តីសង្ខេប

ការរៀបចំនិងបង្ហាញទិន្នន័យទាក់ទងជាមួយការរៀបចំជាតារាងសង្ខេប និងគំនូសតាងផ្សេងៗ ដើម្បីងាយស្រួលដល់ការធ្វើបទបង្ហាញនិងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ ការជ្រើសរើសប្រភេទតារាងសង្ខេប និងគំនូសតាង គឺអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទទិន្នន័យ។ នៅជំពូកទី3 អ្នកនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើស្ថិតិបែបបរិយាយដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការវិភាគទិន្នន័យនិងសិក្សាអំពីការបកស្រាយទិន្នន័យ។

សំណួរនិងលំហាត់

I. សំណួរ

1. តើ ហ៊ីស្តូក្រាម និង ប៉ូលីហ្គុន ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការសង់និងប្រើប្រាស់?
2. តើគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមានអ្វីខ្លះក្នុងការប្រើគំនូស បាធាត ផាយធាត និង ប៉ារ៉ាតូធាត?
2. ចូរប្រៀបធៀបចំណុចខុសគ្នារវាង បាធាត និង ហ៊ីស្តូក្រាម ។
3. តើចំណុចខុសគ្នារវាងគំនូសស៊េរី និង ស្កាត្រីផ្លុត មានអ្វីខ្លះ?
4. តើតារាងខ្វែងប្រើប្រាស់នៅពេលណា?

II. លំហាត់

5. ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយ ត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ 2020 មានប្រភពដូចខាងក្រោម៖

ប្រភព	ចំណូល (គិតជា \$1000)
ស្រាបៀរ	5,000
សម្ភារៈសំណង់	3,000
កសិកម្ម	1,500
ផ្សេងៗ	500

- ចូលគណនាកាតរយនៃប្រភេទនីមួយៗ ?
- តើអ្នកសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះប្រភពនៃចំណូលនៅឆ្នាំ 2020 ?

6. ការស្ទង់មតិមួយទៅលើអ្នកទិញទំនិញតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតចំនួន 400 នាក់ដែលទាក់ទងជាមួយឥរិយាបថអតិថិជន។ ក្នុងចំណោមសំណួរទាំងនោះ មានសំណួរមួយត្រូវបានសួរថា៖ តើអ្នកចូលចិត្តទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតដែរឬទេ ? ចម្លើយ៖ បាទ ឬ ទេ។ លទ្ធផលត្រូវបានសង្ខេបក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ចូលចិត្ត	ភេទ		Total
	បុរស	ស្រី	
បាទ	70	150	220
ទេ	80	100	180
Total	150	250	400

- ចូលបង្កើតតារាងខ្វែងដោយផ្អែកលើភាគរយសរុប ភាគរយនៃជួរដេក និងភាគរយនៃជួរឈរ
- តើអ្នកធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះឥរិយាបថនៃការទិញនេះ ?

6. សិប្បកម្មផលិតដែកសសៃមួយ បានផលិតសរសៃដែកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារសំណង់។ ផលិតករបានកំណត់ថា ស្តង់ដារនៃសរសៃដែកគឺត្រូវស្ថិតនៅចន្លោះ 8.30 មីលីម៉ែត្រ ទៅ 8.60 មីលីម៉ែត្រ ។ ដើម្បីចង់ដឹងការផលិតរបស់គាត់នៅគោរពតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់ដែរឬយ៉ាងណា គាត់បានប្រមូលប៉ាន់គំរូចំនួន 40 សរសៃ ហើយទិន្នន័យទាំងនោះត្រូវបានកត់ត្រាដូចខាងក្រោម៖

8.317	8.484	8.489	8.429	8.405
8.383	8.403	8.414	8.46	8.439
8.348	8.414	8.481	8.412	8.411
8.41	8.419	8.415	8.42	8.427
8.351	8.385	8.479	8.41	8.42
8.373	8.465	8.429	8.405	8.498
8.481	8.498	8.458	8.323	8.409
8.422	8.447	8.462	8.42	8.511

a. ចូលគណនាបំណែងចែកប្រភេទនិងភាគរយនៃបំណែងចែកសរសៃដែក

b. ចូលគណនាផលបូកភាគរយនៃបំណែងចែក

c. តើអ្នកសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចម្តេចអំពីការផលិតសរសៃដែករបស់គាត់ដែលទាក់ទងជាមួយស្តង់ដារផលិតកម្មដែលតម្រូវឲ្យការផលិតសរសៃដែកគឺនៅចន្លោះពី 8.30 និង 8.60មីលីម៉ែត្រ ?

7. ការស្ទង់មតិមួយទៅលើមនុស្សចំនួន 300 នាក់ទាក់ទងដល់កកក្តៅដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការទិញទំនិញរបស់ពួកគេ។ ទិន្នន័យទាំងនោះត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងតារាងខាងក្រោម។

ឥទ្ធិពល	ចំនួនអ្នកទិញ
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់	60
តាមរយៈមិត្តភក្តិ	30
បណ្តាញព័ត៌មាន	40
វេបសាយរបស់អ្នកលក់	120
បុគ្គលិករបស់អ្នកលក់	20
ផ្សេងៗ	30

a. ចូលសង់គំនូស បាធាតុ ផាយធាតុនិង ហ៊ីស្តូក្រាម

b. តើគំនូសតាងណាមួយដែលអ្នកគិតថាសក្តិសមទៅនឹងទិន្នន័យប្រភេទនេះ ?

c. ចូលធ្វើការសន្និដ្ឋានចំពោះកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងនោះ ?

8. ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណាយថ្លៃអគ្គីសនីប្រចាំខែ (គិតជា 1000 រៀល) ដែលត្រូវបានប្រមូលដោយចៃដន្យកាលពីឆ្នាំ 2000 របស់គ្រួសារទាំង 80 នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃរាជធានីភ្នំពេញ។

100	178	150	96	108	178	111	109
168	185	149	163	119	185	148	120
200	90	206	150	183	90	213	183
178	116	178	154	151	116	130	151
147	172	123	130	114	172	165	114
102	111	128	143	135	102	143	102
153	148	144	187	191	153	187	153
197	213	168	166	140	197	166	197
127	130	109	139	130	127	139	127
82	165	167	149	160	85	149	87

- a. ចូលសង់គំនូសតាង ហ៊ីស្តូក្រាម និង ប៉ូលីហ្គុនគិតជាភាគរយ
- b. ចូលសង់គំនូសតាង ប៉ូលីហ្គុន គិតជាភាគរយត្រួត
- c. ចូលសង់គំនូសតាងដើមនិងសន្លឹក
- c. តើចំណាយភាគច្រើនប្រមូលផ្តុំត្រង់តម្លៃប៉ុន្មាន ?

9. ខាងក្រោមនេះគឺជាពិន្ទុមុខវិជ្ជាស្ថិតិរបស់និស្សិតទាំងបីវេន។ ចូលប្រើគំនូស ប៉ូលីហ្គុន គិតជាភាគរយដើម្បីប្រៀបធៀបពិន្ទុនិងផ្តល់ការសន្និដ្ឋានទៅលើពិន្ទុរបស់និស្សិតទាំងបីវេន។

វេនព្រឹក	16	23	20	22	26	30	27	39	20	40
វេនថ្ងៃ	21	22	22	25	25	27	32	37	38	16
វេនយប់	17	20	39	25	26	21	23	28	32	33

គោលបំណង

- រៀបរាប់អំពីវិធាននៃទំនោរកណ្តាល បម្រែបម្រួល និងទម្រង់នៃទិន្នន័យជាលេខ
- បង្កើតនិងបកស្រាយអំពីរូបភាពនៃប្រអប់
- គណនាចតុភាគ និង សតភាគ
- គណនារង្វាស់សង្ខេបតាមបែបបរិយាយនៃចំនួនសកល
- គណនា ខ្វែរវ៉ារីយ៉ង់ និង មេគុណទំនាក់ទំនង
- លើកឧទាហរណ៍ផ្សេងៗនៃការប្រើប្រាស់ស្ថិតិ

3.1. ស្ថិតិបរិយាយ

ស្ថិតិបរិយាយ (descriptive statistics) គឺសេចក្តីសង្ខេបដែលរៀបរាប់ខ្លីៗអំពីសំណុំទិន្នន័យមួយ។ វាអាចជាសេចក្តីសង្ខេបដែលដំណាងឲ្យចំនួនសកល (population) ឬតំណាងឲ្យប៉ាន់គំរូណាមួយ (a sample)។ ស្ថិតិបរិយាយត្រូវបានបំបែកជា រង្វាស់ទំនោរកណ្តាល (measure of center or tendency) និងរង្វាស់ភាពរាយប៉ាយ (variability or spread)។ ហើយរង្វាស់ទំនោរកណ្តាលរួមមាន៖ តម្លៃមធ្យម (mean) មេដ្យាន (median) និង ម៉ូដ (mode) ដោយឡែករង្វាស់ភាពរាយប៉ាយរួមមាន៖ គម្លាតស្តង់ដារ (standard deviation) វ៉ារីយ៉ង់ (variance) ចំនួនអប្បបរមា (minimum) ចំនួនអតិបរមា (maximum) កីតូស៊ីស (kurtosis) និង ស្កូនេសskewness²។

3.2 រង្វាស់កណ្តាល

តម្លៃមធ្យម (mean or average) គឺជារង្វាស់ចំនុចកណ្តាលនៃទិន្នន័យដែលត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់ជាងគេ។ តម្លៃមធ្យមគឺត្រូវបានចែកចេញជាបីប្រភេទ៖ មធ្យមពិជគណិត (arithmetic mean) មធ្យមទម្ងន់ ឬសមាមាត្រ (weighted mean) និងមធ្យមធរណីមាត្រ (geometric mean)³។

3.2.1 មធ្យមពិជគណិត

មធ្យមពិជគណិត(arithmetic mean) អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីគណនាទៅលើចំនួនគត់ (discrete data) ឬចំនួនដែលមានក្បៀស (continuous data) ដោយបូកតម្លៃនៃសំណុំ X ពីមួយដល់ n រួចចែកនឹង n។ រូបមន្តមធ្យមពិជគណិតត្រូវបានកំណត់ដូចតទៅ៖

² ទាញយកនៅថ្ងៃទី 5/5/2021 ចេញពី [https://www.investopedia.com/terms/d/descriptive_statistics.asp#:~:text=Descriptive%20statistics%20are%20brief%20descriptive,measures%20of%20variability%20\(spread\).](https://www.investopedia.com/terms/d/descriptive_statistics.asp#:~:text=Descriptive%20statistics%20are%20brief%20descriptive,measures%20of%20variability%20(spread).)

³ ទាញយកនៅថ្ងៃទី 5/5/2021 ចេញពី <https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-mean-mode-median.php>

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \quad (3.1a)$$

ដោយសារសមាមាត្រនៃមធ្យមពិជគណិតគឺស្មើគ្នា យើងអាចទាញបាន $1/n$ ជាកត្តាបាន ដូច្នេះរូបមន្ត (4.1a) អាចសរសេរទៅជា៖

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (3.1b)$$

ឧទាហរណ៍ 3.1 ចំណូល 5 ថ្ងៃរបស់អ្នកលក់ម្នាក់គឺដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃ	1	2	3	4	5
ចំណូល(\$)	12	13	14	15	101

ដូច្នេះ ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃរបស់អ្នកលក់គឺ 35 ដុល្លារ៖

$$\bar{X} = \frac{12 + 13 + 14 + 15 + 16}{5} = \frac{1}{5} (12 + 13 + 14 + 15 + 16) = \$14$$

មធ្យមពិជគណិតមានសារៈសំខាន់ចំពោះទិន្នន័យដែលកើតរួច ហើយធាតុនីមួយៗនៃសំណុំ X មានតម្លៃមិនសូវខុសគ្នាខ្លាំង ក៏ប៉ុន្តែវាមានគុណវិបត្តិ ដោយសារតែវាងាយរងឥទ្ធិពលនៃធាតុមិនប្រក្រតី ឬធាតុខុសគេ (unusual or outlier)។ ក្នុងករណីដែលមានធាតុមិនប្រក្រតីណាមួយក្នុងសំណុំទិន្នន័យ វាអាចធ្វើឲ្យតម្លៃមធ្យមរបស់វាមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងពីការពិត។ ឧបមាថា ការចំណូល 5 ថ្ងៃខាងលើ បើថ្ងៃទី 5 លក់បាន 101 ដុល្លារវិញ (មិនមែន 16 ដុល្លារទេ) ពេលនេះចំនួនមធ្យមនៃការលក់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺ 31 ដុល្លារណោះ គឺពិតជាមិនសមស្របទាល់តែសោះព្រោះថា មធ្យម 31 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ គឺខុសពីការលក់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ ថ្ងៃទី 4 ខ្លាំងណាស់។ ក្នុងករណីដែលមាន ធាតុមិនប្រក្រតី ឬធាតុខុសគេ អ្នកអាចប្រើមេដ្យានមកជំនួសវិញ។

3.2.2 មធ្យមទម្ងន់

មធ្យមពិជគណិតគឺជាករណីពិសេសរបស់មធ្យមទម្ងន់ ឬសមាមាត្រ (weighted average)។ មធ្យមពិជគណិតបានកំណត់ថា សមាមាត្រឬមេគុណនៃធាតុ X នីមួយៗគឺស្មើគ្នា ($1/n$)។ ផ្ទុយពីមធ្យមពិជគណិត មេគុណរបស់មធ្យមទម្ងន់នៃធាតុ X នីមួយៗ គឺមិនស្មើគ្នានោះទេ ហើយភាគច្រើន ផលបូកនៃមេគុណត្រូវតែស្មើ 1 ពេលខ្លះក៏អាចខុសពី 1 ផងដែរ។ បើក្នុងករណីផលបូកមេគុណរបស់វាស្មើ 1 យើងអាចហៅថា មធ្យមសមាមាត្រ ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលផលបូកវាខុសពី 1 យើងអាចហៅថាមធ្យមទម្ងន់ ឧទាហរណ៍ ពិន្ទុគណិតវិទ្យាគឺមានមេគុណ 200% ហើយពិន្ទុមុខវិជ្ជាខ្មែរមានមេគុណ 150%។ ចំណុចខុសគ្នាមួយទៀតរវាងមធ្យមពិជគណិត និងមធ្យមទម្ងន់គឺថា មធ្យមពិជគណិតភាគច្រើនត្រូវបានអនុវត្តទៅលើទិន្នន័យ ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតរួច (past data) ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលទិន្នន័យឬព្រឹត្តិការណ៍នោះមិនទាន់កើតមាន (future event) ឧទាហរណ៍ ដូចជាអាត្រាប្រាក់ចំណេញលើការវិនិយោគដែលរំពឹងទុកក្នុងពេលអនាគត គឺគេប្រើមធ្យមទម្ងន់ ឬសមាមាត្រជំនួសវិញ។ ក្នុងជីវភាពជាក់ស្តែង មធ្យមទម្ងន់ត្រូវបានអនុវត្តភាគច្រើននៅក្នុងពិភពហិរញ្ញវត្ថុ ។ មធ្យមទម្ងន់មានរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

$$\bar{X} = \frac{W_1 X_1 + W_2 X_2 + \dots + W_n X_n}{W_1 + W_2 + \dots + W_n} \quad (3.2)$$

ហើយ $W_1 + W_2 + \dots + W_n = 1$

ឧទាហរណ៍ 3.2 លោក A មានលុយសរុបចំនួន 500ដុល្លារ គាត់យកលុយ 200ដុល្លារ ទៅចងការឲ្យលោក B ដោយយកការប្រាក់ 5%ក្នុងមួយឆ្នាំ និង300ដុល្លារទៀតចងការឲ្យលោក C ដោយយកការប្រាក់តែ4%តែប៉ុណ្ណោះ។ តើ លោក A រំពឹងថានឹងទទួលបានការប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

$$\bar{X} = \frac{(200 \times 0.05) + (300 \times 0.04)}{(200 + 300)} = \frac{200 \times 0.05}{500} + \frac{300 \times 0.04}{500}$$

$$= \frac{200}{500} * 0.05 + \frac{300}{500} * 0.04 = 0.40(0.05) + 0.60(0.04) =$$

0.044 or 4.4%

ដូច្នេះការប្រាក់ដែលរំពឹងទុករបស់លោក A គិតជាមធ្យមគឺ 4.4%ឬ 22ដុល្លារ។ ផ្ទុយមកវិញបើ លោក A ឲ្យលោក B និង លោក C ខ្ចីម្នាក់ៗ 250 ដុល្លារស្មើគ្នា។ ការប្រាក់រំពឹងទុករបស់លោកA គឺ 4.5% ពេលនេះមធ្យមទម្ងន់ក្លាយជាមធ្យមពិជគណិត ពីព្រោះសមាមាត្រស្មើគ្នា។

$$\bar{X} = \frac{250}{500} * 0.05 + \frac{250}{500} * 0.04 = \frac{1}{2} * 0.05 + \frac{1}{2} * 0.04 = \frac{1}{2} * (0.05 + 0.04) = 4.5\%$$

3.2.3 មធ្យមធរណីមាត្រ

មធ្យមធរណីមាត្រ (geometric mean) ជួនកាលហៅថា មធ្យមនៃអត្រាផ្គុំប្រចាំឆ្នាំ (compound annual growth rate) ។ វាគឺជាតម្លៃប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ក្នុងមួយដុល្លារ រួចបំពាក់ឬសទី n ហើយដក1។ មធ្យមធរណីមាត្រ មានរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

$$\bar{X}_G = \sqrt[n]{(1 + r_1)(1 + r_2) \dots (1 + r_n)} - 1 \quad (3.3)$$

ឧទាហរណ៍ 3.3 Sophia ទិញភាគហ៊ុនរដ្ឋករទឹករយៈពេល 3ឆ្នាំ។ ឆ្នាំទី1 ចំណេញបាន 10% ឆ្នាំទី2 ចំណេញ 5% និងឆ្នាំទី3 ខាត 8%។ តើជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំ Sophia ចំណេញបានប៉ុន្មាន ?

$$\bar{X}_G = \sqrt[3]{(1 + 0.10)(1 + 0.05)(1 - 0.08)} - 1 = 2.04\%$$

ដូច្នេះអត្រាចំណេញរបស់ Sophia ទៅលើភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋករទឹក គិតជាមធ្យមគឺ 2.04%ក្នុងមួយឆ្នាំ។

3.2.4 មេដ្យាន

មេដ្យាន (median) គឺជាចំនុចកណ្តាលនៃទិន្នន័យ បន្ទាប់ពីទិន្នន័យនោះត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយរួច។ រូបមន្តមេដ្យានត្រូវបានចែកចេញជាពីរ អាស្រ័យទៅនឹងចំនួនធាតុនៃសំណុំ X ជាលេខសេស ឬ លេខគូ។

- ក្នុងករណីទិន្នន័យជាចំនួនសេស រូបមន្តមេដ្យានX៖

$$\text{Median } X(\text{if } n \text{ is even number}) = X_{\frac{(n+1)}{2}} \quad (3.4a)$$

ហើយ X= សំណុំដែលមានធាតុ n

ឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលទិន្នន័យនៃការលក់ទាំង 5 (n=5) នៅក្នុងឧទាហរណ៍ 3.1ខាងលើ។ បន្ទាប់ពីយើងរៀបចំទិន្នន័យនោះតាមលំដាប់លំដោយរួច យើងបានរកឃើញមេដ្យានគឺ 14ដុល្លារ (ធាតុទី3)។ គួរកត់សំគាល់ថា បើយើងប្រើមេដ្យានជារង្វាស់កណ្តាល វាហាក់ដូចជាមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកលក់ទី1 ទី2 និងទី4 ឡើយ បើធៀបជាមួយចំនួនមធ្យមពិជគណិត 31 ដុល្លារក្នុងករណីដែលថ្ងៃទី 5 លក់បាន 101ដុល្លារខាងលើ។

- ក្នុងករណីដែល n ជាចំនួនគត់ រូបមន្តមេដ្យានត្រូវបានកែសម្រួលដូចខាងក្រោម៖

$$\text{Median } X(\text{if } n \text{ is odd number}) = \frac{X_{n/2} + X_{(n/2)+1}}{2} \quad (3.4b)$$

ឧទាហរណ៍ 3.4 ចំណូលរបស់អ្នកលក់ម្នាក់ក្នុងរយៈពេល៦ថ្ងៃ (n=6) គឺដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃ	1	2	3	4	5	6
ចំណូល(\$)	10	15	20	25	105	106

ដោយសារ n = 6 គឺជាចំនួនគត់ មេដ្យាន ឬធាតុនៅកណ្តាលគឺមានដល់ទៅពីរ គឺធាតុទី 3 និង ទី4ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើរូបមន្ត (3.4b) នឹងត្រូវបានអនុវត្ត។

$$\text{Median } X(\text{if } n \text{ is odd number}) = \frac{X_{6/2} + X_{(6/2)+1}}{2} = \frac{X_{(3+4)}}{2} = X_{3.5}$$

$$\text{ដូច្នេះមេដ្យានគឺជាធាតុទី3.5 ឬ } = \frac{(20+25)}{2} = \$22.5$$

3.2.5 ម៉ូដ

ម៉ូដ (Mode) គឺជាតម្លៃដែលកើតញឹកញាប់ជាងគេ។ ម៉ូដមានសារៈសំខាន់ចំពោះអថេរដាច់ ឬអថេរប្រភេទ (discrete or categorical variable) តែបើអថេរដាច់ ឬមានក្បៀសវិញ គឺវាមិនសូវត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើយ។ ដើម្បីរកម៉ូដ យើងត្រូវរៀបចំទិន្នន័យនោះតាមលំដាប់លំដោយជាមុនសិន រួចយើងធ្វើការអង្កេតទៅលើធាតុមួយណាដែលកើតញឹកញាប់ជាងគេ។

ឧទាហរណ៍ 3.5 ការលក់ទឹកត្រចៀកកាំចំនួន 7 ថ្ងៃរបស់ Dany ត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃ	1	2	3	4	5	6	7
ចំណូល(\$)	10	12	12	12	15	15	16

ឧទាហរណ៍ 3.5 បញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមការលក់ចំនួន 7ថ្ងៃ មាន 3ថ្ងៃលក់បាន 12ដុល្លា និង 2ថ្ងៃលក់បាន 15ដុល្លា ដូច្នេះម៉ូដគឺ 12ដុល្លា។ សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យខ្លះ អត់មាន ម៉ូដក៏មានដែរ។

3.3 វង្វាស់ភាពរាយប៉ាយ

ជាទូទៅ ភាពរាយប៉ាយ (measure of variation) មានតម្លៃតូច បង្ហាញតម្លៃមធ្យម (mean or average) អាចទុកចិត្តបាន ហើយផ្ទុយមកវិញបើភាពរាយប៉ាយមានតម្លៃធំ គឺបញ្ជាក់ថាតម្លៃមធ្យមមិនគួរទុកចិត្តនោះទេ ។ វង្វាស់ភាពរាយប៉ាយរួមមាន៖ វង្វ (range) វ៉ារីយ៉ង់ (variance) គម្លាតស្តង់ដារ (standard deviation) និងមេគុណបម្រែបម្រួល (coefficient of variation)

3.3.1 វង្វ

វង្វ (range) គឺជាគម្លាតពីធំទៅតូចដែលវាស់ភាពរាយប៉ាយដ៏សាមញ្ញមួយ។ វង្វត្រូវបានគណនាដោយយកតម្លៃធំជាងគេ (max) ដកនឹងតម្លៃតូចជាងគេ (min)។ រូបមន្តវង្វដូចខាងក្រោម៖

$$\text{Range} = X_{\text{largest}} - X_{\text{smallest}} \quad (3.5)$$

ឧទាហរណ៍ 3.6 ចំណូលរបស់និស្សិត 11 រូប (គិតជាដុល្លា) ត្រូវបានកត់ត្រាដូចខាងក្រោម៖

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

$$\text{Range} = \text{Max} - \text{Min} = 10 - 0 = 10$$

ដូច្នេះគម្លាតនៃចំណូលពីធំទៅតូចរបស់និស្សិតទាំង 11រូបគឺ 10ដុល្លា។

3.3.2 វ៉ារីយ៉ង់និងគម្លាតស្តង់ដារ

- វ៉ារីយ៉ង់នៃប៉ាន់គំរូ (sample variance) គឺជាគម្លាតចេញពីតម្លៃមធ្យមគិតជាការេ។ បើតម្លៃវ៉ារីយ៉ង់នៃប៉ាន់គំរូកាន់តែធំគឺបង្ហាញថា ទិន្នន័យមានភាពរាយប៉ាយកាន់តែច្រើន។ រូបមន្តវ៉ារីយ៉ង់នៃប៉ាន់គំរូត្រូវបានកំណត់ដូចតទៅ៖

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1} \quad (3.6)$$

ហើយ X_i = តម្លៃ X ដែលបានអង្កេត

$\bar{X}$ = តម្លៃមធ្យមរបស់ $X = \frac{\sum X_i}{n}$

n = ចំនួនដែលបានអង្កេត

- គម្លាតស្តង់ដារ (standard deviation) គឺជាឫសការេនៃវ៉ារីយ៉ង់

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}} \quad (3.7)$$

ឧទាហរណ៍ ចំណូលរបស់និស្សិតទាំង 11រូបខាងលើ យើងអាចគណនាវ៉ារីយ៉ង់ដោយប្រើរូបមន្ត 3.6 ហើយបានលទ្ធផលដូចក្នុងតារាង 3.1។

តារាង 3.1 នីតិវិធីគណនាវ៉ារីយ៉ង់ចំណូលរបស់និស្សិត 11នាក់

n	X_i	$\bar{X}$	$X_i - \bar{X}$	$(X_i - \bar{X})^2$
1	0	5	-5	25
2	1	5	-4	16
3	2	5	-3	9
4	3	5	-2	4
5	4	5	-1	1
6	5	5	0	0
7	6	5	1	1
8	7	5	2	4
9	8	5	3	9
10	9	5	4	16
11	10	5	5	25
Total	55			110

ដើម្បីគណនាវ៉ារីយ៉ង់ ដំហែនដំបូងគេត្រូវគណនាតម្លៃមធ្យមជាមុនសិន។

- គណនាតម្លៃមធ្យម: $\bar{X} = \frac{(0+1+\dots+10)}{11} = \frac{55}{11} = \$5$ (មើល column ទី3)

➢ គណនារ៉ឺយ៉ង់ $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{110}{11-1} = \$11$

មានន័យថាគម្លាតចំណូលគិតជាមធ្យមរបស់និស្សិតតាំង 11 នាក់គឺ 11 ដុល្លាការ។ ជាទូទៅរ៉ឺយ៉ង់ពិបាកក្នុងការបកស្រាយ ដូច្នេះដើម្បីបកស្រាយឲ្យងាយយល់ គេបង្វែររ៉ឺយ៉ង់ទៅជាគម្លាតស្តង់ដារវិញ។


➢ ដូច្នេះគម្លាតស្តង់ដារនៃចំណូលរបស់និស្សិតទាំង 11 រូបគឺ៖

$$S = \sqrt{\frac{110}{11-1}} = \$3.32$$

សរុបមក ចំណូលរបស់និស្សិតទាំង 11 រូប គិតជាមធ្យមគឺ 5 ដុល្លា ហើយគម្លាតស្តង់ដារ (គម្លាតចេញពីមធ្យម) គឺ 3.32 ដុល្លា។

ជាទូទៅគម្លាតស្តង់ដារកាន់តែធំបញ្ជាក់ថា ភាពរាយប៉ាយចេញពីតម្លៃមធ្យមកាន់តែឆ្ងាយ (សូមមើលរូប 3.1)។

រូប 3.1 ការប្រៀបធៀបគម្លាតស្តង់ដារ និង ឌីស្ទ្រីប៊ុស៊ីស



តើគម្លាតស្តង់ដារប៉ុន្មានទើបចាត់ទុកថាធំ? ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះ យើងអាចយកតម្លៃគម្លាតស្តង់ដារធៀបជាមួយតម្លៃមធ្យម។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍ 3.6 តម្លៃមធ្យមគឺ 5 ដុល្លា រីឯគម្លាតស្តង់ដារវិញគឺ 3.32 ដុល្លា ហាក់ដូចជាធំណាស់ វាប្រហែលជា 66% នៃតម្លៃមធ្យម ដូច្នេះគម្លាតស្តង់ដារបែបនេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាធំមែនទែន។

វិធានអក្សរសាស្ត្រ

ទិន្នន័យភាគច្រើនបានប្រមូលផ្តុំជុំវិញមេដ្យាន។ ក្នុងករណីដែលទិន្នន័យរៀងទៅខាងធ្វេង ទិន្នន័យបានភាគច្រើនប្រមូលផ្តុំនៅខាងធ្វេងហើយតម្លៃទាំងនោះគឺតូចជាងតម្លៃមធ្យម។ ក្នុងករណីដែលទិន្នន័យរៀងទៅខាងស្តាំ ទិន្នន័យបានប្រមូលភាគច្រើនប្រមូលផ្តុំនៅខាងស្តាំហើយតម្លៃទាំងនោះគឺធំជាងតម្លៃមធ្យម។ ក្នុងករណីស៊ីមេទ្រីគឺមេដ្យានស្មើទៅនឹងតម្លៃមធ្យម ហើយទិន្នន័យភាគច្រើនប្រមូលផ្តុំនៅត្រង់មេដ្យាននិងតម្លៃមធ្យមដែលបង្កើតបានបំណែងចែកមួយរវាងរូបដូចជួង (មើលរូប 3.4 ខាងក្រោម)។ ករណីដែលទិន្នន័យមានបំណែងចែកមួយរវាងរូបដូចជួងនោះ អ្នកអាចប្រើវិធានអក្សរសាស្ត្របាន (Empirical Rule) ហើយវិធាននេះបានកំណត់ថា៖

- ប្រហែលជា 68% នៃតម្លៃរបស់ទិន្នន័យស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ ± 1 ស្តង់ដារចេញពីតម្លៃមធ្យម

- ហែលជា 95% នៃតម្លៃរបស់ទិន្នន័យស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ ± 2 ស្តង់ដារចេញពីតម្លៃមធ្យម
- ហែលជា 99.7% នៃតម្លៃរបស់ទិន្នន័យស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ ± 3 ស្តង់ដារចេញពីតម្លៃមធ្យម

ក្រៅពីប្រើសម្រាប់ធ្វើការបកស្រាយគម្លាតចេញពីតម្លៃមធ្យម វិធានអក្សរសាស្ត្រអាចត្រូវបានគេប្រើផងដែរដើម្បីកំណត់ធាតុមិនប្រក្រតី (outlier)។ ជាទូទៅបើធាតុណាមួយនៃទិន្នន័យដែលមិនស្ថិតនៅចន្លោះ $\mu \pm 3\sigma$ ត្រូវបានចាត់ទុកថា ធាតុមិនប្រក្រតីឬ outlier។

ឧទាហរណ៍ ចំនួនសកលនៃធុរកិច្ចកំពតប្រភេទលេខមួយមានទម្ងន់ $\mu = 4$ គឺឡូក្រាម ក្នុងមួយផ្លែ ហើយមានគម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកល $\sigma = 0.2$ គឺឡូក្រាម។ ចូលគណនាចន្លោះ ± 1 , ± 2 , និង ± 3 ស្តង់ដារចេញពីតម្លៃមធ្យម ហើយបើសិនជាមានធុរកិច្ចមួយផ្លែទម្ងន់ 4.8 គឺឡូក្រាម បើសិនគម្លាត ± 3 ស្តង់ដារត្រូវបានគេប្រើ តើធុរកិច្ចនោះទម្ងន់មិនប្រក្រតីមែនទេ?

- $\mu \pm 1\sigma = 4 \pm 1(0.2) = (3.8, 4.2)$
- $\mu \pm 2\sigma = 4 \pm 2(0.2) = (3.6, 4.4)$
- $\mu \pm 3\sigma = 4 \pm 3(0.2) = (3.4, 4.6)$

បកស្រាយវិធានអក្សរសាស្ត្រ:

- ប្រហែល 68% ទម្ងន់ធុរកិច្ចគឺស្ថិតនៅចន្លោះ 3.8 ទៅ 4.2 គឺឡូក្រាម
- ប្រហែល 95% ទម្ងន់ធុរកិច្ចគឺស្ថិតនៅចន្លោះ 3.6 ទៅ 4.4 គឺឡូក្រាម
- ប្រហែល 99.7% ទម្ងន់ធុរកិច្ចគឺស្ថិតនៅចន្លោះ 3.4 ទៅ 4.6 គឺឡូក្រាម

ដោយសារតែគម្លាត 3ស្តង់ដារគឺនៅចន្លោះ 3.4 ទៅ 4.6 គឺឡូក្រាម ហើយចន្លោះនេះមិនមានតម្លៃ 4.8 គឺឡូក្រាម ដូច្នេះផ្លែធុរកិច្ចដែលមានទម្ងន់ 4.8 គឺឡូក្រាម គឺជាផ្លែធុរកិច្ចពិសេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានទម្ងន់មិនប្រក្រតី។

ទ្រឹស្តី The Chebyshev

ក្នុងករណីដែលទិន្នន័យមានលក្ខណៈរៀងរៀង គួរប្រើទ្រឹស្តីរបស់ Chebyshev។ វិធាននេះបានចែងថា គ្រប់ទម្រង់ទិន្នន័យទាំងអស់ មិនទាក់ទងជាមួយបំណែងចែករបស់វានោះទេ តម្លៃគិតជាភាគរយនៃទិន្នន័យគឺស្ថិតនៅចម្ងាយ k ស្តង់ដារយ៉ាងតិចចេញពីតម្លៃមធ្យម។

$$(1 - \frac{1}{K^2}) \times 100\%$$

អ្នកអាចទ្រឹស្តីនេះគ្រប់តម្លៃ $K > 1$ (មិនបាច់ជាចំនួនគត់នោះទេ)។ ទ្រឹស្តីនេះបានចែងថា គ្រប់សំណុំទិន្នន័យជាលេខ⁴:

- $K=2$: យ៉ាងហោចណាស់ $(1 - \frac{1}{2^2}) \times 100\% = 75\%$ នៃទិន្នន័យគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ 2 ស្តង់ដារនៃតម្លៃមធ្យម។ ហើយចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់ប៉ាន់គំរូគឺ $\bar{X} \pm 2s$ ហើយសម្រាប់ចំនួនសកលគឺ $(\mu \pm 2\sigma)$

⁴ ទ្រឹស្តី The Chebyshev ទាញយកនៅថ្ងៃទី 1/4/2021 ចេញពី

[https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Statistics/Book%3A_Introductory_Statistics_\(Shafer_and_Zhang\)/02%3A_Descriptive_Statistics/2.05%3A_The_Empirical_Rule_and_Chebyshev's_Theorem#:~:text=Chebyshev's%20Theorem%20is%20a%20fact,standard%20deviations%20of%20the%20mean.](https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Statistics/Book%3A_Introductory_Statistics_(Shafer_and_Zhang)/02%3A_Descriptive_Statistics/2.05%3A_The_Empirical_Rule_and_Chebyshev's_Theorem#:~:text=Chebyshev's%20Theorem%20is%20a%20fact,standard%20deviations%20of%20the%20mean.)

- $K=3$: យ៉ាងហោចណាស់ $(1 - \frac{1}{3^2}) \times 100\% = 88.9\%$ នៃទិន្នន័យគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ 3 ស្តង់ដារនៃតម្លៃមធ្យម។ ហើយចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់ប៉ាន់គំរូគឺ $\bar{X} \pm 3s$ ហើយសម្រាប់ចំនួនសកលគឺ $(\mu \pm 3\sigma)$ ឧទាហរណ៍ផ្ទៃធុរនៃខាងលើ $\mu=4$ គឺឡូក្រាម និងគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ $s=0.2$ គឺឡូក្រាម។
- 75% នៃទម្ងន់ផ្ទៃធុរនៃគំរូគឺនៅចន្លោះ $4 \pm 2(0.2)$ ឬ ចាប់ពី 3.6 ដល់ 4.4 គឺឡូក្រាម
- 88.9% នៃទម្ងន់ផ្ទៃធុរនៃគំរូគឺនៅចន្លោះពី $4 \pm 3(0.2)$ ឬ ចាប់ពី 3.4 ដល់ 4.6 គឺឡូក្រាម

3.3.3 មេគុណនៃភាពរាយប៉ាយ

មេគុណនៃភាពរាយប៉ាយ (coefficient of variation, CV) គឺជាអង្វាស់នៃភាពរាយប៉ាយដែលចេញពីតម្លៃមធ្យម។ ជាទូទៅមេគុណនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រៀបធៀបម្រូបម្រួលនៃសំណុំទិន្នន័យពីរប្រភេទដែលមានគម្លាតស្តង់ដារដូចគ្នា ឬផ្ទៃធុរខុសគ្នា និងត្រូវបានគណនាជាភាគរយ។ រូបមន្តមេគុណនៃភាពរាយប៉ាយគឺដូចខាងក្រោម៖

$$CV_i = \frac{S_i}{\bar{X}_i} * 100\% \quad (3.8)$$

CV_i = មេគុណនៃភាពរាយប៉ាយរបស់វត្ថុណាមួយ (coefficient of variation of i item)

S_i = គម្លាតស្តង់ដាររបស់វត្ថុណាមួយ (standard deviation of i item)

$\bar{X}_i$ = តម្លៃមធ្យមរបស់វត្ថុណាមួយ (average value of i item)

CV_i គឺជាប្រភេទអនុបាតអាក្រក់ (bad ratio) មានន័យថា តម្លៃ CV_i កាន់តែធំកាន់តែអស់ ឬអាក្រក់។ ឧបមាថា តម្លៃភាគហ៊ុន A ជាមធ្យម 50 ដុល្លារនិងតម្លៃភាគហ៊ុន B ជាមធ្យម 100 ដុល្លារ ហើយតម្លៃភាគហ៊ុន A និង B មានគម្លាតស្តង់ដារដូចគ្នាគឺ 5 ដុល្លារ។ តើភាគហ៊ុនមួយណាមានហានិភ័យខ្ពស់ជាង? សូមបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ គម្លាតស្តង់ដារគឺជាអង្វាស់ហានិភ័យសរុប (total risk)។ ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវគណនា មេគុណនៃភាពរាយប៉ាយរបស់ភាគហ៊ុនទាំងពីរជាមុនសិន។

$$CV_A = \frac{5}{50} * 100\% = 10\%$$

$$CV_B = \frac{5}{100} * 100\% = 5\%$$

បើយើងពិនិត្យលើគម្លាតស្តង់ដារតែមួយមុខ យើងអាចសន្និដ្ឋានថា ភាគហ៊ុនទាំងពីរមានហានិភ័យស្មើគ្នា (គម្លាតស្តង់ដារស្មើគ្នា) តែបើយើងពិនិត្យឲ្យបានឱ្យបានឆ្លាតដល់ ភាគហ៊ុន A មានហានិភ័យខ្ពស់ជាងភាគហ៊ុន B ពីព្រោះ $CV_A > CV_B$ ។

3.3.4 សតភាគ ចតុភាគ ចន្លោះចតុភាគ និង គំនូសប្រអប់

- a. **សតភាគ** (percentile) គឺជាស្តង់ដារមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបគម្លាតមួយ ឧទាហរណ៍ ការប្រៀបធៀបប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិក ពិន្ទុរបស់និស្សិត សុខភាពសាធារណៈ ធនាគារជាដើម។ ជាទូទៅ ទិន្នន័យត្រូវបានគេរៀបតាមលំដាប់ដោយពីតូចទៅធំ ហើយអង្កត់ជា 100 ភាគស្មើគ្នា ។ សូមកុំច្រឡំសតភាគ គឺជាភាគរយ⁵។ សតភាគចំពោះតម្លៃ X ត្រូវបានគណនាតាមរូបមន្តដូចតទៅ

⁵ Allan G.B (2009) Statistics: A Step-by-Step Approach. Eighth Edition. McGraw-Hill.

$$\text{សតភាគ} = \frac{(\text{ចំនួនតម្លៃក្រោម } X) + 0.50}{\text{ចំនួនតម្លៃសរុប}} * 100 \quad (3.9)$$

ឧទាហរណ៍ 3.7 គ្រូម្នាក់បានអោយពិន្ទុសិស្សចំនួន 10 នាក់ (ពិន្ទុ 20/20) ដូចខាងក្រោម៖

17	15	11	5	8	2	4	5	20	12
----	----	----	---	---	---	---	---	----	----

ចូលគណនា សតភាគលំដាប់ (percentile rank) នៃពិន្ទុស្មើ 15?

- ជំហានទី1: រៀបចំទិន្នន័យតាមលំដាប់ពីតូចទៅធំ

2	4	5	5	8	11	12	15	17	20
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

- ជំហានទី2: គណនាសតភាគដោយប្រើរូបមន្ត (3.9)

ដោយសារ ចំនួនលេខនៅក្រោម $X=15$ ពិន្ទុគឺមាន 7 លេខ ដោយរាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ ដូច្នេះយើងបាន៖

$$\text{សតភាគ} = \frac{(7) + 0.50}{10} * 100 = 75 (\text{ទី } 75 \text{ សតភាគ})$$

- ជំហានទី3: បំណកស្រាយ

ដូច្នេះចំពោះនិស្សិតដែលបានពិន្ទុ 15 គឺប្រសើរជាង 75 ភាគរយនៃនិស្សិតក្នុងថ្នាក់ដែលមាន គ្នា 10 នាក់។

- b. ចតុភាគ (quartile) ស្រដៀងទៅនឹងសតភាគដែរ ប៉ុន្តែទិន្នន័យត្រូវបានគេបែងចែកបួនភាគស្មើៗគ្នា ៖ 25% 50% និង 75% ដូចរូប 3.2 ខាងក្រោម។

រូប 3.2 ចតុភាគ

Lower	Q_1	Second	Q_2	Third	Q_3	Upper
$\leftarrow 25\% \rightarrow$	I	$\leftarrow 25\% \rightarrow$	II	$\leftarrow 25\% \rightarrow$	III	$\leftarrow 25\% \rightarrow$

ចតុភាគ ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ និងភាគហ៊ុនជាដើម។ ដើម្បីគណនាចតុភាគ គេត្រូវរៀបចំទិន្នន័យតាមលំដាប់លំដោយពីតូចទៅធំ ហើយបន្ទាប់មកគេធ្វើការកំណត់នូវតម្លៃ៖

- Q_1 តំណាងទិន្នន័យតូចជាង 25%
- Q_2 តំណាងទិន្នន័យតូចជាង 50% (តំណាងមេដ្យាន)
- Q_3 តំណាងទិន្នន័យតូចជាង 75%

ឧទាហរណ៍ 3.8 អ្នកវិភាគខាងហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់ បានធ្វើការវិភាគទៅលើសំរៀងវិនិយោគមួយ (portfolio) ដែលមានប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 12 ។ ប្រាក់ចំណេញ (ដុល្លារ) ក្នុងមួយហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវបានរៀបតាមលំដាប់លំដោយពីតូចទៅធំដូចខាងក្រោម៖

Lower			Q_1	Second			Q_2	Third			Q_3	Upper		
$\Leftarrow 25\% \Rightarrow$			$\Leftarrow 25\% \Rightarrow$			$\Leftarrow 25\% \Rightarrow$			$\Leftarrow 25\% \Rightarrow$			$\Leftarrow 25\% \Rightarrow$		
8	12	21	29	31	34	36	38	40	42	45	48			

- ជំហានទី១: រៀបចំទិន្នន័យតាមលំដាប់លំដោយពីតូចទៅធំ (ដូចទិន្នន័យខាងលើ)

- ជំហានទី២: គណនាតម្លៃ Q_1, Q_2, Q_3

- តម្លៃ Q_1 គឺនៅចន្លោះ X_3 និង X_4 , $Q_1 = (21+29)/2 = \$25$
- តម្លៃ Q_2 គឺនៅចន្លោះ X_6 និង X_7 , $Q_2 = (34+36)/2 = \$35$
- តម្លៃ Q_3 គឺនៅចន្លោះ X_9 និង X_{10} , $Q_3 = (40+42)/2 = \$41$

- ជំហានទី៣: បំណកស្រាយ

- $Q_1 = \$25$ បញ្ជាក់ថា 25% ប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយហ៊ុន ចំណេញមិនដល់ 25 ដុល្លា
- $Q_2 = \$35$ បញ្ជាក់ថា 50% ប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយហ៊ុន ចំណេញមិនដល់ 35 ដុល្លា
- $Q_3 = \$41$ បញ្ជាក់ថា 75% ប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយហ៊ុន ចំណេញមិនដល់ 41 ដុល្លា

ដើម្បីឲ្យដឹងថាសំព័ត្រវិនិយោគមួយណាប្រើសេរីជាង អ្នកអាចយកតម្លៃ Q ទាំងនេះប្រៀបធៀបជាមួយនិង តម្លៃ Q នៃសំព័ត្រវិនិយោគដទៃទៀត។ ឧបមាថា កញ្ចប់សំព័ត្រមួយទៀតដែលមានតម្លៃ $Q_3 = 50$ ដុល្លា ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា សំព័ត្រទី២គឺល្អជាងសំព័ត្រទីមួយពីព្រោះ 75% នៃសំព័ត្រទី២គឺចំណេញបានរហូតដល់ 50 ដុល្លា ហើយ 75% នៃសំព័ត្រទី១គឺចំណេញបានតែ 41 ដុល្លាតែប៉ុណ្ណោះ។

របៀបរកទីតាំង Q_1 និង Q_3 ចំពោះទិន្នន័យដែលបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយពីតូចទៅធំ រួចរាល់ យើងអាចប្រើរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

$$Q_1 = \frac{(n+1)}{4} \text{ តម្លៃតាមលំដាប់លំដោយ} \quad (3.10)$$

$$Q_3 = \frac{3(n+1)}{4} \text{ តម្លៃតាមលំដាប់លំដោយ} \quad (3.11)$$

ហើយ n =លេខទីតាំង

- វិធានទី១: ឧបមាថា $n=11$ លេខគត់ ដូច្នេះ $Q_1 = \frac{11+1}{4} = 3$ ជាលេខដែលមានលេខរៀងទី៣
- វិធានទី២: បើតម្លៃរបស់ Q_1 ជាចំនួនមានក្បៀស ត្រូវបង្ក្រប់លេខនោះទៅជាលេខគត់ដែលនៅជិតបំផុត ឧបមាថា $n=12$ ដូច្នេះ $Q_1 = 3.25$ បង្អត់ 3
- វិធានទី៣: បើតម្លៃរបស់ Q_1 ជាចំនួនមានក្បៀស ឧទាហរណ៍ 2.5, ឬ 4.5, ឬ 7.5។ ឧបមាថា $n=9$ ដូច្នេះ $Q_1 = 2.5$ ករណីនេះយើងមិនអាចបង្អត់បានទេ គឺតម្លៃ Q_1 ត្រូវស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី 2 ទី៣។

ឥឡូវយើងត្រឡប់មកឧទាហរណ៍ 3.8 ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 12 ខាងលើ ដែលទិន្នន័យត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយពីតូចទៅធំរួចរាល់។ ចូលគណនា Q_1 និង Q_3 ?

$$Q_1 = \frac{(12+1)}{4} = 3.25$$

ដោយសា $Q_1 = 3.25$ យើងបង្កត់3។ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនដែលមានលេខរៀងទី3 គឺមានប្រាក់ចំណេញ 21 ដុល្លាក្នុងមួយហ៊ុន (មើលរូប 3.2 ត្រង់ X មានលេខរៀងទី3) ហើយយើងដឹងហើយថា Q_1 គឺតំណាង25% ដូច្នេះយើងអាចបកស្រាយបន្តទៀតថា 25%នៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានប្រាក់ចំណេញតិចជាង 21ដុល្លាក្នុងមួយហ៊ុន ឬ75% នៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាង 21ដុល្លាក្នុងមួយហ៊ុន។

$$Q_3 = \frac{3(12+1)}{4} = 9.75$$

ដោយសា $Q_3 = 9.75$ យើងបង្កត់10។ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនដែលមានលេខរៀងទី10 គឺមានប្រាក់ចំណេញ 42 ដុល្លាក្នុងមួយហ៊ុន (មើលរូប 3.2 ត្រង់ X មានលេខរៀងទី10) ហើយយើងអាចបកស្រាយថា 75% នៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានប្រាក់ចំណេញតិចជាង 42ដុល្លាក្នុងមួយហ៊ុន ឬ25%នៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាង 42ដុល្លាក្នុងមួយហ៊ុន។

- c. **គម្លាតចតុកោត** (interquartile range ឬ mid-spread) គឺជាតម្លៃខុសគ្នារវាង Q_3 និង Q_1 នៃសំណុំទិន្នន័យ។ វាតំណាងអោយ 50%នៃសំណុំទិន្នន័យដែលស្ថិតនៅកណ្តាល ហើយវាមិនរងឥទ្ធិពលដោយធាតុមិនប្រក្រតី ឬ outlier នោះទេ។

គម្លាតចតុកោត (Interquartile Range, IQR)

$$IQR = Q_3 - Q_1 \quad (3.12)$$


ឥឡូវយើងត្រឡប់មកឧទាហរណ៍ 3.8 របស់យើង។ ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន12 គឺ $Q_3 = \$42$ និង $Q_1 = \$21$ ដូច្នេះចន្លោះចតុកោត $IQR = 42 - 21 = \$21$ ឬ យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា 50% នៃប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺស្ថិតនៅចន្លោះ 21ទៅ42ដុល្លា ឬមានគម្លាតចតុកោត 21ដុល្លា។ ជាទូទៅបើគម្លាតចតុកោតកាន់តែធំ មានន័យថាទិន្នន័យរាយប៉ាយកាន់តែខ្លាំងចេញពីមេដ្យាន ឬគម្លាតស្តង់ដារកាន់តែខ្ពស់ ជាហេតុធ្វើអោយតម្លៃមធ្យម (mean) មិនអាចទុកចិត្តបាន។

d. គំនូសប្រអប់

គំនូសប្រអប់ (Box Plox) គឺជាវិធីសាស្ត្របែងចែកទិន្នន័យជាលេខទៅតាមចតុកោត (quartile) ដោយដាក់បង្ហាញវានៅលើក្រាហ្វិក។ វាជាឧបករណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរករកទិន្នន័យ តួរយ៉ាងដូចការរកធាតុមិនប្រក្រតី ឬ outlier។ ដើម្បីសង់គំនូសប្រអប់ គេត្រូវពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យចំនួន 5៖ តម្លៃអប្បបរមា, Q_1 , Q_2 , Q_3 និង អតិបរមា។ បើយើងយកទិន្នន័យប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង12 រួចដាក់ក្នុងគំនូសប្រអប់យើងនឹងបាន Box Plox ដូចរូប 3.3។

តាមរយៈរូប3.3 បញ្ជាក់អោយឃើញថា មេដ្យាន ($Q_3 = \$35$) និងតម្លៃមធ្យម (mean=\$32) មិនត្រួតស៊ីគ្នានោះទេ ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាទិន្នន័យនេះអស៊ីមេទ្រី (តម្លៃមធ្យមនិងមេដ្យានមិនស្មើគ្នា) ហើយក៏ប៉ុន្តែតម្លៃមធ្យមខុសគ្នាជាមួយតម្លៃមេដ្យានតែ2ដុល្លាតែប៉ុណ្ណោះ។ ហើយតាមរយៈរូប3.3 ដែលនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងថា សំណុំទិន្នន័យហាក់ដូចជារៀងទៅខាងឆ្វេងច្រើនជាង (negative skewed)។

រូបទី 3.3 គំនូសប្រអប់នៃប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង12




3.4 បំណែងចែកទម្រង់ទិន្នន័យ

បំណែងចែកទម្រង់ទិន្នន័យ (shape of distribution) គឺជារូបភាពទាំងមូលនៃបំណែងចែកតម្លៃទិន្នន័យ។ ពេលខ្លះបំណែងចែកតម្លៃទិន្នន័យអាចស៊ីមេទ្រី (symmetry) អស៊ីមេទ្រី (asymmetry) ឬធៀង (skewness)។ ស៊ីមេទ្រីគឺមានន័យថា តម្លៃនៅក្រោមតម្លៃមធ្យម និងលើមធ្យមគឺមានបរិមាណស្មើគ្នា ឬសមតុល្យ ឬ តម្លៃធៀងស្មើសូន្យ ($skewness=0$)។ ក្នុងករណីទិន្នន័យស៊ីមេទ្រី តម្លៃមធ្យម ស្មើនឹងមេដ្យាន ($mean=median$) ហើយការប្រើប្រាស់តម្លៃមធ្យមគឺអាចទុកចិត្តបាន។

ភាពធៀង (skewness) និង ឌីតូស៊ីស (kurtosis) គឺជាទម្រង់ពីរទាក់ទងជាមួយស្ថិតិ។ ឌីតូស៊ីសវាស់អំពីភាពប្រមូលផ្តុំនៅកណ្តាលនៃសំណុំទិន្នន័យ រីឯភាពធៀងវាស់អំពីភាពស៊ីមេទ្រី។ ភាពធៀងអាចមានតម្លៃវិជ្ជមាន ពេលន្ទុយផ្នែកខាងស្តាំដៃវែងជាងខាងឆ្វេង (right skewed) និងអវិជ្ជមាន ពេលកន្ទុយផ្នែកឆ្វេងវែងជាងខាងស្តាំ (left skewed) (មើលរូបភាព 3.2)។ ដោយឡែក ឌីតូស៊ីស (kurtosis) គឺវាស់វែងអំពីកំពស់នៃបំណែងចែក (មើលរូបភាព 3.1)។ បើតម្លៃឌីតូស៊ីសកាន់តែធំ កំពស់កាន់តែខ្ពស់ តម្លៃរបស់ទិន្នន័យភាគច្រើនប្រមូលផ្តុំនៅត្រង់កណ្តាលឬតម្លៃមធ្យម ហើយផ្ទុយមកវិញ តម្លៃឌីតូស៊ីសកាន់តែតូច កំពស់ទាប តម្លៃរបស់ទិន្នន័យភាគច្រើនឃ្លាតឆ្ងាយពីតម្លៃមធ្យម ។ ដើម្បីអោយបំណែងចែកស៊ីមេទ្រី តម្លៃស្ថិតិឌីតូស៊ីសស្មើសូន្យ⁶។ ដោយឡែកសម្រាប់ បាបេរ៉ាតេស្ត (Jarque-Bera test) ជាប្រភេទតេស្តរកបំណែងចែក ធម្មតា (normal distribution) គឺតម្រូវអោយតម្លៃឌីតូស៊ីសស្មើ 3.0 ហើយវិជ្ជមានជានិច្ច។ JB-test មាននៅក្នុងកម្មវិធី Eviews ប៉ុន្តែនៅក្នុង SPSS ឬ Excel ដើម្បីអោយបំណែងចែកធម្មតានោះ គឺតម្រូវអោយតម្លៃ kurtosis ស្មើសូន្យ ហើយអាចអវិជ្ជមាន ដូច្នេះតម្លៃស្ថិតិឌីតូស៊ីស (kurtosis statistic) អាស្រ័យនឹងប្រភេទកម្មវិធី (software)។


រូបភាព 3.4 ភាពធៀងនិងស៊ីមេទ្រី

⁶ Allan G.B (2009) Elementary Statistics: A Step by Step Approach. Eight Edition McGraw-Hill



បើយើងយកទិន្នន័យប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង12 មកពិនិត្យមើលបំណែងចែករបស់វា ដោយប្រើ SPSS យើងនឹងទទួលបានបំណែងចែកទិន្នន័យដូចរូបភាព 3.5។

រូបភាព 3.5 ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង12



រូប 3.5 បញ្ជាក់អោយឃើញថា ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង12 មានសភាពធៀងទៅខាងធ្វេង តម្លៃស្ថិតិធៀងស្មើនឹង -0.819 ហើយ មេដ្យានស្មើនឹង 35ដុល្លា តម្លៃមធ្យមស្មើនឹង 32ដុល្លា និងខ្ចីតូស៊ីស ស្មើនឹង -0.205 គឺអវិជ្ជមាន (មើលតារាងស្ថិតិសង្ខេប 3.2 ខាងក្រោម) ។ ស្ថិតិទាំងនេះបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យនេះគឺអស៊ីមេទ្រី (asymmetric) ឬមិនមានបំណែងចែកធម្មតានោះទេ។ ដូច្នេះតម្លៃមធ្យម មិនសូវទុកចិត្តបានឡើយ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី តម្លៃមធ្យមនេះអាចប្រើការបានពីព្រោះវាខុសជាមួយមេដ្យានតែ3ដុល្លាតែប៉ុណ្ណោះ។

តារាង 3.2 ស្ថិតិសង្ខេបនៃប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង12

Descriptives			
		Statistic	Std. Error
PE	Mean	32.0000	3.64318
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	23.9814
		Upper Bound	40.0186
	5% Trimmed Mean	32.4444	
	Median	35.0000	
	Variance	159.273	
	Std. Deviation	12.62033	
	Minimum	8.00	
	Maximum	48.00	
	Range	40.00	
	Interquartile Range	18.50	
	Skewness	-.819	.637
	Kurtosis	-.205	1.232

3.5 កូរ៉េលេស៊ីន មេគុណទំនាក់ទំនង

នៅក្នុងផ្នែកនេះយើងនឹងសិក្សាលើរង្វាស់ពីរដែលទាក់ទងនឹងអថេរជាលេខគឺ៖ កូរ៉េលេស៊ីន និង មេគុណទំនាក់ទំនង (correlation) ។

i) កូរ៉េលេស៊ីន

កូរ៉េលេស៊ីន (covariance) វាស់វែងកំលាំងទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់រវាងអថេរជាលេខចំនួនពីរ (X និង Y) ហើយមានរូបមន្តដូចក្នុង សមីការ 3.13 ។


$$\text{កូរ៉េលេស៊ីនរបស់ប៉ាន់ត្រូវ } \text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n-1} \quad (3.13)$$

ii) មេគុណទំនាក់ទំនង

មេគុណទំនាក់ទំនង (the coefficient of correlation, r) វាស់វែងកំលាំងទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់គិតជាភាគរយរវាងអថេរជាលេខចំនួនពីរ (X និង Y) ។ វាគឺជាទម្រង់ស្តង់ដាររបស់កូរ៉េលេស៊ីន (standardized form of covariance) ហើយមានតម្លៃនៅចន្លោះពី -1 ទៅ +1 ។

- បើ $r=-1$ ទំនាក់ទំនងរវាង X និង Y អវិជ្ជមាន 100% (រូប 3.6a)
- បើ $r=0$ គ្មានទំនាក់ទំនងរវាង X និង Y (រូប 3.6c)
- បើ $r=+1$ ទំនាក់ទំនងរវាង X និង Y វិជ្ជមាន 100% (រូប 3.6c)

រូប 3.6 ទម្រង់ផ្សេងៗនៃមេគុណទំនាក់ទំនង



រូបមន្ត 3.14 កំណត់មេគុណទំនាក់ទំនង

មេគុណទំនាក់ទំនងរបស់ប៉ាន់គំរូ: $r = \frac{Cov(X,Y)}{S_X S_Y}$ ((3.14))

- $Cov(X, Y)$ រូបមន្ត (3.13)

- $S_X = \sqrt{\frac{(X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$

- $S_Y = \sqrt{\frac{(Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}}$

- $n =$ ចំនួនប៉ាន់គំរូ

ឧទាហរណ៍ អាត្រាប្រាក់ចំណេញរយៈពេល 5 ថ្ងៃរបស់ភាគហ៊ុន X និង Y ត្រូវបានកត់ត្រាដូចក្នុងតារាង 3.3 ខាងក្រោម៖

តារាង 3.3 អាត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់ភាគហ៊ុន X និង Y រយៈពេល 5 ថ្ងៃ

ថ្ងៃ	អាត្រាចំណេញ របស់ X	អាត្រាចំណេញ របស់ Y
1	1.1	3
2	1.7	4.2
3	2.1	4.9
4	1.4	4.1
5	0.2	2.5
មធ្យម	1.30	3.74

ចូលគណនានិងបកស្រាយ កូរ៉េឡង់និងមេគុណទំនាក់ទំនង?

ចម្លើយ៖

- កូរ៉េឡង់: $Cov(X, Y) = \frac{(1.1-1.30)(3-3.74)+(1.7-1.30)(4.2-3.74)+\dots+(0.20-1.3)(2.5-3.74)}{5-1} = 0.665$
- គម្លាតស្តង់ដារ X: $S_X = \sqrt{\frac{(1.1-1.30)^2+(1.7-1.30)^2+\dots+(0.20-1.30)^2}{5-1}} = 0.72$
- គម្លាតស្តង់ដារ Y: $S_Y = \sqrt{\frac{(3-3.74)^2+(4.2-3.74)^2+\dots+(2.5-3.74)^2}{5-1}} = 0.97$

$$\text{ដូច្នេះមេគុណទំនាក់ទំនង } r = \frac{0.665}{0.72 \cdot 0.97} = 0.95$$

បំណកស្រាយ៖

អថេរ X និង Y មានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានខ្លាំងរហូតដល់ 95%។ មានន័យថាបើភាគហ៊ុន X ចំណេញ នោះភាគហ៊ុន Y ក៏ចំណេញដែរ ហើយបើខាតគឺខាតទាំងអស់គ្នា។

តារាង 3.4 ខាងក្រោមគឺមេគុណទំនាក់ទំនងដែលជាលទ្ធផលរបស់ Excel។ សូបធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនេះដោយខ្លួនឯង។

តារាង 3.4 មេគុណទំនាក់ទំនងរបស់ X និង Y

	X	Y
X	1	
Y	0.95425	1

សេចក្តីសង្ខេប

ជំពូកនេះបានរៀបរាប់អំពីស្ថិតិបែបបរិយាយ ដែលទាក់ទងជាមួយ តម្លៃមធ្យម គម្លាតស្តង់ដារ មេដ្យាន សតភាគ ចតុភាគ និងចន្លោះចតុភាគ ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបរាប់អំពីចរិតលក្ខណៈនៃទំនោរកណ្តាល បម្រែបម្រួលនិងទម្រង់។ ក្រៅពីនេះជំពូកនេះក៏បានរៀបរាប់ផងដែរអំពីឌីស៊ីស និងភាពធៀង ដែលតំណាងឲ្យរបស់បំណែងចែកធម្មតារបស់សំណុំទិន្នន័យមួយ។

នៅជំពូកបន្ទាប់នេះអ្នកនឹងសិក្សាអំពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃប្រៀបធៀបបីលើគេ ដែលជាស្ថានភាពស្ថិតិបែបបរិយាយទៅនឹងស្ថិតិបែបសន្និដ្ឋាន។

សំណួរនិងលំហាត់

I. សំណួរ

1. ចូលរៀបរាប់អំពីវិបាករបស់ទ្រឹស្តីប្រមូលផ្តុំកណ្តាល?
2. ចូលរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងតម្លៃមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូដ និងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាទាំងបី។
3. ចូលធ្វើការបកស្រាយអំពីចតុភាគទីមួយ ទីពីរនិងទីបី?
4. តើតម្លៃ Z វាស់វែងអំពីអ្វី?
5. ចូលរៀបរាប់ចរិតលក្ខណៈរបស់ រឹង វ៉ែរីយ៉ង់ គម្លាតស្តង់ដារ និងមេគុណបម្រែបម្រួល។
6. តើវិធានអក្សរសាស្ត្រជួយបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រដែលទិន្នន័យជាលេខត្រូវបានគេបកស្រាយយ៉ាងដូចម្តេច?
7. តើវិធានអក្សរសាស្ត្រខុសគ្នាជាមួយវិធានរបស់លោក Chebyshev យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?
8. អ្វីខ្លះជាវិបាកនៃទម្រង់របស់បំណែងចែក (the property of shape) ?
9. តើកូរ៉េរីយ៉ង់និងមេគុណទំនាក់ទំនងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

II. លំហាត់

10. ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាដុល្លាររបស់និស្សិត 10នាក់។

7 5 8 5 6 4 3 5 7 2

- ចូលគណនាចំណាយជាមធ្យមនិងមេដ្យាន
- ចូលគណនារ៉េរីយ៉ង់ គម្លាតស្តង់ដារ រ៉េរីយ៉ង់និងមេគុណបម្រែបម្រួល
- តើទិន្នន័យនេះរៀងដែរឬទេ? បើរៀងតើទៅខាងណា?
- ផ្អែកលើចំណេះ (a) ដល់ (c), តើអ្នកសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចម្តេច?

11. សន្មត់ថា ធនាគារមួយមានទីតាំងនៅភ្នំពេញមានការងារមាញឹកខ្លាំង ហើយតែងតែធ្វើឲ្យអតិថិជនមានការរង់ចាំយូរនៅពេលទទួលសេវាម្តងៗ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារយៈពេលតម្រង់ជួរ(គិតជានាទី) ដែលបានប្រមូលពីអតិថិជន ចំនួន 16 នាក់។

28.06 15.10 18.02 15.40 18.33 14.25 18.01 8.35
10.49 16.40 15.50 14.08 16.17 19.41 15.47 17.20

- ចូលគណនារយៈពេលមធ្យម និងមេដ្យាន
- ចូលគណនារ៉េរីយ៉ង់ គម្លាតស្តង់ដារ រ៉េរីយ៉ង់ មេគុណបម្រែបម្រួល និងពិន្ទុ Z។
- តើធាតុណាខ្លះដែលមិនធម្មតា? ចូលពន្យល់
- តើទិន្នន័យនេះរៀងឬទេ? បើមាន តើរៀងយ៉ាងដូចម្តេច?

12. ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណាយទៅលើអាហារពេលព្រឹករបស់និស្សិត 14នាក់ (គិតជាដុល្លារ):

1.70 1.72 1.92 1.14 2.42 2.94 2.80
7.60 5.51 4.57 4.55 2.86 3.41 3.95

- ចូលគណនាចតុកោណទី 1 (Q1) និងចតុកោណទី 3 (Q3) និងចន្លោះចតុកោណ (the interquartile range)
- ចូលបង្កើតគំនូសតាងប្រអប់ រួចបរិយាយទម្រង់របស់វា។

13. ធនាគារមួយមានទីតាំងនៅភ្នំពេញមានការងារមាញឹកខ្លាំងតែងតែធ្វើឲ្យអតិថិជនមានការរង់ចាំយូរនៅពេលទទួលសេវាម្តងៗ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារយៈពេលតម្រង់ជួរ(គិតជានាទី) ដែលបានប្រមូលពីអតិថិជន ចំនួន 16 នាក់។

8.06 5.10 8.02 5.40 8.33 4.25 8.01 8.35
10.49 6.40 5.50 4.08 6.17 9.41 5.47 7.20

ធនាគារមួយទៀតដែលជាសាខារបស់ធនាគារខាងលើ មានទីតាំងស្ថិតនៅជ្វាយក្រុង ហើយក៏មានការមាញឹកដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារយៈពេលតម្រង់ជួរ(គិតជានាទី) ដែលបានប្រមូលពីអតិថិជន ចំនួន 16 នាក់:

7.06 5.10 7.05 5.40 8.30 4.25 7.00 8.30
8.49 6.40 5.50 5.00 6.17 9.41 5.47 7.20

- ចូលបង្កើតគំនូសតាងប្រអប់និងបរិយាយអំពីទម្រង់នៃបំណែងចែករបស់ធនាគារទាំងពីរ

b. 75% នៃរយៈពេលរងចាំ តើធនាគារមានរយៈពេលយូរជាង ?

c. ចូលប្រើគំនូសតាងប៉ូលីហ្គុនជាភាគរយ ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបរយៈពេលរងចាំរបស់ធនាគារទាំងពីរ

14. សន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុនរបស់ S&P500 នៅឆ្នាំ 2020 មានអត្រាប្រាក់ចំណេញ $\mu=9\%$ គម្លាតស្តង់ដារ $\sigma=2\%$ ។

a. យោងតាមវិធានអក្សរសាស្ត្រ តើអត្រាដែលស្ថិតនៅចន្លោះ ± 1 ស្តង់ដារ និង ± 2 ស្តង់ដារគិតជាមធ្យមគឺប៉ុន្មានភាគរយ ?

b. យោងតាមវិធាន Chebyshev តើអត្រាដែលស្ថិតនៅចន្លោះ ± 1 , ± 2 និង ± 3 ស្តង់ដារគិតជាមធ្យមគឺប៉ុន្មានភាគរយ ?

15. ខាងក្រោមនេះគឺជាទិន្នន័យដែលបានកត់ត្រាទៅលើអថេរពីរគឺ X និង Y ៖

X	8	6	9	4	9	14	15	20
Y	15	10	13	8	19	11	14	18

a. ចូលគណនាកូរ៉េលីយ៉ង់

b. ចូលគណនាមេគុណទំនាក់ទំនងរបស់អថេរទាំងពីរ

c. តើទំនាក់ទំនងរបស់អថេរទាំងពីរខ្លាំងកំរិតណា ? ចូលពន្យល់

គោលបំណង

- សិក្សាអំពីវិធាននៃបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរដាច់
- គណនាតម្លៃរំពឹងទុក និង វ៉ារីយ៉ង់បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- គណនាការវិវិធីនិងការប្រើប្រាស់កូរ៉េលីយ៉ង់នៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុ
- បំណែងចែកទ្វេធា បំណែងចែកព័រស្យុង បំណែងចែកអ៊ីពែកហ្សែន
- បំណែងចែកធម្មតា
- ការប្រើប្រាស់បំណែងចែកទាំងនោះក្នុងបញ្ហាជំនួញ

4.1 បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរដាច់

នៅក្នុងមេរៀនមុនយើងបានដឹងហើយថា អថេរជាលេខ (numerical variable) ត្រូវបានបែងចែកជាពីរគឺអថេរលេខគត់ ឬដាច់ (discrete numerical variable) និងអថេរលេខបន្ត ឬមានក្បៀស (continuous numerical variable) ។ អថេរលេខបន្ត បានមកពីការវាស់ ឧទាហរណ៍ កំពស់ ចំងាយ ទម្ងន់ជាដើម។ ដោយឡែក អថេរលេខគត់ ឬដាច់ បានមកពីការរាប់ ឧទាហរណ៍ ចំនួនកូន ចំនួនបន្ទប់ ចំនួនផ្ទៃដូង។ ល។ ឥឡូវនេះយើងសិក្សាអំពី បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរដាច់ (probability distribution for a discrete random variable) វាគឺជា បំណែងចែកជាលេខដែលមានជំរើសតែមួយគត់ (numerical mutually exclusive) នៃលទ្ធផលទាំងអស់ដែលកើតមាន។


តារាង 4.1 ប្រេកង់នៃចរន្តអគ្គិសនីដាច់ក្នុងមួយខែ

ចំនួនដងដែលចរន្តអគ្គិសនីដាច់/មួយខែ	ករណីដែលដាច់	ប្រូបាប៊ីលីតេ
1	50	0.50
2	25	0.25
3	15	0.15
4	10	0.10
សរុប	100	1.00

ឧទាហរណ៍ 4.1 អ្នកសិក្សាម្នាក់ធ្វើការកត់ត្រានូវការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ តារាង 4.1 បង្ហាញអំពីប្រេកង់ដែលបានកត់ត្រាប្រចាំខែនៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុង 100 ខែ ឬករណី ចុងក្រោយ។

ជួរឈរទី 1 ក្នុងតារាង 4.1 បានបង្ហាញចំនួនដងដែលអគ្គិសនីបានដាច់ចរន្តក្នុងខែនីមួយៗ។ មួយខែដាច់ចរន្តអគ្គិសនី 1 ដង មាន 50 ករណី ឬ 50% (50/100) មួយខែដាច់ចរន្តអគ្គិសនី 2 ដង មាន 25 ករណី ឬ

25%(25/100) មួយខែដាច់ចរន្តអគ្គិសនី 3ដង មាន15ករណីឬ15%(15/100) មួយខែដាច់ចរន្តអគ្គិសនី 4 ដង មាន10ករណី ឬ10% (10/100)។ បំណែងប្រូបាប៊ីលីតេទាំងនេះមានរាងដូច រូប 4.1។



រូប 4.1 បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងមួយខែ

4.1.1 តម្លៃរំពឹងទុកនៃបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេរបស់អថេរដាច់

តម្លៃមធ្យម (μ)នៃបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេរបស់អថេរដាច់ គឺជាតម្លៃរំពឹងទុកនៃអថេរចៃដន្យ។ ដើម្បីគណនាតម្លៃរំពឹងទុក ($E(X)$) អ្នកត្រូវគុណលទ្ធផល (X) ជាមួយនិងប្រូបាប៊ីលីតេដែលត្រូវគ្នា $P(X=x_i)$ រួចបូលផលគុណទាំងនោះចូលគ្នា ដូចរូបមន្តខាងក្រោម៖

តម្លៃមធ្យម (μ) នៃបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរដាច់

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^N x_i P(X = x_i) \quad (4.1)$$

ហើយ x_i = លទ្ធផលទី (i) នៃអថេរចៃដន្យដាច់ X

$P(X=x_i)$ =ប្រូបាប៊ីលីតេដែលកើតមានលទ្ធផល X

ឧទាហរណ៍ ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី (តារាង 4.1) តម្លៃរំពឹងទុក ឬចំនួនដងនៃការដាច់អគ្គិសនីគិតជាមធ្យមក្នុងមួយខែ៖

$$\mu = E(X) = (1) * (0.50) + (2) * (0.25) + (3 * 0.15) + (4) * (0.10) = 1.85$$

ដូច្នេះចំនួនដងនៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីគិតជាមធ្យម ឬតម្លៃរំពឹងគឺ 1.85 ដងក្នុងមួយខែ។

4.1.2 វ៉ារីយ៉ង់និងគម្លាតស្តង់ដារនៃអថេរដាច់

អ្នកអាចគណនាវ៉ារីយ៉ង់នៃបំណែងចែកអថេរដាច់ ដោយគុណតម្លៃខុសគ្នាគិតជាការរំខានលទ្ធផលដែលអាចកើតមាននិងតម្លៃរំពឹងទុក ឬតម្លៃមធ្យម ជាមួយប្រូបាប៊ីលីតេដែលត្រូវគ្នា រួចបូកលទ្ធផលទាំងនោះបញ្ចូលគ្នា។

$$\sigma_i^2 = \sum_{i=1}^N p_i [x_i - E(X)]^2 \quad (4.2)$$

ហើយ x_i = គឺជាលទ្ធផលនៃអថេរដាច់ចៃដន្យ X

$p_i = P(X=x_i)$ =ប្រូបាប៊ីលីតេដែលកើតមានលទ្ធផល X

ក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើង វ៉ារីយ៉ង់នៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី៖

$$\sigma^2 = 0.50 * (1 - 1.85)^2 + 0.25 * (2 - 1.85)^2 + 0.15 * (3 - 1.85)^2 + 0.10 * (4 - 1.85)^2 =$$

1.0275

និងគម្លាតស្តង់ដារ $\sigma = \sqrt{1.02755} = 1.0136$

នេះមានន័យថា ចំនួនដងនៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីគិតជាមធ្យមគឺ 1.85 ដងក្នុងមួយខែ និងមានគម្លាតស្តង់ដារគឺ 1.0136 ដង។

តារាង 4.2 គណនារ៉ឺយ៉ង់និងគម្លាតស្តង់ដារនៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

Prob.(p_i)	x_i	$E(X)$	$[x_i - E(X)]^2$	$p_i[x_i - E(X)]^2$
0.50	1	1.85	$(1 - 1.85)^2$	$0.50 * (1 - 1.85)^2$
0.25	2	1.85	$(2 - 1.85)^2$	$0.25 * (2 - 1.85)^2$
0.15	3	1.85	$(3 - 1.85)^2$	$0.15 * (3 - 1.85)^2$
0.10	4	1.85	$(4 - 1.85)^2$	$0.10 * (4 - 1.85)^2$
				$\sigma^2 = 1.0275$

4.2 កូរ៉េលេស្យង់ និងការអនុវត្តក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

នៅផ្នែក 4.1 យើងបានសិក្សាអំពី រ៉េលេស្យង់ និងគម្លាតស្តង់ដារ ព្រមទាំងតម្លៃរំពឹងទុក។ ដោយឡែកនៅផ្នែកនេះ យើងនឹងសិក្សាអំពី កូរ៉េលេស្យង់របស់អថេរពីរ ដែលត្រូវបានអនុវត្តជាញឹកញាប់នៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុ។

4.2.1 កូរ៉េលេស្យង់

កូរ៉េលេស្យង់ σ_{XY} (covariance) គឺកំណត់ទំនាក់ទំនងនៃអថេរជាលេខចំនួនពីរ X និង Y ។ ជាទូទៅកូរ៉េលេស្យង់ពិបាកក្នុងការបកស្រាយណាស់ ដូច្នេះដើម្បីបកស្រាយ ភាគច្រើនគេបង្វែរទៅជាកូរ៉េលេស្យង់ (correlation = ρ_{XY}) វិញ។ កូរ៉េលេស្យង់ ត្រូវបានគណនាដោយ យកកូរ៉េលេស្យង់ចែកនឹងផលគុណគម្លាតស្តង់ដារ៖ $\rho_{XY} = \sigma_{XY} / (\sigma_X * \sigma_Y)$ ។ តម្លៃ កូរ៉េលេស្យង់ គឺនៅចន្លោះពី -1 ទៅ +1 ។ ពេលកូរ៉េលេស្យង់ វិជ្ជមាន មានន័យថាអថេរទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្របគ្នា ហើយបើអវិជ្ជមានវិញ មានន័យថាអថេរទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងប្រាស់ ហើយបើស្មើសូន្យ មានន័យថា អថេរទាំងពីរគឺមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា។ សមីការ (4.3) បានកំណត់កូរ៉េលេស្យង់នៃបំណែងប្រូបាប៊ីលីតេរបស់អថេរដាច់។

$$\sigma_{XY} = \sum_{i=1}^N p_{X_i Y_i} [x_i - E(X)] * [y_i - E(Y)] \quad (4.3)$$

ហើយ $X =$ អថេរចែងជូនដាច់ X

$x_i =$ លទ្ធផលទី (i) នៃអថេរចែងជូនដាច់ X

$Y =$ អថេរចែងជូនដាច់ Y

$y_i =$ លទ្ធផលទី (i) នៃអថេរចែងជូនដាច់ Y

$p_{X_i Y_i} =$ ប្រូបាប៊ីលីតេទី(i)ដែលកើតមានលទ្ធផល X និងទី(i)ដែលកើតមានលទ្ធផល Y

ឧទាហរណ៍ 4.2 ដូចបានដឹងមកហើយ សេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នគឺអាស្រ័យទៅនឹងស្ថានភាព COVID-19 បើស្ថានភាព COVID-19 នៅតែរាលដាលខ្លាំង សេដ្ឋកិច្ចរំពឹងថានឹងធ្លាក់ខ្លាំងដែរ បើការរាលដាលតិច សេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់តិចដែរ ហើយបើស្ថានភាព COVID-19 ឈប់រាលដាល សេដ្ឋកិច្ចក៏រំពឹងប្រសើរឡើងវិញដែរ។ ឥឡូវ

នេះយើងសន្មតថា តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋករ (PPWSA) និង អេស៊ីលីដា (ACLEDA) មានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថានភាព COVID-19 នៅឆ្នាំក្រោយ ហើយយើងសន្មតបន្តទៀតថា ប្រូបាប៊ីលីតេនៃ COVID-19ឆ្នាំក្រោយ មានបីសណ្ឋាន ដូចក្នុងតារាង 4.3 ខាងក្រោម។

តារាង 4.3 អាត្រាប្រាក់ចំណេញនៃភាគហ៊ុន ACLEDA និង PPWSA ក្នុងស្ថានភាព COVID-19

$p_{X Y}$	ស្ថានភាព COVID-19	អាត្រាចំណេញរបស់ ACLEDA	អាត្រាចំណេញរបស់ PPWSA
0.5	ប្រសើរ	0.12	0.10
0.3	មានស្ថេរភាព	0.06	0.06
0.2	ធ្ងន់ធ្ងរ	-0.04	-0.03

❖ អនុវត្តរូបមន្ត (4.1) តម្លៃរំពឹងទុកនិងគម្លាតស្តង់ដាររបស់ភាគហ៊ុននីមួយៗដូចខាងក្រោម៖

តាង X =អាត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់ ACLEDA និង Y = អាត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់ PPWSA

❖ អនុវត្តរូបមន្ត (4.1) តម្លៃរំពឹងទុករបស់ភាគហ៊ុនទាំងពីរ៖

- $E(X) = 0.5 (0.12) + 0.3(0.06) + 0.2(-0.04) = 0.07$
- $E(Y) = 0.5 (0.08) + 0.3(0.06) + 0.2(-0.03) = 0.062$

❖ អនុវត្តរូបមន្ត (4.2) វ៉ារីយ៉ង់របស់ភាគហ៊ុនទាំងពីរគឺ៖

- $VAR(X)=\sigma_X^2=0.5(0.12 - 0.07)^2+0.3(0.08 - 0.07)^2 + 0.2(-0.04 - 0.07)^2=0.0037$
- គម្លាតស្តង់ដារ: $SD(X)=\sigma_X=\sqrt{0.0037} = 0.06082$
- វ៉ារីយ៉ង់: $VAR(Y)=\sigma_Y^2=0.5(0.08 - 0.062)^2+0.3(0.05 - 0.062)^2 + 0.2(-0.01 - 0.062)^2=0.002416$
- គម្លាតស្តង់ដារ: $SD(Y)=\sigma_Y=\sqrt{0.002416} = 0.04915$

❖ អនុវត្តរូបមន្ត (4.3) កូរ៉េលេស្យុងរបស់ភាគហ៊ុនទាំងពីរ៖

- $\sigma_{XY} = 0.5(0.12 - 0.07) * (0.10 - 0.062) + 0.3(0.06 - 0.07) * (0.06 - 0.062) + 0.2(-0.04 - 0.07) * (-0.03 - 0.062) = 0.00298$

- គណនាកូរ៉េលេស្យុង

$$\rho_{XY} = \sigma_{XY}/(\sigma_X * \sigma_Y) = 0.00298/(0.06082 * 0.04915) = 0.996$$

បំណកស្រាយ៖ ភាគហ៊ុន ACLEDA រំពឹងថាឆ្នាំក្រោយនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាមធ្យម 7% និងគម្លាតស្តង់ដារ 0.06082 ហើយ PPWSA រំពឹងថាឆ្នាំក្រោយនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាមធ្យម 6.2% និងគម្លាតស្តង់ដារ 0.04915។ ភាគហ៊ុន ACLEDA គឺមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងភាគហ៊ុន PPWSA ពីព្រោះថា ភាគហ៊ុន ACLEDA មានគម្លាតស្តង់ដារធំជាងភាគហ៊ុន PPWSA។ លើសពីនេះទៅទៀតភាគហ៊ុន ACLEDA អស់ជាភាគហ៊ុន PPWSA ពីព្រោះក្នុងមួយឯកតានៃហានិភ័យ ភាគហ៊ុន ACLEDA ទទួលបានប្រាក់ចំណេញតែ 1.15%តែប៉ុណ្ណោះ($0.07/0.06082$) រីឯភាគហ៊ុន PPWSA ចំណេញដល់ 1.26%ឯណោះ ($0.062/0.04915$)។ ភាគហ៊ុនទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាន 99.6% ប្រហាក់ប្រហែល 1 មានន័យថា បើ

ចំណេញគឺចំណេញទាំងពីរ បើខាត គឺខាតទាំងពីរ។ តាមទ្រឹស្តីហិរញ្ញវត្ថុ បើសិនជាកូរ៉េវីយ៉ង់នៃអាត្រាប្រាក់ ចំណេញរបស់ភាគហ៊ុនទាំងពីរស្មើ +1 ការទិញភាគហ៊ុនទាំងពីរបញ្ចូលគ្នា មិនជួយឲ្យកាត់បន្ថយហានិភ័យអ្វី ទាំងអស់ បើកូរ៉េវីយ៉ង់រំកិលទៅ -1 ការទិញភាគហ៊ុនទាំងពីរបញ្ចូលគ្នា អាចជួយឲ្យកាត់បន្ថយហានិភ័យរហូត ដល់សូន្យ។ បើកូរ៉េវីយ៉ង់កាន់តែតូចគឺកាន់តែប្រសើរ។

4.2.2 អាត្រាវិញ្ញាបនបត្រនិងហានិភ័យនៃសំបៀតវិនិយោគ

យើងបានសិក្សាអំពី កូរ៉េវីយ៉ង់របស់អថេរពីរ គម្លាតស្តង់ដារ និងតម្លៃរំពឹងរបស់អថេរពីរ ។

ឥឡូវនេះយើងសិក្សាតម្លៃរំពឹងនៃសំបៀតវិនិយោគវិញ្ញាបនបត្រ (portfolio)។ តម្លៃរំពឹងនៃសំបៀតត ចំណេះការវិនិយោគទៅលើទ្រព្យសកម្មពីរ គឺស្មើនឹងសមាមាត្រដែលបានកំណត់ទៅលើ X គុណនឹងតម្លៃរំពឹង នៃទ្រព្យសកម្ម X បូកជាមួយ សមាមាត្រដែលបានកំណត់ទៅលើ Y គុណនឹងតម្លៃរំពឹងនៃទ្រព្យសកម្ម Y។

$$E(P) = wE(X) + (1-w)E(Y) \quad (4.4)$$

ហើយ $E(P)$ = តម្លៃរំពឹងនៃសំបៀតវិនិយោគ P

w = សមាមាត្រវិនិយោគលើ X

(1-w) = សមាមាត្រវិនិយោគលើ Y

$E(X)$ = តម្លៃរំពឹងនៃទ្រព្យសកម្ម X

$E(Y)$ = តម្លៃរំពឹងនៃទ្រព្យសកម្ម Y

- កូរ៉េវីយ៉ង់នៃសំបៀតវិនិយោគ

$$\sigma_p^2 = w^2\sigma_X^2 + (1-w)^2\sigma_Y^2 + 2w(1-w)\sigma_{XY} \quad (4.5)$$

- គម្លាតស្តង់ដារនៃសំបៀតវិនិយោគ $\sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2}$

ឧបមាថា អ្នកមានប្រាក់ 1000 ដុល្លា ហើយអ្នកបានសំរេចចិត្តវិនិយោគលើភាគហ៊ុន ACLEDA ចំនួន 600 ដុល្លា ឬ 0.60 និង សល់ប៉ុន្មានវិនិយោគលើភាគហ៊ុន PPWSA។ ចូលគណនា តម្លៃរំពឹង និង គម្លាតស្តង់ ដារនៃសំបៀតវិនិយោគ។

សម្មតិកម្ម: $W=600/1000=0.60$, $E(ACLEDA)=0.07$, និង $E(PPWSA)=0.062$

- $E(P) = 0.60(0.07) + (1-0.60)(0.062) = 0.0668$

គណនាកូរ៉េវីយ៉ង់និងគម្លាតស្តង់ដារ របស់សំបៀតវិនិយោគ

សម្មតិកម្ម: $W=0.60$, $SD(ACLEDA)=0.06082$, $SD(PPWSA)=0.04915$ និង $\sigma_{XY} = 0.00298$

ជំនួសទិន្នន័យទាំងនេះចូលក្នុងរូបមន្ត (4.5)

- $\sigma_p^2 = 0.60^2(0.06082)^2 + (1-0.60)^2(0.04915)^2 + 2(0.60)(1-0.60)(0.00298)$
 $=0.003148$

- គម្លាតស្តង់ $\sigma_p = \sqrt{0.003148}=0.05611$

ដូច្នេះការសំរេចចិត្តវិនិយោគ 60% ទៅលើភាគហ៊ុន ACLEDA និង 40% ទៅលើភាគហ៊ុន PPWSA និងទទួលបានអាត្រាវិនិយោគទុកស្មើនឹង 6.68% ឬ 66.8 ដុល្លា និងមានគម្លាតស្តង់ដារ 5.611% ឬ 56.11ដុល្លា។

សូមបញ្ជាក់ថា សមីការ (4.5) គឺសម្រាប់វាស់វែងហានិភ័យ បើក្នុងរយៈពេលរបស់ភាគហ៊ុនទាំងពីរ កាន់តែតូច σ_{XY} ឬអវិជ្ជមាន តម្លៃនៃសមីការ (4.5)កាន់តែតូចដែរ មានន័យថាការវិនិយោគទៅលើទ្រព្យ សកម្មភាពដែលមានក្នុងរយៈពេលអវិជ្ជជួយអោយយើងកាត់បន្ថយហានិភ័យកាន់តែតិច។

4.3 បំណែងចែកទ្វេធា

បំណែងចែកទ្វេធា (binomial distribution) គឺជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃភាពជោគជ័យ ឬបរាជ័យ របស់លទ្ធផលនៃការធ្វើពិសោធន៍ ឬការស្ទង់មតិ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាច្រើនលើក។ ទ្វេធា គឺជា បំណែងដែលមានលទ្ធផលពីរ⁷ ឧទាហរណ៍ ប្រលងជាប់ ឬធ្លាក់ អតិថេជនទិញ ឬមិនទិញ ជួលឬមិនជួល ឥណទានត្រូវបានអនុម័ត ឬ មិនអនុម័ត។ ល។

4.3.1 ប្រូបាប៊ីលីតេនៃបំណែងចែកទ្វេធានិងវិបាក

បំណែងចែកទ្វេធាមានវិបាកបួន៖

1. ចំនួនប៉ាន់គំរូគឺមានចំនួនថេរ (n)
2. ចំនួនប៉ាន់គំរូនីមួយៗមានលទ្ធផលពីរ តែជ្រើសរើសបានតែមួយគត់
3. ប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់អារម្មណ៍ (π) គឺមានលក្ខណៈថេរពីការអង្កេតមួយទៅការអង្កេតមួយទៀត។ ដូច្នេះប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនចាប់អារម្មណ៍គឺ $(1-\pi)$ ក៏ថេរដែរ
4. លទ្ធផលនៃការអង្កេតគឺឯករាជ្យពីមួយទៅមួយ

រូបមន្តបំណែងចែកទ្វេធាដែលទាក់ទងប្រូបាប៊ីលីតេជោគជ័យ X ដែលធ្វើពិសោធន៍ n ដង៖

$$P(X) = \frac{n!}{(n-X)!X!} * p^X * q^{n-X} \quad (4.6)$$

ហើយ $P(X)$ =ប្រូបាប៊ីលីតេជោគជ័យ

p = គួរលេខនៃប្រូបាប៊ីលីតេជោគជ័យ

q = គួរលេខនៃប្រូបាប៊ីលីតេបរាជ័យ

X =ចំនួនជោគជ័យក្នុងចំណោមពិសោធន៍ n ដង

n = ចំនួនដងនៃការធ្វើពិសោធន៍

ឧទាហរណ៍4.3 អ្នកបោះកាក់បីក្នុងពេលតែមួយ (n=3) ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែល បានរូបពីរដង (X=2)។

⁷ ទាញយកនៅថ្ងៃទី 10/5/2021 ចេញពី <https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/binomial-theorem/binomial-distribution-formula/>

តារាង H= មានរូប និង T=គ្មានរូប ហើយលទ្ធផលជា

តារាង 4.3 លទ្ធផលនៃប្រៀបប្រដាប់លើការបោះកាក់៣ក្នុងពេលតែមួយ

	លទ្ធផល		ប្រូបាប៊ីលីតេ
1	មានរូបទាំង៣	HHH	1/8
2	កាក់ទី១និងទី២មានរូប ប៉ុន្តែទី៣គ្មានរូប	HHT	1/8
3	កាក់ទី១មានរូប ទី២គ្មានរូប និងទី៣មានរូប	HTH	1/8
4	កាក់ទី១គ្មានរូប និងទី២និងទី៣មានរូប	THH	1/8
5	កាក់ទី១គ្មានរូប ទី២និងទី៣មានរូប	TTH	1/8
6	កាក់ទី១គ្មានរូប ទី២និងទី៣ មានរូប	THT	1/8
7	កាក់ទី១មានរូប ទី២និងទី៣គ្មានរូប	HTT	1/8
8	គ្មានរូបទាំងបី	TTT	1/8
		ផលបូក	1.00

តាមលទ្ធផលក្នុងតារាង 4.4បង្ហាញថា លទ្ធផលដែលបោះកាក់៣ក្នុងពេលតែមួយដែលផ្តល់ចំលើយមានរូប២គឺមានចំនួន៣លើក៖ HHT, HTH និង THH

ដូច្នេះប្រូបាប៊ីលីតេនៃលទ្ធផលនេះគឺ $= \frac{3}{8} = 0.375$

ឥឡូវយើងចង់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនេះ ដោយជំនួសធាតុចូលទាំងអស់ចូលក្នុងរូបមន្ត (4.6) យើងនឹងទទួលបានចំលើយដូចមុន។

$n = 3$, $X = 2$ (ចំនួនរូប), $p = 0.5$ (ប្រូបាប៊ីលីតេ), $q = 0.5$ (ប្រូបាប៊ីលីតេគ្មានរូប)

$$P(2 \text{ heads}) = \frac{n!}{(n-X)!X!} * p^X * q^{n-X} = \frac{3!}{(3-2)!2!} * 0.5^2 * 0.5^{(3-2)} = 0.375$$

ឧទាហរណ៍ 4.4 ការធ្វើជំរឿនមួយបង្ហាញថា មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម 5នាក់បានខ្ចីលុយធនាគារ។ បើសិនជាមនុស្ស10នាក់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេរបស់មនុស្ស 3នាក់ដែលប្រាកដជាខ្ចីលុយធនាគារ។

ចំលើយ:

$X=3$, $n=10$, $p = 1/5=0.20$, $q = (1-p) = (1-0.20) = 0.80$ យើងបាន៖

$$P(3) = \frac{10!}{(10-3)!3!} * 0.20^3 * 0.80^{10-3} = 0.201$$

ដូច្នេះ ប្រូបាប៊ីលីតេរបស់មនុស្ស 3នាក់ក្នុងចំណោម 10នាក់ដែលប្រាកដជាខ្ចីលុយធនាគារ គឺ 20.1%។

4.3.2 តម្លៃមធ្យម វ៉ារីយ៉ង់ និងគម្លាតស្តង់ដារនៃបំណែងចែកទ្វេធា

$$\text{តម្លៃមធ្យម} : \mu = n * p \quad (4.7)$$

$$\text{វ៉ារីយ៉ង់} : \sigma^2 = n * p * q \quad (4.8)$$

$$\text{គម្លាតស្តង់ដារ: } \sigma = \sqrt{n * p * q} \quad (4.9)$$

ឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលឧទាហរណ៍ 4.4 ឡើងវិញ

- អ្នកខ្ចីលុយធនាគារគិតជាមធ្យម: $\mu = 10 * 0.20 = 2$ នាក់
- Variance: $\sigma^2 = 10 * 0.20 * 0.80 = 1.6$ នាក់
- គម្លាតស្តង់ដារ $\sigma = \sqrt{1.6} = 1.26$ នាក់

4.4 បំណែងចែកព័រសុខ

បំណែងចែកព័រសុខ (the poisson distribution) គឺជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេដាច់ ហើយ n ធំនិង p តូច ហើយអថេររងកើតឡើងគ្រប់ពេល។ បំណែងចែកព័រសុខត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេលដែលដង់ស៊ីតេនៃវត្ថុត្រូវបានរាយការណ៍ទៅលើតំបន់មួយ ឬ មួយចំនួន ដូចជាចំនួនកូនឈើដែលបានដាំក្នុងមួយហិកតា ឬ ចំនួនផលិតផលដែលខូចក្នុងរយៈពេលមួយនៃការផលិត។

ប្រូបាប៊ីលីតេនៃ X ដែលកើតមាននៅចន្លោះពេលវេលាមួយ បរិមាណ ឬ ផ្ទៃក្រឡា ចំពោះអថេរមួយ ហើយ λ គឺជាចំនួនមធ្យមដែលកើតឡើងក្នុងមួយឯកតា វេលាមួយ បរិមាណ ឬ ផ្ទៃក្រឡា។

$$P(X; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^X}{X!} \quad (4.10)$$

ហើយ $X = 0, 1, 2, \dots$

e = ចំនួនថេរដែលមានតម្លៃប្រហែល 2.7183

ឧទាហរណ៍ 4.5 ការបោះពុម្ពសៀវភៅមួយមាន 500 ទំព័រ មានកំហុសចំនួន 200 កន្លែង ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេនៃទំព័រមួយដែលមាន កំហុសចំនួន 3 កន្លែង។

ចំលើយ៖

$$X = 3, \text{ កំហុសគិតជាមធ្យមក្នុងមួយទំព័រ } \lambda = \frac{200}{500} = 0.4$$

$$P(X; \lambda) = \frac{2.7183^{-0.4} 0.4^3}{3!} = 0.0072$$

ដូច្នេះ មួយទំព័រដែលមានកំហុសចំនួន 3 កន្លែង មានប្រូបាប៊ីលីតេស្មើនឹង 0.72%

ជំរើសមួយទៀតអ្នកអាចរកចំឡើយយោងលើតាមរយៈការមើលតារាងព័រសុខដូចមាននៅក្នុងរូប 4.1 ខាងក្រោម

រូប 4.1 ផ្នែកមួយនៃតារាងព័រសុខ

	λ										
X	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0											
1											
2											
3				0.0072							
4											
$\vdots$											

ប្រភព: Allan G. B (2009)

4.5 បំណែងចែកអ៊ីពែកហ្សែនមីទ្រីស

បំណែងចែកអ៊ីពែកហ្សែនមីទ្រីស (The Hypergeometric Distribution) គឺជាបំណែងចែកនៃអថេរមួយដែលមានលទ្ធផលពីរ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេលដែលការប្រមូលបានគំរូមិនបានជំនួសមកវិញ មានន័យថាការប្រមូលបានគំរូមិនឯករាជ្យ ឬចំនួនបានគំរូតូច។ ក្នុងករណីចំនួនបានគំរូតូច បំណែងចែកទ្វេធា ផ្តល់ប្រូបាប៊ីលីតេមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ ដូច្នេះគេអាចប្រើបំណែងចែកអ៊ីពែកហ្សែនមីទ្រីសមកជំនួសវិញ។

មានចំនួនសាកលមួយដែលមានតែវត្ថុពីរ ដូចជាប្រុសឬស្រី វត្ថុខូចឬប្រើបាន ជ័យជំនះ ឬបរាជ័យ។ ទាំងនេះហៅដូចជាមានវត្ថុ a និងវត្ថុមួយទៀត b ហើយ $a+b$ គឺស្មើចំនួនសរុបនៃចំនួនសាកល ។ $P(X)$ ប្រូបាប៊ីលីតេ នៃការជ្រើសរើសបានគំរូ n (ដោយមិនមានការជំនួសវិញ) ដែលមានចំនួនវត្ថុ X ជាប់សរុប ឬប្រភេទ a និង $n-X$ មានចំនួនវត្ថុ ជាប់សរុបប្រភេទ b ប្រូបាប៊ីលីតេនៃ X ៖

$$P(X) = \frac{{}_aC_X \cdot {}_bC_{n-X}}{{}_{a+b}C_n} \quad (4.11)$$

ហើយ

$${}_aC_X = \text{វិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសវត្ថុទី 1}$$

$${}_bC_{n-X} = \text{វិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសវត្ថុទី 2}$$

$${}_{a+b}C_n = \text{វិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសវត្ថុ } n \text{ ចេញពីចំនួនសាកល}$$

ឧទាហរណ៍ 4.6 មានមនុស្ស 10 នាក់ដាក់ពាក្យធ្វើការជាអ្នកទីផ្សារ។ ប្រាំនាក់មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យ ($a=5$) ហើយប្រាំនាក់ទៀតគឺគ្មាន ($b=5$)។ ប្រសិនបើ ការជ្រើសរើសបានគំរូបីនាក់ ($n=3$) ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែលទាំងបីនាក់ ($X=3$) មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យ?

ចំណើយ៖

$a = 5$ ប្រភេទមានសញ្ញាបត្រ ហើយត្រូវជ្រើសរើសយកបីនាក់ ($n=3$) ហើយបីនាក់មានសញ្ញាបត្រ ($X=3$)

$b = 5$ ប្រភេទមិនមានសញ្ញាបត្រ ហើយ $(n-X)=0$

$$a+b=10$$

សំគាល់៖ យើងមានរូបមន្តបន្សំ (combination) : ${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$

ជំនួសលេខទាំងនេះចូលក្នុងរូបមន្ត (4.11) : $P(X) = \frac{{}_aC_X \cdot {}_bC_{n-X}}{{}_{a+b}C_n}$

$$P(X) = \frac{{}_5C_3 \cdot {}_5C_{3-3}}{{}_{5+5}C_3}$$

$$= \frac{[(5!/(5-3)!3!)] \cdot (5!/(5-0)!0!)}{(10!/(10-3)!3!)}$$

$$= (10 \cdot 1) / 120$$

$$= 0.0833$$

ដូច្នេះប្រូបាប៊ីលីតេដែលទាំងបីនាក់មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យគឺ 8.33%

ឥឡូវសន្មតថា យើងចង់គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែលទាំងពីរនាក់ ($X=2$) មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យ?

$$P(X) = \frac{{}_5C_2 \cdot {}_5C_{3-2}}{{}_{5+5}C_3}$$

$$= 5! / (5-2)! 2! * (5! / (5-1)! 1!) / (10! / (10-3)! 3!) \\ = (10 * 5) / 120 \\ = 0.42$$


ដូច្នេះប្រូបាប៊ីលីតេដែលទាំងពីរនាក់មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យគឺ 42%

4.6 បំណែងធម្មតា


បំណែងធម្មតា (normal distribution) ជាទូទៅត្រូវបានគេស្គាល់ថា the Gaussian distribution (1777–1855) គឺជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេដែលមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី និងចំនួនប្រេកង់គឺស្ថិតនៅជុំវិញតម្លៃមធ្យម ហើយមានគំនូសតាងដូចរូបដង (a bell curve)។ បំណែងធម្មតាអាចមានតម្លៃមធ្យមច្រើន (អាចវិជ្ជមាន ឬវិជ្ជមាន) និងគម្លាតស្តង់ដារគឺវិជ្ជមានជានិច្ច។ ទម្រង់និងទីតាំងនៃខ្សែកោងរបស់បំណែងចែកធម្មតាគឺពឹងផ្អែកលើទៅនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រពីរគឺ៖ តម្លៃមធ្យម (mean) និងគម្លាតស្តង់ដារ (standard deviation) ហើយប៉ារ៉ាម៉ែត្រនីមួយៗមានបំណែងចែកធម្មតាផ្ទាល់ខ្លួន អាស្រ័យលើតម្លៃមធ្យម និងគម្លាតស្តង់ដារ។ រូប 4.2a បង្ហាញពីបំណែងចែកធម្មតាពីរដែលមានតម្លៃមធ្យមស្មើគ្នា ប៉ុន្តែគម្លាតស្តង់ដារខុសគ្នា។ រូប 4.2b បង្ហាញពីបំណែងចែកធម្មតាពីរដែលមានគម្លាតស្តង់ដារស្មើគ្នា ប៉ុន្តែតម្លៃមធ្យមខុសគ្នា។ រូប 4.2c បង្ហាញពីបំណែងចែកធម្មតាពីរដែលមានតម្លៃមធ្យមខុសគ្នា និងគម្លាតស្តង់ដារខុសគ្នា។

សូមរំលឹកថា អថេរដាច់ (discrete variable) មិនមានតម្លៃនៅចន្លោះរវាងអថេរពីរនោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់អថេរជាប់ (continuous variable) នៅចន្លោះអថេរនីមួយៗគឺមានតម្លៃ។


រូប 4.2 ទម្រង់ផ្សេងៗនៃបំណែងចែកធម្មតា



(a) Same means but different standard deviations



(b) Different means but same standard deviations



(c) Different means and different standard deviations

ប្រភព: Allan G. B (2009) ទំព័រ 303

សមីការបំណែងចែកធម្មតា (a normal distribution equation) គឺ៖

$$y = \frac{e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}}{\sigma\sqrt{2\pi}} \quad (4.12)$$

ហើយ

$e \approx 2.718$ ($\approx$ តម្លៃមធ្យម៖ *mean*)

$\pi = 3.14$

μ = តម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសកល

σ = គម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកល


សមីការនេះមើលទៅស្មុគស្មាញណាស់ ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តន៍ យើងអាចប្រើតារាង normal ជំនួសសមីការនេះ។

ជាទូទៅក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង កម្រមានអថេរដែលមានបំណែងចែកដូចបំណែងចែកធម្មតាណាស់។ បំណែងចែកធម្មតាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្តីតែប៉ុណ្ណោះ តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ មានអថេរជាច្រើនមានបំណែងចែកខុសពីធម្មតាតិចទូចតែប៉ុណ្ណោះ។

សេក្តីសង្ខេបអំពីវិបាកនៃទ្រឹស្តីបំណែងចែកធម្មតា

1. បំណែងចែកធម្មតាមានរាងដូចជួង (រូប4.3)
2. តម្លៃមធ្យម ម៉ូដ និងមេដ្យានគឺស្មើគ្នា ស្ថិតនៅចំណុចកណ្តាលនៃរូប
3. បំណែងចែកធម្មតាមានម៉ូដតែមួយ
4. រូបមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីត្រង់តម្លៃមធ្យម សងខាងនៃតម្លៃមធ្យមគឺស្មើគ្នា
5. ខ្សែកោងគឺមានលក្ខណៈជាប់គ្នា មិនដាច់ពីគ្នា ឬមិនមានប្រហោង
6. ខ្សែកោងគឺមិនដែលប៉ះគ្នាជាមួយអ័ក្ស X ឡើយ
7. ផ្ទៃនៃខ្សែកោងតំណាងឲ្យប្រូបាប៊ីលីតេ គឺស្មើ1 ឬ100%
8. ផ្ទៃដែលជាផ្នែកនៃខ្សែកោងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់1ស្តង់ដារនៃតម្លៃមធ្យមគឺប្រហែល 68% 2ស្តង់ដារគឺប្រហែល 95% និង 3 ស្តង់ដារគឺប្រហែល 99.7% (មើលរូប 4.3)

រូប 4.3 ផ្ទៃនៅក្នុងបំណែងចែកធម្មតា



ប្រភព៖ Allan G. B (2009) ទំព័រ 304

4.6.1 បំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ

ដូចរៀបរាប់ខាងដើមមកហើយ បំណែងចែកធម្មតាមានតម្លៃមធ្យមផ្ទាល់ខ្លួន (ច្រើន) ហើយគម្លាតស្តង់ដារក៏មានច្រើន ហើយទីតាំងនិងទម្រង់មានការប្រែប្រួល មានសភាពស្មុគស្មាញ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ អ្នកស្ថិតិបានបង្កើតបំណែងចែកសាមញ្ញមួយដើម្បីប្រើប្រាស់ ដែលគេស្គាល់ថា បំណែងចែកធម្មតាដែលមានស្តង់ដារ (the Standard Normal Distribution) ។ បំណែងចែកធម្មតាដែលមានស្តង់ដារ ត្រូវបានគេឲ្យនិយមន័យថា៖ គឺជាបំណែងចែកដែលមានតម្លៃមធ្យមស្មើ 0 និងគម្លាតស្តង់ដារស្មើ 1 ។

រូប 4.4 បង្ហាញអំពី បំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ។ ផ្ទៃដែលស្ថិតខាងលើនិងខាងក្រោមតម្លៃមធ្យម គឺផ្ទៃ 0.3413 ឬ 34.13% ។

រូបមន្តបំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ (the standard normal distribution equation)

$$y = \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \quad (4.13)$$

សូមបញ្ជាក់ថា គ្រប់អថេរដែលមានបំណែងចែកធម្មតា អាចបង្វែរទៅជាបំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ ដោយប្រើរូបមន្តពិន្ទុស្តង់ដារ (standard score) ។

$$z = \frac{X_i - \mu}{\sigma} \quad (4.14)$$

តម្លៃ z គឺជាចំនួនស្តង់ដារដែល X ណាមួយឃ្លាតចេញពីតម្លៃមធ្យម


X_i = តម្លៃវត្ថុ (i)

μ = តម្លៃមធ្យម

σ = គម្លាតស្តង់ដារ

តារាង E ឧបសម្ព័ន្ធ C (Appendix C) បានបង្ហាញអំពីផ្ទៃដែលស្ថិតនៅក្រោមបំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ ចំពោះតម្លៃ z ចាប់ពី -3.49 ដល់ 3.49 ។

រូប 4.4 បំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ



ប្រភព៖ Allan G. B (2009) ទំព័រ 304


ឧទាហរណ៍ 4.7 ប្រសិនបើ X មានបំណែងចែកធម្មតា ហើយមានតម្លៃមធ្យម $\mu=100$ ដុល្លា និងគម្លាតស្តង់ដារ $\sigma=50$ ដុល្លា។ ចូលគណនាតម្លៃ z ដែលមាន $X=200$ ដុល្លា ?

អនុវត្តរូបមន្ត (4.14)

$$z = \frac{X_i - \mu}{\sigma} = \frac{200 - 100}{50} = 2.0$$

មានន័យថា $X = 200$ ដុល្លា គឺស្មើនឹង 2 ស្តង់ដារ (2 ដងនៃ 50 ដុល្លា) នៅពីលើតម្លៃមធ្យម 100 ដុល្លា (រូប 4.5)។

រូប 4.5 បំណែងចែកធម្មតា $\mu=100$ ដុល្លា $\sigma=50$ ដុល្លានិង $X=200$ ដុល្លា




ប្រភព:ការបង្ហាញរបស់អ្នកនិពន្ធ

4.6.2 គណនាប្រូបាប៊ីលីតេនៃបំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ

បន្ទាប់ពីគណនាតម្លៃ z បានហើយ យើងអាចគណនាប្រូបាប៊ីលីតេ ដែលជាផ្ទៃនៃខ្សែកោង។ ផ្ទៃនេះចែកចេញជា 3 តំបន់ 1) ផ្ទៃនៅខាងឆ្វេងនៃ z , 2) ផ្ទៃនៅខាងស្តាំនៃ z , និង 3) ផ្ទៃនៅចន្លោះនៃ z

1. ផ្ទៃនៅខាងឆ្វេងនៃ z

រូប 4.6 $\mu=\$100$ ដុល្លា $\sigma=\$50$ ដុល្លា ហើយ $p(X < \$200)$




Z	0.00	0.01	0.02.....0.09
0.00			
0.01			
0.02			
.....			
2.00	0.9772		
.....			

ប្រភព:ការបង្ហាញរបស់អ្នកនិពន្ធ

តារាង E ឧបសម្ព័ន្ធ C កំណត់អំពីផ្ទៃនៃបំណែងចែកធម្មតានៅខាងឆ្វេងនៃ $z = 2.00$ យើងនឹងបានផ្ទៃរបស់ z គឺ 0.9772 ឬ 97.72% ដូចគំនូសតាងខាងលើ។ នេះមានន័យថា $\mu=100$ ដុល្លា $\sigma=50$ ដុល្លា ប្រូបាប៊ីលីតេដែល X តូចជាង 200ដុល្លា ($p(X < \$200)$) គឺស្មើនឹង 97.72% ។

2. ផ្ទៃនៅខាងស្តាំនៃ z

រូប 4.7 $\mu=\$100$ ដុល្លា $\sigma=\$50$ ដុល្លា ហើយ $p(X > \$200)$



ប្រភព:ការបង្ហាញរបស់អ្នកនិពន្ធ

ឧបមាថា យើងចង់ដឹងអំពីកន្ទុយខាងស្តាំវិញម្តង គឺប្រូបាប៊ីលីតេដែល X ធំជាង 200ដុល្លា ($p(X > 200ដុល្លា)$) គឺស្មើនឹង $1-0.9772$ ឬ ស្មើនឹង 0.0228 នេះមានន័យថា $\mu=100$ ដុល្លា $\sigma=50$ ដុល្លា ប្រូបាប៊ីលីតេដែល X ធំជាង 200ដុល្លា ($p(X > 200ដុល្លា)$) គឺស្មើនឹង 2.28%

3. ផ្ទៃ z នៅចន្លោះ:

ឧបមាថា $\mu=100$ ដុល្លា $\sigma=50$ ដុល្លា ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែល $P(\$31.5 < X < \$200)$

- ជំហានទី 1 គណនាតម្លៃ z ពេលដែល $X = \$31.5$

$$z = \frac{X_i - \mu}{\sigma} = \frac{31.5 - 100}{50} = -1.37$$


តាមតារាង E យើងបាន ប្រូបាប៊ីលីតេ $P(Z < -1.37)$ គឺស្មើនឹង 0.0853

- ជំហានទី 2 គណនាតម្លៃ z ពេលដែល $X = \$200$

តាមឧទាហរណ៍ខាងលើ យើងបានគណនាម្តងពេល $X = \$200$ យើងបាន $z=2.0$ ហើយ $P(Z < 2.0)$ គឺស្មើនឹង 0.9772 ។

ដើម្បីរកប្រូបាប៊ីលីតេ $P(\$31.5 < X < \$200)$ គឺស្មើផ្ទៃដែលតូចជា $\$200$ ដកនឹងផ្ទៃដែលតូចជា $\$31.5$ ឬ $P(-1.37 < Z < 2.00) = 0.9772 - 0.0853 = 0.8919$ ដូចរូប 4.8។ នេះមានន័យថាពេលដែល $\mu = \$100$ $\sigma = \$50$ ប្រូបាប៊ីលីតេ $P(\$31.5 < X < \$200)$ គឺស្មើនឹង 89.19% ។

រូប 4.8 $\mu=\$100$ ដុល្លា $\sigma=\$50$ ដុល្លា ហើយ $P(\$31.5 < X < \$200)$



ប្រភព:ការបង្ហាញរបស់អ្នកនិពន្ធ

4.6.3 ការវាយតម្លៃន័រម៉ាលីតេ

មានអថេរជាប់ជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម មានទម្រង់ដូចទៅនឹងបំណែងចែកធម្មតា។ ដើម្បីកំណត់ថា សំណុំទិន្នន័យមានទម្រង់ដូចទៅនឹងបំណែងចែកធម្មតាដែរឬយ៉ាងណា អ្នកអាចធ្វើការវាយតម្លៃន័រម៉ាលីតេ (normality) តាមរយៈការប្រៀបធៀបចរិតលក្ខណៈទិន្នន័យ ទៅនឹងវិបាកនៃបំណែងចែកធម្មតា។

1. វិបាកនៃបំណែងចែកធម្មតា៖

- ស្តីមេទ្រី គឺមានន័យថាតម្លៃមធ្យមនិងមេដ្យានស្មើគ្នា
- មានរាងដូចជួង
- ចន្លោះនៃចតុកាត ($Q_3 - Q_1$) គឺស្មើនឹង 1.33 ដងនៃគម្លាតស្តង់ដារ
- រង្វង់ (range) គឺប្រហែលនឹង 6 ដងនៃគម្លាតស្តង់ដារ

ក្រៅពីវិធីសាស្ត្រប្រៀបធៀបចរិតលក្ខណៈរបស់ទិន្នន័យទៅនឹងវិបាករបស់បំណែងចែកធម្មតា អ្នកអាចវាយតម្លៃ ន័រម៉ាលីតេ តាមវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតដូចជា៖

- សង់ឆាត (Charts) រួចធ្វើការអង្កេតទម្រង់របស់ឆាត ទាំងនោះ តួយ៉ាងដូចជាឆាតដើមនិងស្លឹក (stem-leave) គំនូសប្រអប់ (box-plot) ឬហ៊ីស្តូក្រាមឆាត (histogram) ជាដើម។
- ការគណនាស្ថិតិបែបបរិយាយ (descriptive statistics) រួចធ្វើការប្រៀបធៀបស្ថិតិទាំងនោះទៅនឹងវិបាកនៃបំណែងចែកធម្មតា។ ប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមនិងមេដ្យាន ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា ចន្លោះចតុកាត (interquartile range) គឺស្មើទៅនឹង 1.333 ដង នៃគម្លាតស្តង់ដារដែរឬអត់? ហើយរង្វង់ (range) ស្មើទៅនឹង 6 ដងគម្លាតស្តង់ដារដែរឬអត់?


ឧទាហរណ៍ 4.8 ឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលបំណែងចែកអាយុក្នុងជំពូក 2 ទិន្នន័យនៅក្នុង Table 2-3។

រូបភាព 4.9 គឺជាលទ្ធផលនៃស្ថិតិបែបបរិយាយដែលបានមកពីការប្រើ SPSS។

រូបភាព 4.9 ស្ថិតិបែបបរិយាយនៃបំណែងចែកអាយុអតិថិជន 20 នាក់

Statistics		
Age		
N	Valid	20
	Missing	0
Mean		32.75
Std. Error of Mean		2.817
Median		33.50
Std. Deviation		12.599
Skewness		.072
Std. Error of Skewness		.512
Kurtosis		-.487
Std. Error of Kurtosis		.992
Range		47
Percentiles	25	24.00
	50	33.50
	75	42.50

រូបភាព 4.10 គំនូសតាងអាយុអតិថិជន20នាក់



រូប 4.11 មែកនិងធាងនៃអាយុអតិថិជនទាំង20នាក់


Age

Age Stem-and-Leaf Plot

Frequency	Stem & Leaf
3.00	1 . 047
5.00	2 . 14467
6.00	3 . 134578
4.00	4 . 1346
2.00	5 . 37

Stem width: 10
Each leaf: 1 case(s)

រូប 4.12 គំនូស q-q នៃអាយុអតិថិជនទាំង20នាក់



តាមរយៈរូប 4.9 ដល់ 4.12 យើងអាចធ្វើការអះអាងដូចតទៅ៖

- តម្លៃមធ្យម 32.75 ខុសពីមេដ្យាន 33.50

- ចន្លោះនៃចតុកាគ ($Q_3 - Q_1$) = 50 គឺប្រហែល 50/12.6=3.97 (បំណែងចែកធម្មតាគឺតម្រូវឲ្យស្មើនឹង 1.33 ដងនៃគម្លាតស្តង់ដារ)
- គំនូសតាង Boxplot គឺមិនសូវធៀង (skewed =0.072) និងកីតូស៊ីសស្មើ -0.487 (បំណែងចែកធម្មតាគឺតម្រូវឲ្យ skewed =0, kurtosis =0)
- រង្វង់ (range) ស្មើនឹង 47 គឺស្មើនឹង 3.73 ដងនៃគម្លាតស្តង់ដារ (បំណែងចែកធម្មតាគឺតម្រូវឲ្យស្មើនឹង 6ដងនៃគម្លាតស្តង់ដារ)
- រូប 4.11 គឺជា ដើមនិងសន្លឹក បញ្ជាក់ថាចំនួនប្រៀបធៀបនៅកណ្តាលគឺមានចំនួនច្រើនជាងគេ ហើយវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាហាក់ដូចបំណែងចែកធម្មតា
- រូប 4.12 គំនូស q-q បញ្ជាក់ថា មេដ្យានហាក់ដូចស្ថិតនៅកណ្តាលនៃចតុកាគទី2និងទី3
ផ្អែកលើអំណះអំណាងទាំងអស់ខាងលើ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ទិន្នន័យអាយុអតិថិជនប្រហែលជាមានលក្ខណៈដូចបំណែងចែកធម្មតា។

2. តេស្តស្ថិតិ

ការប្រៀបធៀបស្ថិតិបរិយាយទៅនឹងវិធានរបស់បំណែងចែកធម្មតា ព្រមទាំងគំនូសតាងផ្សេងៗនៅមានលក្ខណៈស្រពិចស្រពិល មិនអាចធ្វើកំណត់បានថាតើទិន្នន័យនោះមានលក្ខណៈ នាំម៉ាល់លីតធីឬ យ៉ាងណា? ឥឡូវមានតែការប្រើតេស្តស្ថិតិមួយទេដែលអាចអារកាត់បញ្ហានេះ។ មានតេស្តស្ថិតិជាច្រើនដើម្បីតេស្ត នាំម៉ាល់លីតធី ក្នុងចំណោមតេស្តទាំងនោះ មានតេស្តមួយដែលគេនិយមជាងគេក្នុងពិភពអ្នកសេដ្ឋកិច្ច គឺ ចាកបេរ៉ាតេស្ត (Jarque-Bera, JB) ហើយវាមានរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

$$JB = \frac{n}{6} * (S^2 + \frac{(K-3)^2}{4}) \quad (4.15)$$

ហើយ

S=ភាពធៀង (skewness)


K =កីតូស៊ីស kurtosis

$$JB \sim \chi^2_2$$

JB មានបំណែងចែកដូចបំណែងចែកឆាយឈ្វែដែលមានដឺក្រីអ័រក្រីដឺមស្មើពីរ (degree of freedom, df=2)។ ពេលតម្លៃកីរ៉េលឈ្វែ (p-value) របស់ឆាយឈ្វែធំជាង5% ($p > 0.05$) យើងអាចមិនបដិសេធនូវសម្មាតិកម្មមោឃៈដែលថាអថេរនោះមានបំណែងចែកធម្មតា ផ្ទុយមកវិញ បើតម្លៃកីរ៉េលឈ្វែរបស់ឆាយឈ្វែតូចជាង5% ($p < 0.05$) គឺអថេរនោះមានបំណែងចែកមិនធម្មតា (not normal distribution)។

ឥឡូវយើងត្រឡប់មកឧទាហរណ៍អាយុអតិថិជនរបស់យើង។ យើងអាចគណនាតម្លៃ JB យើងត្រូវដឹងតម្លៃកីតូស៊ីស (kurtosis) តម្លៃធៀង (skewness), និងចំនួនប៉ាន់គំរូ n។ យើងអាចរកតម្លៃធាតុចូលទាំងនេះតាមរយៈស្ថិតិបែបបរិយាយ (descriptive statistics) រួចជំនួសចូលក្នុងរូបមន្ត 4.15 ឬគណនាតាម Eviews។ ខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផល JB តេស្តដែលបានមកពី Eviews

រូប 4.12 លទ្ធផល JB តេស្ត ដោយ Eviews 9



$$JB = \frac{20}{6} * (0.066^2 + \frac{(-2.34-3)^2}{4}) = 0.376 \quad (p=0.828 > 0.05)$$

លទ្ធផល JB តេស្តមានតម្លៃតាមល្បែងស្មើនឹង 0.376 ($p = 0.828 > 0.05$) ដូច្នេះ H_0 : អថេរអាយុរបស់អតិថិជន គឺមានបំណែងចែកធម្មតាគឺត្រូវបានខកខានមិនត្រូវបានបដិសេធទេ។

សំគាល់ តម្លៃ $S = 0.066$, និង $K = 2.34$ នៅក្នុងតារាង 4.12 គឺខុសពីលទ្ធផលរបស់ Excel ឬ SPSS នៅក្នុងតារាង 4.9 ទោះជាទិន្នន័យតែមួយក៏ដោយព្រោះរូបមន្តគណនា S និង K ខុសគ្នាទៅតាមកម្មវិធីនីមួយៗ។

4.7 បំណែងចែកឯកសណ្ឋាន

បំណែងចែកឯកសណ្ឋាន (uniform distribution) គឺមានតម្លៃនៃប្រូបាប៊ីលីតេដូចគ្នាដែលនៅចន្លោះតម្លៃតូចជាងគេ a និងធំជាងគេ b ឬហៅថាបំណែងចែកចតុកោណកែង (មើលរូប 4.13)។ សមីការ (4.16) កំណត់អំពីដង់ស៊ីតេនៃប្រូបាប៊ីលីតេឯកសណ្ឋាន។

$$f(X) = \frac{1}{b-a} \quad (4.16)$$

បើ $a \leq X \leq b$ ហើយ 0 មិនស្ថិតនៅចន្លោះនេះ

ហើយ

a = តម្លៃអប្បបរមា

b = តម្លៃអតិបរមា

- តម្លៃមធ្យមនៃបំណែងចែកឯកសណ្ឋាន

$$\mu = \frac{a+b}{2} \quad (4.17)$$


- វ៉ារីយ៉ង់និងគម្លាតស្តង់ដារនៃបំណែងចែកឯកសណ្ឋាន

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \quad (4.18)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}} \quad (4.19)$$

ឧទាហរណ៍ 4.8 ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេនៃការជ្រើសរើសអថេរមួយដែលនៅចន្លោះ\$1 និង \$3 ចំពោះបំណែងចែកឯកសណ្ឋានដែលមាន $a= \$0$ និង $b= \$10$

រូប 4.13 ប្រូបាប៊ីលីតេ $P(1 < X < 3)$ ចំពោះបំណែងចែកឯកសណ្ឋាន $a=0$ និង $b=10$



រូប 4.13មានបណ្តោយ=3-1=2 និងទទឹង=1 ដូច្នេះ $P(1 < X < 3)$ គឺស្មើនឹងផ្ទៃ ចន្លោះ1ទៅ 3 ចែកនឹងផ្ទៃសរុប៖

$$P(1 < X < 3) = (2 * 1) / (1 * 10) = 0.20 \text{ ឬ } 20\%$$

$$\text{តម្លៃមធ្យម: } \mu = \frac{0+10}{2} = 5$$


$$\text{វ៉ារីយ៉ង់: } \sigma^2 = \frac{(10-0)^2}{12} = 8.333$$

$$\text{គម្លាតស្តង់ដារ: } \sigma = \sqrt{8.333} = 2.88$$

4.8 បំណែងចែកអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

បំណែងចែកអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល(the exponential distribution) គឺជាបំណែងចែកជាប់ ដែលរៀងទៅខាងស្តាំចាប់ពី 0 រហូតដល់វិជ្ជមានមិនកំណត់ ដូចរូប4.14ខាងក្រោម។

រូប4.14 បំណែងចែកអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល



បំណែងចែកអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងទ្រឹស្តីរងចាំ គួរយ៉ាងដូចជា ការរងចាំនៅធនាគារ នៅមន្ទីរពេទ្យ ឬរងចាំសេវាផ្សេងៗ ជាដើម។

បំណែងចែកអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលត្រូវបានកំណត់ដោយប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយ λ ចំនួនអ្នកមកដល់ក្នុងរយៈពេលមួយ។ វាមានទំនាក់ទំនងចេញពីនីតិវិធីព័រស្យុង។ ប្រូបាប៊ីលីតេចំពោះថេរវេលាវាងការមកដល់ត្រូវបានកំណត់ដោយសមីការ (4.20)៖

$$f(X) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ for } X > 0 \quad (4.20)$$

ហើយ

$$e = 2.7181$$

λ = ចំនួនមធ្យមនៃការមកដល់ក្នុងមួយឯកតានៃថេរវេលា

X =អថេរជាប់ដែលមានតម្លៃ $0 < X < \infty$

ហើយចំនួនមធ្យមនិងគម្លាតស្តង់ដារនៃការមកដល់ចន្លោះនៃពេលវេលាមួយ៖

$$\mu = \sigma = \frac{1}{\lambda} \quad (4.21)$$

ពេល $\lambda = 1$ គេហៅថា បំណែងចែកអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលដែលមានស្តង់ដារ។

$1/\lambda$ =ចំនួនមធ្យមនៃចន្លោះពេលវេលាដែលមកដល់។

ឧបមាថា ចំនួនអ្នកមកដល់គិតជាមធ្យមក្នុងមួយនាទី $\lambda = 4$ ដូច្នេះរយៈពេលជាមធ្យមក្នុងចន្លោះនៃការមកដល់គឺ $1/4=0.25$ នាទីក្នុងមនុស្សម្នាក់។ សមីការ (4.22) កំណត់អំពីប្រូបាប៊ីលីតេត្រួតបន្តគ្នា (cumulative probability) នៃថេរវេលាមុននិងតិចជាងអ្នកបន្ទប់ X មកដល់៖

Cumulative Exponential Probability

$$P(\text{arrival time} \leq X) = 1 - e^{-\lambda x} \quad (4.22)$$

ឧទាហរណ៍ 4.9 អតិថិជនមកដល់ធនាគារ 20នាក់ក្នុងមួយម៉ោង បើសិនជាអតិថិជនមួយទើបមកដល់ គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែលអតិថិជនបន្ទប់នឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេល6នាទីទៀត?

6នាទី $X= 0.10$ ម៉ោង ហើយ $\lambda = 20$ (20 មកដល់ក្នុងមួយម៉ោង)

$$P(\text{arrival time} \leq X) = 1 - e^{-\lambda x} = 1 - 2.7182^{-20(0.10)} = 0.8647$$

ដូច្នេះប្រូបាប៊ីលីតេដែលអតិថិជនបន្ទប់នឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេល6នាទីទៀតគឺ 86.47%។

សេក្តីសង្ខេប

ជំពូកនេះអ្នកបានសិក្សាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេដាច់និងជាប់។ ប្រូបាប៊ីលីតេដាច់គឺជាបំណែងចែកនៃតម្លៃដែលអាចរាប់បាន មានចំនួនកំណត់និងមានតម្លៃវិជ្ជមាន។ រីឯបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេជាប់រួមមាន៖ បំណែងចែកប៊ីន៉ូមីល និងព័រស្យុង។ ក្នុងបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេដាច់ អ្នកបានសិក្សាតម្លៃរំពឹងទុក វ៉ារីយ៉ង់ និងគម្លាតស្តង់ដាររបស់វា។ ដោយឡែកចំពោះបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេជាប់វិញ អ្នកបានសិក្សាអំពី បំណែងចែកធម្មតា អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងបំណែងចែកឯកសណ្ឋាន។ ចំពោះបំណែងចែកធម្មតា អ្នកក៏បានសិក្សាផងដែរអំពីរបៀបវាយតម្លៃ ដូចជាការប្រើគំនូសដើមនិងសន្លឹកនិង JB តេស្តចែមទៀត។

សំណួរនិងលំហាត់

I. សំណួរ

1. តើតម្លៃរំពឹងទុកនៃបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេមានន័យដូចម្តេច?

2. អ្វីទៅដែលហៅថាបំណែងចែកទេធា ?
3. ពេលណាដែលត្រូវប្រើប្រាស់បំណែងចែក hypergeometric ?

II. លំហាត់

4. ឧបមាថា អ្នកយកលុយចំនួន 1000 ដុល្លារទៅធ្វើការវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនពីរ X និង Y ដែលស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេផ្សេងៗដូចតារាងខាងក្រោម៖

ប្រូបាប៊ីលីតេ	ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច	ប្រាក់ចំណេញ (%)	
		Stock X	Stock Y
0.15	ធ្លាក់	-100	50
0.25	ធម្មតា	0	100
0.45	លូតលាស់មធ្យម	80	-20
0.15	រីកចំរើនខ្លាំង	150	-100

5.

- a. ចូលគណនាអាត្រាប្រាក់ចំណេញដែលរំពឹងទុកទៅលើការវិនិយោគភាគហ៊ុន X និង Y
- b. គណនាគម្លាតស្តង់ដារនាំអាត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់ភាគហ៊ុន X និង Y
- c. គណនាកូរ៉េលីយ៉ង់អាត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់ភាគហ៊ុន X និង Y និងធ្វើការពន្យល់
- d. តើអ្នកនឹងវិនិយោគទៅលើភាគហ៊ុនមួយណា ? ចូលធ្វើការពន្យល់

5. បើ $n=5$ និង $\pi=0.40$ គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែល

- a. $X=4$
- b. $X \leq 3$
- c. $X < 2$
- d. $X > 1$

5. អាជ្ញាធរអាកាសចរណ៍មួយបានរាយការណ៍ថា អាត្រានៃការមកដល់ទាន់ពេលវេលា (on- time arrival rate) នៃការហោះហើរក្នុងស្រុកមួយគឺ 0.825។ ចូលប្រើបំណែងចែកទេធាដើម្បីគណនានូវប្រូបាប៊ីលីតេសម្រាប់ការមកដល់ 6 ជើងបន្ទាប់។

- a. មាន 4 ជើងទាន់ពេលវេលា ?
- b. ទាំង 6 ជើងទាន់ពេលវេលា ?
- c. យ៉ាងហោចណាស់មាន 4 ជើងទាន់ពេលវេលា ?
- d. ចូលគណនាចំនួនមកដល់ជាមធ្យម និងគម្លាតស្តង់ដារនៃការមកដល់ដែលទាន់ពេលវេលា។

6. R. H. Bruskin Associates Market Research បានរកឃើញថា 40% នៃពលរដ្ឋរបស់អាមេរិកមិនបានគិតថា ទាល់តែមានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យទើបធ្វើជំនួញបានជោគជ័យ។ ប្រសិនបើការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូមួយដោយចៃដន្យដែលមានចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិក 5 នាក់ ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេខាងក្រោម៖

- a. មាន 2 នាក់យល់ស្របតាមការរកឃើញនោះ

- b. យ៉ាងច្រើនបំផុត 3 នាក់នឹងយល់ព្រមតាមការឃើញនោះ
- c. យ៉ាងហោចបំផុត 2 នាក់នឹងយល់ព្រមតាមការឃើញនោះ
- d. តិចជាង 3 នាក់នឹងយល់ព្រមតាមការឃើញនោះ

ប្រភព: *American* by Daniel Evans Weiss.

ចំឡើយ $a=0.346$, $b= 0.913$, $c=0.663$, $d= 0.683$

7. សាវនករមួយរូបបានធ្វើការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូនៃប័ណ្ណបង់ពន្ធចំនួន 6 ដើម្បីធ្វើសាវនកម្ម។ ប្រើសិនជាមានប័ណ្ណបង់ពន្ធចំនួន 2 ឬច្រើន រកឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវ នោះប័ណ្ណទាំងអស់ 100 ដែលជាចំនួនសកលនិងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។ ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែលចំនួនសកលទាំងមូលនិងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ បើសិនជាចំនួនពិតប្រាកដដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងចំនួនសកលគឺ

- a. 25 ?
- b. 30 ?
- c. 5 ?
- d. 10 ?

8. អាត្រានៃការបោះបង់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យរបស់សិស្សអាមេរិក ប្រហែល 10.3% មុនបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិ។ ប្រសិនជាសិស្ស 10 នាក់ដើរចូលសាលាដោយចៃដន្យ ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេ៖

- a. ដែលមានសិស្សបោះបង់ការសិក្សាមិនលើសពីពីរនាក់
- b. យ៉ាងហោចណាស់មាន 6នាក់រៀនចប់
- c. សិស្សទាំង 10 រៀនចប់

ប្រភព: www.infoplease.com

ចំឡើយ:

- a. = 0.925
- b. = 0.998
- c. = 0.337

9. កាសិក្សាមួយទាក់ទងទៅនឹងចោរកម្មនៅតំបន់មួយចំនួនពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថា មានមួយករណីក្នុងចំណោមប្រជាជន 20,000 នាក់។ ប្រសិនជាទីក្រុងមួយមានប្រជាជន 80,000 នាក់ ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេដូចខាងក្រោម៖

- a. ចោរកម្ម 0
- b. ចោរកម្ម 1
- c. ចោរកម្ម 2
- d. ចោរកម្ម 3 ឬ ច្រើន

ប្រភព: Allan G. B (2009)

ចំឡើយ:

a. = 0.0183

b. = 0.0733

c. = 0.1465

d. = 0.7619

ប្រភព: Allan G. B (2009)

10. ការត្រួតពិនិត្យការបញ្ចេញផ្សែងពុលរបស់រថយន្ត។ ប្រសិនជា 3% នៃរថយន្តទាំងអស់មិនបានគោរពតាមស្តង់ដារបញ្ចេញផ្សែងពុល ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែលប៉ាន់តម្លៃរថយន្តចំនួន 90 ត្រូវបានជ្រើសរើស មានរថយន្ត 3គ្រឿងដែលមិនគោរពស្តង់ដារបញ្ចេញផ្សែងពុលដោយប្រើបំណែងចែក ព័រសុង។

ចម្លើយ:

0.2205

ប្រភព៖ Allan G. B (2009)


គោលបំណង

- ភាពខុសគ្នានៃវិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់ស្មាន
- ទ្រឹស្តីនៃប្រមូលប៉ាន់ស្មាន
- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេនៃប៉ាន់ស្មានសម្រាប់តម្លៃមធ្យមនិងសមាមាត្រ
- សារៈសំខាន់នៃទ្រឹស្តីចំណុចកណ្តាល

5.1 វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់ស្មាន

ជាទូទៅវិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់ស្មាន (sampling method) មានពីរបែប៖ តាមបែបប្រូបាប៊ីលីតេ (probability sampling) និងមិនមែនប្រូបាប៊ីលីតេ (non-probability sampling)⁸ មើលរូប 5.1។

រូប 5.1 វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់ស្មាន



ក្នុងវិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់ស្មានប្រូបាប៊ីលីតេ (probability sampling) គ្រប់វត្ថុឬបុគ្គលទាំងអស់ដែលជាសមាជិកនៃចំនួនសកល នឹងមានឱកាសស្មើគ្នាត្រូវបានធ្វើការជ្រើសរើស ហើយការជ្រើសរើសគឺផ្អែកលើលក្ខណៈចៃដន្យ (random selection)។ បើសិនជាអ្នកចង់បានលទ្ធផលដែលដំណាងឲ្យចំនួនសកលទាំងមូល។ វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់ស្មានប្រូបាប៊ីលីតេ គឺជាជំរើសដែលមានសុពលភាពជាងគេ⁹។ ដោយឡែកវិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់ស្មានមិនមែនប្រូបាប៊ីលីតេ គឺជាវិធីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវគិតថាងាយស្រួលក្នុងការ

⁸ Barenson et all (2012) Basic Business Statistics: Concepts and Applications. Twelfth Edition. Prentice Hall

⁹ សំរួលចេញពី៖ <https://www.scribbr.com/methodology/sampling>

ប្រមូល។ វិធីសាស្ត្រនេះចំណាយថវិការតិចក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ ប៉ុន្តែវាមានគុណវិបត្តិត្រង់ថា លទ្ធផលនៃការសិក្សាគឺមិនអាចធ្វើការអំណះអំណាងអំពីចំនួនសាកលបាន។

5.1.1 វិធីសាស្ត្រចៃដន្យ

នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រចៃដន្យ គ្រប់វត្ថុឬបុគ្គលដែលជាគោលដៅក្នុងការជ្រើសរើសគឺមានឱកាសស្មើគ្នា។ ក្នុងវិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូបែបនេះ អ្នកអាចធ្វើតាមការប្រមូលប៉ាន់គំរូដោយជំនួស (replacement) និងមិនជំនួស (without replacement) ក៏បាន ក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការតារាងចៃដន្យ (random table) (មើលឧបសម្ព័ន្ធ E) ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូ។

ឧទាហរណ៍ 5.1 ចំនួននិស្សិតជំនាន់ 26 សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដែលត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំ 2021 មានទាំងអស់ 3000 នាក់ ហើយថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យចង់ធ្វើការជ្រើសរើសនិស្សិតចំនួន 50 នាក់ជាតំណាងដើម្បីឡើងទទួលសញ្ញាបត្រ។ សន្មតថាសាកលវិទ្យាល័យសំរេចជ្រើសរើសដោយប្រើវិធីសាស្ត្រចៃដន្យ។

- **ជំហានទី១:** ត្រូវរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតទាំងអស់ក្នុងតារាងតែមួយដែលមានលេខរៀងពី 1 ដល់ 3000
- **ជំហានទី២:** រកតារាងចៃដន្យ (random table) ឧទាហរណ៍ តារាង 5.1 ខាងក្រោម

តារាង 5.1 ផ្នែកមួយនៃតារាងចៃដន្យ (portion of a random table)

39087	71938	40355	54324	08401	26299	49420	59208
55700	24586	93247	32596	11865	63397	44251	43189
14756	23997	78643	75912	83832	32768	18928	57070
32166	53251	70654	92827	63491	04233	33825	69662

- **ជំហានទី៣:** យើងចាប់ផ្តើមធ្វើការជ្រើសរើស ឧបមាថា យើងចាប់ផ្តើមពីជួរដេកទី២និងជួរឈរទី២ គឺត្រូវនឹងលេខ 24586។ ដោយសារតែយើងត្រូវការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូតែ 50 យើងប្រើតែពីរលេខតែប៉ុណ្ណោះ ឧបមាថាយើងយកពីរលេខខាងដើម (ពីរលេខខាងចុងក៏បាន) គឺលេខ 24 ដូច្នេះនិស្សិតដែលមានលេខរៀងទី២៤ គឺជាបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវឡើងទទួលសញ្ញាបត្រ។ អ្នកបន្ទាប់ (ពីឆ្វេងទៅស្តាំ) គឺលេខរៀងទី 93 ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺលេខរៀងទី៣២។ យើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសបែបនេះរហូតដល់បាននិស្សិតចំនួន 50 នាក់។

5.1.2 វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូជាប្រព័ន្ធ

វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូជាប្រព័ន្ធ (systematic sampling) ស្រដៀងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រចៃដន្យដែរ តែមានលក្ខណៈងាយជាងបន្តិច សមាជិកគ្រប់រូបរបស់ចំនួនសាកលត្រូវរៀបចំឲ្យមានលេខរៀងត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់មកគេនឹងធ្វើការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូតាមចន្លោះមួយយ៉ាងទៀងទាត់។ ឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅមើលឧទាហរណ៍ 5.1 ឡើងវិញ។ ដំបូងយើងកំណត់ចំនួននិស្សិតដែលត្រូវឡើងទទួលសញ្ញាបត្រគឺ $n=50$ ចេញពីចំនួនសកល $N=3000$ នាក់ ហើយយើងតាង k =ចន្លោះពីបុគ្គលឬវត្ថុមួយ ទៅបុគ្គលឬវត្ថុមួយទៀតដែលត្រូវជ្រើសរើស (k ជាចំនួនគត់)។ ដូច្នេះ $k = N/n = 3000/50 = 60$ ។ មានន័យថា ក្នុងបញ្ជីនិស្សិតដែលមានលេខ

រៀងពី 1 ដល់ 3000 គឺ 60 យកមួយ។ ឧបមាថា យើងធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកទីមួយចេញដំណើរពីអ្នកដែលមានលេខរៀងទី 10 អ្នកទី 2 ដែលត្រូវជ្រើសរើសគឺអ្នកមានលេខរៀងទី 70 រីឯអ្នកទី 3 គឺមានលេខរៀងទី 130 ធ្វើបែបនេះរហូតដល់បានប៉ាន់គំរូរហូតដល់គ្រប់ចំនួន 50 នាក់។ សូមបញ្ជាក់ថា ចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺការជ្រើសរើសអ្នកទី 1 តើត្រូវចាប់ផ្តើមពីលេខប៉ុន្មានទៅ? លេខនេះគឺត្រូវចាប់ផ្តើមដោយវិធីចៃដន្យ។

5.1.3 វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមកូតា

វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមកូតា (cluster or quota sampling) ទាក់ទងនឹងការបែងចែកចំនួនសកល (N) ទៅជាក្រុមតូចៗ។ ហើយក្រុមតូចៗទាំងនោះគួរតែមានចរិតលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឧទាហរណ៍ ភេទ ឆ្នាំសិក្សា ឬជំនាញ ជាដើម។ បន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូដោយចៃដន្យចេញពីក្រុមតូចៗទាំងនោះ រួចបូករួមបញ្ចូលគ្នាបានគ្រប់ចំនួនប៉ាន់គំរូដែលបានកំណត់។

ឧទាហរណ៍ 5.2 អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ចង់ធ្វើការសិក្សាអំពី គម្រោងអនាគតរបស់សិស្ស។ គាត់សំរេចចិត្តធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ដែលមានចំនួនសិស្សសរុប 10000 នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 ហើយចំនួននេះត្រូវបានបែងចែកជាបួនជំនាញ៖ គណនេយ្យមាន 5000 នាក់ ឬ 50% ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមាន 2000 នាក់ ឬ 20% សេដ្ឋកិច្ចមាន 1000 នាក់ ឬ 10% និងគ្រប់គ្រង 2000 នាក់ ឬ 20%។ ទិន្នន័យទាំងនេះបានបង្ហាញនៅក្នុង តារាង 5.2។

តារាង 5.2 លទ្ធផលនៃប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមកូតា

	ចំនួនសិស្ស	សមាមាត្រ	ប៉ាន់គំរូ
គណនេយ្យ	5,000	0.50	$500 \times 0.50 = 250$
ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ	2,000	0.20	$500 \times 0.20 = 100$
សេដ្ឋកិច្ច	1,000	0.10	$500 \times 0.10 = 50$
គ្រប់គ្រង	2,000	0.20	$500 \times 0.20 = 100$
សរុប	10,000		500

វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមកូតាគឺមានពីរជំហាន៖ ជំហានដំបូងគឺត្រូវកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូរបស់ជំនាញនីមួយៗសិន តាមរយៈការគណនាតម្លៃសមាមាត្រ ឧទាហរណ៍ ចំនួនប៉ាន់គំរូនិស្សិតគណនេយ្យគឺ $5000 \times 0.50 = 250$ នាក់ ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារគឺ $500 \times 0.20 = 100$ នាក់ (មើល column ចុងក្រោយ) ចំណែកចំនួនប៉ាន់គំរូជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងគឺត្រូវបានប្រើវិធីសាស្ត្រគណនាដូចគ្នា។ បន្ទាប់ពីបានកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូរួច អ្នកស្រាវជ្រាវអាចបន្តជំហានទីពីរ គឺត្រូវរៀបចំឈ្មោះសិស្សទាំង 10000 នាក់ក្នុងបញ្ជីមួយ ហើយធ្វើការជ្រើសរើសតាមវិធីសាស្ត្រចៃដន្យ ឲ្យបានគ្រប់ចំនួនកូតាដែលបានកំណត់ក្នុងជំហានទីមួយ។

5.1.4 វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមក្រុម

វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមក្រុម (cluster sampling) ជាវិធីសាស្ត្រប្រមូលតាមបែបប្រើប្រាស់ប៊ីលីតេ ដែលនៅក្នុងនោះអ្នកសិក្សាបានធ្វើការបែងចែកចំនួនសកលជាក្រុមតូចៗហៅថា cluster រួចធ្វើការជ្រើសរើសចំនួនប៉ាន់គំរូចេញពីក្រុមទាំងនោះ។ វិធីសាស្ត្រនេះច្រើនតែអនុវត្តទៅលើចំនួនសកលដែលមានបរិមាណច្រើន ហើយស្ថិតនៅលើភូមិសាស្ត្រធំទូលាយ ដូចជាខេត្ត ក្រុង/ស្រុក ដែនដីចែកចាយផលិតផល ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាដើម។ លើសពីនេះទៅទៀត វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមក្រុមគឺត្រូវការចំនួនប៉ាន់គំរូច្រើនហើយអាចអនុវត្តតែមួយឬច្រើនជំហាន។

ឧទាហរណ៍ 5.3 ការប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមក្រុមច្រើនជំហាន (multistage cluster sampling) ៖

ឧបមាថា អ្នកចង់សិក្សាអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញរបស់សិស្សថ្នាក់ទី12។

- ជំហានទី1 កំណត់ចំនួនសកល (define N population) ៖ ឧទាហរណ៍ សិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់មាន 150000នាក់នៅឆ្នាំសិក្សា 2020-2021
- ជំហានទី2៖ បែងចែកប៉ាន់គំរូទាំងអស់ទៅជាក្រុម (cluster) ៖ វិទ្យាល័យគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ សន្មត់ថាមាន 50 វិទ្យាល័យទូទាំង 25ខេត្តក្រុង
- ជំហានទី3៖ ធ្វើការជ្រើសរើសដោយប្រើវិធីចៃដន្យទៅលើវិទ្យាល័យទាំង 50 នោះ ឧបមាថា ចំនួនប៉ាន់គំរូដែលត្រូវការគឺ10 វិទ្យាល័យ
- ជំហានទី4៖ ធ្វើការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូ (និស្សិត) ចេញពីវិទ្យាល័យទាំង10 នោះ។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចប្រើវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសតាមកូតាបាន។ ឧទាហរណ៍ ចំនួនប៉ាន់គំរូសរុបដែលកំណត់គឺ 1000នាក់ (ចំនួនប៉ាន់គំរូសិស្ស)។ បន្ទាប់មកទៀត អ្នកត្រូវកំណត់កូតាចេញពីវិទ្យាល័យនីមួយៗ ឧទាហរណ៍ វិទ្យាល័យទី1 យកកូតាប៉ុន្មាន? វិទ្យាល័យទី2 យកកូតាប៉ុន្មាន? ដូចវិធីសាស្ត្រកូតាដែលនារៀបរាប់ខាងលើ
- ជំហានទី5៖ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមប្រើវិធីសាស្ត្រចៃដន្យដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសសិស្សចេញពីវិទ្យាល័យនីមួយៗ ឧបមាថា វិទ្យាល័យទី1 មានកូតាដែលត្រូវជ្រើសរើស100នាក់ ហើយវិទ្យាល័យនេះមានសិស្ស សរុប500នាក់ ដូច្នេះអ្នកត្រូវរៀបចំបញ្ជីសិស្សមួយដែលមានសិស្សទាំងអស់500នាក់ រួចជ្រើសរើសដោយចៃដន្យយកចំនួន100នាក់។ ចំណែកឯវិទ្យាល័យផ្សេងៗក៏ត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រដូចគ្នា រហូតដល់បានចំនួនប៉ាន់គំរូគ្រប់ចំនួន 1000 នាក់ ។

5.2 វិធីសាស្ត្រមិនមែនប្រើប្រាស់ប៊ីលីតេ

វិធីសាស្ត្រមិនមែនប្រើប្រាស់ប៊ីលីតេ (non-probability sampling) គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់មានលក្ខណៈចង្អៀត ឧទាហរណ៍ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬការធ្វើសារណារបស់និស្សិតជាដើម។ វិធីសាស្ត្រនេះមានពីរគឺ វិធីសាស្ត្រវិនិច្ឆ័យ និងវិធីងាយស្រួល។

5.2.1 វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមបែបវិនិច្ឆ័យ

វិធីសាស្ត្រប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមបែបវិនិច្ឆ័យ (judgement sampling) ឬហៅថា ឯកទេស (expert sampling) គឺវិធីសាស្ត្រមិនមែនប្រើប្រាស់ប៊ីលីតេ ដែលធ្វើឡើងផ្អែកលើមូលដ្ឋានចំណេះដឹងរបស់អ្នក

ស្រាវជ្រាវ ឬអ្នកឯកទេស។ ដោយសារតែការស្រាវជ្រាវនេះគាត់តែងឡើងដោយអ្នកឯកទេស លទ្ធផលដែលបានកមកគឺខុសតិចតួចបំផុត¹⁰។ ជាទូទៅការប្រមូលប៉ាន់គំរូបែបនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងករណីដែលចំនួនសកលមានកំណត់ គួយដូចជាអ្នកដឹកនាំ ឬនាយកប្រតិបត្តិដែលមានចំនួនតិច។

ឧទាហរណ៍ទី១អំពីចំនួនប៉ាន់គំរូ៖ នៅក្នុងតារាង 5.2បង្ហាញថាចំនួននិស្សិតសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវសាកសួរគឺ50នាក់ អ្នកសិក្សាយល់ឃើញថា ចំនួននេះហាក់ដូចជាតិចពេក ហើយចំនួននិស្សិតគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺ 250 ហាក់ដូចជាច្រើនពេក អ្នកស្រាវជ្រាវអាចប្រើការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន រួចបង្កើនចំនួនប៉ាន់គំរូនិស្សិតសេដ្ឋកិច្ចឡើងដល់ 100នាក់ ហើយចំនួននិស្សិតគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុកាត់បន្ថយត្រឹម 200នាក់វិញ ដោយយល់ថា ចំនួន200 នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ ចៀសវាងលើសចំនួនឥតប្រយោជន៍។

ឧទាហរណ៍ទី២ អំពីគោលដៅប៉ាន់គំរូ៖ អ្នកសិក្សាម្នាក់ចង់សិក្សាវាយតម្លៃទៅលើ “គោលនយោបាយ ភូមិឃុំមានសុវត្ថភាព” សំនួរមួយចោទសួរថា តើគាត់ទៅសួរអ្នកណាទើបត្រឹមត្រូវ? សួរប្រជាជនក្នុងភូមិ ឬសួរនគរបាល? ចំលើយ គឺគួរតែសួរប្រជាជនក្នុងភូមិដែលជាអ្នកទទួលសេវាទើបត្រឹមត្រូវ។ តើគាត់អាចសួរនគរបាលខ្លះ និងប្រជានខ្លះ ហើយយកចំលើយទាំងពីរបូកបញ្ចូលគ្នារួចធ្វើការវិភាគបានទេ? ចំលើយគឺអាចទៅរួច ក៏ប៉ុន្តែ មិនអាចបូកបញ្ចូលគ្នារួចវិភាគនោះទេ ត្រូវធ្វើការវិភាគដោយឡែកពីគ្នា ពីព្រោះម្ខាងជាចំលើយរបស់អ្នកទទួលសេវា ហើយម្ខាងទៀតជាចំលើយរបស់អ្នកផ្តល់សេវា មិនអាចបូកបញ្ចូលគ្នា រួចធ្វើការវិភាគបែបនោះទេ។

5.2.2 វិធីសាស្ត្រងាយស្រួល

វិធីសាស្ត្រងាយស្រួល (convenience sampling) ជូនកាលហៅថាការប្រមូលប៉ាន់គំរូដែលមានគោលបំណង (purposive sampling) ឬហៅថា (authoritative sampling) គឺវិធីសាស្ត្រមិនមែនប្រៀបប្រដាប់លើតេ ដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋានភាពងាយស្រួលទាក់ទងឬមិនសូវចំណាយច្រើនក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ។ ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃនេះហាងពីហ្សានៅផ្សារឡាក់គឺ ធ្វើការស្ទង់មតិចំពោះអ្នកដែលទៅហូបពីហ្សានៅទីនោះ ទាក់ទងជាមួយរស់ជាតិពីហ្សារបស់គេ។ ការធ្វើបែបនេះគឺចំណាយតិច ងាយស្រួល មានលក្ខណៈមិនមែនប្រៀបប្រដាប់លើតេ ពីព្រោះអតិថិជនទាំងអស់មិនមានឱកាសស្មើគ្នានោះទេ អ្នកដែលមានឱកាសគឺអ្នកដែលទៅហូបពីហ្សានៅថ្ងៃនេះ ចំណែកអ្នកដែលមិនបានទៅថ្ងៃនេះគឺមិនមានឱកាសត្រូវបានសាកសួរឡើយ។

5.3 ការវាយតម្លៃលើការប្រមូលប៉ាន់គំរូក្នុងករណីស្ទង់មតិ

ពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវប្រើប្រាស់ការស្ទង់មតិដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យ គាត់ត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃលើការប្រមូលប៉ាន់គំរូដែលបានប្រមូលមកវិញ (survey sampling evaluation)។ ហើយជំហានបន្ទាប់ គាត់ត្រូវវាយតម្លៃថា ការស្ទង់មតិនោះគឺផ្អែកលើប្រៀបប្រដាប់លើតេ ឬមិនប្រៀបប្រដាប់លើតេ។ បើការស្ទង់មតិនោះគឺផ្អែកលើប្រៀបប្រដាប់លើតេ លទ្ធផលដែលបានមកអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានជាទូទៅបាន (generalize the result) តែបើមិនផ្អែកលើប្រៀបប្រដាប់លើតេ គឺមិនអាចប៉ាន់ស្មានជាទូទៅលើចំនួនសកលបានឡើយ ពីព្រោះវាលំអៀង (bias) ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកអាចសន្និដ្ឋានក្នុងដែនកំណត់នៃប៉ាន់គំរូតែប៉ុណ្ណោះ។

¹⁰ ដកស្រង់ចេញពី៖ <https://www.questionpro.com/blog/judgmental-sampling/>

5.3.1 កំហុសក្នុងការស្ទង់មតិ

ទោះបីជាការស្ទង់មតិប្រើប្រាស់បីលើតែក៏អាចមានកំហុសដែរ (error) ។ ជាទូទៅគេអង្កេតឃើញថា អ្នកសិក្សាអាចច្រើនតែមានកំហុសចំនួនបួន៖

1. ការខកខានមិនបានបញ្ចូលប៉ាន់គំរូគ្រប់គ្រាន់ (Coverage Error): កើតឡើងពេលដែលការប្រមូលប៉ាន់គំរូមិនត្រឹមត្រូវ ឬអ្នកដែលត្រូវឆ្លើយសំណួរគ្មានឱកាសចូលរួម ឬត្រូវបានទាត់ចោល។ វាអាចផ្តល់លទ្ធផលលំអៀងលើការជ្រើសរើស (selection bias)។ ឧទាហរណ៍ សួរតែស្រីស្អាត ឬអ្នកមាន មិនសួរអ្នកក្រ សួរតែមន្ត្រីរាជការ មិនសួរពលរដ្ឋជាដើម។
2. ការខកខានមិនបានឆ្លើយ (Non-response Error): មិនមែនគ្រប់អ្នកគ្រប់គ្នាឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកឡើយ ឧទាហរណ៍ ដូចជាអ្នកមាន គេតែងតែរង់ចាំ មិនមានពេលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នក។
3. មិនបានផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នា (Sample Error): សំដៅលើឱកាសចូលរួមឆ្លើយមិនស្មើគ្នា ឧទាហរណ៍ អ្នកប្រើវិធីសាស្ត្រងាយស្រួល (convenience sampling) អាចផ្តល់នូវលទ្ធផលប្រមូលប៉ាន់គំរូមានកំហុស។
4. ការវាស់វែងមិនត្រឹមត្រូវ (Measurement Error): ជួនកាលហៅថា observation error សំដៅលើគុណភាពនៃការតាក់តែងសំណួរ ដូចជាសំណួរមិនច្បាស់លាស់ ឬសំណួរឲ្យតំរូវយមុន។ ឧទាហរណ៍ទី១ អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់តាក់តែងសំណួរឡាយស្តីតម្លៃ (Likert scale) ដើម្បីវាយតម្លៃលើផលិតផលមួយ: 1=មិនពេញចិត្តទាល់តែសោះ, 2= មិនពេញចិត្ត, 3=ពេញចិត្ត, និង 4=ពេញចិត្តខ្លាំង។ សំណួរបែបនេះមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេ ពីព្រោះអ្នកគ្មានយោបល់មិនដឹងគូសលេខប៉ុន្មាន (គ្មានកន្លែងគូស)។ ឧទាហរណ៍ទី២ អ្នកឆ្លើយសំណួរគឺចេះតែឆ្លើយពីព្រោះគាត់ខ្លាចអ្នកសួរ ឬឆ្លើយដើម្បីឲ្យអ្នកសម្ភាសសប្បាយចិត្ត ឧទាហរណ៍ទី៣ ការឆ្លើយដោយសារនិន្ទារឈ្មានស៍។ល។

5.3.2 បញ្ហាក្រមសីលធម៌

បញ្ហាក្រមសីលធម៌គឺកើតចេញពីកំហុសបួនក្នុងពេលធ្វើការស្ទង់មតិ។

- ការខកខានមិនបានបញ្ចូលប៉ាន់គំរូគ្រប់គ្រាន់ (Coverage error) អាចកើតចេញនៅពេលពីការលំអៀងក្នុងការជ្រើសរើស (selection bias) ហើយក្លាយជាបញ្ហាសីលធម៌ បើសិនជាមានក្រុម ឬបុគ្គលណាមួយត្រូវបានទាត់ចោលចេញពីគម្រោងនៃការជ្រើសរើស ដោយសារតែចង់បានលទ្ធផលគាប់ចិត្តអ្នកឧបត្ថម្ភ។
- កំហុសមិនឆ្លើយតប (nonresponse error) នាំឲ្យមានការលំអៀងមិនឆ្លើយតប (nonresponse bias) ហើយក្លាយជាបញ្ហាសីលធម៌ បើសិនជាមានក្រុម ឬបុគ្គលណាមួយមានទំនងជាមានឱតិចជាងគេក្នុងការឆ្លើយសំណួរ។
- កំហុសនៃប៉ាន់គំរូក្លាយជាបញ្ហាសីលធម៌ បើសិនជាលទ្ធផលដែលត្រូវបង្ហាញមិនបានយោងទៅនឹងចំនួនប៉ាន់គំរូនិងភាគរយនៃលំអៀង ជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកឧបត្ថម្ភអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដែលអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំ។
- កំហុសនៃការវាស់វែង (Measurement Error) ក្លាយជាបញ្ហាសីលធម៌តាមរយៈវិធីសាស្ត្របីយ៉ាង៖

1. អ្នកឧបត្ថម្ភជ្រើសរើសសំណួរដែលផ្តល់តម្លៃឲ្យគូសចំឡើយណាមួយ
2. ឥរិយាបថរបស់អ្នកសម្ភាស និងសំណើរបស់គាត់ មានបំណងបង្កើតឥទ្ធិពលឲ្យគូសចំឡើយណាមួយ
3. អ្នកឆ្លើយមានឆន្ទៈផ្តល់ព័ត៌មានខុស។

5.4 បំណែងចែកតម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូ

ជាទូទៅតម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូ (sample mean) ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ និងត្រូវបានយកទៅធ្វើការព្យាករណ៍តម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកលទៀតផង (mean of population)។ បំណែងចែកប៉ាន់គំរូគឺជាបំណែងចែកនៃតម្លៃទាំងអស់របស់ប៉ាន់គំរូស្ថិតិមួយដែលបានជ្រើសរើសចេញពីចំនួនសកល។

ឧទាហរណ៍ 5.3 ថ្នាក់រៀនកំរិតបណ្ឌិតមួយមាននិស្សិតទាំងអស់ចំនួន 4នាក់ (ចំនួនសកលមាន $N=4$) A B C និង D ហើយមានអាយុដូចក្នុងតារាង5.3៖

តារាង5.3 អាយុរបស់និស្សិតទាំង 4នាក់

និស្សិត	X (អាយុគិតជាឆ្នាំ)
A	16
B	18
C	20
D	22

ឧបមាថាយើងធ្វើការសាកសួរចំនួនសកលទាំងមូល (4នាក់) យើងបានតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកលគឺស្មើនឹង19 ឆ្នាំនិងគម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកលគឺស្មើនឹង 2.236 ឆ្នាំ ហើយបំណែងចែកចំនួនសកលដូចបានបង្ហាញក្នុងរូប5.2៖

$$\mu = \frac{\sum X_i}{N} = \frac{(16 + 18 + 20 + 22)}{4} = 19 \text{ ឆ្នាំ}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(16 - 19)^2 + (18 - 19)^2 + (20 - 19)^2 + (22 - 19)^2}{4}} = 2.236 \text{ ឆ្នាំ}$$

រូប5.2 បំណែងចែកចំនួនសកល



តារាង 5.4 ចំនួន16 ប៉ាន់គំរូដែលអាចកើតមាន

1 st Obs.	2 nd Obs.			
	16	18	20	22
16	16, 16	16, 18	16, 20	16, 22
18	18, 16	18, 18	18, 20	18, 22
20	20, 16	20, 18	20, 20	20, 22
22	22, 16	22, 18	22, 20	22, 22

រូប5.2 បញ្ជាក់ថា បើយើងសួរទាំងបួននាក់ ឱកាស ឬប្រូបាប៊ីលីតេរបស់សិស្សម្នាក់ៗដែលត្រូវបានសួរគឺ $\frac{1}{4}$ ឬ 0.25 ស្មើគ្នា ដូច្នេះបំណែងចែកដើមរបស់ចំនួនសកលនេះមានលក្ខណៈឯកសណ្ឋាន (uniform distribution) ។ ឥឡូវ ឧបមាថា យើងធ្វើការសាកសួរតែពីរនាក់ (sample=2) ដោយចៃដន្យ តើបំណែងចែកទៅជាយ៉ាងណា? តារាង5.4 បង្ហាញថា ករណីដែលសាកសួរឬជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូពីរនាក់ដោយជំនួសវិញ (replacement) លទ្ធផលអាចមានរហូតដល់ 16 ករណី។


- ករណីទី1៖ យើងអាចសួរចំអ្នកទី1ដែលមានអាយុ16 ហើយអ្នកទី2 ក៏មានអាយុ16 ដូច្នេះយើងបានអាយុមធ្យមគឺ 16 ឆ្នាំ
- ករណីទី2៖ យើងអាចសួរចំអ្នកទី1 មានអាយុ16 អ្នកទី2 មានអាយុ18 ដូច្នេះយើងបានអាយុមធ្យមគឺ 17 ឆ្នាំ

- ករណីទី៣៖ យើងអាចសួរចំអ្នកទី១ មានអាយុ១៦ អ្នកទី២ មានអាយុ២០ ដូច្នេះយើងបានអាយុមធ្យមគឺ ១៨ ឆ្នាំ។ ការសួរបែបនេះជាបន្តបន្ទាប់ រហូតដល់១៦ករណី យើងបានអាយុមធ្យមដូចក្នុងតារាង ៥.៤។
តារាង៥.៤ តម្លៃមធ្យមនៃប៉ាន់គំរូដែលអាចកើតមាន១៦ករណី

1 st Obs.	2 nd Obs.			
	16	18	20	22
16	16	17	18	19
18	17	18	19	20
20	18	19	20	21
22	19	20	21	22

តារាង៥.៤ បង្ហាញអំពីតម្លៃមធ្យមនៃប៉ាន់គំរូដែលអាចកើតមាន១៦ករណី ហើយបើយើងយក ទិន្នន័យទាំងនេះមកបង្ហាញជាគំនូសតាងប្រេកង់ យើងនឹងបានរូប៥.៣។

រូប៥.៣ បំណែងចែកតម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូ



រូប៥.៣ បង្ហាញឲ្យឃើញថា បំណែងចែកតម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូនៃអាយុរបស់ និស្សិតពីរនាក់មានលក្ខណៈជាបំណែងចែកធម្មតា (normal distribution) ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋាន បានថា៖ ថ្វីបើបំណែងចែកសកល ឬបំណែងចែកដើម របស់វាមានលក្ខណៈឯកសណ្ឋាន (uniform distribution) ក៏ដោយ បំណែងចែករបស់ប៉ាន់គំរូដែលចេញមកពីចំនួនសកលនោះនឹងរំកិលទៅរក បំណែងចែកធម្មតា (approach to normal distribution)។ នេះជាផ្នែកមួយនៃទ្រឹស្តី The Central Limit Theorem។

5.5 ភាពមិនលំអៀងនៃបំណែងចែកតម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូ

មុននេះយើងបានគណនាចម្បងហើយនូវតម្លៃមធ្យមនិងគម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកល ឥឡូវយើងនឹងធ្វើការគណនាតម្លៃមធ្យមនិងគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូវិញម្តង។

$$\mu_{\bar{X}} = \frac{\sum X_i}{N} = \frac{(16 + 17 + 17 + 18 + 18 + 18 + \dots + 22)}{16} = 19 \text{ ឆ្នាំ}$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N}}$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{(16 - 19)^2 + (17 - 19)^2 + (17 - 19)^2 + \dots + (22 - 19)^2}{16}} = 1.58 \text{ ឆ្នាំ}$$

បន្ទាប់មកយើងធ្វើការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមព្រមទាំងគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ ជាមួយនឹងតម្លៃមធ្យមព្រមទាំងគម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកល ដើម្បីឲ្យកំណត់អំពីកំរិតលំអៀងរបស់ប៉ាន់គំរូ។ ការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមនិងគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូគឺត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងតារាង 5.5។

តារាង 5.5 ប្រៀបធៀបតម្លៃនៃប៉ាន់គំរូនិងចំនួនសកល

ចំនួនសកល	ប៉ាន់គំរូ
$\mu = 19$ ឆ្នាំ	$\mu_{\bar{X}} = 19$ ឆ្នាំ
$\sigma = 2.236$ ឆ្នាំ	$\sigma_{\bar{X}} = 1.58$

តារាង 5.5 ប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមនិងគម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកល និងតម្លៃមធ្យមនិងគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ។ តាមរយៈតារាងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា តម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូគឺ 19 ឆ្នាំស្មើទៅនឹងតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកលគឺ 19 ឆ្នាំដែរ ហើយគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូវិញគឺ 1.58 ឆ្នាំ តូចជាងគម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកលដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 2.236 ឆ្នាំ គឺខុសគ្នាច្រើនគួរសម។

ក្រៅពីការគណនាគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ យើងអាចកំណត់គម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ តាមទំនាក់ទំនងគម្លាតស្តង់ដាររបស់សកល និងចំនួនប៉ាន់គំរូ ដូចក្នុងរូបមន្ត 5.1 ៖

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (5.1)$$

ហើយ

σ = គម្លាតស្តង់ដារ (standard deviation)

n = ចំនួនប៉ាន់គំរូ (sample size)

រូបមន្ត 5.1 គឺជារូបមន្ត គម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ ឬហៅថា លំអៀងស្តង់ដារនៃតម្លៃមធ្យម¹¹។

¹¹ ទំព័រ 333 របស់ Allan G. B (2009) Elementary Statistics: A Step by Step Approach. Eight Edition.

ឥឡូវយើងត្រូវបំប្លែងទិន្នន័យទៅជាប្រភេទ 5.3 របស់យើងឡើងវិញ។ ចំនួនប៉ាន់ស្មាន $n=2$ និងគម្លាតស្តង់ដារចំនួនសកល $\sigma = 2.236$ ដូច្នេះមន្តស្តង់ដារលំអៀងស្តង់ដារនៃតម្លៃមធ្យម៖

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2.236}{\sqrt{2}} = 1.581$$


ដូច្នេះយើងបានតម្លៃលំអៀងស្តង់ដារស្មើនឹង 1.581 ដូចតម្លៃគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងតារាង 5.5 ខាងលើ។

សំគាល់៖ ធាតុពិតយើងអាចគណនាគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់ស្មានតាមរយៈមន្តគម្លាតស្តង់ដារធម្មតាក៏បានដែរ ដោយមិនបាច់ប្រើរូបមន្ត លំអៀងស្តង់ដារនៃតម្លៃមធ្យមនោះទេ។ ការបង្កើតរូបមន្តគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់ស្មាន ជាអនុគមន៍នៃគម្លាតស្តង់ដាររបស់សកល និងចំនួនប៉ាន់ស្មានគឺដើម្បីទាញលក្ខណៈទូទៅ ឬបង្កើតទ្រឹស្តីទូទៅមួយ ហៅថាទ្រឹស្តីកណ្តាលដែលមានដែនកំណត់ (The Central Limit Theorem, CLT)។ ទ្រឹស្តីនេះបានចែងថា៖ បើសិនជាយើងមានចំនួនសកលដែលមានតម្លៃមធ្យម (μ) និងគម្លាតស្តង់ដារ (σ) ហើយពេលដែលចំនួនប៉ាន់ស្មាន (n) កើនឡើងដល់ចំនួនមួយគ្រប់គ្រាន់ ទម្រង់នៃបំណែងចែកតម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់ស្មានដែលបានប្រមូលចេញពីចំនួនសកលដោយមានការចំនួនវិញ នឹងរំកិលទៅរកបំណែងចែកធម្មតា (ដូចរូប 5.2 និងរូប 5.3) ហើយបំណែងចែកនេះនឹងមានតម្លៃមធ្យម (μ) និងគម្លាតស្តង់ដារ $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ។


វិបាករបស់ CLT បានបង្ហាញថា ទោះបីជាបំណែងចែកសកលមានលក្ខណៈឯកសណ្ឋានក៏ដោយ (ឬមានលក្ខណៈផ្សេង) ក៏អាចផ្តល់នូវបំណែងចែកប៉ាន់ស្មានលក្ខណៈធម្មតាដែរ បើចំនួនប៉ាន់ស្មាន (n) ធំគ្រប់គ្រាន់។ ដូច្នេះ ពេលដែលបំណែងចែកសកលមានលក្ខណៈឯកសណ្ឋាន វិធីដែលធ្វើឲ្យបំណែងចែកប៉ាន់ស្មានបំណែងចែកធម្មតាគឺត្រូវបង្កើនចំនួនប៉ាន់ស្មាន ដូចបានបង្ហាញក្នុងរូប 5.5 ខាងក្រោម។

រូប 5.5 ទំនាក់ទំនងរវាងចំនួនប៉ាន់ស្មាននិងបំណែងចែកឯកសណ្ឋាន

បំណែងចែកឯកសណ្ឋាន (Population Distribution)



បំណែងចែកប៉ាន់ស្មានជាឯកសណ្ឋាន ពេលចំនួនប៉ាន់ស្មាន(n)កើនឡើង



5.6 បំណែងចែកប៉ាន់គំរូនៃសមាមាត្រ

សូមរំលឹកថា បំណែងចែកប៉ាន់គំរូនៃសមាមាត្រ (the sampling distribution of proportion) គឺច្រើនមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងអថេរប្រភេទចំនួនពីរ (two category variables)។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជនចូលចិត្តផលិតផលរបស់អ្នក ឬចូលចិត្តផលិតផលគូរប្រគូតប្រជែង។ អតិថិជនបើកគណនី ឬមិនបើក ទិញឬមិនទិញផលិតផលរបស់អ្នក។

ជាទូទៅ សមាមាត្ររបស់ចំនួនសកលគឺតាងដោយ π សមាមាត្ររបស់ប៉ាន់គំរូស្ថិតិគឺតាងដោយ p ហើយយើងប្រើ p ដើម្បីព្យាករណ៍ π ។

រូបមន្តសមាមាត្ររបស់ប៉ាន់គំរូស្ថិតិកំណត់ដោយ៖

$$p = \frac{x}{n} = \frac{\text{ចំនួនវត្ថុដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍}}{\text{ចំនួនប៉ាន់គំរូ}} \quad (5.2)$$

$$0 \leq p \leq 1$$

និងលំអៀងស្តង់ដារ (standard deviation) របស់សមាមាត្រត្រូវកំណត់ដោយ៖

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}} \quad (5.3)$$

សមាមាត្រ p គឺមានបំណែងចែកទ្វេធា (binomial distribution) ប៉ុន្តែ p មានបំណែងចែកប្រហែលបំណែងចែកធម្មតា (normal distribution) នៅពេលដែលចំនួនប៉ាន់គំរូធំ (យើងសន្មតថា ការប្រមូលទិន្នន័យមានការជំនួសវិញចំពោះចំនួនប៉ាន់គំរូមានការកំណត់ ឬមិនមានការជំនួសក្នុងករណីប៉ាន់គំរូមិនមានការកំណត់) ជាពិសេស $n\pi \geq 5$ និង $n(1-\pi) \geq 5$ ។ អ្នកអាចយករូបមន្ត z-score (4.14) នៅក្នុងជំពូក 4 មកអនុវត្ត។

យើងជំនួស X ដោយ p , ជំនួស μ ដោយ π , និងជំនួស $\sigma/\sqrt{n}$ ដោយ $\sqrt{\pi(1-\pi)/n}$ យើងបានរូបមន្ត z សម្រាប់បំណែងចែកសមាមាត្រដូចខាងក្រោម៖

$$z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{p-\pi}{\sqrt{\pi(1-\pi)/n}} \quad (5.4)$$

ឧទាហរណ៍ 5. 4 អ្នកគ្រប់គ្រងសាខាអេស៊ីលីជាម្នាក់ដឹងហើយថា អ្នកដែលមានគណនីច្រើនលើសពីមួយ ទូទាំងសាខាទាំងមូលគឺមានសមាមាត្រ $\pi = 0.40$ ចូលគណនាប្រើប្រាស់លីតេនៃការជ្រើសរើសយកចំនួនប៉ាន់គំរូ 200 នាក់ដែលមានគណនេយ្យលើសពីមួយតិចជាង 30% ។

លក្ខខណ្ឌបំណែងចែកធម្មតា $n\pi \geq 5 = 200(0.40) = 80 \geq 5$ និង $n(1-\pi) \geq 5 = 0.40(1-0.40) = 120 \geq 5$ ដូច្នេះបំណែងចែកសមាមាត្រនេះគឺមានបំណែងចែកធម្មតា ហើយ តម្លៃ z គឺ៖

$$z = \frac{p-\pi}{\sqrt{\pi(1-\pi)/n}} = \frac{0.30-0.40}{\sqrt{0.40(1-0.40)/200}} = -2.89$$

យោងតាមតារាង E តារាង Normal Curve បានបង្ហាញថាផ្ទៃដែលតូចជាង -2.89 គឺ 0.0019 ឬ 0.19%។ ដូច្នេះ ប្រើប្រាស់លីតេនៃការជ្រើសរើសយកចំនួនប៉ាន់គំរូ 200 នាក់ដែលមានគណនេយ្យលើសពីមួយតិចជាង 30% គឺមាន 0.19%។

សេចក្តីសង្ខេប

អ្នកបានដឹងមកហើយថា ចំនួនសកលគឺមានទំហំធំធេងណាស់ ពេលខ្លះកំណត់បាន ពេលខ្លះកំណត់មិនបាន ហើយយើងមិនអាចប្រមូលគ្រប់តែបុគ្គលឬវត្ថុដែលស្ថិតនៅក្នុងចំនួនសកលនោះបានឡើយ។ ផ្ទុយមកវិញគឺយើងអាចប្រមូលតាមរយៈគំរូស្ថិតិដែលតំណាងអោយក្រុមតូច រួចប្រើលទ្ធផលនេះដើម្បីប៉ាន់ស្មានក្រុមធំ (ចំនួនសកល) ។

ក្នុងជំពូកនេះអ្នកបានសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យតាមវិធីសាស្ត្រប្រៀបប្រដាប់បីលីតេ ដូចជា៖ វិធីសាស្ត្រប្រៀបប្រដាប់លីតេសាមញ្ញ វិធីសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធ វិធីសាស្ត្រកូតា និងវិធីសាស្ត្រជាក្រុម ហើយការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រនីមួយមកប្រើគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាព។ ក្រៅពីនេះអ្នកក៏បានសិក្សាផងដែរទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងបំណែងចែកប៉ាន់គំរូនិងបំណែងចែកចំនួនសកល ពេលដែលចំនួនប៉ាន់គំរូកើនឡើងកាន់តែធំ ទំនាក់ទំនងនេះក៏បានលេចឡើងនូវទ្រឹស្តីកណ្តាលដែលមានដែនកំណត់ (CLT) ។ តាមរយៈទ្រឹស្តី CLT យើងអាចដឹងថា តម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូគឺមិនលំអៀងទៅនឹងតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកលនោះទេ ហើយតម្លៃមធ្យមរបស់សមាមាត្រក៏មិនលំអៀងទៅនឹងតម្លៃចំនួនសកលរបស់សមាមាត្រនោះដែរ។

សំណួរនិងលំហាត់

I. សំណួរ

1. ហេតុអ្វីបានជាតម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូមិនលំអៀងទៅនឹងតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកល ?
2. ហេតុអ្វីបានជាស្តង់ដារអែរើរបស់តម្លៃមធ្យមថយចុះពេលដែលចំនួនប៉ាន់គំរូ n កើនឡើង ?
3. ហេតុអ្វីបានជាបំណែងចែកប៉ាន់គំរូនៃតម្លៃមធ្យមនឹងមានទម្រង់ជាបំណែងចែកធម្មតាពេលដែលចំនួនប៉ាន់គំរូកើនឡើងគ្រប់គ្រាន់ ទោះបីជាចំនួនសកលមិនមានបំណែងចែកធម្មតាក៏ដោយ ?
4. អ្វីខ្លះជាចំណុចខុសគ្នារវាងបំណែងចែករបស់ចំនួនសកលនិងបំណែងចែករបស់ប៉ាន់គំរូ ?
5. តើក្រោមកាលៈទេសៈបែបណា ដែលបំណែងចែករបស់ប៉ាន់គំរូរបស់សមាមាត្រនឹងមានរាងដូចបំណែងចែកធម្មតា ?
6. អ្វីខ្លះជាចំណុចខុសគ្នារវាងការប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមបែបប្រៀបប្រដាប់បីលីតេនិងការប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមបែបមិនមែនប្រៀបប្រដាប់បីលីតេ ?
7. អ្វីខ្លះជាចំណុចខុសគ្នារវាងការប្រមូលប៉ាន់គំរូដោយជំនួសនិងមិនជំនួសវិញ ?
8. អ្វីខ្លះជាចំណុចខុសគ្នារវាងការប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមរយៈវិធីសាស្ត្រចែកជន្យធម្មតានិងការប្រមូលប៉ាន់គំរូជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ?
9. អ្វីខ្លះជាចំណុចខុសគ្នារវាងការប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមរយៈវិធីសាស្ត្រចែកជន្យធម្មតានិងការប្រមូលប៉ាន់គំរូជាក្រុម (a stratified sample) ?
10. អ្វីខ្លះជាចំណុចខុសគ្នារវាងការប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមរយៈវិធីសាស្ត្រជាក្រុម និងការប្រមូលប៉ាន់គំរូតាមកូតា (a cluster sample) ?

II. លំហាត់

11. រយៈពេលដែលបុគ្គលិកធនាគារចំណាយជាមួយអតិថិជនម្នាក់គិតជាមធ្យមរបស់ចំនួនសកលគឺ

$\mu=3.10$ នាទី និងគម្លាតស្តង់ដារ $\sigma = 0.40$ នាទី។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប៉ាន់តម្លៃអតិថិជន 16 នាក់ដោយចៃដន្យ៖

a. ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេនៃរយៈពេលគិតជាមធ្យមសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់ 3 នាទី?

b. ឌីកាស 95% ដែលរយៈពេលមធ្យមរបស់ប៉ាន់តម្លៃតិចជាងប៉ុន្មាននាទី?

c. តើលក្ខខណ្ឌ (assumption) អ្វីខ្លះដែលតម្រូវឲ្យមានដើម្បីដោះស្រាយចំណេះ (a) និង (b)?

d. ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសដោយចៃដន្យនូវប៉ាន់តម្លៃអតិថិជន 64 នាក់ តើឌីកាស 95% នៃរយៈពេលជាមធ្យមរបស់ប៉ាន់តម្លៃតិចជាងប៉ុន្មាននាទី?

12. ការជ្រើសរើសប៉ាន់តម្លៃមួយដោយចៃដន្យទៅលើគ្រួសារចំនួន 50 ដែលទាក់ទងទៅនឹងសំនួរសំខាន់មួយគឺ “តើផ្ទះរបស់អ្នកមានប្រើអ៊ីនធឺណិតឬទេ?” មានផ្ទះចំនួន 20 ឆ្លើយថា “មាន” និង 30 ឆ្លើយថា “មិនមាន”។

a. ចូលគណនាសមាមាត្រនៃចំនួនផ្ទះដែលប្រើអ៊ីនធឺណិត?

b. បើសិនជាសមាមាត្ររបស់ចំនួនសកលស្មើនឹង 0.45 ចូលកំណត់អំពីស្តង់ដារនៃចំនួនសមាមាត្ររបស់សកល។

13. ការស្ទង់មតិមួយត្រូវបានគេធ្វើឡើង ដើម្បីឲ្យចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខភាពពីររូប។ បើសិនជាមានបេក្ខជនមួយទទួលបានសំលេងយ៉ាងតិច 55% នៃសំលេងនៅក្នុងប៉ាន់តម្លៃ គឺបេក្ខជននោះត្រូវបានព្យាករណ៍ថាជាអ្នកឈ្នះទៅលើការបោះឆ្នោត។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប៉ាន់តម្លៃដោយចៃដន្យចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោត 100 នាក់ ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែលបេក្ខជនមួយនឹងត្រូវបានព្យាករណ៍ថាឈ្នះ៖

a. ពេលដែលភាគរយនៃចំនួនសកលរបស់គាត់ស្មើនឹង 50.1%?

b. ពេលដែលភាគរយនៃចំនួនសកលរបស់គាត់ស្មើនឹង 55%?

c. ពេលដែលភាគរយនៃចំនួនសកលរបស់គាត់ស្មើនឹង 49% (ហើយគាត់ប្រាកដជាបាញ់)?

d. ប្រសិនបើចំនួនប៉ាន់តម្លៃកើនឡើងដល់ចំនួន 500, ចូលគណនាសំនួរ (a) ដល់ (c) ឡើងវិញរួចធ្វើការពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផលទាំងនោះ?

14. អ្នកផលិតនំប៉័ងម្នាក់បានផលិតនំរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ទម្ងន់នំប៉័ងគាត់ដែលបានផលិតគឺមានបំណែងចែកប្រហែលទៅនឹងបំណែងចែកធម្មតា ហើយមានទម្ងន់មធ្យម 50 ក្រាម និងមានគម្លាតស្តង់ដារ 0.40 ក្រាម។ សន្មតថា អ្នកធ្វើការជ្រើសរើសចំនួនប៉ាន់តម្លៃ 30 នំ។

a. ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែលទម្ងន់មធ្យមរបស់ប៉ាន់តម្លៃនឹងតិចជាង 4.60 ក្រាម

b. បើប្រូបាប៊ីលីតេស្មើនឹង 70% ដែលទម្ងន់មធ្យមរបស់ប៉ាន់តម្លៃនឹងច្រើនជាងទម្ងន់មធ្យមរបស់សកលប៉ុន្មាន?

15. សញ្ញាប័ណ្ណប្រភេទ C មួយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា បានទទួលអាត្រាការប្រាក់ចំណេញគិតជាមធ្យមគឺ 57.5% កាលពីឆ្នាំកន្លង។ សន្មតថា អាត្រាប្រាក់ចំណេញមានបំណែងចែកធម្មតា ដែលមានអាត្រា

មធ្យមស្មើទៅនឹង 57.5% និងគម្លាតស្តង់ដារស្មើនឹង 20%។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូដោយចៃដន្យចំនួន

16 ចេញពីចំនួនសកល តើតម្លៃប្រូបាប៊ីលីតេនៃប៉ាន់គំរូដែលមានអត្រាប្រាក់ចំណេញជាមធ្យម៖

- a. តិចជាង 50% ?
- b. ចន្លោះពី 40% ទៅ 60% ?
- c. ច្រើនជាង 40% ?

16. កាស្តង់មតិមួយត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ទៅលើឥតវិយាបទនៃការទិញរថយន្តថ្មីរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។ លទ្ធផលបង្ហាញថា 36% នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទិញរថយន្តថ្មី (ចេញពីរោងចក្រ) ពេលដែលគេចង់ទិញរថយន្ត។ ឧបមាថាអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូអតិថិជនចំនួន 200 នាក់

- a. ចូលគណនាប្រូបាប៊ីលីតេនៃប៉ាន់គំរូដែលនឹងនៅចន្លោះពី 30% និង 40% ជាអតិថិជនដែលចង់ទិញរថយន្តប្រភេទថ្មីចេញពីរោងចក្រ
- b. ច្រើនជាង 30% ?

ជំពូកទី 6

ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់

(Confidence Interval Estimation)


គោលបំណង

- ការប៉ាន់ស្មាននិងបកស្រាយចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមនិងសមាមាត្រ
- កំណត់អំពីចំនួនប៉ាន់ស្មានតំរូវការបង្កើតចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមនិងសមាមាត្រ
- ការប្រើប្រាស់ចន្លោះជឿជាក់ដើម្បីប៉ាន់ស្មានលើករធ្វើសារនកម្ម
- ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់និងបញ្ជាក់លទ្ធផល

6.1 ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមពេលគម្លាតស្តង់ដារមិន

ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យម គឺត្រូវបានចែកជាពីរឈ្មោះ គម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង និងដឹង។ ជាទូទៅការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់របស់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃចំនួនសកល (ឧទាហរណ៍ដូចជា តម្លៃមធ្យម ឬសមាមាត្រ) គឺត្រូវផ្អែកលើតម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់ស្មាន។ ដំហ៊ានទីមួយនេះគេត្រូវធ្វើការប៉ាន់ស្មានចំណុច (point estimation) និងបន្ទាប់មកគេចំណុចដែលបានប៉ាន់ស្មាននេះ ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់ នៃចំនួនសកល (confidence interval estimation)។ រូប 6.1 និងតារាង 6.1 បង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នារវាងចំណុចនិងចន្លោះជឿជាក់។

រូប 6.1 គំនូសតាងនៃការប៉ាន់ស្មានចំណុចនិងចន្លោះជឿជាក់



តារាង 6.1 ការប៉ាន់ស្មានចំណុចនិងចន្លោះជឿជាក់

ប៉ាន់ស្មានតម្លៃ (ការប៉ាន់ស្មានជាចំណុច)	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំនួនសកល (ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់)
$\bar{X}$	$??? \leq \mu \leq ???$
p	$??? \leq \pi \leq ???$

រូបមន្តប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យម (គម្លាតស្តង់ដារដឹង)

នៅជំពូកទី 4 យើងមានរូបមន្ត (4.14) $z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}$

ហើយ $\sigma =$ គម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកល

យើងបានដឹងមកហើយថា $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$ ឬ $\sigma = \sigma_{\bar{X}} \sqrt{n}$ បន្ទាប់មកយើងជំនួស តម្លៃ σ ចូលក្នុងរូបមន្ត (4.14) យើងបាន $z = \frac{X_i - \mu}{\sigma_{\bar{X}} \sqrt{n}} \Rightarrow z(\sigma_{\bar{X}} \sqrt{n}) = X - \mu$ រួចទាញរកតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកល $\mu = X - z(\sigma_{\bar{X}} \sqrt{n})$ ។ យើងចង់បានចន្លោះជឿជាក់ដែលមានដែលកំណត់អប្បបរមានិងអតិបរមា (lower and upper limit) យើងត្រូវយកតម្លៃ z អវិជ្ជមានដាក់ខាងផ្នែកអប្បបរមានិងវិជ្ជមានដាក់ខាងផ្នែកដែនកំណត់អតិបរមា ហើយបើដូច្នោះអាល់ហ្វាក៍ត្រូវចែកជាពីរដែរ ហើយចន្លោះជឿជាក់នេះទៀតសោត គឺពីផ្នែកលើតម្លៃមធ្យម $\bar{X}$ ។ ជំនួសតម្លៃ z $\bar{X}$ និងអាល់ហ្វាក៍ដូចការរៀបរាប់ខាងលើ យើងបានរូបមន្ត 6.1។

$$\mu = \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (6.1)$$

រូបមន្ត 6.1 សម្រាប់ប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមពេលគម្លាតស្តង់ដារដឹង។

ឧទាហរណ៍ 6.1 រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយបានច្រកអង្ករចំនួន 25 បាវ ហើយមានទម្ងន់មធ្យម $\bar{X}=500.3$ ក្រាម និងសន្ទត់គម្លាតស្តង់ដារ $\sigma=15$ ក្រាម ចូលគណនាចន្លោះជឿជាក់ 95% សម្រាប់ចំនួនមធ្យមរបស់ចំនួនសកលនៃការច្រកអង្ករនេះ?


ជំនួសទិន្នន័យទាំងនេះចូលក្នុងរូបមន្ត (6.1)

$$500.3 - 1.96 \frac{15}{\sqrt{25}} \leq \mu \leq 500.3 + 1.96 \frac{15}{\sqrt{25}}$$

$$494.42 \leq \mu \leq 506.8$$

បំណកស្រាយ: លទ្ធផលនេះបញ្ជាក់អោយដឹងថា 95% តម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកល (បរិមាណអង្ករជាមធ្យម) គឺនៅចន្លោះពី 494.42 ក្រាម ទៅ 506.18 ក្រាម។ នេះមានន័យថា បើយើងធ្វើការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូ ឬធ្វើការប្តឹងអង្ករចំនួន 100 បាវដែលបានច្រករួច 95% ឬ 95 បាវ ជាមធ្យម គឺនៅចន្លោះពី 494.42 ក្រាម ទៅ 506.18 ក្រាម ហើយអាចមានខុស 5% ឬ 5 បាវ (ក្រោម 494.42 ក្រាម មាន 2.5% 2.5 បាវ និងលើ 506.18 ក្រាម មាន 2.5% ឬ 2.5 បាវ) សូមមើលរូប 6.2 ខាងក្រោម។

រូប 6.2 ចន្លោះជឿជាក់ 95% នៃទម្ងន់មធ្យមរបស់អង្ករ



6.2 ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមពេលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង

ក្នុងជីវភាពជាក់ស្តែង គម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកលគឺកម្រដឹងណាស់ ដូច្នេះក្នុងករណីដែលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង យើងនឹងអនុវត្តតាម student's t-distribution ឬហៅកាត់ថាបំណែងចែកអក្សរជឿ (t-

distribution)។ រូបមន្តនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក William S. Gosset នៅសតវត្សទី 20 សម្រាប់គណនាចន្លោះជឿជាក់ពេលដែលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង ហើយចំនួនប៉ាន់គំរូតូច¹²។

ប្រសិនបើអថេរ X មានបំណែងចែកធម្មតា បន្ទាប់មកតម្លៃ t -statistic:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad (6.2)$$


t មានចំនួនដឺគ្រីហ្វ្រីឌីម (df) = $n - 1$ (n =ចំនួនប៉ាន់គំរូ)

សមីការ (6.2) ស្រដៀងទៅនឹងរូបមន្ត z (សមីការ 6.1) លើកលែងតែតម្លៃគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ s ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប៉ាន់ស្មានគម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកល σ ។

6.2.1 វិបាកនៃបំណែងចែកអក្សរ

បំណែងចែកអក្សរ (t) មានរូបរាងដូចបំណែងចែកធម្មតា (Normal Distribution) ។ បំណែងចែកទាំងពីរគឺស៊ីមេទ្រី ហើយមានរាងដូចរូបដួង ហើយមានតម្លៃមធ្យមស្មើនឹងមេដ្យាន។ ក៏ប៉ុន្តែបំណែងចែកអក្សរ (t) មានមានកំពស់ទាបជាង មិនសូវប្រមូលផ្តុំនៅនឹងកណ្តាលដូចបំណែងចែកធម្មតានោះទេ (មើលរូប 6.3) ។ នេះមានន័យថា បំណែងចែកអក្សរ (t) មានគម្លាតស្តង់ដារធំជាងបំណែងចែកធម្មតា ($S > \sigma$) ហេតុដូច្នេះ គេប្រើ s ដើម្បីប៉ាន់ស្មាន σ ក្នុងករណី σ មិនដឹង។ ជាទូទៅបើចំនួនប៉ាន់គំរូចាប់ពី 120 ឡើងទៅ បំណែងចែកអក្សរ t និង z មិនសូវខុសគ្នានោះទេ (មើលរូប 6.3) ។

រូប 6.3 បំណែងចែកធម្មតា និងបំណែងចែកអក្សរ (t) ដែលមាន ចំនួនដឺគ្រីហ្វ្រីឌីម (df) ផ្សេងៗគ្នា



តារាង 6.2 ប្រៀបធៀប តម្លៃ t និង z ផ្អែកលើចន្លោះជឿជាក់និងចំនួនដឺគ្រីហ្វ្រីឌីម (df) មួយចំនួន

Confidence level	$t (df = 5)$	$t (df = 15)$	$t (df = 30)$	$Z (df = \infty)$
0.90	1.4398	1.3406	1.6973	1.645
0.95	1.9432	1.7531	2.0423	1.96
0.975	2.4469	2.1315	2.4573	2.24
0.99	3.1427	2.6025	2.750	2.33

តារាង 6.2 បញ្ជាក់ថា ពេលចំនួន df កើនឡើង តម្លៃ t -critical រំកិលទៅរកតម្លៃ Z ។

¹² ទាញយកនៅថ្ងៃទី 2/5/2021 ចេញពី https://en.wikipedia.org/wiki/William_Sealy_Gosset

6.2.2 ចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមពេលដែលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង

សមីការ (6.1) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគណនាចន្លោះជឿជាក់ពេលដែលគម្លាតស្តង់ដារដឹង។ តាមរយៈសមីការ (6.1) យើងអាចទាញបានរូបមន្តចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមពេលដែលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹងដោយប្រើតម្លៃ t -critical ។

$$\mu = \bar{X} \pm t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{X} - t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (6.2)$$

ដែល t មានដីត្រីហ្វ្រីឌីម $df=n-1$ ហើយចំណែកអថេរដ៏ទៃទៀតគឺមានអត្ថន័យដូចមុន។

ឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅពិនិត្យឧទាហរណ៍ 6.1 ឡើងវិញ រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយបានច្រកអង្ករចំនួន $n=25$ បារ ហើយមានទម្ងន់មធ្យម $\bar{X}=500.3$ ក្រាម និងសន្ទត់គម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ $S=15$ ក្រាម ចូលគណនាចន្លោះជឿជាក់ 95% សម្រាប់តម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកលនៃការច្រកអង្ករនេះ?

ចន្លោះជឿជាក់ 95% តម្លៃដ៏ដែលមាន $df=25-1=24$, $t_{\frac{0.05}{2}, 25-1} = 2.0639$ (មើលតារាង t -distribution) ជំនួសទិន្នន័យទាំងនេះចូលរូបមន្ត 6.2 យើងបាន៖

$$\bar{X} - t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$500.3 - 2.0639 \frac{15}{\sqrt{25}} \leq \mu \leq 500.3 + 2.0639 \frac{15}{\sqrt{25}}$$

$$494.11 \leq \mu \leq 506.49$$

បំណកស្រាយ៖ លទ្ធផលនេះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា 95% តម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកល (បរិមាណអង្ករគិតជាមធ្យម) គឺនៅចន្លោះពី 494.11 ក្រាម ទៅ 506.49 ក្រាម។ នេះមានន័យថា បើយើងធ្វើការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូ ឬធ្វើការប្តឹងអង្ករចំនួន 100 បារដែលបានច្រករួច 95% ជាមធ្យម គឺនៅចន្លោះពី 494.11 ក្រាម ទៅ 506.49 ក្រាម ហើយអាចមានខុស 5% (ក្រោម 494.11 ក្រាម មាន 2.5% និង លើ 506.49 ក្រាម មាន 2.5%) ។

6.3 ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់សមាមាត្រ

មុននេះយើងបានសិក្សាលើការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់សម្រាប់ទិន្នន័យជាលេខ (numerical variable) ឥឡូវយើងចូលដល់ ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់សមាមាត្រ (confidence interval estimate for the proportion) ។ នេះគឺជាការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ទិន្នន័យជាប្រភេទ (categorical data) ។ ជំហ្លងយើងត្រូវគណនាការប៉ាន់ស្មានលើចំណុច (point estimation) គឺ $p = X/n$ ហើយ p គឺជាសមាមាត្រដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ ឧទាហរណ៍ និស្សិតរៀនជាប់ប៉ុន្មានភាគរយ (យើងចាប់អារម្មណ៍ឬចង់ដឹងលើអ្នកជោគជ័យ) ហើយ p ក៏អាចជាការបរាជ័យដែរ ឲ្យតែយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ឬចង់សិក្សា។ បន្ទាប់ពីយើងបានតម្លៃសមាមាត្រ p ហើយ យើងអាចប្រើទិន្នន័យនេះដើម្បីប៉ាន់ស្មានលើចន្លោះជឿជាក់នៃសមាមាត្ររបស់ចំនួនសកល (π) ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាចន្លោះជឿជាក់នៃចំនួនសកលសមាមាត្រ៖

$$\pi = p \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$p - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \pi \leq p + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad (6.3)$$

ហើយ $p =$ សមាមាត្ររបស់ប៉ាន់គំរូ $= \frac{X}{n} = \frac{\text{ចំនួនវត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍}}{\text{ចំនួនប៉ាន់គំរូ}}$

$\pi =$ សមាមាត្ររបស់ចំនួនសកល

$z_{\alpha/2} =$ តម្លៃ z នៅក្នុងតារាង Normal ដែលយើងកំណត់យកមកប្រើ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៖ $X > 5$ ហើយ $n-X > 5$ ដើម្បីគោរពនូវលក្ខខណ្ឌ normal distribution ។

ឧទាហរណ៍ 6.2 ការសាកសួរនិស្សិត 100 នាក់ដោយចៃដន្យបង្ហាញថា 20 នាក់ចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យា ហើយ 80 នាក់ទៀតមិនចូលចិត្ត។ ចូលធ្វើការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់ 95% នៃសមាមាត្រពិតប្រាកដរបស់ចំនួនសកលចំពោះនិស្សិតដែលចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យា។

- គណនាសមាមាត្រនិស្សិតចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យា

$$p = \frac{X}{n} = \frac{20}{100} = 0.20$$

- ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនាំម៉ាល់លីតធី (normality): $X=20 > 5$, $100-20 > 5$ (ផ្ទៀងផ្ទាត់)
- គណនាចន្លោះជឿជាក់ 95% ($Z = 1.96$)

$$p - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \pi \leq p + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$0.20 - 1.96 \sqrt{\frac{0.20(1-0.20)}{100}} \leq \pi \leq 0.20 + 1.96 \sqrt{\frac{0.20(1-0.20)}{100}}$$

$$0.1216 \leq \pi \leq 0.2784$$

បំណកស្រាយ៖ 95% យើងជឿជាក់ថា និស្សិតដែលចូលចិត្តរៀនព័ត៌មានវិទ្យា គឺស្ថិតនៅចន្លោះ 12.16% ទៅ 27.84%។

6.4 ការកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូ

ការកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូ (determining the sample size) គឺជាសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គណនាចន្លោះជឿជាក់។ ជាទូទៅចំនួនប៉ាន់គំរូគឺរឹងឥទ្ធិពលដោយសារតែ ចន្លោះជឿជាក់ដែលអ្នកសិក្សាចង់បាន ឧទាហរណ៍អ្នកសិក្សាចង់សិក្សាចន្លោះជឿជាក់ 90%, 95% ឬ 99% និងកំរិតលំអៀងដែលអ្នកសិក្សាសុខចិត្តទទួលយក។

6.4.1 ការកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូសម្រាប់តម្លៃមធ្យម

ការកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូសម្រាប់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់នៃតម្លៃមធ្យម (sample size determination for confidence interval of mean) គឺយើងអាចទាញចេញពីរូបមន្ត (6.1) ៖

$$\mu = \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

តម្លៃដែលបូកបន្ថែម ឬដកចេញពីលើតម្លៃមធ្យម ($\bar{X}$) ត្រូវបានចាត់ទុកជាកំរិតលំអៀង (error) របស់ប៉ាន់គំរូចេញពីតម្លៃមធ្យម។ ដូច្នេះ កំរិតលំអៀង (e) ត្រូវបានកំណត់ដូចតទៅ៖

$$e = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

បន្ទាប់មកយើងទាញរក n ដែលតំណាងអោយប៉ាន់គំរូក្នុងការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យម (μ) គឺ៖

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{e^2} \quad (6.4)$$

តាមរយៈរូបមន្ត (6.4) បង្ហាញឲ្យដឹងថា ដើម្បីគណនាចំនួនប៉ាន់គំរូក្នុងការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមគឺយើងត្រូវដឹងធាតុផ្សំបី៖

1. ចន្លោះជឿជាក់ $(1-\alpha)$ កំណត់ដោយ $z_{\alpha/2}$ ដែលបានមកពីតារាងបំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ (the Standard Normal Distribution)
2. ការទទួលយកនូវកំរិតលំអៀងរបស់ប៉ាន់គំរូ (e)
3. គម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកល (σ)

ឧទាហរណ៍ 6.3 អង្គភាពកាំកុងត្រូលចង់ចុះទៅត្រួតពិនិត្យក្នុងទំរៅស្ថានីយ៍សាំងមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដឹងថាស្ថានីយ៍ទាំងនោះចាក់សាំងអតិបិជនគ្រប់ចំណុះដែរឬអត់។ បើតាមទិន្នន័យចាក់សាំងកន្លងមកទូទាំងប្រទេសមានគម្លាតស្តង់ដារ 6 មីលីលីត្រ ក្នុងមួយលីត្រ។ ឥឡូវ កាំកុងត្រូលចង់កំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូដើម្បីប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់លើចំណុះសាំងជាមធ្យមក្នុងមួយលីត្រដែលចាក់អតិបិជនដោយផ្អែកលើកំរិតជឿជាក់ 95% ហើយកាំកុងត្រូលសុខចិត្តទទួលកំរិតលំអៀង 5មីលីលីត្រ ។ តើប៉ាន់គំរូត្រូវប្រើប្រាស់គឺចំនួនប៉ុន្មាន?

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{e^2} = \frac{(1.96^2)(6^2)}{5^2} = 5.53 \approx 6$$

ដូច្នេះដើម្បីវាស់ចំណុះឬកំណត់ថាក្នុងទំរៅចាក់សាំងនីមួយៗបានចាក់សាំងអតិបិជនគ្រប់លីត្រដែរឬអត់ កាំកុងត្រូលត្រូវយកប៉ាន់គំរូ (វាស់សាំងម្តងមួយលីត្រ) ចំនួន 6ដងចេញពីក្នុងទំរៅនីមួយៗ

6.4.2 ការកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូសម្រាប់សមាមាត្រ

ស្រដៀងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូសម្រាប់តម្លៃមធ្យម ការកំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូសម្រាប់សមាមាត្រ (sample size determination for proportion) គឺត្រូវដឹងអំពីចំនួនសកល (π)។ សូមរំលឹកថា ការកំណត់ប៉ាន់គំរូក្នុងការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យម (μ) គឺ៖

$$e = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅលើចន្លោះជឿជាក់របស់សមាមាត្រ យើងជំនួស σ ដោយ $\sqrt{\pi(1-\pi)}$ ដូច្នេះយើងបានកំរិតលំអៀងរបស់ប៉ាន់គំរូចេញពីសមាមាត្រដូចខាងក្រោម៖

$$e = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$$

បន្ទាប់មកយើងទាញរក n ដែលតំណាងអោយប៉ាន់គំរូក្នុងការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមរបស់សមាមាត្រ (π) គឺរូបមន្ត (6.5)៖

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \pi(1-\pi)}{e^2} \quad (6.5)$$

ដូច្នេះដើម្បីគណនាចំនួនប៉ាន់គំរូក្នុងការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមរបស់សមាមាត្រ គឺយើងត្រូវដឹងធាតុបី៖

1. ចន្លោះជឿជាក់ $(1-\alpha)$ កំណត់ដោយ $z_{\alpha/2}$ ដែលបានមកពីតារាងបំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ (the Standard Normal Distribution)
2. ការទទួលយកនូវកំរិតលំអៀងរបស់ប៉ាន់ស្មាន (e)
3. សមាមាត្របស់ចំនួនសកល (π)

នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង តម្លៃ (π) អាចដឹងបានតាមរយៈនៃការពិសោធន៍ឬព័ត៌មានពីអតីតកាល ប៉ុន្តែបើគ្មានព័ត៌មានអំពី (π) នោះទេ យើងត្រូវកំណត់ចំនួនប៉ាន់ស្មានដោយគ្រប់គ្រាន់។ ជាការកត់សំគាល់ពេល $\pi = 0.5$ ពេលនោះតម្លៃ $\pi(1 - \pi)$ មានតម្លៃអតិបរមា។

ឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលឧទាហរណ៍ 6.2 ឡើងវិញដែលទាក់ទងទៅនឹងការសាកសួរនិស្សិត 100 នាក់ដោយចៃដន្យដែលលទ្ធផលបង្ហាញថា 20% ចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យា ហើយ 80% ទៀតមិនចូលចិត្ត។ បន្ទាប់មកយើងធ្វើការគណនាចំនួនប៉ាន់ស្មានសម្រាប់សមាមាត្រនៃនិស្សិតដែលចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យាស្ថិតនៅចន្លោះជឿជាក់ 95% ដោយសន្មតថា យើងសុខចិត្តទទួលយកកាតព្វកិច្ចលំអៀងទៅលើការប៉ាន់ស្មាននេះ 10% ហើយយើងគ្មានព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងចំនួនសកល (π) ឡើយ។

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \pi(1 - \pi)}{e^2} = \frac{(1.96^2) * 0.5(1 - 0.5)}{0.10^2} = 96.04$$

ដូច្នេះចំនួនប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ការសាកសួរនេះគឺ 96 នាក់។

សំគាល់៖ រូបមន្ត (6.3) និង (6.4) អាចប្រើសម្រាប់កំណត់ចំនួនប៉ាន់ស្មានដើម្បីយកទៅប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់នៃតម្លៃមធ្យមនិងសមាមាត្រតែប៉ុណ្ណោះ។ រូបមន្តទាំងនេះមិនអាចយកទៅគណនាចំនួនប៉ាន់ស្មានសម្រាប់សមីការលីនេអ៊ែរដែលមានច្រើនអថេរ (multiple regression) confirmatory factor analysis (CFA), structural equation modelling (SEM), exploratory factor analysis (EFA) និង principal components factor analysis (PCFA) នោះទេ។ បើអ្នកអានមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការកំណត់ចំនួនប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ម៉ូដែលទាំងនេះ សូមអានសៀងកៅរបស់អ្នកនិពន្ធ Tabachnick & Fidell (2007); Meyers, Gamst and Guarino (2013) និងអត្ថបទរបស់ Brooks G. P & Barcikowsk. R. S (2012)។

6.5 ការអនុវត្តន៍ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់លើសាវនកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ជាទូទៅការងារសាវនកម្មគឺជាការងារប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តន៍នាពេលកន្លង។ ការងារនេះកម្រធ្វើការពិនិត្យលើព័ត៌មានទាំងអស់របស់ចំនួនសកលណាស់ គឺគេពឹងផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មាននូវប្រូបាប៊ីលីតេរបស់ប៉ាន់ស្មាន ពីព្រោះ មានហេតុផលសំខាន់ដូចខាងក្រោម៖

- ចំណេញពេលវេលានិងថវិការ
- ផ្តល់លទ្ធផលអោយយើងអាចការពារខ្លួនបានចំពោះមុខច្បាប់
- អាចឲ្យយើងដឹងនូវកំរិតលំអៀង
- អាចឲ្យយើងសន្និដ្ឋានចំនួនសកលបានត្រឹមត្រូវ
- អាចឲ្យសាវនករចងក្រងជាមួយឯកសាររបស់បុគ្គលផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃជាសមូហភាព

6.5.1 ការប៉ាន់ស្មានលើបរិមាណសរុបនៃចំនួនសកល

ការងារសាវនកម្មគឺជាបំណងដើម្បីដឹងពីការវាយតម្លៃទៅលើបរិមាណសរុបរបស់ចំនួនសកល (total amount of population) មិនមែនប៉ាន់ស្មានលើចំនួនមធ្យមនោះទេ។ ហើយការងារប៉ាន់ស្មានលើចំនួនសរុបនៃចំនួនសកលគឺមានពីរជំហាន៖

ជំហានដំបូងយើងត្រូវធ្វើការប៉ាន់ស្មានលើចំនុចសរុបនៃចំនួនសកល (the point estimate for the population total) ជាមុនសិន

$$Total = N * \bar{X} \quad (6.6)$$

ហើយ N = ចំនួនសរុបនៃ ចំនួនសកល (population size)

$\bar{X}$ = តម្លៃមធ្យម

ជំហានបន្ទាប់គឺធ្វើការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់ចំពោះចំនួនសកលសរុប (confidence interval estimation for the total)

$$N * \bar{X} \pm N \left(t_{\frac{\alpha}{2}} \right) \frac{S}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \quad (6.7)$$

ហើយ $t_{\frac{\alpha}{2}}$ = តម្លៃ t នៅក្នុងតារាង t -distribution ដែលមានតម្លៃ $\alpha/2$ និងមានដឺក្រឡីឌីផេនស៊ី $df=n-1$

$\bar{X}$ = តម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់ស្មាន

N = ចំនួនសកលសរុប

n = ចំនួនប៉ាន់ស្មាន

S = គម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់ស្មាន

ឧទាហរណ៍ 6.4 សវនករម្នាក់បានធ្វើសវនកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានប័ណ្ណចំណាយចំនួន 2000 ប័ណ្ណ ហើយគាត់ចង់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានចំនួនសកលសរុបនៃប័ណ្ណចំណាយទាំងនោះតាមរយៈការជ្រើសរើសប័ណ្ណចំនួន 100 ហើយបានលទ្ធផលដូចតទៅ៖

តម្លៃមធ្យមរបស់ប័ណ្ណ $\bar{X} = \$1000$

គម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់ស្មាន $S = \$250$

ចូលបង្កើតចន្លោះជឿជាក់ 95% ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅលើតម្លៃរបស់ចំនួនសកលសរុប?

(សំគាល់៖ តារាង t -critical, 95%, $t_{\frac{0.05}{2}, 100-1} = 1.9842$)

- ជំហានដំបូងគណនាចំនុចប៉ាន់ស្មាននៃចំនួនសកលសរុប (point estimate of the population total) ដោយប្រើរូបមន្ត (6.6)

$$Total = N * \bar{X} = 2,000 * 1000 = \$2,000,000$$

- ជំហានបន្ទាប់គឺប្រើរូបមន្ត (6.7) ដើម្បីគណនាចន្លោះជឿជាក់នៃតម្លៃសរុបនៃចំនួនសកល

$$\begin{aligned} & N * \bar{X} \pm N \left(t_{\frac{\alpha}{2}} \right) \frac{S}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \\ & = 2,000 * 1,000 \pm 2,000 (1.9842) \frac{250}{\sqrt{100}} \sqrt{\frac{2,000-100}{2,000-1}} \\ & = 2,000,000 \pm 96,722.13 \end{aligned}$$

$$= 2,000,000 \pm 96,722.13$$

$$\$1,903,277.87 \leq \text{Population total} \leq \$2,096,722.13$$

ដូច្នេះនៅចន្លោះជឿជាក់ 95% សវនករបានប៉ាន់ស្មានថា តម្លៃសរុបរបស់ប័ណ្ណទាំង 2,000 គឺនៅចន្លោះពី \$1,903,277.87 ដល់ \$2,096,722.13។ បើសិនជាបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនមិនបានបង្ហាញនូវតម្លៃសរុបទាំង 2,000 ប័ណ្ណនៅចន្លោះនេះទេ សវនករអាចមានភស្តុតាងដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់បាន។

6.5.2 ការប៉ាន់ស្មានលើភាពខុសគ្នា

ការប៉ាន់ស្មានលើភាពខុសគ្នា (difference estimation) គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ពេលដែលសវនករ ឬអ្នកត្រួតពិនិត្យគុណភាពយល់ឃើញថា មានភាពលំអៀងកើតមានចំពោះការប៉ាន់ស្មានរៀបរាប់ទៅនឹងទិន្នន័យជាក់ស្តែង ហើយគាត់ចង់ដឹងអំពីទំហំនៃភាពលំអៀងនោះដោយផ្អែកប៉ាន់គំរូ។

ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានលើភាពខុសគ្នា យើងត្រូវធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោម¹³៖

1. កំណត់ចំនួនប៉ាន់គំរូដែលត្រូវការ
2. គណនាភាពលំអៀងរវាងតម្លៃដែលបានធ្វើសវនកម្មនិងតម្លៃក្នុងឯកសារ តម្លៃខុសគ្នាទី (i) យើងតាងដោយ D_i បើ $D_i = 0$ មានន័យថាតម្លៃដែលធ្វើសវនកម្មស្មើនឹងតម្លៃក្នុងឯកសារដើម គឺត្រឹមត្រូវ ហើយវិជ្ជមានពេលតម្លៃដែលធ្វើសវនកម្មធំជាងតម្លៃឯកសារដើម និងអវិជ្ជមានតម្លៃដែលធ្វើសវនកម្មតូចជាងតម្លៃឯកសារដើម
3. គណនាតម្លៃមធ្យមនៃភាពខុសគ្នា ($\bar{D}$) ដោយចែកតម្លៃខុសគ្នាសរុបទៅនឹងចំនួនប៉ាន់គំរូ ដូចសមីការ (6.8)៖

$$\text{តម្លៃខុសគ្នាជាមធ្យម: } \bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n} \quad (6.8)$$

ហើយ D_i = តម្លៃលំអៀងនីមួយៗ

4. គណនាគម្លាតស្តង់ដារនៃតម្លៃខុសគ្នា S_D

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}} \quad (6.9)$$

5. ប្រើសមីការ (6.10) ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានលើចន្លោះជឿជាក់នៃតម្លៃខុសគ្នាសរុបរបស់ចំនួនសកល។

$$N * \bar{D} \pm N \left(t_{\frac{\alpha}{2}} \right) \frac{S_D}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \quad (6.10)$$

ហើយ $t_{\frac{\alpha}{2}}$ = តម្លៃ t នៅក្នុងតារាង t-distribution ដែលមានតម្លៃ $\alpha/2$ និងមាន $df=n-1$

ឧទាហរណ៍ 6.5 ជារឿងរាល់សប្តាហ៍ស្ថានីយ៍លក់សាំង SOPHIA បានធ្វើការចាក់សាំង (លក់) 1,000 លើកទៅទីផ្សារ (សម្រាប់តែក្នុងទំហំចាក់សាំងលេខ១តែប៉ុណ្ណោះ) ហើយអ្នកលក់មានការបារម្ភណ៍ចំពោះក្នុងទំហំចាក់សាំងមួយនេះ គាត់ក៏ធ្វើការប្រមូលប៉ាន់គំរូចំនួន 50 លើក ហើយសំគាល់ឃើញថាមានកំហុស 14លើក (អវិជ្ជមាន មានន័យថាខ្វះលីត្រ វិជ្ជមាន មានន័យថាលើសលីត្រ)។ ហើយទិន្នន័យត្រូវបានកត់ត្រាដូចខាងក្រោម៖

2	3	3.3	2.2	2.3	-1	-1.2	3	2.4	0.8	0.6	1.5	-0.8	0.9
---	---	-----	-----	-----	----	------	---	-----	-----	-----	-----	------	-----

¹³ ដកស្រង់ចេញពី Berenson M. L, Levine D. M, & Krehbiel T. C. (2012). ទំព័រ 305-306

ចូលបង្កើតចន្លោះជឿជាក់ 95% ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅលើបរិមាណលំអៀងសរុបចំនួន 1,000 លើក ?

ចម្លើយ:

- គណនាតម្លៃមធ្យមខុសគ្នា $\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n} = \frac{(2+3+\dots+0.9)}{50} = \frac{19}{50} = 0.38$
- គណនាគម្លាតស្តង់ដារ $S_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(2-0.38)^2 + \dots + (0.9-0.38)^2}{50-1}} = \frac{43.5016}{49} = 0.8878$
- គណនាចន្លោះជឿជាក់ 95% ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅលើបរិមាណលំអៀងសរុបចំនួន 1,000 លើក (សំគាល់៖ តារាង t-critical, 95%, $t_{\frac{0.05}{2}, 50-1} = 2.0096$)

$$N * \bar{D} \pm N \left(t_{\frac{\alpha}{2}} \right) \frac{S_D}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = 1,000 * 0.38 \pm 1,000 (2.0096) \frac{0.8878}{\sqrt{50}} \sqrt{\frac{1,000-50}{1,000-1}}$$

$$380 \pm 246.047$$

$$133.953 \leq \text{total difference} \leq 626.047$$

ដូច្នេះនៅចន្លោះជឿជាក់ 95% ក្នុងទំហំចាក់សាំងលេខ 1 នៅស្ថានីយ៍ SOPHIA ចាក់សរុប 1,000 លីត្រ (ចំនួនសកល) លំអៀងសរុបគឺនៅចន្លោះ 133.953 លីត្រ ដល់ 626.047 លីត្រ។ ចន្លោះនេះគឺវិជ្ជមានទាំងសង្វាង មានន័យថាចាក់សាំងលើសលីត្រ។

6.5.3 ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់កន្ទុយម្ខាង

ការមិនគោរពតាមស្តង់ដារឬបទបញ្ញត្តិរបស់កំរិតត្រួលគឺត្រូវប្រើចន្លោះជឿជាក់កន្ទុយម្ខាង (one-side confidence interval estimation) ។ ជួនកាលប្រើកន្ទុយខាងធ្វេង ជួនកាលខាងស្តាំ ឧទាហរណ៍ ម្ចាស់ស្ថានីយ៍បារម្មណ៍ខ្លាចលើលីត្រ រីឯកំរិតត្រួលបារម្មណ៍ខ្លាចខ្វះលីត្រ។

សមីការ (6.11) កំណត់អំពីចន្លោះជឿជាក់កន្ទុយម្ខាង (ស្តាំ) សម្រាប់សមាមាត្ររបស់ម្ចាស់ស្ថានីយ៍ដែលខ្លាចលើសលីត្រ៖

$$\text{Upper bound} = p + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} * \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \quad (6.8)$$

ឧទាហរណ៍ 6.6 ឥឡូវយើងពិនិត្យឡើងវិញនូវ ឧទាហរណ៍ 6.5 ឧបមារថា មានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថានីយ៍បានកំណត់ថា អត្រាអនុគ្រោះចំពោះការចាក់សាំងលើសលីត្រមិនឲ្យស 10% (tolerable rate) ។ ក្នុងករណីដែលលើស ម្ចាស់ស្ថានីយ៍មានចំណាត់ការជួសជុលក្នុងទំរង់។ បើសិនជាចន្លោះជឿជាក់ 95% ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ តើអ្នកសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះស្ថានីយ៍មួយនេះ ?

ចម្លើយ:

ការចាក់សាំងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ 6.5 មានកំហុស 14 ដង ក្នុងប៉ាន់គំរូ $n = 50$ ក្នុងនោះ 12 ដងលើសចំណុះ និង 2 ដងខ្វះលីត្រ។ ឥឡូវយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចាក់សាំងលើសលីត្រ (កន្ទុយខាងស្តាំ) ដូច្នេះកំហុសគិតជាសមាមាត្រ $p = 12/50 = 0.24$ ឬ 24% ហើយបើ $\alpha = 0.05$ យើងបានតម្លៃគោល $z_{\alpha} = 1.645$

$$\text{Upper bound} = p + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} * \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = 0.24 + 1.645 \sqrt{\frac{0.24(1-0.24)}{50}} * \sqrt{\frac{1,000-50}{1,000-1}}$$

$$Upper\ bound = 0.24 + 1.645 * 0.06 * 0.9752 = 0.337$$

ដូច្នេះចន្លោះជឿជាក់ 95% យើងអាចសន្និដ្ឋានថា អត្រាចាក់សាំងលើសគឺ 33.7% ហើយកំរិតនេះបានលើសកំរិតដែលបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលបានអនុញ្ញាត។ សូមផ្អែកបច្ចេកទេសពិនិត្យក្នុងទំរង់ចាក់សាំងលេខ១នេះឡើងវិញ។

6.6 ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់និងបញ្ជាក់សីលធម៌

បញ្ជាក់សីលធម៌គឺទាក់ទងដល់ការប៉ាន់ស្មានលើចំណុច (point estimation) ប៉ាន់គំរូ (sample size) និងចន្លោះជឿជាក់ (confidence interval) ។ បើយើងខកខានមិនបានរាយការណ៍អំពីចន្លោះជឿជាក់ធ្វើឲ្យអ្នកអានយកចិត្តទុកដាក់តែការប៉ាន់ស្មានលើចំណុចឬចាប់អារម្មណ៍តែតម្លៃមធ្យមតែប៉ុណ្ណោះ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខូចការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើបំណែងចែកចំនួនសកល។

សេចក្តីសង្ខេប

ជំពូកនេះបានពិភាក្សាអំពីការប៉ាន់ស្មានលើចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យម និងសមាមាត្ររបស់ចំនួនសកល ព្រមទាំងចំនួនប៉ាន់គំរូដែលចាំបាច់សម្រាប់ការប៉ាន់ស្មាននោះ។ ករណីគម្លាតស្តង់ដារដឹងអ្នកប្រើ Z ហើយករណីមិនដឹងអ្នកប្រើបំណែងចែកអក្សរធី។ លើពីនេះអ្នកក៏បានសិក្សាផងដែរអំពីការប៉ាន់ស្មានទៅលើចន្លោះជឿជាក់ដែលអនុវត្តទៅលើបញ្ហាសរុបនិងការត្រួតពិនិត្យគុណភាព។

សំនួរនិងលំហាត់

I. សំនួរ

1. ហេតុអ្វីបានអ្នកមិនដែលឮគេប្រើប្រាស់ចន្លោះជឿជាក់ 100% ដើម្បីប៉ាន់ស្មានចំនួនសកលដែលគេចាប់អារម្មណ៍?
2. តើពេលណាទើបអ្នកអាចប្រើបំណែងចែកអក្សរធី (t) ដើម្បីបង្កើតចន្លោះជឿជាក់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកល?
3. ស្ថានភាពបែបណាទើបអ្នកប្រើចន្លោះជឿជាក់តែម្ខាងជំនួសចន្លោះជឿជាក់ទាំងសង្វាង?
4. ពេលណាអ្នកចង់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅលើចំនួនសកលសរុប ជំនួសតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកល?
5. តើការប៉ាន់ស្មានលើតម្លៃលំអៀងខុសពីការប៉ាន់ស្មានលើតម្លៃមធ្យមយ៉ាងដូចម្តេច?

II. លំហាត់

6. ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណាយទៅលើអាហារពេលថ្ងៃត្រង់របស់បុគ្គលិកធនាគារចំនួន 10 នាក់ (គិតជាដុល្លារ)

តម្លៃ	7.38	8.46	5.03	6.45	8.47	4.20	6.50	5.86	7.54	9.87
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- a. ចូលបង្កើតចន្លោះជឿជាក់ 95% ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានចំនួនមធ្យមរបស់ចំនួនសកលនៃបរិមាណចំណាយសម្រាប់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ ដោយសន្មតថា បំណែងចែកមានលក្ខណៈធម្មតា

- b. ចូលធ្វើការបកស្រាយចន្លោះជឿជាក់នៅក្នុងសំនួរ (a)

8. បើអ្នកចង់បានចន្លោះជឿជាក់ 95% ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅលើតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកល ដែលស្ថិតនៅកំរិតអ៊ែរី ± 5 និងគម្លាតស្តង់ដារស្មើ 15 ចូលគណនាចំនួនប៉ាន់ស្មានតម្លៃដែលត្រូវការក្នុងការប៉ាន់ស្មាន នេះ។

9. ការស្ទង់មតិមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីចង់ដឹងអំពីចំណាយទៅលើសេវាសុខភាពរបស់គ្រួសារ នីមួយៗនៅក្នុងភ្នំពេញ។ អ្នកធ្វើការស្ទង់មតិចង់ដឹងនៅចន្លោះជឿជាក់ 95% ទៅលើការចំណាយនេះ។ ការ សិក្សាពីមុនមកបញ្ជាក់ថា គម្លាតស្តង់ដារគឺប្រហែល 200 ដុល្លារ។ បើអ្នកធ្វើការស្ទង់មតិចង់ឲ្យកំរិតអ៊ែរី ± 25 ដុល្លារ តើចំនួនប៉ាន់ស្មានតម្លៃដែលត្រូវការគឺប៉ុន្មានសម្រាប់ការសិក្សានេះ?

10. អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ចង់ប៉ាន់ស្មានលើចំណាយជាមធ្យមនៃថ្ងៃអាគ្នីសនីប្រចាំខែសម្រាប់គ្រួសារ នីមួយៗនៅខណ្ឌមួយរបស់រាជធានីភ្នំពេញ។ កន្លងមកធ្លាប់មានការសិក្សានៅខណ្ឌដ៏ទៃ ដែលមានគម្លាត ស្រង់ដារ 25 ដុល្លារ។ គាត់ចង់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានក្នុងចន្លោះជឿជាក់ 99% ទៅលើចំណាយជាមធ្យម ហើយនៅ ចន្លោះអ៊ែរី ± 5 ដុល្លារ។

a. តើចំនួនប៉ាន់ស្មានតម្លៃដែលត្រូវការគឺប៉ុន្មានសម្រាប់ការសិក្សានេះ?

b. បើចន្លោះជឿជាក់ 95% ត្រូវបានសំរេចយក តើចំនួនប៉ាន់ស្មានតម្លៃដែលត្រូវការគឺប៉ុន្មានសម្រាប់ការសិក្សា នេះ?

11. ក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកចំនួន 5000 នាក់ ចង់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅលើចំណាយប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់សេវាសុខភាពរបស់គ្រួសារបុគ្គលិកនីមួយៗ ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនងាយស្រួលងាយធ្វើគម្រោងធានារ៉ាប់រង លើសេវាសុខភាពរបស់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន។ បុគ្គលិកចំនួន 10 នាក់ត្រូវបានសាកសួរដោយចៃដន្យ បាន បង្ហាញចំណាយលើសេវាសុខភាពសម្រាប់ឆ្នាំកន្លងមកដូចតទៅ៖

ចំណាយ	120	365	246	155	500	208	173	425	316	180
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ចូលបង្កើតចន្លោះជឿជាក់ 90% ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅលើចំណាយទៅលើសេវាសុខភាពសរុប របស់បុគ្គលិកទាំងអស់កាលពីឆ្នាំមុន។

12. សាវនករម្នាក់បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើវិក័យប័ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ ដោយយកប៉ាន់ស្មានចំនួន 160 ចេញពីវិក័យប័ត្រសរុបចំនួន 5,000 ហើយបានរកឃើញថា មានការកត់ត្រាលំអៀង (លើស) ចំនួន 14 វិក័យប័ត្រ ហើយបរិមាណដែលលើសត្រូវបានកត់ត្រាជាដុល្លារដូចខាងក្រោម៖

Amount	28.60	20.32	97.36	200.63	104.18	84.92	98.76
	76.10	26.50	130.43	88.32	47.81	89.01	90.50

ចូលធ្វើការប៉ាន់ស្មានបរិមាណដុល្លារសរុបដែលបានកត់ត្រាលើសនៅចន្លោះជឿជាក់ 99% ។

13. មន្ត្រីសវនកម្មមួយក្រុមបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើទៅលើវិក័យប័ត្រចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ ដោយធ្វើការជ្រើសរើសប៉ាន់ស្មានចំនួន 200 ចេញពីចំនួនសកល 10,000 វិក័យប័ត្រ។ តាមស្តង់ដារអនុគ្រោះ របស់សវនកម្មគឺ 0.05។ ក្រុមសវនករ បានរកឃើញថា មានវិក័យប័ត្រចំនួន 15 បានបំពានលើស្តង់ដារដែល បានកំណត់។

- a. ចូលគណនាចន្លោះជឿជាក់ 95% ផ្នែកខាងស្តាំ (the upper bound) ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មាននូវអាត្រាមិនគោរពតាមស្តង់ដារអនុគ្រោះ។
 - b. ដោយផ្អែកលើចំណេះដឹង (a) តើក្រុមសវនករគួរសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចម្តេច ?
14. ការស្ទង់មតិមួយបានធ្វើទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ញែកប្រាក់ចំនួន 1,000 នាក់ ដោយរកឃើញថា 70% បានធ្វើការផ្ទេរតាមរយៈភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់ និង 50% បានផ្ទេរតាមរយៈទូរស័ព្ទ។
- a. ចូលប្រើចន្លោះជឿជាក់ 95% ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានលើសមាមាត្ររបស់ចំនួនសកលរបស់អ្នកផ្ទេរប្រាក់តាមភ្នាក់ងារ។
 - b. ចូលប្រើចន្លោះជឿជាក់ 95% ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានលើសមាមាត្ររបស់ចំនួនសកលរបស់អ្នកផ្ទេរប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ។
 - c. ចូលសរសេរលទ្ធផលសង្ខេបនៃចំណេះដឹង (a) និង (b)។

ជំពូកទី 7

ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មសម្រាប់ប៉ាន់ស្មានតែមួយ

(One-sample Hypothesis Testing)

គោលបំណង

- គោលការណ៍គ្រឹះនៃការធ្វើតេស្តសម្មតិកម្មនិងនីតិវិធី

- ការធ្វើតេស្តលើតម្លៃមធ្យម និងសមាមាត្រ
- លក្ខខណ្ឌចំពោះនីតិវិធីនៃការធ្វើតេស្តនីមួយៗ និងរបៀបវាយតម្លៃលើលក្ខខណ្ឌ
- ការចៀសវាងកំហុសក្នុងការធ្វើតេស្តសម្មតិកម្ម

7.1 នីតិវិធីសំខាន់នៃការធ្វើតេស្តសម្មតិកម្ម

ការធ្វើតេស្តសម្មតិកម្មគឺជានីតិវិធីមួយដែលពឹងផ្អែកលើភស្តុតាងចេញពីប៉ាន់ស្មាននិងទ្រឹស្តីនៃប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីកំណត់ថា ការអះអាងអំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រណាមួយរបស់ចំនួនសកលគួរតែបដិសេធ ឬមិនបដិសេធ។ ឧទាហរណ៍ ចៅសង្កាត់ម្នាក់បានអះអាងថា “គ្រួសារនីមួយៗក្នុងឃុំរបស់គាត់ មានម៉ូតូពីរគ្រឿងជាមធ្យមក្នុងមួយគ្រួសារ” នេះគឺជាសម្មតិកម្ម។

ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មគឺអាចត្រូវបានបែងចែកប្រាំជំហានដូចតទៅ៖

1. កំណត់សម្មតិកម្មមោឃៈនិង សម្មតិកម្មជំរើស

ជំហានដំបូងនៃការធ្វើតេស្តគឺយើងត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណសម្មតិកម្មដែលអះអាងថា ប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្មើទៅនឹងតម្លៃណាមួយ សម្មតិកម្មនេះហៅថាសម្មតិកម្មមោឃៈ ឬសូន្យ (null hypothesis) ដែលសរសេរកាត់ H_0 ។ វាគឺជាស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមាន (status quo) ហើយគេអាចសរសេរជាប្រយោគ ឬជាលេខក៏បាន។ ឧទាហរណ៍ (1) H_0 : មនុស្សគ្រប់រូបសន្មត់ថាគ្មានទោស, (2) $H_0: \mu = 2$ (ម៉ូតូពីរគ្រឿង)។ បន្ទាប់ពីសម្មតិកម្មមោឃៈត្រូវបានបញ្ជាក់ គេត្រូវសរសេរសម្មតិកម្មជំរើស ឬផ្លាស់ (alternative hypothesis, H_1) ដែលជាសម្មតិកម្មផ្ទុយពីសម្មតិកម្មមោឃៈ ឧទាហរណ៍ $H_A \neq 2$ (ម៉ូតូពីរគ្រឿង)។

ជាទូទៅសម្មតិកម្មមោឃៈមានបីប្រភេទ៖

សម្មតិកម្មមោឃៈ	សម្មតិកម្មជំរើសឬផ្លាស់
$H_0: \mu = 2$ (ម៉ូតូពីរគ្រឿង)	$H_A \neq 2$ (ម៉ូតូពីរគ្រឿង)
$H_0: \mu \geq 2$ (ម៉ូតូពីរគ្រឿង)	$H_A: \mu < 2$ (ម៉ូតូពីរគ្រឿង)
$H_0: \mu \leq 2$ (ម៉ូតូពីរគ្រឿង)	$H_A: \mu > 2$ (ម៉ូតូពីរគ្រឿង)

លក្ខណៈទូទៅនៃសម្មតិកម្មមោឃៈគឺសំគាល់ដោយសញ្ញាស្មើ ដូចជា $=, \geq$ ឬ $\leq$

2. ការកំណត់តម្លៃអាល់ហ្វា ឬកំរិតសារៈសំខាន់

ជំហានទីពីរគឺយើងត្រូវកំណត់នូវកំរិតសារៈសំខាន់ (level of significance) ដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើតេស្ត។ កំរិតសារៈសំខាន់ គឺជាប្រូបាប៊ីលីតេដែលធ្វើការបដិសេធ H_0 ពេលដែលសម្មតិកម្មមោឃៈនោះពិត ហើយវាត្រូវបានតាងដោយ α ។ ជាទូទៅតម្លៃ α គឺនៅចន្លោះពី 0 ទៅ 1 ហើយតម្លៃ α ដែលត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់មាន បីកំរិត 10%, 5% និង 1%។ ជាទូទៅ $\alpha = 1\%$ គឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងគុណភាព $\alpha = 5\%$ សម្រាប់ការសិក្សាលើផ្នែកទីផ្សារ និង $\alpha = 10\%$ គឺសម្រាប់ការស្ទង់មតិលើការបោះឆ្នោត។

3. ការកំណត់ប្រភេទតេស្តនិងតម្លៃស្ថិតិគោល

ដើម្បីធ្វើការតេស្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អ្នកត្រូវកំណត់ថា ប្រភេទតេស្តមួយណាដែលត្រូវប្រើតួយ៉ាងដូចជា t , ឬ Z , F ឬ χ^2 ជាដើម។ ការជ្រើសរើសប្រភេទតេស្តយកមកប្រើគឺអាស្រ័យលើប្រភេទទិន្នន័យ

និងការសន្មត់ប្រភេទទី២។ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ប៉ាន់តម្លៃដែលមានមួយអថេរ ហើយការធ្វើតេស្តទៅលើតម្លៃមធ្យម បើយើងសន្មត់ថាគម្លាតស្តង់ដារដឹងគឺប្រើ Z-test ហើយបើគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹងគឺប្រើ t-test។

បន្ទាប់ពីដឹងថាប្រភេទតេស្តណាមួយនឹងត្រូវប្រើ ជំហានបន្ទាប់គឺរកតម្លៃស្ថិតិគោល (critical value) ។ តម្លៃស្ថិតិគោល គឺជាចំណុចមួយនៃបំណែងចែកតំបន់បដិសេធ និងមិនបដិសេធ។ ហើយវាក៏ជាតម្លៃដែលតម្លៃតេស្តស្ថិតិត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយ ដើម្បីសំរេចថាត្រូវបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈ (H_0) ឬមិនបដិសេធទេ។ តម្លៃស្ថិតិគោលគឺអាស្រ័យទៅនឹងកំរិតសារៈសំខាន់ α និងការធ្វើតេស្តសងខាង ឬកន្ទុយតែម្ខាង។ ឧទាហរណ៍ បើសិនជា កំរិតសារៈសំខាន់ឬ $\alpha = 5\%$ ត្រូវបានជ្រើសរើស យើងនឹងបានតម្លៃស្ថិតិគោលពីតារាងបំណែងចែកធម្មតាសម្រាប់កន្ទុយម្ខាងគឺ $Z_c = 1.645$ (រូប 7.1) និងសម្រាប់កន្ទុយសង្វាងគឺ $Z_c = 1.96$ (រូប 7.2)

4. គណនាតម្លៃតេស្តស្ថិតិ

តម្លៃតេស្តស្ថិតិ(test statistic)គឺជាតម្លៃមួយដែលត្រូវបានគណនាចេញពីប៉ាន់តម្លៃ ហើយវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ថាតើបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈដែរឬអត់ តាមរយៈការប្រៀបធៀបតម្លៃតេស្តនេះទៅនឹងតម្លៃស្ថិតិគោលនៅក្នុងជំហានទី៤។ ចំណុចខុសគ្នារវាង តេស្តស្ថិតិ (test-statistic) ស្ថិតិគោល (critical value) គឺថា ដើម្បីបានតម្លៃតេស្តស្ថិតិ គេត្រូវប្រមូលទិន្នន័យរួចយកមកគណនា ដោយឡែក ដើម្បីបានតម្លៃស្ថិតិគោល គេត្រូវមើលតារាងស្ថិតិ។ ជាទូទៅការតេស្តសម្មតិកម្មសម្រាប់ប៉ាន់តម្លៃតែមួយគឺមានតេស្តពីរប្រភេទដែលអាចប្រើបានគឺ z-test និង t-test ។ z-test គឺត្រូវបានប្រើក្នុងករណីដែលគម្លាតស្តង់ដារដឹង (known σ) ហើយមានរូបមន្តដូច (7.1) ហើយ t-test ត្រូវបានប្រើក្នុងករណីដែលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង (unknown σ)។

z-test មានរូបមន្តដូច (7.2) និង t-test មានរូបមន្តដូច (7.1) ។

$$Z - statistic = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad (7.1)$$

$$t - statistic = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad (7.2)$$

5. ការកំណត់អំពីវិធាននៃការធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត

បើសិនតម្លៃជាប់ខាតរបស់តេស្តស្ថិតិ (test-statistic) ធំជាងតម្លៃជាប់ខាតរបស់ស្ថិតិគោល (critical value) គឺ H_0 ត្រូវបានបដិសេធ និងផ្ទុយមកវិញ បើសិនតម្លៃជាប់ខាតតេស្តស្ថិតិតូចជាងតម្លៃស្ថិតិគោល គឺ H_0 មិនត្រូវបដិសេធទេ។


i) ការធ្វើតេស្តកន្ទុយម្ខាង (one-tailed test)

ការធ្វើតេស្តកន្ទុយម្ខាង ជួនកាលអាចជាកន្ទុយខាងស្តាំ ឬកន្ទុយខាងឆ្វេង គឺអាស្រ័យលើសម្មតិកម្មឧបមាថា ចោលផ្កាតម្កាក់បានអះអាងថា “គ្រួសារនីមួយៗក្នុងភូមិរបស់គាត់មានម៉ូតូពីរយ៉ាងតិច” ($H_0 \geq 2$) ការធ្វើតេស្តគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្ទុយខាងឆ្វេង។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បើគាត់អះអាងថា “គ្រួសារនីមួយៗក្នុងភូមិរបស់គាត់មានម៉ូតូពីរយ៉ាងច្រើន” ($H_0 \leq 2$) ការធ្វើតេស្តគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្ទុយខាងស្តាំវិញម្តង។ ហេតុអ្វី? ពីព្រោះថា អ្នកសិក្សា ឬអ្នកធ្វើតេស្តជានិច្ចកាលតែងតែចង់បដិសេធនូវសម្មតិកម្ម H_0 ដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃរបស់គេ។ មានវិធីមួយទៀតដែលងាយចំណាំជាងនេះគឺការធ្វើតេស្តកន្ទុយខាងឆ្វេងត្រូវបានគេប្រើបើសិនតម្លៃ test-


statistic អវិជ្ជមាន ហើយផ្ទុយមកវិញការធ្វើតេស្តកន្ទុយខាងស្តាំត្រូវបានគេប្រើបើសិនតម្លៃ test-statistic វិជ្ជមាន វិធីសាស្ត្រនេះលុះត្រាតែអ្នកធ្វើការគណនា t-statistic រួចទើបដឹង។

- a. **ការធ្វើតេស្តកន្ទុយខាងស្តាំ** (right or upper tailed test): ឧបមាថា អាល់ហ្វាត្រូវបានគេជ្រើសរើស នូវកំរិត 5% តម្លៃស្ថិតិគោល (critical value) គឺ $Z_c = 1.645$ (មើរូប 7.1) ហើយបើតម្លៃ Z-statistic ធំជាង 1.645 (នៅខាងស្តាំដៃ 1.645) យើងបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈ (H_0) ហើយផ្ទុយ មកវិញ បើតម្លៃ Z-statistic តូចជាង 1.645 (នៅខាងឆ្វេងដៃ 1.645) គឺសំរេចចិត្តមិនបដិសេធនោះ (H_0) នូវកំរិតអាល់ហ្វា 5%។
- b. **ការធ្វើតេស្តកន្ទុយខាងឆ្វេង** (left or lower-tailed test): ឧបមាថា អាល់ហ្វាត្រូវបានគេជ្រើសរើស នូវកំរិត 5% ហើយការធ្វើតេស្តគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្ទុយខាងឆ្វេងវិញម្តង (រូប 7.2) គឺតម្លៃ Z-critical = -1.645។ បើ Z-statistic < -1.645 សម្មតិកម្មមោឃៈត្រូវបានបដិសេធនៅកំរិតអាល់ហ្វា 5% ហើយ ផ្ទុយមកវិញ Z-statistic > -1.645 គឺសម្មតិកម្មមោឃៈមិនត្រូវបានបដិសេធនោះឡើយ។

រូប 7.1 បំណែងចែក របស់ Z នៅកំរិតសំខាន់ $\alpha=5\%$ កន្ទុយស្តាំ




រូប 7.2 បំណែងចែក របស់ Z នៅកំរិតសំខាន់ $\alpha=5\%$ កន្ទុយឆ្វេង



ii) ការធ្វើតេស្តកន្ទុយសងខាង (two-tailed test)

បើសិនអាល់ហ្វាត្រូវបានគេជ្រើសរើសនូវកំរិត 5% សម្រាប់ការធ្វើតេស្តកន្ទុយសងខាង តម្លៃស្ថិតិគោល (critical value) $Z_c = \pm 1.96$ (មើរូប 7.3)។ បើតម្លៃដាច់ខាត Z-statistic នៅក្នុងរូបមន្ត (7.1) ធំជាងតម្លៃដាច់ខាត 1.96 គឺយើងបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈ (H_0) និងផ្ទុយមកវិញ បើតម្លៃដាច់ខាត Z-statistic តូចជាងដាច់ខាត 1.96 ឬ តម្លៃ Z-statistic នៅចន្លោះ $= \pm 1.96$ គឺសំរេចបិទមិនបដិសេធ (H_0) នូវកំរិតអាល់ហ្វា 5%។

រូប 7.3 បំណែងចែក របស់ Z នៅកំរិតសំខាន់ $\alpha=5\%$ កន្ទុយសង្វាង



7.2 ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មកន្ទុយសងខាង

7.2.1 ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មកន្ទុយសងខាងពេលគម្លាតស្តង់ដារដឹង

ក្នុងករណីដែលគម្លាតស្តង់ដារដឹង យើងប្រើ Z-test ហើយបើករណីដែលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង យើងប្រើ t-test (t-test និងវិភាគនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ)។

ឧទាហរណ៍ 7.1 សិប្បកម្មផលិតជបទឹកមួយប្រភេទដែលធ្វើពីដើមឬស្សីបានកំពស់តាមស្តង់ដារសកលគិតជាមធ្យមគឺ 30.15 សង់ទីម៉ែត្រ និងគម្លាតស្តង់ដារ $\sigma = 0.8$ សង់ទីម៉ែត្រ។ ប៉ាន់គំរូចំនួន 100 ត្រូវបានគេប្រមូល ហើយបានផ្តល់នូវកំពស់ជាមធ្យម 30 សង់ទីម៉ែត្រ ។ តើការផលិតនេះគោរពតាមស្តង់ដារសកលដែរ ឬទេ?

ចម្លើយ:

i) ការប្រើតេស្តស្ថិតិ

1. កំណត់សម្មតិកម្មមោឃៈនិង សម្មតិកម្មជំនួស

$$H_0: \mu = 30.15 \text{ សង់ទីម៉ែត្រ} \quad H_1: \mu \neq 30.15 \text{ សង់ទីម៉ែត្រ} \quad (\text{តេស្តកន្ទុយសង្វាង})$$

2. ការកំណត់តម្លៃអាស់ហ្វា ឬកំរិតសារៈសំខាន់

សន្មត់ថា $\alpha=0.05$ ត្រូវបានគេជ្រើសរើស សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះ និង $n=100$ (ទិន្នន័យនៅក្នុង Table 7.1)

3. ការកំណត់តម្លៃស្ថិតិគោល និងប្រភេទតេស្ត

ដោយសារ $\alpha=0.05$ តាមតារាង the Standard Normal Distribution យើងបានតម្លៃស្ថិតិគោល $Z\text{-critical} = \pm 1.96$


4. គណនាតម្លៃតេស្តស្ថិតិ

បើគម្លាតស្តង់ដារដឹងយើងប្រើ Z-test, $n=100$, $\sigma=0.8$, $\bar{X}=30$, $\mu=30.15$ ជំនួសចូល រូមន្ត (7.1) យើងបាន $Z\text{-statistic} = \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{30-30.15}{\frac{0.8}{\sqrt{100}}} = -1.875$

5. ការកំណត់អំពីវិធាននៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

បើសិនតម្លៃដាច់ខាតរបស់ Z-test តូចជាង 1.96 មិនបដិសេធ H_0 ក៏ប៉ុន្តែបើតម្លៃដាច់ខាតរបស់ Z-test ធំជាង 1.96 បដិសេធអ H_0

ក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើង $Z\text{-statistic} = -1.875$ តូចជាង $Z\text{-critical} = -1.96$ ស្ថិតនៅតំបន់មិនបដិសេធ (រូប 7.4)



ដោយសារ $Z_{Stat} = -1.875 < -1.96$ សម្មតិកម្មមោឃៈមិនត្រូវបានបដិសេធ ដូច្នេះយើងសន្និដ្ឋានថា មានភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថា កំពស់ដបជាមធ្យមគឺខុសពី 30.15 cm នោះទេ (insufficient evidence that true mean of the bamboo bottle's height is different from 30.15 cm)។

i) ការប្រើតម្លៃកំរិតរំលាយ (p-value)

ក្រៅពីវិធីសាស្ត្រប្រៀបធៀបតម្លៃ Z_{Stat} ទៅនឹងតម្លៃ $Z\text{-critical}$ យើងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈ ឬមិនត្រូវបដិសេធ គួរយ៉ាងដូចជា ការគណនាចន្លោះជឿជាក់ និងការមើលតម្លៃ p-value ជាដើម។ សម្រាប់ពេលនេះគឺយើងពិភាក្សាតម្លៃ p-value

ជាមុនសិន។ បើសិនជាតម្លៃ p តូចជាងអាល់ហ្វា ($p < \alpha$) យើងបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈ ហើយផ្ទុយមកវិញបើ $p > \alpha$ យើងមិនបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈនោះឡើយ។

p -value ត្រូវបានឲ្យនិយមន័យថា ជាប្រូបាប៊ីលីតេដែលបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈ (H_0)។ វាគឺជាផ្ទៃខាងចុងបំផុតនៃរូប បើនិយាយឆ្ងាយយល់ (ឧទាហរណ៍ Z-test) p -value គឺបង្ហាញអំពីទីតាំងរបស់ Z_{Stat} ថាតើវានៅត្រង់ណានៃទីតាំងណាមួយនៃ Z -critical? បើ p -value តូចជាងអាល់ហ្វា ($p < \alpha$) Z_{Stat} ស្ថិតនៅតំបន់បដិសេធហើយផ្ទុយមកវិញ បើ p -value ធំជាងអាល់ហ្វា ($p > \alpha$) Z_{Stat} ស្ថិតនៅតំបន់មិនបដិសេធា។ ជាទូទៅតម្លៃ Z_{Stat} កាន់តែធំ p -value កាន់តែតូច កាន់តែបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈ (H_0) (មើលរូប 7.4)។

ឥឡូវយើងពិនិត្យឧទាហរណ៍ 7.1 របស់យើងឡើងវិញ $Z_{Stat} = -1.87$ ហើយបើយើងមើលតារាង The Cumulative Standardized Normal Distribution (ដូចបានបង្ហាញក្នុងតារាង 7.1) យើងនឹងទទួលបានតម្លៃ p -value = 0.0307 ដោយសារយើងតេស្តសងខាង តម្លៃ p -value ត្រូវគុណនឹង $2 * 0.0307 = 6.14\% > \alpha = 5\%$ ដូច្នេះ យើងមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈនោះទេ¹⁴។




តារាង 7.1 The Cumulative Standardized Normal Distribution

Z	0.00	0.01	...	...	0.07	0.08	0.09
-6.0	...	...	...	...	...	...	...
-5.5	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
-1.9	...	...	...	...	...	...	...
-1.8	...	...	...	...	0.0307	0.0301	0.0204
...	...	...	...	...	...	...	...

រូប 7.4 តម្លៃ p -value ពេល Z -statistic = -1.875

¹⁴ តារាង The Cumulative Standardized Normal Distribution គឺជាតារាងដែលផ្តល់ប្រូបាប៊ីលីតេនៃក្នុងមួយទេ ហើយបើយើងធ្វើការតេស្តក្នុងមួយខាង យើងត្រូវយកតម្លៃក្នុងតារាងនេះគុណនឹងពីរ រួចធៀបវាទៅនឹងតម្លៃអាល់ហ្វា។ ហើយក្នុងករណីធ្វើការតេស្តក្នុងមួយខាង យើងអាចយកតម្លៃក្នុងតារាង The Cumulative Standardized Normal Distribution ធៀបជាមួយអាល់ហ្វាតែម្តង មិនបាច់គុណនឹង 2 នោះទេ។



ii) ការប្រើចន្លោះជឿជាក់

ដូចដែលបញ្ជាក់ពីខាងលើខ្លះមកហើយ ក្រៅពីមើលតម្លៃ p-value យើងអាចមើលទៅលើចន្លោះជឿជាក់ ដើម្បីកំណត់ថាតើសម្មតិកម្មមោឃៈនិងត្រូវបានបដិសេធ ឬយ៉ាងណា។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍ 7.1 របស់យើង $\bar{X} = 30$, $\sigma = 0.8$, $n = 100$ ។ រូបមន្តចន្លោះជឿជាក់ជំពូក 6 សមីការ (6.1) ៖

$$\begin{aligned}\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} &\leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ 30 - 1.96 \frac{0.8}{\sqrt{100}} &\leq \mu \leq 30 + 1.96 \frac{0.8}{\sqrt{100}} \\ 29.8432 &\leq \mu \leq 30.1568\end{aligned}$$

ដោយហេតុថា ចន្លោះជឿជាក់នេះមានតម្លៃសម្មតិកម្មមោឃៈ ($\mu = 30.15$) ដូច្នេះយើងមិនបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈនូវកំរិត $\alpha = 5\%$ នោះទេ។

សរុបមក ដើម្បីពិនិត្យទៅលើលទ្ធផលនៃការតេស្តសម្មតិកម្ម យើងមានជំរើសបី ៖ ទីមួយ គឺយើងយកតម្លៃ test-statistic ធៀបជាមួយតម្លៃ critical-value ទីពីរគឺយកតម្លៃ p-value ធៀបជាមួយតម្លៃអាល់ហ្វា និងទីបីគឺពិនិត្យទៅលើចន្លោះជឿជាក់។ ជំរើសទាំងបីនេះគឺផ្តល់នូវចំណេះដឹងតែមួយ ប៉ុន្តែ p-value មានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាង។

7.2.2 ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មក្នុងសង្ខេបពេលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង

ក្នុងជីវភាពជាក់ស្តែង គម្លាតស្តង់ដារភាគច្រើនគឺមិនដឹង។ ក្នុងករណីដែលគម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង យើងអាចប្រើ t-test ជំនួស Z-test វិញ។

ឧទាហរណ៍ 7.2 របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរណ៍មួយបានអះអាងថា តម្លៃសណ្ឋាគារថ្នាក់កណ្តាលនៅក្រុងសៀមរាបគិតជាមធ្យមគឺ \$66 ក្នុងមួយយប់។ ដើម្បីតេស្តទៅលើអំណះអំណាងនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង បានប្រមូលទិន្នន័យទៅលើសណ្ឋាគារថ្នាក់កណ្តាលចំនួន 25 ហើយបានរកឃើញថា តម្លៃសណ្ឋាគារនៅក្រុងសៀមរាប ជាមធ្យមគឺ $\bar{X} = \$72.50$ ក្នុងមួយយប់ ហើយគម្លាតស្តង់ដារ $S = \$15.41$ (ទិន្នន័យនៅក្នុង Table 9.2)។ បន្ទាប់មកគាត់ក៏ធ្វើការតេស្តទៅលើសម្មតិកម្មនេះ។

ដោយសារតែគម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកលមិនបានដឹង (σ unknown) ហើយយើងមានតែគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់តម្លៃប៉ុណ្ណោះ ($S=\$15.41$)។ ដូច្នេះ t-test នឹងត្រូវបានប្រើជំនួស Z-test វិញ។ ចំណែកដំណើរការក្នុងការធ្វើតេស្តនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹង Z-test ដែរ៖

ចំឡើយ៖

i) ការប្រើតេស្តស្ថិតិ

1. កំណត់សម្មតិកម្មមោឃៈនិង សម្មតិកម្មជំនួស

$$H_0: \mu = \$66 \quad H_1: \mu \neq \$66 \quad (\text{តេស្តកន្ទុយសងខាង})$$


2. ការកំណត់តម្លៃអាល់ហ្វា ឬកំរិតសារៈសំខាន់

សន្មតថា យើងសំរេចយក $\alpha=0.05$ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះ

3. ការកំណត់ប្រភេទតេស្តនិងតម្លៃស្ថិតិគោល

ដោយសារតែគម្លាតស្តង់ដារមិនបានដឹង ហើយយើងដឹងតែគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់តម្លៃ $S=\$15.41$ ដូច្នេះតេស្តដែលត្រូវប្រើគឺ t-test។ បើសិន $\alpha=0.05$ ហើយ t មាន $df = n-1 = 25-1 = 24$ មើលតារាងបំណែងចែកអក្សរ t (តារាង 7.2 ខាងក្រោម) ត្រង់ចំណុចប្រសព្វគ្នារវាង $df=24$ និង ប្រូបាប៊ីលីតេកន្ទុយខាងស្តាំ 0.025 យើងនឹងបានតម្លៃស្ថិតិគោល $t\text{-critical} = 2.0639$

តារាង 7.2 Critical Values of t



Degrees of Freedom	Cumulative Probabilities					
	0.75	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
	Upper-Tail Areas					
	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
.....						
24	0.6848	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.6844	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874


4. គណនាតម្លៃតេស្តស្ថិតិ

ចំនួនប៉ាន់តម្លៃ $n=25$, $S=\$15.41$, $\bar{X} = \$72.50$ និង $\mu = \$66$

$$\text{យើងប្រើរូបមន្ត (7.2) } t\text{-statistic} = \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \frac{72.50-66}{\frac{15.41}{\sqrt{25}}} = 2.1090$$

5. ការកំណត់អំពីវិធាននៃការធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត

រូប 7.5 តម្លៃ $t_{0.025,24} = 2.0639$ និង $t\text{-statistic} = 2.1090$



បើតម្លៃដាច់ខាតរបស់ t-test តូចជាងតម្លៃដាច់ខាតរបស់ 2.0639 មិនបដិសេធ H_0 ក៏ប៉ុន្តែបើ តម្លៃដាច់ខាតរបស់ t-test ធំជាងតម្លៃដាច់ខាតរបស់ 2.0639 បដិសេធ H_0

តាមរយៈរូប 7.5 បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា តម្លៃ t-statistic (2.1090) ធំជាងតម្លៃ t-critical (2.0639) យើងបដិសេធ H_0 ។ ដូច្នេះ យើងសន្និដ្ឋានថា មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា តម្លៃ បន្ទប់របស់សណ្ឋាគារថ្នាក់កណ្តាលគឺខុសពី \$66 ដុល្លាក្នុងមួយយប់ ហើយរបាយការណ៍នោះមិនត្រឹម ត្រូវនោះទេ។

ii) ការប្រើវិធីសាស្ត្រក្តីវិលយូ (p-value)

ដោយសារតម្លៃ t-statistic = 2.1090 ហើយតម្លៃតេស្តនេះមាន df=24 តាមតារាង Excel យើងបានតម្លៃក្តីវិលយូ $p = 0.0456 < 0.05$ ដូច្នេះយើងបដិសេធ H_0 ។

iii) ការប្រើចន្លោះជឿជាក់ (confidence interval)

សូមរំលឹកថា នៅជំពូកទី៦ យើងធ្លាប់ដឹងរូបមន្តចន្លោះជឿជាក់រួចមកហើយ សម្រាប់ពេលនេះ យើងយករូបមន្តនោះមកអនុវត្តទីនេះតែម្តង។

ឥឡូវនេះយើងពិនិត្យឧទាហរណ៍ 7.2 របស់យើងឡើងវិញ។ $n=25$, $S=\$15.41$, $\bar{X} = \$72.50$ ។ ប្រសិន $\alpha=0.05$ ហើយ t មាន df= $n-1 = 25-1 = 24$ តាមរយៈតារាងបំណែងចែកអក្សរ t (កន្ទុយសងខាង) យើងនឹងបានតម្លៃស្ថិតិគោល t-critical = 2.0639


$$\begin{aligned} \bar{X} - t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} &\leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} & (6.2) \\ 72.50 - 2.0639 \frac{15.41}{\sqrt{25}} &\leq \mu \leq 72.50 + 2.0639 \frac{15.41}{\sqrt{25}} \\ \$66.14 &\leq \mu \leq \$78.86 \end{aligned}$$

ដោយហេតុថា 95% នៃតម្លៃបន្ទប់សណ្ឋាគារថ្នាក់កណ្តាលគឺស្ថិតនៅចន្លោះ \$66.14 ដល់ \$78.86 ហើយចន្លោះនេះពុំមានលេខ 66 នោះឡើយ ដូច្នេះយើងបដិសេធ $H_0: \mu = \$66$ នៅ កំរិត $\alpha=0.05$ ហើយធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចមុន។


7.3 ការធ្វើតេស្តកន្ទុយម្ខាង

ការធ្វើតេស្តកន្ទុយម្ខាង (one-tail tests) ត្រូវបានគេធ្វើឡើងពេលដែលអ្នកសិក្សាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទិសដៅតែម្ខាង។ ការធ្វើតេស្តនេះអាចមានកន្ទុយខាងឆ្វេង ឬខាងស្តាំ វាអាស្រ័យលើសម្មតិកម្មដែលមាន។ ហើយការធ្វើតេស្តនេះទៀតសោតគឺអាចប្រើ t-test ឬ Z-test គឺ អាស្រ័យលើគម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកលដឹងឬមិនដឹង។ ឧបមាថា ចោលសង្កាត់មួយរូបបានអះអាងថា ប្រជាជននៅភូមិតាត់មានម៉ូតូ 2 គ្រឿងយ៉ាងតិចក្នុងមួយគ្រួសារ ($H_0: \mu \geq 2$) ដើម្បីតេស្តទៅលើសម្មតិកម្មនេះ យើងត្រូវតេស្តកន្ទុយខាងឆ្វេង ពីព្រោះថា អ្នកធ្វើតេស្តគឺជាអ្នកដែលមិនយល់ស្រប (បើយល់ស្របគឺមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តនោះទេ) ហើយមានបំណងបដិសេធសម្មតិកម្មនេះ។

រូប 7.6 ការតេស្តកន្ទុយខាងឆ្វេង (lower-tail tests)



រូប 7.7 ការតេស្តកន្ទុយខាងឆ្វេង (upper-tail tests)



ដើម្បីបដិសេធបានលុះត្រាតែគ្រួសារមួយមានម៉ូតូតិចជាង 2 គ្រឿងក្នុងមួយគ្រួសារ ។ បើ $\mu < 2$ គឺកន្ទុយខាងឆ្វេងដូចបង្ហាញក្នុងរូប 7.6។ ហើយបើចោលសង្កាត់រូបនោះបានអះអាងថា ប្រជាជននៅភូមិតាត់មានម៉ូតូ 2 គ្រឿងយ៉ាងច្រើនបំផុតក្នុងមួយគ្រួសារ ($H_0: \mu \leq 2$) ក្នុងករណីនេះ ការធ្វើតេស្តគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្ទុយខាងស្តាំ ដូចបង្ហាញក្នុងរូប 7.7 ដោយសំអាងលើហេតុផលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការធ្វើតេស្តលើកន្ទុយខាងឆ្វេង។

ឧទាហរណ៍ 7.3 t-test កន្ទុយខាងស្តាំ (គម្លាតស្តង់ដារមិនដឹង): ឥឡូវយើងធ្វើការពិនិត្យទៅលើឧទាហរណ៍ 7.2 របស់យើងឡើងវិញ ឧបមាថា របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរណ៍អះអាងថា តម្លៃសណ្ឋាគារ

ថ្នាក់កណ្តាលនៅសៀមរាបយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺ \$66 ក្នុងមួយយប់ ($H_0: \mu \leq \$66$)។ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអំណះអំណាងនេះពិតឬមិនពិត យើងធ្វើការសាកសួរសណ្ឋាគារចំនួន $n=25$, យើងបានតម្លៃមធ្យម $\bar{X} = \$72.50$ ក្នុងមួយយប់ ហើយគម្លាតស្តង់ដារ $S=\$15.41$ (ទិន្នន័យនៅក្នុង Table 9.2) ហើយយើងធ្វើការតេស្តកន្ទុយខាងស្តាំ ហើយនីតិវិធីក្នុងការតេស្តគឺដូចមុន។

i) ការប្រើតេស្តស្ថិតិ

ចំណុចទី១:

1. កំណត់សម្មតិកម្មមេរោយ:និង សម្មតិកម្មជំនួស

$$H_0: \mu \leq \$66 \quad H_1: \mu > \$66 \quad (\text{តេស្តកន្ទុយខាងស្តាំ})$$


2. ការកំណត់តម្លៃអាល់ហ្វា ឬកំរិតសារៈសំខាន់

សន្មត់ថា យើងសំរេចយក $\alpha=0.05$ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះ

3. ការកំណត់ប្រភេទតេស្តនិងតម្លៃស្ថិតិគោល

ដោយសារតែគម្លាតស្តង់ដារមិនបានដឹង ហើយយើងដឹងតែគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ $S=\$15.41$ ដូច្នេះតេស្តដែលត្រូវប្រើគឺ t-test។ បើ $\alpha=0.05$ ហើយ t មាន $df = n-1 = 25-1 = 24$ មើលតារាងបំណែងចែកអក្សរ t (តារាង 7.3 ខាងក្រោម) ត្រង់ចំណុចប្រសព្វគ្នារវាង $df=24$ និងប្រូបាប៊ីលីតេកន្ទុយខាងស្តាំ 0.05 យើងនឹងបានតម្លៃស្ថិតិគោល $t\text{-critical} = 1.7109$

តារាង 7.3 Critical Values of t



Degrees of Freedom	Cumulative Probabilities					
	0.75	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
	Upper-Tail Areas					
	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
.....						
24	0.6848	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.6844	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874


4. គណនាតម្លៃតេស្តស្ថិតិ

ចំនួនប៉ាន់គំរូ $n=25$, $S=\$15.41$, $\bar{X} = \$72.50$ និង $\mu = \$66$

$$\text{យើងប្រើរូបន្ត (7.2) } t\text{-statistic} = \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \frac{72.50-66}{\frac{15.41}{\sqrt{25}}} = 2.1090$$

5. ការកំណត់អំពីវិធាននៃការធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត

រូប 7.8 តម្លៃ $t_{0.05,24} = 1.7109$ និង $t\text{-statistic} = 2.1090$



បើតម្លៃ t-test តូចជាងតម្លៃដាច់ខាតរបស់ 1.7109 មិនបដិសេធ H_0 ហើយបើតម្លៃ t-test ធំជាងតម្លៃ 1.7109 បដិសេធ H_0 ។

លទ្ធផល t-test = 2.1090 > 1.7109 ដូច្នេះយើងបដិសេធ H_0 ហើយសន្និដ្ឋានថា មិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា តម្លៃសណ្ឋាគារថ្នាក់កណ្តាលនៅក្រុងសៀមរាបមានតម្លៃយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺ \$66 នោះទេ។

ii) ការប្រើកំរិតវិវេល (p-value)

ក្រៅពីមើលតម្លៃ t-test ធៀបទៅនឹង t-critical ដើម្បីបដិសេធ H_0 យើងមានវិធីមួយទៀតគឺមើលតម្លៃ p-value របស់ t-test រួចធៀបវាទៅនឹងតម្លៃអាល់ហ្វា។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើងដោយសារ លទ្ធផល t-test = 2.1090 ហើយ t មាន df=24 តាម Excel យើងទទួលបាន p-value = 0.02278 < $\alpha = 0.05$ ¹⁵ ដូច្នេះយើងបដិសេធ H_0 ។

iii) ការប្រើចន្លោះជឿជាក់

ជាទូទៅការធ្វើតេស្តកន្ទុយម្ខាង ទោះជាខាងស្តាំ ឬឆ្វេងក៏ដោយ គឺមានតែវិធីពីរតែប៉ុណ្ណោះ គឺតាមរយៈ test-statistic និង p-value ហើយគេកម្រមើលគណនាចន្លោះជឿជាក់ (confidence interval) ណាស់ លើកលែងតែករណីចាំបាច់ ឧទាហរណ៍ដូចជា សវនកម្ម ឬការត្រួតពិនិត្យគុណភាពដូចបានសិក្សានៅជំពូកមុន។

7.4 តេស្តសម្មតិកម្មលើសមាមាត្រ

សូមរំលឹកថា សមាមាត្រគឺទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលពីរ ឧទាហរណ៍ដូចជា អតិថិជនបើកគណនេយ្យ ឬមិនបើកគណនេយ្យ ទិញឬមិនទិញ យល់ព្រម ឬមិនយល់ព្រម។ល។ ការតេស្តលើសមាមាត្រក៏អាចធ្វើឡើងដោយប្រើកន្ទុយសងខាង ឬម្ខាង ដូចការធ្វើតេស្តសម្រាប់តម្លៃមធ្យមដែរ។

នៅជំពូកទី៦ យើងធ្លាប់ដឹងមកហើយ សមាមាត្រមានរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

$$p = \text{សមាមាត្រនៃប៉ាន់គំរូ} = \frac{x}{n} = \frac{\text{ចំនួនវត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍}}{\text{ចំនួនប៉ាន់គំរូ}} \quad (6.3)$$

¹⁵ ករណីនេះមិនចាំបាច់គុណនឹង 2 ទេពីព្រោះយើងតេស្តកន្ទុយតែម្ខាង

ពេល $X > 5$ ហើយ $n-X > 5$ នោះ p មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល normal distribution ដែលមានតម្លៃមធ្យមនិងគម្លាតស្តង់ដារ¹⁶៖

$$\mu_p = \pi \quad (7.1)$$

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}} \quad (7.2)$$

ដោយសារតែសមាមាត្រនៃប៉ាន់គំរូ p មានបំណែងចែក ប្រហាក់ប្រហែល normal distribution ដូច្នេះ Z-test នឹងត្រូវបានប្រើ៖

$$Z - \text{statistic} = \frac{p - \pi}{\sigma_p} = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}} \quad (7.3)$$

ឧទាហរណ៍ 7.4 ការធ្វើតេស្តលើសមាមាត្រដោយប្រើកន្ទុយសងខាង៖

របាយការណ៍សិក្សាមួយបានអះអាងថា មានសិស្សវិទ្យាល័យចំនួន 15% ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា។ ដើម្បីតេស្តលើអំណះអំណាងនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើសិស្សវិទ្យាល័យចំនួន 500 នាក់ដោយចៃដន្យ ហើយបានរកឃើញថា មានសិស្សចំនួន 30 នាក់ឆ្លើយថាចូលចិត្ត។ សន្មតថា $\alpha = 0.05$ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ តើរបាយការណ៍ខាងលើពិតឬមិនពិត?

ចម្លើយ៖

i) ការប្រើតេស្តស្ថិតិ

1. កំណត់សម្មតិកម្មមោឃៈនិង សម្មតិកម្មជំនួស

$$H_0: \pi = 0.15 \quad H_1: \pi \neq 0.15 \quad (\text{តេស្តកន្ទុយសង្ខាង})$$

2. ការកំណត់តម្លៃអាល់ហ្វា ឬកំរិតសារៈសំខាន់

សន្មតថា យើងសំរេចយក $\alpha = 0.05$ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះ

3. ការកំណត់ប្រភេទតេស្តនិងតម្លៃស្ថិតិគោល

ជាទូទៅការធ្វើតេស្តលើសមាមាត្រ គឺ Z-statistic នឹងត្រូវបានគេប្រើ។ ដោយហេតុថា $x = 30 > 5$ ហើយ $n-X = 470 > 5$ បំណែងចែកសមាមាត្រនេះមានលក្ខណៈ normal ដូច្នេះបើ $\alpha = 0.05$ យើងបានតម្លៃស្ថិតិគោល $Z\text{-critical} = \pm 1.96$

4. គណនាតម្លៃតេស្តស្ថិតិ

$$\text{ចំនួនប៉ាន់គំរូ } n=500, X=30, p = \frac{X}{n} = \frac{30}{500} = 0.06$$

យើងប្រើរូបមន្ត (7.3)

$$Z - \text{statistic} = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \frac{0.06 - 0.15}{\sqrt{\frac{0.15(1-0.15)}{500}}} = -5.636$$

5. ការកំណត់អំពីវិធាននៃការធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត

¹⁶ រូបមន្ត (7.3) នឹងប្រើបានក្នុងករណីដែល $X > 5$ ហើយ $n-X > 5$ ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលចំនួនប៉ាន់គំរូតូច ហើយមានលក្ខណៈមិន normal ជាពិសេស $X < 5$ ហើយ $n-X < 5$ រូបមន្តផ្សេងទៀតនឹងអនុវត្ត តែយើងមិនលើកមកសិក្សាក្នុងសៀវភៅនេះទេ ព្រោះរូបមន្តមានសភាពស្មុគស្មាញ ហើយភាគច្រើនគឺមាននៅក្នុង software ផ្សេងៗ។

បើតម្លៃដាច់ខាត Z-statistic < 1.96 មិនបដិសេធ H_0 ហើយបដិសេធ បើសិនជាតម្លៃដាច់ខាត Z-statistic > 1.96។

ដោយសារតម្លៃដាច់ខាតរបស់ Z-statistic = 5.636 > 1.96 H_0 ត្រូវបានបដិសេធ ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា សមាមាត្រសិស្សវិទ្យាល័យចូលចិត្តគណិតវិទ្យាខុសពី 15% ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថា របាយការណ៍នេះរាយការណ៍លើសឬខ្វះនោះទេ។

ii) ការប្រើកំរិតលក្ខណៈ (p-value)

ដោយសារ តម្លៃ Z-statistic = -5.636 តាមរយៈ Excel Calculator បានផ្តល់ថា p-value = 1.74E-08 < $\alpha=0.05$ ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធ

iii) ការប្រើចន្លោះជឿជាក់

បើ $\alpha=0.05$ ត្រូវបានគេអនុម័ត យើងទទួលបាន Z-critical = ± 1.96 ។ តាមរូបមន្ត (6.3) នៅជំពូកទី 6 យើងបានចន្លោះជឿជាក់ 95% សម្រាប់សមាមាត្ររបស់ចំនួនសកលៈ

$$p - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \pi \leq p + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$0.06 - 1.96 \sqrt{\frac{0.06(1-0.06)}{500}} \leq \pi \leq 0.06 + 1.96 \sqrt{\frac{0.06(1-0.06)}{500}}$$

$$0.0392 \leq \pi \leq 0.0808$$

ដោយហេតុថា ចន្លោះជឿជាក់មិនមានតម្លៃ $H_0: \pi = 0.15$ ដូច្នេះយើងបដិសេធ H_0 នូវកំរិត $\alpha=5\%$ ។

សរុបមកវិធីសាស្ត្រទាំងបី៖ test-statistic (ក្នុងករណីនេះគឺ Z-statistic) p-value និង វិធីសាស្ត្រ interval គឺបានបង្ហាញលទ្ធផលដូចគ្នា។

សេចក្តីសង្ខេប

ក្នុងជំពូកនេះ អ្នកបានសិក្សាទៅលើវិធីសាស្ត្រពីរសំខាន់ៗ ក្នុងការតេស្តសម្មតិកម្ម ក៏ដូចជា និងចន្លោះជឿជាក់។ អ្នកបានដឹងអំពីនីតិវិធីក្នុងការធ្វើតេស្ត តួយ៉ាងដូចជា ការសរសេរសម្មតិកម្ម និងការជ្រើសរើសប្រភេទតេស្តដែលត្រូវប្រើ និងវិធានករណីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត។ លើពីនេះទៅទៀត អ្នកក៏បានដឹងផងដែរអំពីរបៀបប្រើប្រាស់តេស្តកន្ទុយម្ខាង និងសង្វាង។

សំនួរនិងលំហាត់

I. សំនួរ

1. អ្វីទៅជាលក្ខណៈខុសគ្នារវាងសម្មតិកម្មមោឃៈនិងសម្មតិកម្មឆ្លាស់
2. អ្វីទៅជាលក្ខណៈខុសគ្នារវាងការតេស្តកន្ទុយម្ខាងនិងសង្វាង
3. អ្វីទៅក៏វ៉ែលយូ (p-value) ?

II. លំហាត់

4. អ្នកត្រួតពិនិត្យគុណភាពអំពូលអគ្គិសនីម្នាក់ចង់ដឹងថា រយៈពេលមធ្យមនៃអំពូលដែលអាចប្រើប្រាស់បានស្មើទៅនឹង 400 ម៉ោងដែរឬយ៉ាងណា។ គាត់ប្រមូលបានគំរូចំនួន 80 អំពូល គិតជាមធ្យមគឺប្រើប្រាស់បាន 385 ម៉ោង។ សន្មតថា គម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកលគឺ 90 ម៉ោង។

a. នៅកំរិតអាល់ហ្វាស្មើនឹង 5% តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាជីវិតមធ្យមរបស់អំពូលខុសពី 400 ម៉ោងដែរឬអត់?

b. ចូលគណនានិងបកស្រាយតម្លៃ p-value

c. ចូលបង្កើតចន្លោះជឿជាក់ 95% ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានរយៈពេលប្រើប្រាស់ជាមធ្យមរបស់ចំនួនសកលរបស់អំពូល

d. ចូលធ្វើការប្រៀបធៀបចំលើយ (a) និង (c) រួចធ្វើការសន្និដ្ឋាន

5. អ្នកគ្រប់គ្រងភោគជនីយដ្ឋានម្នាក់បានធ្វើការកត់ត្រារយៈពេលរងចាំរបស់អតិថិជន (ចាប់ពីពេលហៅម្ហូបរហូតដល់ទទួលបានម្ហូប) គឺមានរយៈពេល 4 នាទី។ គាត់ធ្វើការជ្រើសរើសបានគំរូចំនួន 70 ដោយចៃដន្យ បានបង្ហាញថា រយៈពេលរងចាំជាមធ្យមគឺ 3.50 នាទី និងមានគម្លាតស្តង់ដារ 0.9 នាទី។

a. នៅកំរិតអាល់ហ្វាស្មើនឹង 5% តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថារយៈពេលរងចាំខុសពី 4 នាទីដែរឬអត់?

b. ចូលគណនានិងបកស្រាយតម្លៃកំរិតដែលយូ (p-value)

c. ដោយសារតែចំនួនបានគំរូមានតែ 70 តើអ្នកមានក្តីបារម្ភណាមួយអំពីទម្រង់នៃបំណែងចែកសកលដែរឬទេពេលដែលអ្នកប្រើ t តេស្ត? ចូលពន្យល់

6. អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍លក់សាំងមួយកន្លែងបានអះអាងថា ការលក់សាំងទៅទីផ្សារនៅស្ថានីយ៍របស់គាត់គឺយ៉ាងតិចបំផុតគឺ 1,000 លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានធ្វើការប្រមូលបានគំរូដោយចៃដន្យចំនួន 20 ថ្ងៃ ជាមធ្យមលក់បាន 1,020 លីត្រ និងគម្លាតស្តង់ដារ 15 លីត្រ។

a. នៅកំរិតអាល់ហ្វា 5% តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាការអះអាងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងខាងលើពិត ឬមិនពិត?

b. ចូលកំណត់កំរិតដែលយូ (p-value) និងធ្វើការបកស្រាយ

7. ខាងក្រោមនេះគឺជាទិន្នន័យចំណាយ (គិតជាដុល្លារ) ទៅលើអាហារថ្ងៃត្រង់របស់បុគ្គលិក 10 នាក់នៃក្រុមហ៊ុនមួយ៖

ចំណាយ	4.80	6.20	5.40	5.03	6.45	3.47	4.20	5.86	4.54	5.60
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

a. នៅកំរិតអាល់ហ្វាស្មើនឹង 5% តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ចំណាយលើអាហារថ្ងៃត្រង់របស់បុគ្គលិកគិតជាមធ្យមខុសពី 6.80 ដុល្លារឬទេ?

b. ចូលកំណត់កំរិតដែលយូ (p-value) ក្នុងចំលើយ (a) និងធ្វើការបកស្រាយ

c. តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលត្រូវដាក់លើបំណែងចែករបស់ចំនួនសកល ដើម្បីឱ្យការប្រើប្រាស់ t តេស្តនៅក្នុងចំលើយ (a) មានសុពលភាព?

8. អ្នកគ្រប់គ្រងសេវាលាងថយន្តមួយកន្លែងចង់ធ្វើប្រសើរឡើងនូវសេវារបស់ខ្លួន។ សន្មតថា រយៈពេលលាងសំអាតថយន្តនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះគឺមានរយៈពេល 20 នាទី។ ហើយថ្មីៗនេះគាត់បានក៏បានធ្វើការកាត់ត្រាលើសេវាលាងថយន្តរបស់គាត់ចំនួន 90 ករណី គិតជាមធ្យមគឺមានរយៈពេល 18 នាទី និងគម្លាតស្តង់ដារ 1.5 នាទី។

a. នៅកំរិតអាល់ហ្វាស្មើនឹង 5% តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាសេវាកម្មលាងថយន្តរបស់គាត់ប្រសើរជាងឧស្សាហកម្មដែរឬអត់? ចុះបើកំរិតអាល់ហ្វាស្មើនឹង 1% វិញ?

b. ចូលកំណត់កំរិតដែលយុ p-value ក្នុងចំណោម (a) និងធ្វើការបកស្រាយ

9. អ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារមួយបានប្រមូលយកចង់ធ្វើប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មរបស់ខ្លួនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ គាត់បានធ្វើការប្រមូលរយៈពេលរងចាំ (គិតជានាទី) ដោយចែងទៅលើអតិថិជនចំនួន 16 នាក់នៅចន្លោះម៉ោង 11:30 ទៅ ម៉ោង 1:00។ ទិន្នន័យទាំងនោះបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

រយៈពេលរងចាំ	5.22	4.55	3.02	5.13	4.15	6.34	3.54	3.20
	3.50	5.10	3.38	5.12	6.46	6.19	3.79	6.20

- នៅកំរិតអាល់ហ្វាស្មើនឹង 5% តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថារយៈពេលរងចាំតិចជាង 6 នាទីដែរឬទេ?
- ចុះបើនៅកំរិតអាល់ហ្វាស្មើនឹង 10% តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថារយៈពេលរងចាំតិចជាង 6 នាទីដែរឬទេ?
- តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលត្រូវដាក់លើបំណែងចែករបស់ចំនួនសកល ដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ t តេស្តនៅក្នុងចំណោម (a) មានសុពលភាព?
- ចូលបង្កើតគំនូសប្រអប់ដើម្បីវាយតម្លៃលើលក្ខខណ្ឌ normality ក្នុងចំណោម (b)។

ជំពូកទី 8

ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មលើប៉ាន់ស្មាន

(Two-sample Tests)

គោលបំណង

ក្នុងជំពូកនេះ អ្នកនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីរបៀបតេស្តសម្មតិកម្មទៅលើ៖

- តម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសកលពីរឯករាជ្យ
- តម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសកលពីរដែលទាក់ទងគ្នា
- សមាមាត្រនៃចំនួនសកលពីរឯករាជ្យ
- សមាមាត្រនៃចំនួនសកលពីរដែលទាក់ទងគ្នា
- វ៉ារីយ៉ង់ពីរ

8.1 ការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសកលពីរដែលឯករាជ្យ

សឹងតែគ្រប់ករណីទាំងអស់ គឺយើងមិនដឹងអំពីគម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកលនោះទេ ទោះបីជាចំនួនសកលនោះមានតែមួយ ឬពីរក៏ដោយ។ ករណីចំនួនសកលពីរ គឺយើងរឹតតែមិនដឹងអំពីគម្លាតស្តង់ដារ ឬវ៉ារីយ៉ង់របស់វាទាំងពីរនោះស្មើគ្នាឬអត់ថែមទៀត។ ដើម្បីសិក្សាទៅលើករណីនេះ យើងត្រូវបែងចែកជាពីរករណី៖ ករណីទី1 គឺយើងអាចសន្មតថា វ៉ារីយ៉ង់របស់ចំនួនសកលទាំងពីរស្មើគ្នា និងករណីទី2 គឺវ៉ារីយ៉ង់មិនស្មើគ្នា ហើយចុងក្រោយយើងធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថា វ៉ារីយ៉ង់ទាំងពីរស្មើគ្នាឬយ៉ាងណា។

8.1.1 តេស្តរកភាពខុសគ្នានៃតម្លៃសកលពីរដែលមានវ៉ារីយ៉ង់ស្មើគ្នា

ដើមសំរេចថា សម្មតិកម្មមោឃៈត្រូវបានបដិសេធដែរឬយ៉ាងណា យើងប្រើវិធីសាស្ត្របីដូចនៅក្នុងជំពូកទី6។ ករណីនេះយើងសន្មតថា ប៉ាន់ស្មានតម្លៃកចេញពីចំនួនសកលពីរដោយចៃដន្យ ហើយចំនួនសកលទាំងពីរគឺឯករាជ្យពីគ្នា និងមានវ៉ារីយ៉ង់ស្មើគ្នា។ ក្នុងករណីបែបនេះ អ្នកអាចប្រើវិធីតេស្តដែលមានវ៉ារីយ៉ង់រួមបញ្ចូលគ្នា (pooled variance t-test) ដើម្បីកំណត់ថា តម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកលពីរនោះខុសគ្នាដែរឬយ៉ាងណា។

ឥឡូវយើងសន្មតថា តម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសកលទី1 គឺ μ_1 និងតម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសកលទី2 គឺ μ_2 ។ ដើម្បីតេស្តរកភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃមធ្យមទាំងពីរ យើងអាចប្រើកន្ទុយសង្វាង ឬ ម្ខាង (ខាងស្តាំ ឬឆ្វេង) ហើយសម្មតិកម្មទាំងនោះអាចសរសេរដូចខាងក្រោម៖

- តេស្តសម្មតិកម្មកន្ទុយសង្វាង

សម្មតិកម្មមោឃៈ $H_0: \mu_1 = \mu_2$ ឬ $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$

សម្មតិកម្មជំរើស $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ ឬ $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

- តេស្តសម្មតិកម្មកន្ទុយខាងឆ្វេង

សម្មតិកម្មមោឃៈ $H_0: \mu_1 \geq \mu_2$ ឬ $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0$

សម្មតិកម្មជំរើស $H_1: \mu_1 < \mu_2$ ឬ $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$

- តេស្តសម្មតិកម្មក្នុងខាងស្តាំ

សម្មតិកម្មមោឃៈ $H_0: \mu_1 \leq \mu_2$ ឬ $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0$

សម្មតិកម្មជំរើស $H_1: \mu_1 > \mu_2$ ឬ $H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$

ដើម្បីតេស្តសម្មតិកម្មមោឃៈ យើងប្រើវិធីតេស្តដែលមានវ៉ារីយ៉ង់រួមបញ្ចូលគ្នា (pooled variance t-test) ដូចសមីការ (8.1)។

$$t - statistic = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \quad (8.1)$$

ហើយ $S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$

S_p^2 = វ៉ារីយ៉ង់បញ្ចូលគ្នា

$\bar{X}_1$ = តម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូដែលបានមកពីចំនួនសកលទី1

S_1^2 = វ៉ារីយ៉ង់របស់ប៉ាន់គំរូដែលបានមកពីចំនួនសកលទី1

n_1 = ប៉ាន់គំរូរបស់ចំនួនសកលទី1

$\bar{X}_2$ = តម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់គំរូដែលបានមកពីចំនួនសកលទី2

S_2^2 = វ៉ារីយ៉ង់របស់ប៉ាន់គំរូដែលបានមកពីចំនួនសកលទី2

n_2 = ប៉ាន់គំរូរបស់ចំនួនសកលទី2

t-statistic មានបំណែងចែកអក្សរជឺ (t-distribution) ដែលមានដឺគ្រីហ្វ្រីខ្លីម $df = n_1 + n_2 - 2$

សំគាល់៖ ក្នុងករណី $n_1 = n_2$ វ៉ារីយ៉ង់រួមបញ្ចូលគ្នា $S_p^2 = \frac{S_1^2 + S_2^2}{2}$

រីឯចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់ $\mu_1 - \mu_2$ គឺ៖

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\alpha/2} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \quad (8.2)$$

ឧទាហរណ៍ 8.1 អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបអាត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់សន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុនពីរ គឺផ្សារ NYSE និងផ្សារ NASDAQ ដែលមានទិន្នន័យដូចក្នុងតារាង 8.1 ៖

តារាង 8.1 ទិន្នន័យផ្សារហ៊ុន NYSE និង NASDAQ

	ផ្សារ NYSE	ផ្សារ NASDAQ
ចំនួនប៉ាន់គំរូ	21	25
អត្រាប្រាក់ចំណេញ	3.27%	2.53%
គម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ	1.30%	1.16%

ឥឡូវនេះយើងសន្មតថា ចំនួនសកលទាំងពីរគឺមានបំណែងចែកប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបំណែងចែកធម្មតា ហើយមានវ៉ារីយ៉ង់របស់វាគឺស្មើគ្នា។ បើសិនជា $\alpha = 5\%$ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ តើតម្លៃមធ្យមនៃអត្រាប្រាក់ចំណេញ របស់ចំនួនសកលទាំងពីរស្មើគ្នាដែរឬទេ?

សំគាល់៖ រាល់ការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្មគឺយើងអាចដើរតាមជំហានទាំង5ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូកទី7 ។ សម្រាប់ជំពូកនេះគឺអាចខុសខ្លះពីជំពូកមុនៗដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃការគណនាតម្លៃតេស្ត។

ចំណុចទី១៖

i) ប្រើតេស្តស្ថិតិ

- ជំហានទី១: សរសេរសម្មតិកម្ម

សម្មតិកម្មមោឃៈ $H_0: \mu_1 = \mu_2$ ឬ $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$

សម្មតិកម្មជំរើស $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ ឬ $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

- ជំហានទី២: គណនារ៉េវីយ៉ង់រួមបញ្ចូលគ្នារវាងចំនួនសកលទាំងពីរ

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} = \frac{(21 - 1)1.3^2 + (25 - 1)1.16^2}{(21 - 1) + (25 - 1)} = 1.5021$$

- ជំហានទី៣: បន្ទាប់មកជំនួសរ៉េវីយ៉ង់រួមបញ្ចូលគ្នារវាងចំនួនសកលទាំងពីរចូលក្នុងរូបមន្ត (8.1)

$$t - \text{statistic} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{(3.27 - 2.53) - 0}{\sqrt{1.5021 \left(\frac{1}{21} + \frac{1}{25} \right)}} = 2.040$$

- ជំហានទី៤: រកតម្លៃស្ថិតិគោល

យើងសន្មតថា $\alpha=0.05$ និង ហើយ $df = n_1 + n_2 - 2 = 21 + 25 - 2 = 44$ នោះយើងបាន $t - \text{critical} = 2.0154$ (មើលតារាង $t - \text{distribution}$)

- ជំហានទី៥: ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត៖ ដោយសារ $t - \text{statistic} = 2.040 > t - \text{critical} = 2.0154$ ដូច្នេះយើងបដិសេធនៃ H_0 នៅកំរិត $\alpha=0.05$ ហើយសន្និដ្ឋានថា វាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា អាត្រាប្រាក់ចំណេញនៅលើទីផ្សារទំនើបនេះ។

ii) ការប្រើតម្លៃកំរិតយុទ្ធសាស្ត្រ $p - \text{value}$

ក្រៅពីប្រើ $t - \text{statistic}$ ឥឡូវយើងប្រើ $p - \text{value}$ ម្តង។ តម្លៃ $t - \text{statistic}$ ដែលយើងគណនាខាងលើគឺ 2.040 និងមាន $df = n_1 + n_2 - 2 = 21 + 25 - 2 = 44$ តាម Excel Calculator យើងអាចរកតម្លៃ $p - \text{value} = 0.047$ ។ ដោយសារតម្លៃ $p - \text{value}$ នេះតូចជាង 5% ដូច្នេះយើងបដិសេធនៃ H_0 ហើយរក្សាការសន្និដ្ឋាននៅដូចមុន។

iii) ការប្រើចន្លោះជឿជាក់ (confidence interval)

ក្រៅពីប្រើ $t - \text{statistic}$ និង $p - \text{value}$ ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ឥឡូវយើងប្រើចន្លោះជឿជាក់វិញម្តង តាមរយៈនៃការប្រើរូបមន្ត (8.2)។ ដើម្បីគណនា ចន្លោះជឿជាក់ 95% ទៅលើឧទាហរណ៍ 8.1 វិញម្តង។

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\alpha/2} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \quad (8.2)$$

$$(3.27 - 2.53) \pm 2.0154 * \sqrt{1.5021 \left(\frac{1}{21} + \frac{1}{25} \right)}$$

$$0.0087 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 1.4710$$

ផលដកនៃចំនួនសកលទី១ និងទី២ គឺនៅចន្លោះ 0.0087 និង 1.4710 នៅចន្លោះ ពុំមានលេខសូន្យនោះទេ ដូច្នេះយើងសន្និដ្ឋានថា នៅចន្លោះជឿជាក់ 95% អាត្រាប្រាក់ចំណេញនៅលើទីផ្សារទំនើបនេះ។ ដោយសារតែយើងយកតម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសលទីមួយដកតម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសលទីពីរ

ហើយយើងបានលទ្ធផលវិជ្ជមានទាំងសង្ខេប។ លទ្ធផលនេះអាចឲ្យយើងដឹងបន្ថែមទៀតថា អាត្រាប្រាក់ចំណេញនៅលើទីមួយចំណេញច្រើនជាងផ្សារទីពីរ គឺ 95%នៅចន្លោះពី 0.0087% ដល់ 1.4710%។

8.1.2 ជីតេស្តរកកាតខុសគ្នារវាងតម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសកលពីរដែលមានវ៉ារីយ៉ង់មិនស្មើគ្នា

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើការសន្មតថា វ៉ារីយ៉ង់មិនស្មើគ្នានៃចំនួនសកលឯករាជ្យពីរ អ្នកមិនអាចប្រើវ៉ារីយ៉ង់រួមបញ្ចូលគ្នា (S_p^2) បាននោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រើវ៉ារីយ៉ង់ដោយឡែករបស់ជីតេស្ត (separate-variance t-test) ដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Battherwaite។ សមីការ (8.3) កំណត់តេស្តស្ថិតិសម្រាប់វ៉ារីយ៉ង់ដោយឡែករបស់ជីតេស្តដើម្បីរកកាតខុសគ្នារវាងតម្លៃមធ្យម។

$$t - statistic = \frac{(\overline{X_1} - \overline{X_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)}} \quad (8.3)$$

ហើយ $\overline{X_1}$ = តម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់តម្លៃដែលបានមកពីចំនួនសកលទី1
 S_1^2 = វ៉ារីយ៉ង់របស់ប៉ាន់តម្លៃដែលបានមកពីចំនួនសកលទី1
 n_1 = ប៉ាន់តម្លៃរបស់ចំនួនសកលទី1
 $\overline{X_2}$ = តម្លៃមធ្យមរបស់ប៉ាន់តម្លៃដែលបានមកពីចំនួនសកលទី2
 S_2^2 = វ៉ារីយ៉ង់របស់ប៉ាន់តម្លៃដែលបានមកពីចំនួនសកលទី2
 n_2 = ប៉ាន់តម្លៃរបស់ចំនួនសកលទី2

ជីតេស្តសម្រាប់វ៉ារីយ៉ង់ដោយឡែកក្នុងសមីការ (8.3) ស្រដៀងជីតេស្តសម្រាប់វ៉ារីយ៉ង់រួមនៃសមីការ (8.1) ដែរ តែខុសគ្នាត្រង់កាតបែងតែប៉ុណ្ណោះ ហើយសមីការ (8.3) មាន df ស្រដៀងទៅនឹងបំណែងចែកអក្សរជី (t-distribution) ដែលមាន df ជាចំនួនគត់តាមសមាមាត្រដូចខាងក្រោម៖

$$V = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

ពេលនេះយើងពិនិត្យឧទាហរណ៍ 8.1 របស់យើងឡើងវិញ (ទិន្នន័យដូចក្នុងតារាង 8.1) ដោយសន្មតថា វ៉ារីយ៉ង់នៃអាត្រាប្រាក់ចំណេញនៅលើទីផ្សារទាំងពីរគឺមិនស្មើគ្នា។

តារាង 8.1 ទិន្នន័យផ្សារហ៊ុន NYSE និង NASDAQ

	ផ្សារ NYSE	ផ្សារ NASDAQ
ចំនួនប៉ាន់តម្លៃ	21	25

អត្រាប្រាក់ចំណេញ	3.27%	2.53%
គម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ	1.30%	1.16%

បន្ទាប់មកយើងគណនា df ដែលប្រើជាមួយ ជីតេស្តសម្រាប់គណនារ៉ឺយ៉ង់ដោយឡែក៖

$$V = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}} = \frac{\left(\frac{1.30^2}{21} + \frac{1.16^2}{25}\right)^2}{\frac{\left(\frac{1.30^2}{21}\right)^2}{21 - 1} + \frac{\left(\frac{1.16^2}{25}\right)^2}{25 - 1}} = \frac{(0.0805 + 0.0538)^2}{\frac{(0.0805)^2}{20} + \frac{(0.0538)^2}{24}} = \frac{0.0180}{0.00044} = 40.48$$

បើ $\alpha = 0.05$ ហើយ $df = 40$ ។ តាមតារាង t-distribution យើងបានតម្លៃ t-critical = 2.0211

បន្ទាប់ទៀតគឺប្រើសមីការ (8.3) ដើម្បីគណនាជីតេស្ត៖

$$t - statistic = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)}} = \frac{(3.27 - 2.53) - 0}{\sqrt{\left(\frac{1.30^2}{21} + \frac{1.16^2}{25}\right)}} = \frac{0.74}{0.1343} = 2.0193$$

ដោយសារតម្លៃ t-statistic (2.0193) តូចជាងតម្លៃ t-critical (2.0211) ដូច្នេះ H_0 គឺខកខានមិនត្រូវបានបដិសេធ។ លទ្ធផលនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងករណីរ៉ឺយ៉ង់រួមដែលបានគណនាខាងលើ។

ឥឡូវយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលរបស់យើងទៅនឹងលទ្ធផលរបស់ SPSS វិញម្តង។ តារាង 8.2 គឺជាលទ្ធផល t-test ដែលបានមកពីការប្រើកម្មវិធី SPSS។ កម្មវិធីនេះបានផ្តល់ឲ្យយើងនូវលទ្ធផលទាំងពីរតែម្តង ទាំងរ៉ឺយ៉ង់ស្មើគ្នា (equal variance) និងរ៉ឺយ៉ង់មិនស្មើគ្នា (unequal variance)។

តារាង 8.2 Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	.849	.362	2.040	44	.047	.7399200	.3627905	.0087638	1.4710762
Return (%) Equal variances not assumed			2.019	40.570	.050	.7399200	.3664768	-.0004331	1.4802731

លទ្ធផលរបស់តាមតារាង (8.2) បញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថា តេស្តទាំងពីរគឺខុសគ្នា បើរ៉ឺយ៉ង់ត្រូវបានសន្មតថាស្មើគ្នា គឺលទ្ធផលនៃតេស្តបង្ហាញថា អត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់ទីផ្សារទាំងពីរគឺខុសគ្នា ហើយបើរ៉ឺយ៉ង់ត្រូវបានសន្មតថាមិនស្មើគ្នា គឺលទ្ធផលនៃតេស្តបង្ហាញថា អត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់ទីផ្សារទាំងពីរគឺមិនខុសគ្នា នោះទេ។ តើតេស្តមួយណាត្រឹមត្រូវ? ដើម្បីឆ្លើយនិងសំនួរនេះ យើងត្រូវធ្វើការតេស្តមួយទៀតគឺតេស្តដើម្បី

ដឹងថា វ៉ារីយ៉ង់របស់ចំនួនសកលទាំងពីរស្មើគ្នាឬយ៉ាងណា ទើបយើងអាចរកចំឡើយមួយដ៏ត្រឹមត្រូវបាន។ ការតេស្តលើវ៉ារីយ៉ង់គឺត្រូវប្រើ F-test ដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅខាងចុងជំពូកនេះ។

8.2 ការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកលពីរដែលទាក់ទងគ្នា

មានស្ថានភាពពីរដែលទាក់ទងជាមួយចំនួនសកលពីរដែលមិនឯករាជ្យពីគ្នា៖ ករណីទីមួយគឺវង្វាស់ដដែលៗ (repeated measures) គឺជាការប្រមូលប៉ាន់គំរូចេញពីសំណុំវត្ថុឬបុគ្គលដដែលៗ ដែលស្ថិតនៅលក្ខខណ្ឌ ឬពេលវេលាផ្សេងគ្នា ឧទាហរណ៍ គ្រូពេទ្យវាស់កំដៅអ្នកជំងឺប្រាំម៉ោងម្តងៗ និងករណីទីពីរ គឺទាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យជាគូ (paired sample) ឧទាហរណ៍ ការធ្វើតេស្តពិន្ទុគណិតវិទ្យា មុនចូលរៀននិងក្រោយចូលរៀន ឬវិធីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីរផ្សេងគ្នាលើផលិតផលតែមួយ។ ក្នុងស្ថានភាពទាំងពីរនេះ អ្នកកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមពីរដែលទាក់ទងគ្នា មិនមែនធ្វើការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមពីរដែលឯករាជ្យពីគ្នានោះទេ។

8.2.1 ជីតេស្តទិន្នន័យជាគូ

ជីតេស្តទិន្នន័យជាគូ (paired sample t-test) ជូនកាលហៅថាជីតេស្តលើទិន្នន័យមិនឯករាជ្យ (dependent sample t-test) គឺជានីតិវិធីតេស្តស្ថិតិដើម្បីកំណត់ថាតម្លៃមធ្យមពីរខុសគ្នាឬយ៉ាងណា។ ជីតេស្តទិន្នន័យជាគូ តម្រូវឲ្យ ឬបុគ្គលដែលត្រូវបានសាកសួរនោះ ត្រូវធ្វើឡើងពីរដង ទើបចេញលទ្ធផលជាគូ។

- សមីការ (8.4a) កំណត់តម្លៃខុសគ្នាជាគូទី i th (the paired difference) គឺ D_i ៖

$$D_i = X_{1i} - X_{2i} \quad (8.4a)$$

- តម្លៃខុសគ្នាគិតជាមធ្យមនៃចំនួនសកល μ_D គឺ៖

$$\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n} \quad (8.4b)$$

- គម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ៖

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}} \quad (8.4c)$$

ហើយ n =ចំនួនគូរប៉ាន់គំរូ

- តេស្តស្ថិតិសម្រាប់តម្លៃ μ_D គឺ៖

$$t - \text{statistic} = \frac{\bar{D} - \mu_D}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}} \quad (8.4d)$$

ដែល t -statistic មាន $df = n-1$

- ចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃ μ_D គឺ៖

$$\bar{D} \pm t_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{S_D}{\sqrt{n}} \quad (8.4e)$$

ឧទាហរណ៍ 8.2 ជីតេស្តទិន្នន័យជាគូ៖ ក្រុមហ៊ុនមួយបានបញ្ជូនបុគ្គលិកផ្នែកលក់ប្រាំនាក់ឲ្យទៅចូលរួមកម្មវិធីវីកហ្វីនមួយដើម្បីឲ្យលក់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ហើយក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការកត់ត្រាចំនួនពាក្យបណ្តឹង មុននិងក្រោយចូលរួមកម្មវិធីវីកហ្វីន ដូចក្នុងតារាង 8.3 ខាងក្រោម៖

តារាង 8.3 ចំនួនពាក្យបណ្តឹងរបស់បុគ្គលិកទាំងប្រាំ

	ចំនួនពាក្យបណ្តឹង	ខុសគ្នា=2-1
--	------------------	-------------

បុគ្គលិក	មុនហ្វឹកហ្វឺន (1)	ក្រោយហ្វឹកហ្វឺន (2)	(D_i)
A	6	4	-2
B	20	6	-14
C	3	2	-1
D	0	0	0
E	4	0	-4
សរុប			-21

ចំណុចទី១:

i) ប្រើតេស្តស្តីតិ

- ជំហានទី១: សរសេរសម្មតិកម្ម

$$H_0: \mu_D = 0$$

$$H_1: \mu_D \neq 0$$

- ជំហានទី២: គណនាតម្លៃខុសគ្នាគិតជាមធ្យមនៃចំនួនសកលៈ

$$\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n} = \frac{-21}{5} = -4.2$$

- ជំហានទី៣: គណនាគម្លាតស្តង់ដាររបស់ប៉ាន់គំរូ៖

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (-2+4.2)^2 + \dots + (-4+4.2)^2}{5-1}} = 5.67$$

- ជំហានទី៤: គណនាតេស្តស្តីតិសម្រាប់តម្លៃ μ_D គឺ៖

$$t - \text{statistic} = \frac{\bar{D} - \mu_D}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}} = \frac{-4.2 - 0}{\frac{5.67}{\sqrt{5}}} = -1.66$$

- ជំហានទី៥: រកតម្លៃគោល

ឥឡូវសន្មតថា $\alpha = 5\%$ ហើយ $df=n-1=4$, តាមតារាង t-distribution យើងបាន t-critical = ± 2.7764 (two-tail)

- ជំហានទី៦: សេចក្តីសំរេច

ដោយសារតម្លៃជាប់ខាតរបស់ t-test គឺស្មើនឹង 1.66 តូចជាងតម្លៃ t-critical (2.7764) ដូច្នេះនូវកំរិត $\alpha = 5\%$ $H_0: \mu_D = 0$ ខកខានមិនបានបដិសេធឡើយ ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា ការហ្វឹកហ្វឺនមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ។

8.2.2 ប្រើតម្លៃ p-value

សូមរំលឹកថា ដើម្បីសំរេចថា H_0 ត្រូវបានបដិសេធឬយ៉ាងណា យើងមានវិធីសាស្ត្របី៖ ទីមួយ គឺ ប្រើតេស្តស្តីតិ ទីពីរគឺ p-value និងទីបីគឺ ប្រើចន្លោះជឿជាក់ ។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង t-statistic=-1.66, df= តម្លៃ p-value =0.173(Sig. 2-tailed)>0.05 ដូច្នេះ H_0 គឺត្រូវបានខកខានមិនត្រូវបានបដិសេធនោះទេ ហើយការសន្និដ្ឋានរបស់យើងគឺនៅដដែល។

8.2.3 ប្រើចន្លោះជឿជាក់

ឥឡូវនេះយើងប្រើចន្លោះជឿជាក់វិញម្តង។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង ចន្លោះជឿជាក់ 95% សម្រាប់តម្លៃ μ_D គឺ៖

$$\bar{D} \pm t_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{S_D}{\sqrt{n}} = -4.2 \pm 2.7764 \left(\frac{5.67}{\sqrt{5}} \right)$$

$$-11.2401 \leq \mu_D \leq 2.8401$$

ដូច្នេះនៅចន្លោះជឿជាក់ 95% បានបញ្ជាក់ថា តម្លៃខុសគ្នានៃចំនួនពាក្យបណ្តឹងគឺស្ថិតនៅចន្លោះ -11.2401 ទៅ 2.8401។ ដោយសារចន្លោះជឿជាក់នេះមានលេខសូន្យ ដូច្នេះនូវកំរិត $\alpha = 5\%$ យើងខកខានមិនបានបដិសេធអ₀ នោះឡើយ ហើយយើងសន្និដ្ឋានគឺនៅដដែល។

តារាង 8.4 ខាងក្រោមគឺជាលទ្ធផលតេស្តទិន្នន័យជាគូរបស់ SPSS។ សូមអ្នកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃ t-test, ចន្លោះជឿជាក់ និង p-value ទៅនឹងការគណនាខាងលើដោយខ្លួនឯង។

តារាង 8.4 Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 After - Before	-4.200	5.675	2.538	-11.246	2.846	-1.655	4	.173

8.3 ការប្រៀបធៀបតម្លៃខុសគ្នារបស់សមាមាត្រ

ជាញឹកញាប់ យើងចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបតម្លៃខុសគ្នារវាងសមាមាត្រពីរ គឺយើងអាចប្រើតេស្តស្ថិតិតីរគឺ Z-test ឬ ឆាយស្វីតេស្ត (χ^2 - test) ហើយលទ្ធផលរបស់តេស្តទាំងពីរគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ សម្រាប់ពេលនេះ យើងនឹងសិក្សាតែ Z-test តែប៉ុណ្ណោះ។ Z-test សម្រាប់តម្លៃខុសគ្នារវាងសមាមាត្រពីរគឺត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងសមីការ 8.7 ខាងក្រោម៖

$$Z - \text{statistic} = \frac{(p_1 - p_2) - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad (8.7)$$

និង

$$\bar{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}; p_1 = \frac{X_1}{n_1}; p_2 = \frac{X_2}{n_2}$$

ហើយ p_1 = សមាមាត្រនៃវត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងប៉ាន់គំរូទីមួយ

X_1 = ចំនួននៃវត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងប៉ាន់គំរូទីមួយ

n_1 = ចំនួនប៉ាន់គំរូទីមួយ

π_1 = សមាមាត្រនៃវត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំនួនសកលទីមួយ

p_2 = សមាមាត្រនៃវត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងប៉ាន់គំរូទីពីរ
 X_2 = ចំនួននៃវត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងប៉ាន់គំរូទីពីរ
 n_2 = ចំនួនប៉ាន់គំរូទីពីរ
 π_2 = សមាមាត្រនៃវត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំនួនសកលទីពីរ
 $\bar{p}$ = តម្លៃមធ្យមនៃសមាមាត្រទាំងពីររបស់ចំនួនសកលដែលចាប់អារម្មណ៍

Z-test មានបំណែងចែកធម្មតាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ (standard normal distribution) ។ ហើយការតេស្តនេះយើងអាចធ្វើឡើងដោយប្រើកន្ទុយសងខាង (two-tailed test) ឬកន្ទុយម្ខាង ជួនកាលកន្ទុយខាងស្តាំ ឬឆ្វេង (upper- or lower- tailed) ដូចបានរៀបរាប់ត្រង់ចំណុច 8.1 ហើយការជ្រើសរើសតេស្តខាងស្តាំ ឬឆ្វេង គឺអាស្រ័យលើសម្មតិកម្ម។

ឧទាហរណ៍ 8.3 ការស្ទង់មតិមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីចង់ដឹងថា សមាមាត្របុរសនិងស្ត្រីនឹងគាំទ្របេក្ខភាព A ខុសគ្នាឬយ៉ាងណា។ ការប្រមូលប៉ាន់គំរូដោយចៃដន្យបានបង្ហាញថា បុរស 36 នាក់ក្នុងចំណោម 72 នាក់ និងស្ត្រី 35 នាក់ក្នុងចំណោម 50 នាក់ បានបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាព A។ បើសិន $\alpha=5\%$ តើសមាមាត្រទាំងពីរខុសគ្នាដែរឬទេ ?

ចម្លើយ:

សូមរំលឹកថា ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងដើម្បីសំរេចចិត្តបដិសេធ H_0 ឬមិនបដិសេធ ក្រៅពីធ្វើការប្រៀបធៀប Z-test ទៅនឹង Z-critical យើងយើងមានជំរើសពីរទៀតគឺតាមរយៈ តម្លៃ p-value និង ការគណនាចន្លោះជឿជាក់។

8.3.1 ការប្រើតេស្តស្ថិតិ

- **ជំហានទី១:** សរសេរសម្មតិកម្ម

$$H_0: \pi_1 = \pi_2 \quad \text{or} \quad H_0: \pi_1 - \pi_2 = 0$$

$$H_1: \pi_1 \neq \pi_2 \quad \text{or} \quad H_1: \pi_1 - \pi_2 \neq 0$$

- **ជំហានទី២:** គណនាសមាមាត្ររបស់ប៉ាន់គំរូ

$$p_1 = \frac{X_1}{n_1} = \frac{36}{72} = 0.50$$

$$p_2 = \frac{X_2}{n_2} = \frac{35}{50} = 0.70$$

- **ជំហានទី៣:** គណនាតម្លៃមធ្យមនៃសមាមាត្រទាំងពីរ

$$\bar{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2} = \frac{(36+35)}{(72+50)} = 0.582$$

- **ជំហានទី៤:** គណនា Z-statistic

$$Z\text{-statistic} = \frac{(p_1 - p_2) - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{(0.50 - 0.70) - (0)}{\sqrt{0.582(1-0.582)\left(\frac{1}{72} + \frac{1}{50}\right)}} = -2.2026$$


- **ជំហានទី៥:** កំណត់តម្លៃ Z-critical

នៅត្រង់ $\alpha=5\%$ យើងបាន Z-critical = ± 1.96

- **ជំហានទី៦:** ធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត

ដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្តនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះ យើងធ្វើការប្រៀបធៀបតម្លៃ Z-statistic ទៅនឹង Z-critical។ ក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើង Z-statistic = -2.20 < Z-critical = -1.96 ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធនៅកំរិត $\alpha=5\%$ (មើលរូប 8.1) ហើយយើងសន្និដ្ឋានថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា មានភាពខុសគ្នារវាងសមាមាត្របុរសនិងស្ត្រីក្នុងការគាំទ្របេក្ខភាព A។

រូប 8.1 តម្លៃ Z-statistic នៃសមាមាត្ររបស់ស្ត្រីនិងបុរស



សូមបញ្ជាក់ថា SPSS មិនបានបង្កើត Z-test សម្រាប់តេស្តរកតម្លៃខុសគ្នារវាងសមាមាត្រនៃចំនួនសកលពីរនោះទេ តែ SPSS បានបង្កើត ឆាយឈ្មួតេស្តជំនួសវិញ។ ចំពោះតេស្តនេះយើងនឹងលើកមកសិក្សាម្តងទៀតនៅជំពូកក្រោយៗ។

8.3.2 ការប្រើ p-value

នៅខាងលើយើងបានគណនាតម្លៃតេស្តរួចមកហើយ គឺ Z-test=-2.2026 តាមរយៈតម្លៃ Z-test នេះយើងអាចរក p-value = 0.0276។ ដោយសារ $p=0.0276$ (two-tailed) < 0.05 ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធនៅកំរិត $\alpha=5\%$ ហើយការសន្និដ្ឋានគឺដូចមុន។

8.3.3 ការប្រើចន្លោះជឿជាក់

ចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់សមាមាត្រខុសគ្នានៃចំនួនសកលពីរ $\pi_1 - \pi_2$ គឺត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្ត 8.8៖

$$(p_1 - p_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}} \quad (8.8)$$

ចន្លោះជឿជាក់ 95% សម្រាប់សមាមាត្រខុសគ្នានៃចំនួនសកលពីរក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងគឺ

$$\begin{aligned} & (0.50 - 0.70) \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.50(1-0.50)}{72} + \frac{0.70(1-0.70)}{50}} \\ & -0.20 \pm 1.96 (0.08759) \\ & -0.37167 \leq \pi_1 - \pi_2 \leq -0.02832 \end{aligned}$$

សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង ចន្លោះជឿជាក់ 95% នៃសមាមាត្រខុសគ្នារបស់ចំនួនសកលគឺនៅចន្លោះ -0.37167 និង -0.02832 ក្នុងចន្លោះនេះមិនមានលេខសូន្យនោះទេ គឺអវិជ្ជមានទាំងសង្វាង ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធនៅកំរិត $\alpha=5\%$ ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា សមាមាត្រនៃមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសដែលបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាព A គឺខុសគ្នា។

8.4 ការធ្វើតេស្តលើវ៉ារីយ៉ង់

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើរួចមកហើយថា ការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសកលពីរដែលឯករាជ្យពីគ្នា (two independent populations) គឺយើងប្រើជីតេស្ត (t-test) ហើយជីតេស្តនេះទៀតសោតគឺមានពីរប្រភេទ អាស្រ័យទៅនឹងការសន្មតថា វ៉ារីយ៉ង់របស់ចំនួនសកលទាំងពីរនោះស្មើគ្នាឬមិនស្មើគ្នា។ ដូច្នេះដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើស ជីតេស្តណាមួយយកមកប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះ គឺយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើតេស្តលើវ៉ារីយ៉ង់របស់ចំនួនសកលទាំងនោះជាមុនសិន។

ជាញឹកញាប់ ផលធៀបនៃវ៉ារីយ៉ង់របស់ប៉ាន់គំរូ (S_1^2/S_2^2) ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តដើម្បីកំណត់ភាពស្មើគ្នាឬមិនស្មើគ្នានៃវ៉ារីយ៉ង់។ S_1^2 គឺជាវ៉ារីយ៉ង់ដែលបានមកពីប៉ាន់គំរូទីមួយហើយត្រូវបានសន្មតថាជា S_2^2 គឺជាវ៉ារីយ៉ង់ដែលបានមកពីប៉ាន់គំរូទីពីរ។ ផលធៀបនេះមានបំណែងចែកតាមបំណែងចែក អក្សរ F-distribution (មើលតារាង E.5)។ F-distribution មានចំនួន df ចំនួនពីរ គឺ df របស់ភាគយក (numerator) និង df របស់ភាគបែង (denominator)។ F-statistic សម្រាប់ផលធៀបនៃវ៉ារីយ៉ង់ពីរគឺត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងសមីការ 8.9។

$$F_{stat} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \quad (8.9)$$

ហើយ $S_1^2 =$ វ៉ារីយ៉ង់របស់ប៉ាន់គំរូទីមួយ

$S_2^2 =$ វ៉ារីយ៉ង់របស់ប៉ាន់គំរូទីពីរ

$n_1 =$ ចំនួនប៉ាន់គំរូទីមួយ

$n_2 =$ ចំនួនប៉ាន់គំរូទីពីរ

$n_{1-1} =$ ចំនួន df របស់ភាគយក

$n_{2-1} =$ ចំនួន df របស់ភាគបែង

សម្មាតិកម្មរបស់ F-test គឺ


$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$


ដូចតេស្តផ្សេងៗទៀតដែរ យើងនឹងបដិសេធ H_0 ប្រសិន F-statistic > F-critical ហើយផ្ទុយមកវិញបើ F-statistic < F-critical គឺយើងមិនបដិសេធ H_0 នោះឡើយ។

សូមបញ្ជាក់ថា ការធ្វើតេស្តនេះអាចតេស្តក្នុងសងខាង និងក្នុងម្ខាង គឺខាងស្តាំតែមួយគត់ (upper-tailed only) មិនអាចក្នុងខាងឆ្វេងនោះទេ ពីព្រោះ F-statistic = S_1^2/S_2^2 មិនអាចតូចជាង 1 ឬអវិជ្ជមានទេ (ពីព្រោះ $S_1^2 > S_2^2$ ជានិច្ច)។ គំនូសបង្ហាញក្នុងរូប 8.2a ជាការតេស្តដោយប្រើក្នុងសងខាង (ប្រើ $\alpha/2$) ហើយ 8.2b ជាការតេស្តដោយប្រើក្នុងម្ខាងស្តាំ (ប្រើ α)។

រូប 8.2a F-critical ដែលតេស្តក្នុងសងខាង



រូប 8.2b F-critical ដែលតេស្តកន្ទុយម្ខាង



ឥឡូវយើងធ្វើការពិនិត្យឧទាហរណ៍ 8.1ឡើងវិញ ដែលនៅក្នុងនោះយើងធ្វើការប្រៀបធៀបអាត្រាប្រាក់ចំណេញនៅលើទីផ្សារ NYSE និងផ្សារ NASDAQ ហើយយើងបានធ្វើតេស្តម្តងរួចមកហើយ ទាំងករណីសន្មត់ថាវ៉ារីយ៉ង់ស្មើគ្នា និងមិនស្មើគ្នា។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថា បើ $\alpha=5\%$ ករណីវ៉ារីយ៉ង់ស្មើគ្នា H_0 ត្រូវបានបដិសេធ (t-statistic =2.040, p=0.047) ហើយបើ $\alpha=5\%$ ករណីវ៉ារីយ៉ង់មិនស្មើគ្នា H_0 មិនត្រូវបានបដិសេធនោះទេ (t-statistic =2.019, p=0.050)។ សំនួរមួយអាចសួរថា តើតេស្តមួយណាត្រឹមត្រូវ? ចំណើយ គឺសូមរងចាំការធ្វើតេស្តណាទៅលើវ៉ារីយ៉ង់សិន។

សូមរំលឹកថា នៅក្នុងឧទាហរណ៍ 8.1៖ ផ្សារ NYSE: $n = 21$, $\bar{X} = 3.27$, និង $S_1 = 1.30\%$

ហើយផ្សារ NASDAQ: $n = 25$, $\bar{X} = 2.53$, និង $S_2 = 1.16\%$ ។

8.4.1 ការប្រើតេស្តស្ថិតិ

- ជំហានទី១: សរសេរសម្មតិកម្ម:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

- ជំហានទី២: គណនា F-statistic:


$$F_{stat} = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{1.30^2}{1.16^2} = \frac{1.69}{1.3456} = 1.2559$$

- ជំហានទី៣: កំណត់តម្លៃសារៈសំខាន់និង តម្លៃស្ថិតិគោល

សន្មតថា $\alpha=5\%$, df របស់ភាគយក (numerator) = $n_1-1 = 21-1=20$, ហើយ df របស់ភាគបែង (denominator) = $n_2-1 = 25-1=24$ យោងតាមតារាង F-distribution (E.5) យើងបានតម្លៃ F-critical, $F_{0.025,20,24} = 2.33$ ។

- ជំហានទី៤: ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

ដោយសារតែ $F\text{-statistic} = 1.2559 < F\text{-critical} = 2.33$ (រូប 8.3) គឺ H_0 មិនត្រូវបានបដិសេធ ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា មិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា វារីយ៉ង់ទាំងពីរខុសគ្នានោះទេ ហើយ $t\text{-statistic} = 2.040$ ($p=0.047$) គឺជាតេស្តដែលត្រឹមត្រូវ (សូមមើលតារាង 8.2 និងការសន្និដ្ឋាននៅត្រង់ចំណុច 8.1.1)។



8.4.2 ការប្រើ p-value

បន្ទាប់ពីបានតម្លៃ F-statistic រួចហើយ យើងអាចរក តម្លៃ p-value របស់ F-statistic នោះ។ សូមរំលឹកថា p-value គឺជាប្រូបាប៊ីលីតេដែលអាចបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈ ហើយមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងស្តាំនៃ F-statistic។ វិធីសាស្ត្រងាយស្រួលក្នុងការរកតម្លៃ p-value គឺយើងប្រើ Excel Calculator (អ្នកអាចរកបានតាមរយៈ Google)។ ក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើង $F\text{-statistic}=1.2559$, degree freedom (df) របស់ភាគយកស្មើនឹង 20 និង df របស់ភាគបែងស្មើនឹង 24 ប្រើ Excel Calculator យើងទទួលបាន $p\text{-value} = 0.2944 > 0.05$ ។ ដូច្នេះ H_0 : ត្រូវបានបដិសេធទៅនឹងការសន្និដ្ឋាន។

សេចក្តីសង្ខេប

ជំពូកនេះបានណែនាំអោយអ្នកស្គាល់អំពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗនៃការប្រៀបធៀបប៉ាន់គំរូពីរ។ ក្នុងករណីដែលប៉ាន់គំរូពីរឯករាជ្យពីគ្នា ហើយមានវ៉ារីយ៉ង់ស្មើគ្នា អ្នកអាចប្រើជីតេស្តដោយរួមបញ្ចូលវ៉ារីយ៉ង់ទាំងពីរចូលគ្នា (pooled variance) ប្រើចន្លោះជឿជាក់ និង p-value ជាដើម។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលវ៉ារីយ៉ង់មិនស្មើគ្នាវិញ នីតិវិធីនៃការប្រៀបធៀបនៅរក្សាដដែល ក៏ប៉ុន្តែរួមបន្ថែមជីតេស្តនិង df មានការកែប្រែបន្តិចបន្តួច។ ក្រៅពីនេះអ្នកក៏បានសិក្សាអំពីការធ្វើតេស្តលើប៉ាន់គំរូពីរដែលជាប់ទាក់ទងគ្នា ឬការប្រៀបធៀបជាគូ និងសមាមាត្រផងដែរ។ ទីបំផុតអ្នកបានស្គាល់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើតេស្តដើម្បីកំណត់ថា វ៉ារីយ៉ង់របស់ប៉ាន់គំរូពីរស្មើគ្នាឬអត់ តេស្តនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីកំណត់ថា តេស្តមួយណាដែលត្រូវប្រើ៖ តេស្តដែលមានវ៉ារីយ៉ង់ស្មើគ្នា ឬមិនស្មើគ្នា។

សំនួរនិងលំហាត់

I. សំនួរ

1. ចូលសរសេរនីតិវិធីលើការធ្វើតេស្តលើសម្មតិកម្ម
2. តើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលវ៉ារីយ៉ង់រួម t តេស្តត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរកតម្លៃខុសគ្នានៃមធ្យមពីរបស់ចំនួនសកលដែលឯករាជ្យពីគ្នា?
3. តើនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលអ្នកគួរប្រើ F តេស្ត ដើម្បីរកភាពខុសគ្នានៃវ៉ារីយ៉ង់របស់ចំនួនសកលពីរឯករាជ្យ?
4. អ្វីខ្លះជាលក្ខណៈខុសគ្នារវាងចំនួនសកលពីរឯករាជ្យនិងចំនួនសកលពីរទាក់ទងគ្នា?
5. អ្វីខ្លះជាលក្ខណៈខុសគ្នារវាងរង្វាស់ច្រំដែលនិងរង្វាស់បន្សំឬមុននិងក្រោយ?
6. ពេលដែលអ្នកមានចំនួនសកលពីរឯករាជ្យពីគ្នា ចូលពន្យល់លក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នារវាងការតេស្តសម្មតិកម្មនិងការតេស្តដោយប្រើចន្លោះជឿជាក់ដើម្បីរកតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកលពីរខុសគ្នា?
7. តើនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលអ្នកគួរប្រើ t តេស្តជាគូរដើម្បីរកតម្លៃមធ្យមពីរខុសគ្នារបស់ចំនួនសកលពីរដែលជាប់ទាក់ទងគ្នា?

II. លំហាត់

8. ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារចង់ធ្វើការកែលំអរគុណភាពសេវារបស់ធនាគារ។ គាត់បានធ្វើការកត់ត្រារយៈពេលរងចាំ (គិតជានាទី) របស់អតិថិជនចំនួន 16 នាក់ នៅសាខាទីមួយ ដូចខាងក្រោម៖

4.21	5.55	3.02	5.13	4.30	2.34	3.54	3.20
4.50	6.10	0.38	5.12	6.46	6.19	3.39	5.30

ហើយគាត់ក៏ធ្វើការកត់ត្រារយៈពេលរងចាំរបស់អតិថិជន 16 នាក់នៅសាខាទីពីរ៖

9.30	5.40	8.02	5.79	8.13	3.82	8.01	8.35
10.49	6.18	5.24	4.08	6.17	9.31	5.47	7.12

- a. សន្មតថាវ៉ារីយ៉ង់នៃទិន្នន័យរបស់ធនាគារពីរស្មើគ្នា តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថារយៈពេលរងចាំរបស់សាខានៃធនាគារទាំងពីរខុសគ្នាដែរទេ ?
- b. ចូលគណនា p-value ក្នុងសំណួរ (a) និងធ្វើការបកស្រាយអត្ថន័យរបស់វា
- c. ក្រៅពីសន្មតថាវ៉ារីយ៉ង់នៃទិន្នន័យរបស់ធនាគារពីរស្មើគ្នា តើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីបន្ថែមទៀតដែលចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើតេស្តសំណួរ (a) ?
- d. ចូលគណនាចន្លោះជឿជាក់ 95% និងធ្វើការបកស្រាយរយៈពេលរងចាំនៃសាខាទាំងពីររបស់ធនាគារ

9. អ្នកជំនាញខាងតុបតែងចំនួន 9 រូបត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើសោភ័ណភាពហាងកាហ្វេពីរកន្លែង ដោយឲ្យពិន្ទុចាប់ពី 1 ដល់ 10។ ទិន្នន័យទាំងនោះមានដូចតទៅ៖

អ្នកជំនាញ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	7	7	8	6	6	8	9	6	7
B	6	7	9	6	7	9	10	7	8

- a. នៅកំរិតអាល់ហ្វា 0.05 តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ហាងកាហ្វេទាំងពីរមានពិន្ទុខុសគ្នាឬទេ ?
 - b. តើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលតម្រូវឲ្យមាន ក្នុងការធ្វើតេស្តប្រភេទនេះ ?
 - c. ចូលគណនា p-value ក្នុងសំណួរ (a) និងធ្វើការបកស្រាយអត្ថន័យរបស់វា
 - d. ចូលគណនាចន្លោះជឿជាក់ 95% និងធ្វើការបកស្រាយពិន្ទុខុសគ្នារបស់ហាងកាហ្វេទាំងពីរ។
10. ការស្ទង់មតិមួយត្រូវបានធ្វើទៅលើអ្នកទិញទំនិញតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណែតចំនួន 400 នាក់ដែលទាក់ទងជាមួយឥរិយាបថអតិថិជន។ ក្នុងចំណោមនោះ មានសំនួរមួយត្រូវបានសួរ “តើអ្នកមានការពេញចិត្តក្នុងការទិញទំនិញតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណែតដែរឬទេ ?” ក្នុងចំណោមបុរស 150 នាក់ មាន 100 នាក់ឆ្លើយថា “ពេញចិត្ត” ហើយក្នុងចំណោមស្ត្រី 250 នាក់ មាន 200 នាក់បានឆ្លើយថា “ពេញចិត្ត”។
- a. នៅកំរិតអាល់ហ្វា 0.01 តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា សមាមាត្រ “ពេញចិត្ត” របស់បុរសខុសគ្នាជាមួយនឹងស្ត្រីដែរឬទេ ?
 - b. ចូលគណនា p-value ក្នុងសំណួរ (a) និងធ្វើការបកស្រាយអត្ថន័យរបស់វា
 - c. ចូលគណនាចន្លោះជឿជាក់ 99% និងធ្វើការបកស្រាយសមាមាត្រ “ពេញចិត្ត” ខុសគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការទិញទំនិញតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណែត។
11. សិប្បកម្មផលិតសណ្តែកដឹកប៉ង់មួយកន្លែងមានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពីរ A និង B។ អ្នកគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្មបានកំណត់ថា ទម្ងន់សណ្តែកដឹកជាមធ្យមនៅក្នុងកំប៉ុងនីមួយៗគឺ 200ក្រាម។ ថ្មីៗនេះគាត់មានការសង្ស័យថា បម្រែបម្រួលនៃការច្រកកំប៉ុងអាចខុសគ្នា ហើយគាត់បានប្រមូលប៉ាន់គំរូមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

	ចង្វាក់ A	ចង្វាក់ B
--	-----------	-----------

ទម្ងន់មធ្យម	200.5 ក្រាម	198.8 ក្រាម
គម្លាតស្តង់ដារ	0.40	0.16
n	14	20

a. នៅកំរិតអាល់ហ្វា 0.05 តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា វ៉ារីយ៉ង់របស់សង្វាក់ផលិតកម្ម A ធំជាងវ៉ារីយ៉ង់របស់សង្វាក់ផលិតកម្ម B?

b. ចូលគណនា p-value ក្នុងសំណួរ (a) និងធ្វើការបកស្រាយអត្ថន័យរបស់វា

c. តើលក្ខខណ្ឌចាំបាច់អ្វីខ្លះដែលតម្រូវឲ្យមានក្នុងចំនួនសកលទាំងពីរ ដើម្បីធ្វើ F តេស្តនៅក្នុងសំណួរ (a) មានសុពលភាព?

12. ខាងក្រោមនេះគឺជាទិន្នន័យដែលទាក់ទងជាមួយរយៈពេល (គិតជាម៉ោង) ប្រើប្រាស់ថ្មីពីប្រភេទ A និង B ទៅលើកុំព្យូទ័រប្រភេទតែមួយ មុននឹងត្រូវបានសាកថ្មីជាថ្មី (សន្មតថាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើគឺដូចគ្នា)។ ប៉ាន់គំរូថ្មី A និង B គឺ 18 ស្មើគ្នា។

A	3.35	3.10	2.50	2.45	2.50	2.00	3.30	2.40	2.40
	2.35	2.20	2.55	2.10	3.15	2.34	2.40	2.10	2.05
B	3.20	3.30	2.50	2.40	3.50	2.40	3.30	2.20	3.15
	2.30	2.50	2.55	3.20	3.25	2.00	2.150	3.00	2.45

a. នៅកំរិតអាល់ហ្វា 0.05 តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា វ៉ារីយ៉ង់របស់របស់ថ្មីទាំងពីរខុសគ្នាឬទេ?

b. ចូលគណនា p-value ក្នុងសំណួរ (a) និងធ្វើការបកស្រាយអត្ថន័យរបស់វា

c. តើលក្ខខណ្ឌចាំបាច់អ្វីខ្លះដែលតម្រូវឲ្យមានក្នុងចំនួនសកលទាំងពីរ ដើម្បីធ្វើ F តេស្តនៅក្នុងសំណួរ (a) មានសុពលភាព?

d. ផ្អែកលើចំណើយ (a) តើ t ប្រភេទណាមួយដែលនិងយកមកប្រើក្នុងការប្រៀបធៀបរយៈពេលប្រើប្រាស់ជាមធ្យមរបស់ថ្មីទាំងពីរ?

តាមវិធីសាស្ត្រ និងតេស្តដទៃទៀតដែលមិនមែនជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្ត

(Chi-square Test and Other Non-parametric Tests)

គោលបំណង

- ជំពូកនេះអ្នកនឹងសិក្សាអំពី
- របៀបប្រើឆាយវិធីសាស្ត្រលើសមាមាត្រ
 - ឆាយវិធីសាស្ត្ររកតម្លៃខុសគ្នារវាងសមាមាត្រពីរ និងលើសពីពីរ
 - ឆាយវិធីសាស្ត្ររកភាពឯករាជ្យ
 - របៀបប្រើម៉ាកណេម៉ាតេស្ត
 - វិក្កុសុនតេស្តលើប៉ាន់គំរូពីរឯករាជ្យ
 - គ្រួសារលំដាប់លីសតេស្ត

9.1 តាមវិធីសាស្ត្រចំពោះភាពអនុលោមតាម

ឆាយវិធីសាស្ត្រចំពោះភាពអនុលោមតាម ឬភាពស័ក្តិសមទៅនឹងទម្រង់ណាមួយ (Chi-square test for goodness of fit) គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់តេស្តដើម្បីចង់ដឹងថា បំណែងចែកប្រូបាប្រភេទអនុលោមតាម ឬគោរពតាមទម្រង់ណាមួយជាក់លាក់ ឬយ៉ាងណា។ ឧទាហរណ៍ ផលិតផលបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែរឬអត់ ការអនុវត្តន៍ការងារបានអនុលោមតាម ឬគោរពតាមគោលនយោបាយ ឬផែនការដែរឬអត់ ។ ឆាយវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ភាពអនុលោមតាម ឬភាពសម្របតាមត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងសមីការ 9.1។

$$\chi^2_{Stat} = \sum \frac{(O - E)^2}{E} \quad (9.1)$$

ហើយ O = ប្រេកង់ដែលបានអង្កេត (observed frequency)

E = ប្រេកង់រំពឹងទុក (expected frequency) : $E = n * p_i$

n = ចំនួនប៉ាន់គំរូ


p_i = ប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរប្រភេទនីមួយៗដែលបានបញ្ជាក់ដោយ H_0

χ^2_{Stat} មានទម្រង់ជាបំណែងចែកប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង χ^2 -distribution ដែលមាន degree of freedom, df = ចំនួនអថេរប្រភេទដកមួយ (number of category variable -1) ។ បើ $\chi^2_{Stat} > \chi^2$ -critical នោះ H_0 នឹងត្រូវបានបដិសេធ ហើយផ្ទុយមកវិញ បើតូចជាង គឺ H_0 នឹងមិនត្រូវបានបដិសេធនោះទេ (មើលរូប 9.1)។

កាសន្ទត់នៃការប្រើឆាយឈ្នួតេស្តភាពអនុលោមតាម ឬភាពសម្របតាមទម្រង់អ្វីមួយគឺ៖

- ការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូត្រូវធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈចៃដន្យ
- ប្រភេទរំពឹងទុកនៃអថេរប្រភេទនីមួយៗត្រូវធំជាង 5

រូប 9.1 តំបន់បដិសេធនិងមិនបដិសេធក្នុងការប្រើឆាយឈ្នួតេស្តសមាមាត្រ



ឧទាហរណ៍ 9.1 គោលនយោបាយរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាដែលដាក់លើធនាគារពាណិជ្ជកម្មអនុវត្តតាមគឺ 60% នៃការផ្តល់កម្ចីទៅលើអជីវកម្ម 30% ទៅលើបុគ្គល និង 10% ទៅលើកសិកម្ម។ ដើម្បីវាយតម្លៃថា ធនាគារពាណិជ្ជកម្មយោគោលនយោបាយនេះដែរឬអត់ សាវ័នកម្មក៏បានចុះទៅប្រមូលប៉ាន់គំរូពីធនាគារនោះដោយចៃដន្យទៅលើកម្ចីចុងក្រោយនេះចំនួន 85 ហើយនៅក្នុងចំណោមកម្ចីទាំង 85 នោះ គាត់បានរកឃើញថា កម្ចីចំនួន 62 ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យអជីវកម្ម កម្ចីចំនួន 13 បានផ្តល់ឲ្យបុគ្គល និងកម្ចីចំនួន 10 បានផ្តល់ឲ្យកសិករ។ នៅកំរិត $\alpha=0.05$ តើធនាគារពាណិជ្ជកម្មនេះបានគោរព ឬដើមតាមគោលនយោបាយរបស់ធនាគារជាតិដែរឬទេ?

ចម្លើយ៖

i) តេស្តស្ថិតិ

- ជំហានទី១: សរសេរសម្មតិកម្ម

H_0 : គោលនយោបាយរបស់ធនាគារជាតិត្រូវបានគោរព

H_1 : គោលនយោបាយរបស់ធនាគារជាតិមិនត្រូវបានគោរព

- ជំហានទី២: រកតម្លៃ χ^2 - critical, បើ $\alpha = 0.05$ ហើយចំនួន df = ចំនួនអថេរប្រភេទ-1 ឬ $3-1=2$ តាមតារាង χ^2 -distribution យើងបាន $\chi^2_{0.05,2} = 5.991$

- ជំហានទី៣: គណនាតម្លៃរំពឹងទុក $E = n * p_i$

តម្លៃរំពឹងទុករបស់កម្ចីអជីវកម្ម: $E = 85 \times 0.60 = 51$

តម្លៃរំពឹងទុករបស់កម្ចីបុគ្គល: $E = 85 \times 0.30 = 25.5$

តម្លៃរំពឹងទុករបស់កម្ចីកសិករ: $E = 85 \times 0.10 = 8.5$


- ជំហានទី៤: គណនា $\chi^2_{Stat.}$ ដោយប្រើរូបមន្ត (9.1): $\chi^2_{Stat.} = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$

$$\chi^2_{Stat.} = \frac{(62-51)^2}{51} + \frac{(13-25.5)^2}{25.5} + \frac{(10-8.5)^2}{8.5} = 8.76 \quad (p=0.012)$$

- **ជំហានទី៥:** ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

ដោយ $\chi^2_{Stat.}=8.76 > \chi^2_{0.05,2} = 5.991$ ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធ (មើលរូប 9.2)

រូប 9.2 បំណែងចែកឆាយឈ្នួចព័ត៌មានការតេស្តលើគោលនយោបាយរបស់ធនាគារពាណិជ្ជ



- **ជំហានទី៦:** សន្និដ្ឋាន

នៅកំរិត $\alpha = 0.05$ សវនករមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា ការអនុវត្តរបស់ធនាគារពាណិជ្ជនេះមិនគោរពតាមគោលនយោបាយរបស់ធនាគារជាតិនោះឡើយ។

- ii) ការប្រើក្រីវែលយូ (p-value)

បន្ទាប់ពីបានតម្លៃឆាយឈ្នួចតេស្តរួច យើងអាចរកតម្លៃ ក្រីវែលយូ ។ $\chi^2_{Stat.}=8.76$ ហើយមាន $df=2$ តាមរយៈ Excel យើងបាន $p\text{-value} = 0.012 < 0.05$ ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធ ហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានដូចមុន។

- iii) ការប្រើកម្មវិធីស្វែង (Software)

តារាង 9.1 គឺជាលទ្ធផលឆាយឈ្នួចតេស្តរបស់ SPSS នៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើង។ សូមអ្នកអានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃឆាយឈ្នួចតេស្តនិង p-value នៅក្នុងតារាងនេះដោយខ្លួនឯង។

តារាង 9.1 លទ្ធផលនៃឆាយឈ្នួចតេស្តរបស់ SPSS

Test Statistics	
	Loan
Chi-Square	8.765 ^a
df	2
Asymp. Sig.	.012

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5.

The minimum expected cell frequency is 8.5.

□

9.2 តាមល្បែកស្តេស្តសម្រាប់តារាងខ្វែង

9.2.1 តាមល្បែកស្តេស្តរកតម្លៃខុសគ្នារវាងសមាមាត្រពីរ

នៅក្នុងជំពូកមុន អ្នកបានប្រើ Z-test ដើម្បីតេស្តរកតម្លៃខុសគ្នារវាងសមាមាត្រពីរ តែសម្រាប់ពេលនេះគឺអ្នកនឹងសិក្សាអំពីតាមល្បែកស្តេស្តរកតម្លៃខុសគ្នារវាងសមាមាត្រពីរវិញម្តង។ លទ្ធផលនៃតេស្តទាំងពីរគឺស្រដៀងគ្នា។

តាមល្បែកស្តេស្តគឺផ្នែកលើតារាងខ្វែង (cross or contingency table) ដែលអ្នកបានសិក្សានៅជំពូកទីពីរ។ សូមរំលឹកថា តារាងខ្វែងគឺទាក់ទងទៅនឹងអថេរប្រភេទ (categorical variables) ហើយប្រសិនបើមានអថេរប្រភេទពីរនោះ យើងនឹងបានតារាងខ្វែង 2×2 (ជួរដេកពីរ និងជួរឈរពីរ) ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង 9.2។

តារាង 9.2 ទម្រង់នៃតារាងខ្វែង 2×2

	ក្រុម		
អថេរ	1	2	សរុប
វត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍	X_1	X_2	X
វត្ថុដែលមិនចាប់អារម្មណ៍	$n_1 - X_1$	$n_2 - X_2$	$n - X$
សរុប	n_1	n_2	n

ហើយ $X_1 =$ ចំនួនវត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងក្រុមទីមួយ

$X_2 =$ ចំនួនវត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងក្រុមទីពីរ

$n_1 - X_1 =$ ចំនួនវត្ថុដែលមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងក្រុមទីមួយ

$n_2 - X_2 =$ ចំនួនវត្ថុដែលមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងក្រុមទីពីរ

$X = X_1 + X_2 =$ ចំនួនវត្ថុដែលចាប់អារម្មណ៍សរុប

$n_1 =$ ចំនួនប៉ាន់គំរូនៃក្រុមទីមួយ

$n_2 =$ ចំនួនប៉ាន់គំរូនៃក្រុមទីពីរ

$n = n_1 + n_2 =$ ចំនួនប៉ាន់គំរូសរុប

ដើម្បីតេស្តលើសមាមាត្រពីរ យើងត្រឡប់ទៅឧទាហរណ៍ 8.3 នៅក្នុងជំពូកទី៨ ដែលទាក់ទងទៅនឹងសមាមាត្របុរសនិងស្ត្រីគាំទ្របេក្ខភាព A។ ហើយឥឡូវយើងរៀបចំទិន្នន័យទាំងនោះជាតារាងខ្វែង 2×2 ដូចខាងក្រោម៖

តារាង 9.3 សមាមាត្របុរសនិងស្រ្តីគាំទ្របេក្ខភាព A

អរថេរ	ក្រុម		
	បុរស	ស្រ្តី	សរុប
គាំទ្រ	36	35	71
មិនគាំទ្រ	36	15	51
សរុប	72	50	122

ដើម្បីកំណត់ថា សមាមាត្របុរសនិងស្រ្តីដែលបានគាំទ្របេក្ខភាព A ខុសពីសមាមាត្រស្រ្តីដែលបានគាំទ្របេក្ខភាព A នោះ យើងប្រើឆាយឈ្មោះតេស្តចំពោះភាពខុសគ្នារវាងសមាមាត្រពីរ (Chi-square test for difference between two proportion) ។ សម្មតិកម្មមោឃៈរបស់តេស្តនេះបានកំណត់ថា $H_0: \pi_1 = \pi_2$ ហើយសមីការរបស់តេស្តនេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងសមីការ 9.2។

$$\chi^2_{Stat} = \sum_{all\ cell} \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \quad (9.2)$$

ហើយ f_o = ចំនួនប្រេកង់អង្កេត (observed frequency) នៅក្នុងសែល (cell) នៃតារាងខ្វែង

f_e = ចំនួនប្រេកង់ដែលបានរំពឹងទុកក្នុងសែល (cell) នៃតារាងខ្វែង

χ^2_{Stat} មានទម្រង់ជាបំណែងចែកប្រហាក់ប្រហែល χ^2 -distribution ដែលមាន df នៅក្នុងតារាងខ្វែងស្មើទៅនឹងចំនួនជួរដេកដកមួយ គុណចំនួនជួរឈរដកមួយ (number of row -1 times number of column -1)។

បើ χ^2_{Stat} ធំជាង χ^2 -critical នោះ $H_0: \pi_1 = \pi_2$ នឹងត្រូវបានបដិសេធ ហើយផ្ទុយមកវិញ បើតូចជាង គឺ H_0 នឹងមិនត្រូវបានបដិសេធនោះទេ (មើលរូប 9.1)។

ដើម្បីបង្ហាញថាឆាយឈ្មោះតេស្តរបៀបណា សូមយើងត្រឡប់ទៅឧទាហរណ៍ 8.3 របស់យើងឡើងវិញ។

i) តេស្តស្ថិតិ

- ជំហានទី១: សរសេរសម្មតិកម្ម

$H_0: \pi_1 = \pi_2$ សមាមាត្របុរសនិងស្រ្តីគាំទ្របេក្ខភាព A គឺស្មើគ្នា

$H_0: \pi_1 \neq \pi_2$ សមាមាត្របុរសនិងស្រ្តីគាំទ្របេក្ខភាព A គឺមិនស្មើគ្នា

- ជំហានទី២: បើ $\alpha = 0.05$ ត្រូវបានគេជ្រើសរើសហើយ ឆាយឈ្មោះដែលមាន $df = (Row - 1) * (Column - 1) = (1 * 1) = 1$ ដូច្នេះយើងបាន χ^2 -critical = 3.841

- ជំហានទី៣: គណនាមធ្យមសមាមាត្រ (រូបមន្ត 8.7 ជំពូកទី 8)

$$\bar{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2} = \frac{X}{n} = \frac{37 + 35}{72 + 50} = \frac{71}{122} = 0.582$$

$\bar{p}$ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប៉ាន់ស្មាន π ដែលជាសមាមាត្រតំណាងអោយការគាំទ្របេក្ខភាព A។ ដោយផ្អែកលើចំនួនប៉ាន់ស្មានសរុប 122 សមាមាត្រដែលគាំទ្របេក្ខភាព A គឺ 58.2% ហើយសមាមាត្រដែលមិនគាំទ្រគឺ $1 - 0.582$ ឬ 41.8%.

- ជំហានទី៤: គណនាប្រេកង់ដែលបានរំពឹងទុក

តារាង 9.4 ប្រេកង់ដែលបានរំពឹងទុក

	ប្រេកង់ដែលបានរំពឹងទុក (f_e) (គាំទ្រ) = $\bar{p} * n_i$	ប្រេកង់ដែលមិនបានរំពឹងទុក (f_e) (មិនគាំទ្រ) = $(1 - \bar{p}) * n_i$
បុរស	$0.582 * 72 = 41.902$	$(1-0.582) * 72 = 30.096$
ស្រី	$0.582 * 50 = 29.1$	$(1-0.582) * 50 = 20.9$

- ជំហានទី៥: បញ្ចូលតារាងរំពឹងទុកចូលក្នុងតារាងអង្កតជាក់ស្តែង

តារាង 9.5 តារាងរំពឹងទុកជាមួយនិងតារាងអង្កតជាក់ស្តែង

	ក្រុម		
អរថេរ	បុរស	ស្រី	សរុប
គាំទ្រ	$f_0 = 36$ $f_e = 41.902$	$f_0 = 35$ $f_e = 29.1$	71
មិនគាំទ្រ	$f_0 = 36$ $f_e = 30.096$	$f_0 = 15$ $f_e = 20.9$	51
សរុប	72	50	122

- ជំហាន៦: គណនាឆាយឈ្នួតេស្ត

$$\chi^2_{Stat} = \sum_{all\ cell} \frac{(f_0 - f_e)^2}{f_e} = \frac{(36-41.902)^2}{41.902} + \frac{(35-29.1)^2}{29.1} + \frac{(36-30.096)^2}{30.096} + \frac{(15-20.9)^2}{20.9}$$

$$= 0.8313 + 1.1962 + 1.1582 + 1.6655$$

$$= 4.8512$$

- ជំហានទី៧: ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

ដោយសារតែតម្លៃឆាយឈ្នួតេស្ត $\chi^2_{Stat} = 4.8512 > \chi^2\text{-critical} = 3.841$, ដូច្នេះ $H_0: \pi_1 = \pi_2$ ត្រូវបានបដិសេធ ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា សមាមាត្របុរសនិងស្រីដែលគាំទ្របេក្ខភាព A គឺមិនដូចគ្នាទេ។

- ii) ការប្រើកម្រិតវិលយូ (p-value)

បន្ទាប់ពីបានតម្លៃ ឆាយឈ្នួតេស្តរួចមក យើងអាចគណនាតម្លៃ ក៏វិលយូតាមរយៈ Excel ។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង $\chi^2_{Stat} = 4.8512$ ហើយមាន $df=1$ យើងបាន $p=0.0276 < 0.05$ ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធនៅកំរិតអាលហ្វា 5% ហើយយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចមុន។

- iii) ការប្រើកម្មវិធីស៊ុវ៉េ (Software)

តារាង 9.6 គឺជាលទ្ធផលឆាយឈ្នួតេស្តរបស់ SPSS នៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើង។ សូមអ្នកអានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃឆាយឈ្នួតេស្តនិង p-value នៅក្នុងតារាងនេះដោយខ្លួនឯង។

តារាង 9.6 លទ្ធផលឆាយឈ្នួតេស្តតាមតារាងខ្វែងរបស់ SPSS

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.852 ^a	1	.028		
Continuity Correction ^b	4.064	1	.044		
Likelihood Ratio	4.935	1	.026		
Fisher's Exact Test				.040	.021
Linear-by-Linear Association	4.812	1	.028		
N of Valid Cases	122				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.90.

b. Computed only for a 2x2 table

9.2.2 ឆាយវិធីស្តារកកាតខុសគ្នារវាងសមាមាត្រលើសពីពីរ

នៅក្នុងផ្នែកនេះយើងធ្វើការពង្រីកការប្រើប្រាស់ឆាយវិធីស្តារទៅលើសមាមាត្រនៃចំនួនសកលឯករាជ្យលើសពីពីរ។ វាស្របដៀងទៅនឹងការធ្វើតេស្តទៅលើចំនួនសមាមាត្រពីរដែរ ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការពង្រីកចំនួនគូឡោន (c) នៅក្នុងតារាងខ្វែង (contingency table)។ ហើយសម្មតិកម្មមោឃៈគឺ មិនមានភាពខុសគ្នារវាងសមាមាត្រនៃចំនួនសកលពីរនោះទេ។

$$H_0: \pi_1 = \pi_2 = \dots \pi_c$$

$$H_1: \text{មិនមែន } \pi_j \text{ ទាំងអស់ស្មើគ្នានោះទេ (j=1,2,\dots,c)}$$

ហើយរូបមន្តឆាយវិធីស្តារ (9.1) មុន

$$\chi^2_{Stat} = \sum_{all\ cell} \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \quad (9.1)$$

ហើយ f_o = ចំនួនប្រៀបធៀបដែលបានអង្កេត នៅក្នុងសែល (cell) នៃតារាងខ្វែង $2 \times c$

f_e = ចំនួនប្រៀបធៀបដែលបានរំពឹងទុកក្នុងសែល (cell) នៃតារាងខ្វែង

χ^2_{Stat} សម្រាប់ $2 \times c$ ដែលមាន $df = (2-1) \times (c-1) = c-1$ ដោយសន្មត់ថានៅក្នុងសែល (cell) នៃតារាងខ្វែងនីមួយៗមានយ៉ាងតិចមួយ។

បើ χ^2_{Stat} ធំជាង χ^2 -critical នោះ H_0 នឹងត្រូវបានបដិសេធ ហើយផ្ទុយមកវិញ បើតូចជាង គឺ H_0 នឹងមិនត្រូវបានបដិសេធនោះទេ។

ដើម្បីគណនាសមាមាត្រដែលមាន c ក្រុម យើងត្រូវពង្រីកសមីការ 9.2 ទៅតទៅ៖

$$\bar{p} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_c}{n_1 + n_2 + \dots + n_c} = \frac{X}{n} \quad (9.3)$$

បន្ទាប់ពីបានតម្លៃ $\bar{p}$ យើងអាចយកមកគណនាតម្លៃសមាមាត្រដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ និងសមាមាត្រដែលមិនចាប់អារម្មណ៍។

- តម្លៃសមាមាត្រដែលចាប់អារម្មណ៍ (expected frequency of interest proportion) គឺ៖

$$f_e = n_1 * \bar{p} \quad (9.4)$$

- តម្លៃសមាមាត្រដែលមិនចាប់អារម្មណ៍ (expected frequency of not interest proportion) គឺ៖

$$f_{e1} = n_i * (1 - \bar{p}) \quad (9.5)$$

ឧទាហរណ៍ 9.1 កាស្តង់មតិមួយបានធ្វើទៅលើសិស្សចំនួនសរុប 500នាក់ ចេញពីវិទ្យាល័យចំនួនបី A B និង C ទាក់ទងដល់ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គេចំពោះមុខវិទ្យាគណិតវិទ្យា។ ចូលចិត្ត (yes) ឬមិនពេញចិត្ត (no) ។ ទិន្នន័យទាំងអស់នេះបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង 9.4។

តារាង 9.7 តារាងអង្កេត 2*3 របស់ប៉ាន់ស្មាន (f_o)

	វិទ្យាល័យ			សរុប
	A	B	C	
ចូលចិត្ត	190	160	110	460
មិនចូលចិត្ត	50	40	50	140
សរុប	240	200	160	600

បន្ទាប់មកយើងគណនា សមាមាត្រដែលចូលចិត្តគណិតវិទ្យារបស់វិទ្យាល័យទាំងបី ($\bar{p}$) ដើម្បីប៉ាន់ស្មានតម្លៃសមាមាត្ររបស់ចំនួនសកល (π) ដោយប្រើរូបមន្ត (9.3)។

$$\bar{p} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_c}{n_1 + n_2 + \dots + n_c} = \frac{(190 + 160 + 110)}{(240 + 200 + 160)} = \frac{460}{600} = 0.7667$$

ដូច្នេះសិស្សដែលចូលចិត្តមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាមាន 76.67% ហើយសិស្សដែលមិនចូលចិត្តមុខវិជ្ជានេះមាន (1- $\bar{p}$) ឬ 23.33%។

បន្ទាប់មកយើងគណនា តម្លៃសមាមាត្រដែលចាប់អារម្មណ៍ដោយប្រើរូបមន្ត 9.4

- សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើងតម្លៃសមាមាត្រដែលចាប់អារម្មណ៍គឺ ការចូលចិត្តមុខវិទ្យាគណិតរួមមាន៖

- តម្លៃរំពឹងទុករបស់វិទ្យាល័យ A: $f_e = n_1 * \bar{p} = 240 * 0.7667 = 184$
- តម្លៃរំពឹងទុករបស់វិទ្យាល័យ B: $f_e = n_2 * \bar{p} = 200 * 0.7667 = 153.33$
- តម្លៃរំពឹងទុករបស់វិទ្យាល័យ C: $f_e = n_3 * \bar{p} = 160 * 0.7667 = 122.67$

- ហើយសមាមាត្ររំពឹងទុករបស់សិស្សដែលមិនចូលចិត្តមុខវិទ្យាគណិត គឺត្រូវគណនាតាមរូបមន្ត៖

$$f_{e1} = n_i * (1 - \bar{p}) \quad (9.5)$$

- តម្លៃរំពឹងទុកមិនចូលចិត្តរបស់វិទ្យាល័យ A: $f_{e1} = 240 * (1 - 0.7667) = 56$
- តម្លៃរំពឹងទុកមិនចូលចិត្តរបស់វិទ្យាល័យ B: $f_{e1} = 200 * (1 - 0.7667) = 46.67$
- តម្លៃរំពឹងទុកមិនចូលចិត្តរបស់វិទ្យាល័យ C: $f_{e1} = 160 * (1 - 0.7667) = 37.33$

តារាង 9.8 តារាងរំពឹងទុក 2×3 (f_e)

	វិទ្យាល័យ			
	A	B	C	សរុប
ចូលចិត្ត	184	153.33	122.67	460
មិនចូលចិត្ត	56	46.67	37.33	140
សរុប	240	200	160	600

- ជំហានបន្ទាប់យើងសរសេរសម្មតិកម្មនៃតម្លៃសមាមាត្រ

$$H_0: \pi_1 = \pi_2 = \pi_3$$

$$H_1: \text{មិនមែន } \pi_j \text{ ស្មើគ្នា, (ហើយ } j = 1, 2, 3)$$

- វិធីដែលងាយស្រួលក្នុងការគណនាឆាយឈ្នួតេស្ត χ^2_{Stat} គឺយើងបញ្ចូលតារាង អង្កេត និងរំពឹងទុក ចូលក្នុងតារាងតែមួយ។

តារាង 9.10 សមាមាត្រអង្កេតនិងរំពឹងទុក

f_o	f_e	$(f_o - f_e)$	$(f_o - f_e)^2$	$\frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$
190	184	6	36	0.195652
160	153.33	6.67	44.4889	0.290151
110	122.67	-12.67	160.5289	1.308624
50	56	-6	36	0.642857
40	46.67	-6.67	44.4889	0.953265
50	37.33	12.67	160.5289	4.300265
សរុប				7.69

$$\chi^2_{Stat} = \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} = 7.69$$

- បើ $\alpha = 0.05$ និងឆាយឈ្នួតេស្តដែលមាន $df = c-1 = 3-1 = 2$, តាមតារាង E 4 យើងបានតម្លៃ $\chi^2_{0.05,2} = 5.991$
- ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត៖ ដោយសារ $\chi^2_{Stat} = 7.69 > \chi^2_{0.05,2} = 5.991$ ដូច្នេះ $H_0: \pi_1 = \pi_2 = \pi_3$ ត្រូវបានបដិសេធនូវកំរិត $\alpha = 0.05$ ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាចំណង់ ចំណូលចិត្តរបស់សិស្សវិទ្យាល័យទាំងបីគឺមិនស្មើគ្នានោះទេ។

ii) ការប្រើកម្រិតដែលយូ (p-value)

បន្ទាប់ពីបានតម្លៃ ឆាយឈ្នួតេស្តរួចមក យើងអាចគណនាតម្លៃ p-value តាមរយៈ Excel Calculator។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង $\chi^2_{Stat} = 7.69$ ហើយមាន $df=2$ យើងបាន $p\text{-value} = 0.021 < 0.05$ ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធនៅកំរិតអាលហ្វា 5% ហើយយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចមុន។

iii) ការប្រើកម្មវិធីសូហ្វ (Software)

តារាង 9.7 គឺជាលទ្ធផលឆាយឈ្នួតេស្តរបស់ SPSS នៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើង។ សូមអ្នកអានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃឆាយឈ្នួតេស្តនិង p-value នៅក្នុងតារាងនេះដោយខ្លួនឯង។

តារាង 9.11 លទ្ធផលឆាយឈ្នួតេស្តរបស់ SPSS

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.686 ^a	2	.021
Likelihood Ratio	7.383	2	.025
N of Valid Cases	600		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37.33.

9.3 តាមឈ្នួតេស្តរកភាពឯករាជ្យ

នៅផ្នែកមុនយើងបានសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ឆាយឈ្នួតេស្តដើម្បីរកតម្លៃខុសគ្នារវាងសមាមាត្រពីរ ឬច្រើនដោយផ្អែកលើតារាងខ្វែង។ ឥឡូវយើងបន្តប្រើតារាងខ្វែងដែលមានជួរដេក (r) និងជួរឈរ (c) ដើម្បីបង្កើតករណីទូទៅមួយសម្រាប់ការប្រើឆាយឈ្នួតេស្តរកភាពឯករាជ្យ (Chi-square test for independence) នៃចំនួនសកលដែលមានលក្ខណៈសមាមាត្រពីរ។

- សម្មតិកម្មនៃភាពឯករាជ្យ

H_0 : អថេរប្រភេទពីរឯករាជ្យពីគ្នា (មិនទាក់ទងគ្នា)

H_1 : អថេរប្រភេទពីរមិនឯករាជ្យពីគ្នា (ទាក់ទងគ្នា)

- ចំណែករូបមន្តគឺនៅដែលគឺរូបមន្ត 9.1៖

$$\chi^2_{Stat} = \sum_{all\ cell} \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \quad (9.1)$$

ហើយ f_o = ចំនួនប្រេកង់ដែលបានអង្កេត (observed frequency) នៅក្នុងសែល (cell) នៃតារាងខ្វែង (ដូចមុន)

f_e = ចំនួនប្រេកង់ដែលបានរំពឹងទុកក្នុងសែលនៃតារាងខ្វែង (ដូចមុន)

- ការតេស្តគឺនៅដែលដូចមុន បើ χ^2_{Stat} ធំជាង χ^2 -critical នោះ $H_0: \pi_1 = \pi_2$ នឹងត្រូវបានបដិសេធហើយផ្ទុយមកវិញ បើតូចជាង គឺ H_0 នឹងមិនត្រូវបានបដិសេធនោះទេ។
- ដោយឡែកប្រេកង់ដែលរំពឹងទុកត្រូវបានគណនាដូចរូបមន្ត 9.6៖

$$f_e = \frac{\text{Row Total} \times \text{Column Total}}{n} \quad (9.6)$$

ហើយ ចំនួនរួសរូប (row total) = ផលបូកនៃប្រេកង់ទាំងអស់នៅក្នុងជួរដេក

ចំនួនជួរឈររួសរូប (column total) = ផលបូកនៃប្រេកង់ទាំងអស់នៅក្នុងជួរឈរ

n = ចំនួនប៉ាន់គំរូ

ឧទាហរណ៍ 9.3 ការស្ទង់មតិមួយដើម្បីសិក្សាទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវក្នុងការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារក្នុងតំបន់មួយនៃក្រុងព្រះសីហនុ។ ដើម្បីឲ្យដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការធ្លាក់ចុះនេះ អ្នកសិក្សាម្នាក់បានធ្វើការសាកសួរទៅលើប៉ាន់គំរូសណ្ឋាគារចំនួនបីប្រភេទ (A=ទំហំធំ B=កណ្តាល និង C=តូច) ៖ A ចំនួន 100 នាក់ B ចំនួន 40 នាក់ និង C ចំនួន 80 នាក់ ដែលទាក់ទងជាមួយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវមិនត្រឡប់មកស្នាក់នៅជាថ្មី៖

- 1) តម្លៃ
- 2) ទីតាំង
- 3) លក្ខណៈបន្ទប់
- 4) និងកត្តាផ្សេងៗ

ទិន្នន័យទាំងនេះមាននៅក្នុងតារាង 9.10។

តារាង 9.12 តារាងខ្វែង ហេតុផលមិនត្រឡប់មកស្នាក់នៅជាថ្មី

	ប្រភេទសណ្ឋាគារ			
ហេតុផលមិនត្រឡប់	A	B	C	សរុប
តម្លៃ	30	8	40	78
ទីតាំង	40	16	12	68
បន្ទប់	15	7	18	40
ផ្សេងៗ	15	9	10	34
សរុប	100	40	80	220

i) ការប្រើតេស្តស្ថិតិ

- ជំហានទី1: សរសេរសម្មាតិកម្ម

H_0 : ប្រភេទសណ្ឋាគារគឺឯករាជ្យទៅនឹងហេតុផលមិនត្រឡប់មកវិញ (មិនទាក់ទងគ្នា)

H_1 : ប្រភេទសណ្ឋាគារគឺមិនឯករាជ្យទៅនឹងហេតុផលមិនត្រឡប់មកវិញ (ទាក់ទងគ្នា)

- ជំហានទី2: គណនាតម្លៃរំពឹងទុករបស់ស៊ែលនីមួយៗតាមរូបមន្ត 9.6

- ស៊ែល (ថ្លៃរបស់ A) = $(78 \times 100) / 220 = 35.45$
- ស៊ែល (ទីតាំងរបស់ A) = $(68 \times 100) / 220 = 30.91$
- ស៊ែល (បន្ទប់របស់ A) = $(40 \times 100) / 220 = 18.18$
- ស៊ែល (ផ្សេងៗរបស់ A) = $(34 \times 100) / 220 = 15.45$

ចំពោះតម្លៃរំពឹងទុកនៃស៊ែល (cell) ដទៃទៀតរបស់សណ្ឋាគារ B និង C គឺត្រូវបានគណនាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដូចគ្នា ហើយលទ្ធផលទាំងនោះត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងតារាង 9.11 ខាងក្រោម៖

តារាង 9.13 តម្លៃរំពឹងទុករបស់សណ្ឋាគារនីមួយៗ

	សណ្ឋាគារ			
ហេតុផលមិនត្រឡប់	A	B	C	សរុប
តម្លៃ	35.45	14.18	28.36	78
ទីតាំង	30.91	12.36	24.73	68
បន្ទប់	18.18	7.27	14.54	40
ផ្សេងៗ	15.45	6.18	12.36	34
សរុប	100	40	80	220

• ជំហានទី៣: គណនាឆាយឈ្នួតេស្ត

តារាង 9.14 គណនាឆាយឈ្នួតេស្តលើភាពឯករាជ្យ

ស៊ែល (cell)	f_o	f_e	$(f_o - f_e)$	$(f_o - f_e)^2$	$(f_o - f_e)^2 / f_e$
តម្លៃរបស់ A	30	35.45	-5.45	29.7025	0.83787
ទីតាំងរបស់ A	40	30.91	9.09	82.6281	2.673183
បន្ទប់របស់ A	15	18.18	-3.18	10.1124	0.556238
ផ្សេងៗរបស់ A	15	15.45	-0.45	0.2025	0.013107
តម្លៃរបស់ B	8	14.18	-6.18	38.1924	2.693399
ទីតាំងរបស់ B	16	12.36	3.64	13.2496	1.071974
បន្ទប់របស់ B	7	7.27	-0.27	0.0729	0.010028
ផ្សេងៗរបស់ B	9	6.18	2.82	7.9524	1.286796
តម្លៃរបស់ C	40	28.36	11.64	135.4896	4.777489
ទីតាំងរបស់ C	12	24.73	-12.73	162.0529	6.552887
បន្ទប់របស់ C	18	14.54	3.46	11.9716	0.823356
ផ្សេងៗរបស់ C	10	12.36	-2.36	5.5696	0.450615
					21.74694

$$\chi^2_{Stat} = \sum_{all\ cell} \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} = 21.74694 \quad (p = 0.00134)$$

• ជំហានទី៤: ធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត

ឆាយឈ្នួតេស្តដែលមាន $df = (r-1) * (c-1) = (4-1)(3-1) = 6$

បើសិន $\alpha = 0.05$, ដូច្នេះតាមតារាងបំណែងចែកឆាយឈ្នួតេស្តយើងបាន $\chi^2_{0.05,6} = 12.5921$

ដោយ $\chi^2_{Stat} = 21.74694 > \chi^2_{0.05,6} = 12.592$ ។ ដូច្នេះយើងបដិសេធ H_0 ហើយសន្និដ្ឋានថា យើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា ប្រភេទសណ្ឋាគារ (A=ទំហំធំ B=កណ្តាល និង C=តូច) មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងហតុផលមិនត្រូវទប់មកជួលសណ្ឋាគារវិញ។

ii) ការប្រើក្រីវីលយូ (p-value)

បន្ទាប់ពីបានតម្លៃ ឆាយឈ្នួតេស្តរួចមក យើងអាចគណនាតម្លៃ p-value តាមរយៈ Excel Calculator។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង $\chi^2_{Stat} = 21.74694$ ហើយមាន $df=6$ យើងបាន $p\text{-value} = 0.001 < 0.05$ ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធនៅកំរិតអាលហ្វា 5% ហើយយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចមុន។

iii) ការប្រើកម្មវិធីស៊ុវ៉ែ (Software)

តារាង 9.15 គឺជាលទ្ធផលឆាយឈ្នួតេស្តរបស់ SPSS នៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើង។ សូមអ្នកអានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃឆាយឈ្នួតេស្តនិង p-value នៅក្នុងតារាងនេះដោយខ្លួនឯង។

តារាង 9.15 ឆាយឈ្នួតេស្តរកភាពឯករាជ្យនៃសណ្ឋាគារផ្តល់ដោយ SPSS

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	21.739 ^a	6	.001
Likelihood Ratio	22.830	6	.001
Linear-by-Linear Association	1.002	1	.317
N of Valid Cases	220		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.18.

9.4 ម៉ាកណេម៉ាតេស្ត

នៅពេលដែលអ្នកប្រមូលប៉ាន់គំរូជាគួរ ឬវាស់វែងច្រើនដង (repeated sample) ឧទាហរណ៍ដូចជា មុនប្រឡង និងក្រោយប្រឡង គឺយើងមិនអាចប្រើឆាយឈ្នួតេស្តធម្មតាបានទេ។ អ្នកត្រូវប្រើម៉ាកណេម៉ាតេស្ត (McNemar's Test)។ ទ្វីបឆាយឈ្នួតេស្តនិងម៉ាកណេម៉ាតេស្តត្រូវបានប្រើសម្រាប់តេស្តលើសមាមាត្រ តែតេស្តទាំងពីរគឺខុសគ្នា ឆាយឈ្នួតេស្តគឺតម្រូវឲ្យទិន្នន័យឯករាជ្យពីគ្នា (independent sample) ចំណែកម៉ាកណេម៉ាតេស្តគឺតម្រូវឲ្យទិន្នន័យទាក់ទងគ្នា (related sample) ហើយការរៀបចំទិន្នន័យក៏មិនដូចឆាយឈ្នួតេស្តធម្មតាដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត ម៉ាកណេម៉ាតេស្តមានទម្រង់ដូចបំណែងចែកធម្មតា (normal distribution)។

តារាង 9.16 កំណត់អំពីទម្រង់របស់ម៉ាកណេម៉ាតេស្ត។ តារាងនេះគឺជាតារាងខ្វែងដូចគណិតវិទ្យារបស់ឆាយឈ្នួតេស្តប៉ុន្តែរបៀបគណនាសមាមាត្រគឺខុសគ្នា។

តារាង 9.16 តារាងខ្វែង 2 x 2 សម្រាប់ម៉ាកណេម៉ាតេស្ត

	After Condition (group 2)	
--	---------------------------	--

Before Condition (group 1)	Yes	No	Total
Yes	A	B	A+B
No	C	D	C+D
Total	A+C	B+D	n

ហើយ $A =$ ចំនួនអ្នកឆ្លើយបាទ ចំពោះលក្ខខណ្ឌទីមួយ និងបាទចំពោះលក្ខខណ្ឌទីពីរ
 $B =$ ចំនួនអ្នកឆ្លើយបាទ ចំពោះលក្ខខណ្ឌទីមួយ និងទេចំពោះលក្ខខណ្ឌទីពីរ
 $C =$ ចំនួនអ្នកឆ្លើយទេ ចំពោះលក្ខខណ្ឌទីមួយ និងបាទចំពោះលក្ខខណ្ឌទីពីរ
 $D =$ ចំនួនអ្នកឆ្លើយទេ ចំពោះលក្ខខណ្ឌទីមួយ និងទេ ចំពោះលក្ខខណ្ឌទីពីរ
 $n =$ ចំនួនអ្នកឆ្លើយក្នុងប៉ាន់គំរូ

- សមាមាត្រនៃប៉ាន់គំរូដែលចាប់អារម្មណ៍គឺ៖

$$p_1 = \frac{A+B}{n} = \text{សមាមាត្ររបស់អ្នកឆ្លើយ "បាទ" ចំពោះលក្ខខណ្ឌទីមួយ}$$

$$p_2 = \frac{A+C}{n} = \text{សមាមាត្ររបស់អ្នកឆ្លើយ "បាទ" ចំពោះលក្ខខណ្ឌទីពីរ}$$

- សម្មតិកម្មត្រូវតែស្គាល់សមាមាត្រអាចមានកន្ទុយសងខាងនិងកន្ទុយម្ខាង៖

$$\circ H_0: \pi_1 = \pi_2 \quad \text{និង} \quad H_1: \pi_1 \neq \pi_2 \quad \text{ឬ}$$

$$\circ H_0: \pi_1 \geq \pi_2 \quad \text{និង} \quad H_1: \pi_1 < \pi_2 \quad \text{ឬ}$$

$$\circ H_0: \pi_1 \leq \pi_2 \quad \text{និង} \quad H_1: \pi_1 > \pi_2$$

- ម៉ាកណេម៉ាតេស្តស្ថិតិអាចតេស្តបានពីរបៀប ហើយករណីទាំងពីរគឺពឹងផ្អែកលើតារាងខ្វែង 2x2 តែមួយ

1. McNemar's Z-test

$$Z_{stat.} = \frac{B-C}{\sqrt{B+C}} \quad (9.7)$$

ហើយ $Z_{stat.}$ មានបំណែងចែកដូច the normal distribution

$B =$ មុនឆ្លើយ YES ក្រោយឆ្លើយ NO បើ B កាន់តែធំ ក្រោយដាក់លក្ខខណ្ឌ ឆ្លើយ NO កាន់តែច្រើន។

$C =$ មុនឆ្លើយ NO ក្រោយឆ្លើយ YES បើ C កាន់តែធំ ក្រោយដាក់លក្ខខណ្ឌឆ្លើយ YES កាន់តែច្រើន ។

- បើ $B > C$ ឬតម្លៃ $Z_{stat.} > 0$ ហើយបើ $Z_{stat.}$ មាន p-value < 0.05 ថែមទៀត នោះមានន័យថា បន្ទាប់ពីដាក់លក្ខខណ្ឌរួច $NO > YES$ ឬលក្ខខណ្ឌគ្មានប្រសិទ្ធភាព។
- បើ $B < C$ ឬតម្លៃ $Z_{stat.} < 0$ ហើយបើ $Z_{stat.}$ មាន p-value > 0.05 ថែមទៀត នោះមានន័យថា បន្ទាប់ពីដាក់លក្ខខណ្ឌ $NO < YES$ ឬលក្ខខណ្ឌមានប្រសិទ្ធភាព។

- ការសំរេចចិត្តបដិសេធដូចករណីធម្មតាដែរ៖
 - $Z\text{-stat.} > Z_\alpha$ បដិសេធអ₀
 - $Z\text{-stat.} < Z_\alpha$ មិនបដិសេធអ₀

2. McNemar's χ^2 -test¹⁷

$$\chi^2 = \frac{(B-C)^2}{B+C} \quad (9.10)$$

បើសិនជាស៊េរី C និង B ធំគ្រប់គ្រាន់ តម្លៃ χ^2 មានទម្រង់ដូចបំណែងចែកឆាយឈ្មោះដែលមាន $df=1$ ។

ប្រហែលជាមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពី Quinn McNemar បានចេញផ្សាយរូបមន្តតេស្តរបស់គាត់ លោក Edwards បានស្នើឲ្យមានការកែរូបមន្តឆាយឈ្មោះទៅជា (9.11) ដែលយើងប្រើរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។

ឆាយឈ្មោះដែលធ្វើកំណែត្រឹមត្រូវ (Chi-square Continuity Corrected Version)

$$\chi^2 = \frac{(|B - C| - 1)^2}{B + C} \quad (9.11)$$

ឧទាហរណ៍ 9.4 ឧបមាថា អ្នកធ្វើការសាកសួរទៅលើអតិថិជនចំនួន 400 នាក់ ទាក់ទងដល់ចំណាប់អារម្មណ៍នៃការទទួលយកឥទ្ធិសារជាថ្មីនៃការបង់រំលូសផ្ទះ មុននឹងប្តូរលក្ខខណ្ឌ។ បន្ទាប់ពីកែប្រែលក្ខខណ្ឌបង់រំលូស ហើយដើម្បីកំណត់ថា ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌក្នុងការបង់រំលូសមានប្រសិទ្ធភាព អ្នកធ្វើការសាកសួរទៅលើ 400 នាក់ដដែល ហើយពួកគេបានឆ្លើយដូចខាងក្រោម៖

- មុនកែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឆ្លើយ yes និងក្រោយកែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឆ្លើយ yes មាន 140 នាក់

តារាង 9.17 ភាពស្មោះត្រង់ជាមួយម៉ាកសញ្ញា

មុនកែប្រែលក្ខខណ្ឌ	ក្រោយកែប្រែលក្ខខណ្ឌ		សរុប
	yes	no	
yes	140	40	180
no	20	200	220
សរុប	160	240	400

- មុនកែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឆ្លើយ yes និងក្រោយកែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឆ្លើយ no មាន 40 នាក់
- មុនកែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឆ្លើយ no និងក្រោយកែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឆ្លើយ yes មាន 20 នាក់
- មុនកែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឆ្លើយ no និងក្រោយកែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឆ្លើយ no មាន 200 នាក់។

ចំឡើយទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំជាតារាងខ្វែងដូចក្នុងតារាង 9.17។

¹⁷ McNemar's test for paired nominal data derived from

[http://rasbt.github.io/mlxtend/user_guide/evaluate/mcnemar/#:~:text=The%20McNemar%20test%20statistic%20\(%22chi,with%20one%20degree%20of%20freedom.](http://rasbt.github.io/mlxtend/user_guide/evaluate/mcnemar/#:~:text=The%20McNemar%20test%20statistic%20(%22chi,with%20one%20degree%20of%20freedom.)

តើការកែប្រែលក្ខខណ្ឌបង់រំលូសមិនមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬអត់ ?

ចម្លើយ៖

i) ការប្រើតេស្តស្ថិតិ

- ជំហានទី1: សម្មតិកម្មមោឃៈត្រូវសន្មត់ថាការកែប្រែលក្ខខណ្ឌបង់រំលូសមិនធ្វើឲ្យសមាមាត្រនៃចំនួនអ្នកខ្ចីមានការប្រែប្រួលនោះទេ ឬគ្មានប្រសិទ្ធភាព មានន័យថា សមាមាត្រនៃចំនួនអ្នកខ្ចីមុននិងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌបង់រំលូសគឺស្មើគ្នា

$H_0: \pi_1 = \pi_2$ ការប្តូរលក្ខខណ្ឌគឺមិនធ្វើឲ្យសមាមាត្រអ្នកខ្ចីមានការប្រែប្រួល

$H_0: \pi_1 \neq \pi_2$ ការប្តូរលក្ខខណ្ឌគឺមិនធ្វើឲ្យសមាមាត្រអ្នកខ្ចីមានការប្រែប្រួល

- ជំហានទី2: គណនាសមាមាត្រនៃប៉ាន់គំរូដែលចាប់អារម្មណ៍គឺ

- សមាមាត្ររបស់អ្នកឆ្លើយថា ខ្ចី មុនប្តូរលក្ខខណ្ឌ

$$p_1 = \frac{A+B}{n} = \frac{140+40}{400} = \frac{180}{400} = 0.45$$

- សមាមាត្ររបស់អ្នកឆ្លើយថា ខ្ចី ក្រោយប្តូរលក្ខខណ្ឌ

$$p_2 = \frac{A+C}{n} = \frac{140+20}{400} = \frac{160}{400} = 0.40$$

- ❖ សំគាល់: p_1 បានស្មានឬតំណាង π_1 ហើយ p_2 បានស្មានឬតំណាង π_2 ហើយ

បើ $\pi_1 \geq \pi_2$ ការក្រោយប្តូរលក្ខខណ្ឌគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាព

- ជំហានទី3: ជ្រើសរើស Z-critical បើ $\alpha=0.05$ ត្រូវបានជ្រើសរើសនោះតាមតារាង normal distribution យើងបានតម្លៃ $Z_{0.05} = \pm 1.645$

- ជំហានទី4: គណនា Z-test

$$Z_{stat.} = \frac{B-C}{\sqrt{(B+C)}} = \frac{40-20}{\sqrt{40+20}} = 2.582$$

- ជំហានទី5: ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

ដោយសារតែ $Z_{stat.} = 2.582 > Z_{0.05} = 1.645$ ($B > C$) ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធហើយយើងសន្និដ្ឋាជាបឋមថា មានស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌបង់រំលូសធ្វើឲ្យសមាមាត្រនៃចំនួនអ្នកខ្ចីមានការប្រែប្រួល។ មានន័យថា សមាមាត្រមុននិងក្រោយកែប្រែលក្ខខណ្ឌគឺមិនស្មើគ្នានេះទេ ដោយសារតែ H_0 ត្រូវបានបដិសេធក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកខ្ចីកើនច្រើនជាងមុន ឬថយច្រើនជាងមុន។ បើកើនច្រើនជាងមុនគឺមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែបើថយ ឬមិនប្រែប្រួលគឺមានន័យថាគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ ដូច្នេះជំហានបន្ទាប់ដែលត្រូវពិនិត្យលើតម្លៃនៃ B-C តាមរយៈនៃការប្រើ Z-test:

- $B-C > 0$ ឬ $Z_{stat.} > 0$, ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌបង់រំលូសគ្មានប្រសិទ្ធភាព

- $B-C < 0$ ឬ $Z_{stat.} < 0$, ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌបង់រំលូសមានប្រសិទ្ធភាព

ចំពោះករណីរបស់យើង $Z_{stat.} = 2.582 > 0$ ($p = 0.0098$) ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋាជាចុងក្រោយថា ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌបង់រំលូសមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ។

ឥឡូវយើងប្រើរូបមន្ត 9.11 ដើម្បីធ្វើការតេស្តលើសម្មតិកម្មទៅលើឧទាហរណ៍របស់យើងវិញម្តង តើលទ្ធផលដូច Z-test ឬយ៉ាងណា ?

$$\chi^2 = \frac{(|B-C|-1)^2}{B+C} = \frac{(|40-20|-1)^2}{40+20} = 6.0167 \quad (p=0.01417)$$

បើ $\alpha=0.05$ ត្រូវបានជ្រើសរើសនោះតាមតារាង Chi-square distribution យើងបានតម្លៃតាម លំយូលគោលដែលមាន $df=1$ គឺ $\chi^2_{0.025,1} = 5.024$ ។ ដោយសារ χ^2 -statistic = 6.0167 > $\chi^2_{0.025,1} = 5.024$ ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធ ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌបង់រំលូស ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឥទ្ធាន (សមាមាត្រអ្នកខ្ចីមុននិងក្រោយកែប្រែលក្ខខណ្ឌបង់រំលូសមិនស្មើគ្នា) ក៏ប៉ុន្តែមើលមិនដឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណានោះទេ ពីព្រោះតម្លៃតាមលំយូលមិនមានតម្លៃអវិជ្ជមាននោះទេ ហើយករណីនេះវាខុសពី ការប្រើ Z-test ខាងលើ។

ក្នុងឧទាហរណ៍ 9.4 តែមួយ យើងអាចប្រើ ប្រើតាមលំយូលគោល ឬ Z-test ក៏បាន ហើយលទ្ធផលគឺ បដិសេធអូដូចគ្នា។ Z-test មានលក្ខណៈងាយយល់និងស៊ីជម្រៅជាងតាមលំយូលគោល ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ។

- ❖ SPSS មិនបានបង្កើត McNema's test (Z-test) នោះទេ តែ SPSS បានផ្តើម តាមលំយូលសម្រាប់ McNema's test ជំនួសវិញ។ ហើយបើយើងប្រើទិន្នន័យក្នុងតារាង 9.4 ក្នុង SPSS យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចតារាង 9.18 ខាងក្រោម។

តារាង 9.18 លទ្ធផល McNema's Test លើការកែប្រែលក្ខខណ្ឌបង់រំលូស

Test Statistics ^a	
	Before change & After cchange
N	400
Chi-Square ^b	6.017
Asymp. Sig.	.014

a. McNemar Test

b. Continuity Corrected

9.5 វិធីសុទ្ធតេស្តលើចំនួនសកលពីរឯករាជ្យ

នៅក្នុងជំពូកទី៨ អ្នកបានសិក្សា t-test សម្រាប់តេស្តរកតម្លៃខុសគ្នារវាងចំនួនសកលពីរ ហើយក្នុងការតេស្តនោះបានសន្មតថា ទិន្នន័យមានបំណែងចែកធម្មតា។ ក្នុងករណីបើទិន្នន័យមិនមានលក្ខណៈធម្មតា នោះអ្នកមានជំរើសពីរ៖

- ប្រើវិធីសុទ្ធនៃសំរេង (Wilcoxon Rank Sum Test) ឬ
- ប្រើតេស្តដែលមានវ៉ារីយ៉ង់រួមបញ្ចូលគ្នា (pooled variance t test) (សៀវភៅនេះមិនបានរៀបរាប់ករណីនេះទេ)។


នៅផ្នែកនេះនឹងរៀបរាប់អំពី Wilcoxon Rank Sum Test ជាប្រភេទតេស្តមួយដែលតេស្តរកភាពខុសគ្នារវាងមេដ្យានពីរ របស់ចំនួនសកល (difference between two median of population)។

សូមបញ្ជាក់ថា Wilcoxon test គឺមានពីរ៖ Wilcoxon Rank Sum Test ឬ ហៅថា Mann-Whitney Test ក្នុង SPSS ប្រើប៉ាន់គំរូឯករាជ្យ (two independent samples) ហើយ Wilcoxon Signed-Rank Test គឺប្រើប៉ាន់គំរូមិនឯករាជ្យ ឬទិន្នន័យជាគូ (dependent/ related or paired data) ។ ជំហ្លួងនេះយើងលើកយក Wilcoxon Rank Sum Test ដំដែកជាមុន និង Wilcoxon Signed-Rank Test ដំដែកនៅពេលបន្ទាប់។

វិក្កុសុនរង់សាំតេស្ត មានអានុភាពដូច t-test ដែលបានរៀបរាប់នៅជំពូកទី 8 ដែរ ក៏ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវការទិន្នន័យមានបំណែងចែកធម្មតានោះទេ។ អ្នកអាចប្រើ Wilcoxon Rank Sum Test បាន ដ៏រាបណាទិន្នន័យរបស់អ្នកជាប្រភេទដែលមានលំដាប់លំដោយ (only ordinal data) ។ នេះជាករណីដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងការសិក្សាលើឥរិយាបថអតិថិជននិងការសិក្សាទីផ្សារ¹⁸ (consumer behavior and marketing research)

ដើម្បីប្រើ Wilcoxon តេស្ត អ្នកត្រូវប្រមូលទិន្នន័យចេញពីប៉ាន់គំរូពីរ n_1 និង n_2 ដែលចំនួនប៉ាន់គំរូសរុប $n = n_1 + n_2$ ។ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវកំណត់រង់ (rank) នៃប៉ាន់គំរូពីរតូចទៅធំ។ លេខតូចជាងគេគឺកំណត់លំដាប់ទី 1 និងបន្តបន្ទាប់ រហូតដល់លេខធំជាងគេគឺ $n_1 + n_2$ ។ បើសិនមានលេខដាន់គ្នា អ្នកត្រូវគិតជាតម្លៃមធ្យមកំរើកលំដាប់ដាន់គ្នា។

រូប 9.3 Wilcoxon តេស្តលើមេដ្យានរបស់ចំនួនសកលពីរ



- ក្នុងករណីដែលចំនួនប៉ាន់គំរូមិនស្មើគ្នា n_1 គឺប៉ាន់គំរូដែលតូចជាង n_2 ។ Wilcoxon តេស្តគឺ៖
- T_1 = ផលបូកនៃលំដាប់លំដោយដែលបានកំណត់ក្នុងប៉ាន់គំរូទី 1 n_1 ដែលជាប៉ាន់គំរូដែលតូចជាងគេ (បើប៉ាន់គំរូស្មើគ្នា $n_1 = n_2$ នោះ T_1 គឺយកតម្លៃមួយណាក៏បាន) ហើយ
 - T_2 = ផលបូកនៃលំដាប់លំដោយដែលបានកំណត់ក្នុងប៉ាន់គំរូទី 2 n_2 ។

អ្នកអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នូវផលបូករង់ (rank) របស់ T ទាំងពីរគឺត្រូវទៅនឹង៖

$$T_1 + T_2 = \frac{n(n+1)}{2} \quad (9.12)$$

Wilcoxon តេស្តអាចមានកន្ទុយសងខាង ឬម្ខាង (ស្តាំឬឆ្វេង) ដូចក្នុងរូបទី 9.3។

¹⁸ Page 683 of Allan G. B (2009) Elementary Statistics: A Step by Step Approach. Eight Edition. McGraw-

9.5.1 វិភាគស្ថានភាពលើចំនួនសកលពីរឯករាជ្យ៖ ប៉ាន់គំរូតូច

ក្នុងករណីដែលប៉ាន់គំរូតូច n_1 និង $n_2 \leq 10$ បន្ទាប់ពីបានតម្លៃ T_1 អ្នកត្រូវយល់តម្លៃ T_1 ទៅប្រៀបធៀបជាមួយវិភាគស្ថានភាព (Wilcoxon-critical) ដែលបានកំណត់ក្នុងតារាង E.6

- ករណីតេស្តក្នុងសងខាង (រូប 9.3a) បើតម្លៃ $T_1 > T_{1U}$ ឬ $T_1 < T_{1L}$ បដិសេធអ₀
- ករណីតេស្តក្នុងខាងឆ្វេង (រូប 9.3b) បើតម្លៃ $T_1 < T_{1L}$ បដិសេធអ₀
- ករណីតេស្តក្នុងខាងស្តាំ (រូប 9.3c) បើតម្លៃ $T_1 > T_{1U}$ បដិសេធអ₀

ដូចអ្នកដឹងមកហើយ Wilcoxon's Rank Sum Test គឺចេញមកពីវិភាគស្ថានភាពលើប៉ាន់គំរូពីរ (two sample t-test)។ ដូច្នេះ លក្ខខណ្ឌ (assumptions) របស់វាក៏ដូច t-test ដែរ¹⁹។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការរំលឹកលើវិញ្ញនៃលក្ខខណ្ឌរបស់ t-test៖

- ប៉ាន់គំរូត្រូវតែឯករាជ្យពីគ្នា
- ប៉ាន់គំរូទាំងពីរត្រូវមានវ៉ារីយ៉ង់ស្មើគ្នា
- ចំនួនសកលទាំងពីរត្រូវមានលក្ខណៈដូចបំណែងចែកធម្មតា

ក្នុងករណីដែលប៉ាន់គំរូតូច មិនអាចបំពេញបានលក្ខខណ្ឌទាំងបីនេះបាន គឺអ្នកមិនអាចប្រើ t-test បានទេ។ បើបំពេញបានលក្ខខណ្ឌពីរខាងដើមគេ Wilcoxon's Rank Sum Test នឹងត្រូវបានប្រើជំនួស t-test វិញ។

ឧទាហរណ៍ 9.5 Wilcoxon's Rank Sum Test ក្នុងករណីប៉ាន់គំរូតូច n_1 និង $n_2 \leq 10$: ឧបមាថាអ្នកចង់ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើគុណភាពរបស់សកលវិទ្យាល័យពីរ ដោយប្រើអ័រឌីណាល់ស្កែល (ordinal scale) ពិន្ទុចាប់ពី 1 ដល់ 100។ ដោយសាកសួរទៅលើសកលវិទ្យាធិការ 9 រូបផ្សេងគ្នា។ បួនរូបវាយតម្លៃលើសកលវិទ្យាល័យ A ($n_1 = 4$) និងប្រាំរូប ($n_2 = 5$) វាយតម្លៃលើសកលវិទ្យាល័យ B (ប៉ាន់គំរូពីរឯករាជ្យពីគ្នា)

- សកលវិទ្យាល័យ A មាន 5 រូបបានពិន្ទុ: 69, 72, 80, 88, 90
- សកលវិទ្យាល័យ B មាន 4 រូបបានពិន្ទុ: 70, 80, 86, 96

នៅកំរិត $\alpha=0.05$ តើសាកលវិទ្យាល័យទាំងពីរមានចំណាត់ថ្នាក់ស្មើគ្នាឬយ៉ាងណា?

- **ជំហានទី1:** ដាក់រង្វង់ទិន្នន័យ (rank) (មើលតារាង 9.19)។
ដូច្នេះយើងបាន $T_1 = 21.5$
 - សកលវិទ្យាល័យ B: $n_1 = 4$
 - សកលវិទ្យាល័យ A: $n_2 = 5$
- **ជំហានទី2:** កំណត់តម្លៃវិភាគស្ថានភាព (Wilcoxon's critical) បើ $\alpha=0.05$ យោងតាមតារាង E6- តម្លៃទាប-ខ្ពស់ របស់ T_1 សម្រាប់ Wilcoxon Rank Sum Test យើងនឹងបាន $T_{1L} = 11$ និង $T_{1U} = 29$ (មើលតារាង 9.20)។

¹⁹ <https://data.library.virginia.edu/the-wilcoxon-rank-sum-test/>

តារាង 9.19 Wilcoxon Rank Sum Test ចំពោះប៉ាន់តម្លៃតូច

សាកលវិទ្យាល័យ		រ៉ង់ (rank)	
A	B	A	B
69		1	
	70		2
72		3	
80		4.5	
	80		4.5
	86		6
88		7	
90		8	
	96		9
ផលបូករ៉ង់ (rank sum)		23.5	21.5

តារាង 9.20 តម្លៃទាប-ខ្ពស់ របស់ T_1 សម្រាប់ Wilcoxon Rank Sum Test


n_2	α		n_1	
	One-Tailed	Two-Tailed	4	5
4				
5	.05	.10	12, 28	19, 36
	.025	.05	11, 29	17, 38
	.01	.02	10, 30	16, 39
	.005	.01	---, ---	15, 40
6				

- ជំហានទី៣: សេចក្តីសម្រេចចិត្ត

រូប 9.4 បញ្ជាក់ថា $T_1 = 21.5$ ស្ថិតនៅចន្លោះ $T_{1L} = 11$ និង $T_{1U} = 29$ គឺតំបន់មិនបដិសេធដូច្នេះ $H_0: M_1 = M_2$ មិនត្រូវបានបដិសេធ ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា មិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា ចំណាត់ថ្នាក់របស់សាកលវិទ្យាល័យទាំងពីរខុសគ្នានោះទេ។

រូប9.4 Wilcoxon Tail Test

$$\alpha=0.05, n_1 = 4, n_2 = 5$$



DNR= Do Not Rejection តំបន់មិនបដិសេធ

9.5.2 វិភាគស្ថានភាពប៉ាន់តម្លៃពីរឯករាជ្យ: ប៉ាន់តម្លៃ

ឥឡូវយើងធ្វើការពិភាក្សាលើវិភាគស្ថានភាពប៉ាន់តម្លៃពីរឯករាជ្យ Wilcoxon Rank Sum Test for two independent sample វិញម្តង។ តារាង E6- Wilcoxon Test អាចប្រើបានក្នុងករណីដែលប៉ាន់តម្លៃ n_1 និង n_2 មានត្រឹម 10 តែប៉ុណ្ណោះ។ បើក្នុងករណីដែលប៉ាន់តម្លៃ n_1 និង $n_2 > 10$ T_1 មានបំណែងចែកប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបំណែងចែកធម្មតា ដែលមានតម្លៃរួម μ_{T_1} ស្មើទៅនឹង៖

$$\mu_{T_1} = \frac{n_1(n+1)}{2} \quad (9.12a)$$

និងគម្លាតស្តង់ដារ៖

$$\sigma_{T_1} = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n+1)}{12}} \quad (9.12b)$$

បន្ទាប់មក Wilcoxon' Z-statistic សម្រាប់ចំនួនប៉ាន់តម្លៃ៖

$$Z_{Stat.} = \frac{T_1 - \mu_{T_1}}{\sigma_{T_1}} \quad (9.12c)$$

ហើយ $Z_{Stat.}$ មានបំណែងចែកប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបំណែងចែកធម្មតា

សមីការ 9.12 គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីតេស្តលើសម្មតិកម្មមោឃៈពេលដែលចំនួនប៉ាន់តម្លៃមិនស្ថិតនៅក្នុងតារាង E6 ឬ $n_1 \geq 10$ និង $n_2 \geq 10$ និងប៉ាន់តម្លៃមិនមានលក្ខណៈ normal។

ឧទាហរណ៍9.6 Wilcoxon's Rank Sum Test ក្នុងករណីប៉ាន់តម្លៃ៖ ឧបមាថាយើងធ្វើការពង្រីកចំនួនប៉ាន់តម្លៃក្នុងការវាយតម្លៃសកលវិទ្យាល័យ A និង B ដោយយក $n_1 = 11$ និង $n_2 = 11$ ហើយទិន្នន័យទាំងនេះបានរៀបចំជាដំណាក់កាលនៅក្នុងតារាង 9.21។

ចំឡើយ៖

- ជំហានទី១: សម្មាតិកម្ម

$$H_0: M_1 = M_2 \text{ និង } H_1: M_1 \neq M_2$$

- ជំហានទី២: រកតម្លៃស្ថិតិគោល

ដោយ $\alpha = 0.05$ តាមតារាង normal distribution យើងបាន $Z = \pm 1.96$

តារាង 9.19 Wilcoxon Rank Sum Test ចំពោះប៉ាន់តម្លៃ

University		Rank	
A $n_1 = 11$	B $n_2 = 11$	A	B
	50		1
52		2	
	54		3
55		4.5	
	55		4.5
58		6	
69		7	
	70		8
72		9	
80		10.5	
	80		10.5
	86		12
88		13	
90		14	
	91		15
92		16	
	93		17
94		18	
	96		19
	98		20
	99		21
100		22	
Rank Sum		122	130

- ជំហានទី៣: គណនាតម្លៃតេស្ត

a. គណនា T_1

បន្ទាប់ពីរៀងរៀងរួច (មើលតារាង 9.19) យើងគណនា៖

$$T_1 = 2+4.5+6+7+9+10.5+13+14+16+18+22=122$$

$$T_2 = 1+3+4.5+8+10.5+12+15+7+19+20+21=130$$

សូមរំលឹកថា T_1 = ផលបូកនៃលំដាប់លំដោយដែលបានកំណត់ក្នុងប៉ាន់គំរូទី 1 n_1 ដែលជាប៉ាន់គំរូដែលតូចជាងគេ (បើប៉ាន់គំរូស្មើគ្នា $n_1 = n_2$ នោះ T_1 គឺជាចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងប៉ាន់គំរូទី 1 ដែលតូចជាងគេ)។

b. តម្លៃមធ្យម μ_{T_1}

ក្នុងករណីដែលចំនួនប៉ាន់គំរូ n_1 និង $n_2 > 10$ យើងមិនមានតារាង Wilcoxon ដើម្បីមើល Wilcoxon's critical នោះទេ ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើ Z-test។

$$\mu_{T_1} = \frac{n_1(n_1+1)}{2} = \frac{11(22+1)}{2} = 126.5$$

c. គណនាគម្លាតស្តង់ដារ σ_{T_1}

$$\sigma_{T_1} = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + 1)}{12}} = \sqrt{\frac{11 \cdot 11 (22 + 1)}{12}} = 15.2288$$

d. គណនា Z-test ដោយយក T_1

$$Z_{Stat.}(T_1) = \frac{T_1 - \mu_{T_1}}{\sigma_{T_1}} = \frac{122 - 126.5}{15.2288} = -0.2955$$

• ជំហានទី 4: ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

$$Z_{Stat.} = -0.2955 > -1.96 \text{ មិនបដិសេធអ}_0$$

• ជំហានទី 5: សន្និដ្ឋាន

មិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា សកលវិទ្យាល័យទាំងពីរនោះមានចំណាត់ថ្នាក់ខុសគ្នា នោះទេ។

តារាង 9.20 លទ្ធផលនៃការប្រៀបធៀបចំណាត់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យ

Test Statistics^a

	Rating
Mann-Whitney U	56.000
Wilcoxon W	122.000
Z	-.296
Asymp. Sig. (2-tailed)	.767
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.797 ^b

a. Grouping Variable: University

b. Not corrected for ties.

សូមបញ្ជាក់ថា Wilcoxon Rank Sum Test នៅក្នុង SPSS ហៅថា Mann-Whitney Test។ លទ្ធផលនៃ Mann-Whitney Test ក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងគឺបានបង្ហាញក្នុងតារាង 9.20។ សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃ Z-statistic ក្នុងតារាងនេះជាមួយនឹងឧទាហរណ៍របស់ខាងលើដោយខ្លួនឯង។

9.5.3 វិស័យស្ថានភាពលើប៉ាន់ស្មានពីមិនឯករាជ្យ: ប៉ាន់ស្មាន

ក្នុងករណីប៉ាន់ស្មានពីមិនឯករាជ្យឬជាគូ (two related/matched pair sample) យើងអាចប្រើ Wilcoxon Signed-Rank Test ជំនួស Wilcoxon Rank Sum Test វិញ។ តេស្តប្រភេទនេះបានចាត់ទុកជា តេស្ត មុននិងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ទៅលើកម្មវត្ថុតែមួយ ឬជាគូ (before and after test using the same subject or pair test) ។ Wilcoxon Signed-Rank Test អាចប្រើជំនួស t-test សម្រាប់ប៉ាន់ស្មានដែលទាក់ទងគ្នា (related sample)²⁰។

ឧទាហរណ៍ 9.7 Wilcoxon's Signed-Rank Test

អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ចង់ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើកម្មវិធីបំប៉នទៅលើផ្នែកសេវាទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារ មួយដើម្បីឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណា។ គាត់បានធ្វើការតត់ត្រាចំនួនពាក្យបណ្តឹងពីអតិថិជនទៅលើផ្នែកនេះចំនួន 8 សប្តាហ៍មុនចាប់ផ្តើមវគ្គបំប៉ននិង 8 សប្តាហ៍ ក្រោយពីបំប៉នរួច។ ទិន្នន័យទាំងនោះត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតារាង 9.21។

តារាង 9.21 ពិន្ទុវាយតម្លៃផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារ

N	Before(B)	After(A)
1	85	75
2	70	50
3	40	50
4	65	40
5	80	20
6	75	65
7	55	40
8	20	25

នៅកំរិត $\alpha = 1\%$ តើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា កម្មវិធីបំប៉ននេះមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ ?

ចម្លើយ៖

- ជំហានទី 1: សរសេរសម្មតិកម្ម

²⁰ Page 688 of Allan G. B (2009) Elementary Statistics: A Step by Step Approach. Eight Edition. McGraw-Hill

H_0 : ចំនួនពាក្យបណ្តឹងមុន $\leq$ ចំនួនពាក្យបណ្តឹងក្រោយវគ្គបំប៉ន (កម្មវិធីបំប៉នគ្មានប្រសិទ្ធភាព)

H_1 : ចំនួនពាក្យបណ្តឹងមុន $>$ ចំនួនពាក្យបណ្តឹងក្រោយវគ្គបំប៉ន (កម្មវិធីបំប៉នមានប្រសិទ្ធភាព)

- ជំហានទី 2: រកតម្លៃស្ថិតិគោលចេញពីតារាង the Wilcoxon Signed-Rank Test Critical= W_c
 - បើ $\alpha = 5\%$ និងចំនួនប៉ាន់គំរូ $n = 8$ តេស្តកន្ទុយខាងឆ្វេង (one-tailed test) យើងបានតម្លៃគោលរបស់ Wilcoxon, $W_c = 6$ ។
 - យើងនឹងបដិសេធ H_0 បើសិនតម្លៃតេស្តស្ថិតិ $W_s < 6$ (តាមការណែនាំរបស់តារាងនេះ)។
- ជំហានទី 3: គណនាតម្លៃ Wilcoxon Signed-Rank Test, W_s
 - a. គណនាពិន្ទុសង្ខេបរវាងមុនបំប៉ននិងក្រោយបំប៉ន (B-A) (ជួរឈរទី 4 តារាង 9.22)
 - b. ដាក់តម្លៃដាច់ខាតទៅលើពិន្ទុសង្ខេប (B-A) (ជួរឈរទី 5)
 - c. តំរៀបតាមលំដាប់ពីទាបទៅខ្ពស់ (rank) នូវតម្លៃដាច់ខាត (B-A) (ជួរឈរទី 6)
 - d. កំណត់សញ្ញា (-/+) ឲ្យស្របតាមពិន្ទុសង្ខេបរវាង B-A (ជួរឈរទី 7)
 - e. បូកបញ្ចូលគ្នារវាងតម្លៃ (+) និង (+) ហើយ តម្លៃ (-) និង (-) នៅត្រង់កូឡោន (rank)

ផលបូកវែងវិជ្ជមាន: $W_+ = (3) + (6) + (7) + (8) + (3) + (5) = + 32$

ផលបូកវែងអវិជ្ជមាន: $W_- = (-3) + (-1) = - 4$

តារាង 9.22 តម្លៃតេស្ត

N	Before (B)	After (A)	D=B-A	D	Rank	Signed Rank
1	85	75	10	10	3	+ 3
2	70	50	20	20	6	+ 6
3	40	50	-10	10	3	- 3
4	65	40	25	25	7	+ 7
5	80	20	60	60	8	+ 8
6	75	65	10	10	3	+ 3
7	55	40	15	15	5	+ 5
8	20	25	-5	5	1	-1

- f. ជ្រើសរើសតម្លៃដាក់ខាតដែលតូចជាងគេក្នុងចំណោមផលបូកទាំងពីរធ្វើជាតំណាងឲ្យតម្លៃ Wilcoxon តេស្ត។ ដូច្នេះ: Wilcoxon Signed Rank Test, $W_s = | - 4 | = 4$

- ជំហានទី 4: ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

ដោយសារតម្លៃ Wilcoxon test, $W_s = 4 < W_c = 6$ ដូច្នេះ: H_0 ត្រូវបានបដិសេធ

- ជំហានទី 5: សន្និដ្ឋាន

យើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា វគ្គបំប៉នគឺមានប្រសិទ្ធភាពនូវវិភិត $\alpha = 5\%$ ។

- ❖ សំគាល់៖ ក្នុងករណីដែលចំនួនប៉ាន់គំរូ $n \geq 30$ (តារាង Wilcoxon Signed Rank Test មានត្រឹម $n=30$) នោះ តម្លៃតេស្ត W_S ត្រូវបានជំនួសដោយ Z-test វិញ ពីព្រោះវាត្រូវបានចាត់ទុកដូចបំណែងចែកធម្មតា ហើយមានរូបមន្តដូចបានកំណត់ក្នុងសមីការ 9.13។

$$\text{តម្លៃមធ្យម: } \mu = \frac{n(n+1)}{4} \quad (9.13a)$$

$$\text{គម្លាតស្តង់ដារ: } \sigma = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}} \quad (9.13b)$$

$$Z_{Stat.} = \frac{W_S - \mu_{T1}}{\sigma} = \frac{W_S - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}} \quad (9.13c)$$

ហើយ n = ចំនួនគំរូដែលមានតម្លៃផលដកខុសពី 0

W_S = តម្លៃជាប់ខាងនៃរង្វង់ដែលតូចជាងគេ

ឥឡូវយើងសាកល្បងអនុវត្តទិន្នន័យក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើង។ ដោយសារតែក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងមានរង្វង់ស្មើគ្នា (tied ranks) ដូច្នេះយើងត្រូវកាត់បន្ថយ σ ដោយ $\frac{t^3-t}{48}$ សម្រាប់រង្វង់នីមួយៗដែលស្មើគ្នា²¹។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើងគឺមានរង្វង់ដែលស្មើគ្នា: 3,3,3 ដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយ σ ដោយ $\frac{3^3-3}{48} = 0.5$

$$Z_{Stat.} = \frac{4 - \frac{8(8+1)}{4}}{\sqrt{\frac{8(8+1)(2*8+1)}{24} - 0.5}} = \frac{-14}{\sqrt{50.5}} = -1.97$$

នៅកំរិត $\alpha=0.05$ $Z_{Stat.} = -1.97 < Z_{Critical} = -1.96$ ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធហើយយើងរក្សាការសន្និដ្ឋានដូចមុន។

តារាង 9.23 គឺជាលទ្ធផល Wilcoxon Signed Rank Test ដែលគណនាដោយ SPSS។ ចំលើយរបស់ $Z_{Stat.} = -1.97$ គឺដូចលទ្ធផលរបស់យើងដែរ។

តារាង 9.24 Wilcoxon Signed Rank Test Result (SPSS)

Test Statistics ^a	
	After training score - Before training score
Z	-1.970 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.049

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

9.6 គ្រួសារលំហាសតេស្ត

ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមនៃចំនួនសកលបីឬច្រើនយើងប្រើ One-way ANOVA F-test ដោយសន្មត់ថាចំនួនសកលទាំងនោះមានបំណែងចែកធម្មតា និងវ៉ារីយ៉ង់របស់ចំនួនសកលនោះស្មើគ្នា។ បើសិនជាការសន្មត់នេះមិនបានឆ្លើយតបទេនោះ គ្រួសារលំហាសតេស្ត (The Kruskal-Wallis H Test) អាច

²¹ Derived from <https://www.statisticshowto.com/wilcoxon-signed-rank-test/>

ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជំនួស One-way ANOVA F-test ។ The Kruskal-Wallis H Test បានមកពីការពង្រីក រូបមន្តមែនវ៉ាយនីយូតេស្ត (an extension of Mann-Whitney U Test) ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យម នៃចំនួនសកលបីឬច្រើន។

នៅក្នុងការប្រើ ត្រូវស្គាល់វ៉ាលីសហាស់តេស្ត ទិន្នន័យត្រូវជាលេខ ឬ លំដាប់លំដោយ ឬ ជាចន្លោះ (continuous, ordinal scale or interval) ហើយត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចតទៅ (certain assumptions) ៖

- ❖ លក្ខខណ្ឌទី១: ត្រូវមានអថេរមិនឯករាជ្យមួយ (one dependent variable) ជាលេខ ឬ លំដាប់ លំដោយ ឬ ជាចន្លោះ
- លក្ខខណ្ឌទី២: ត្រូវមានអថេរឯករាជ្យជាប្រភេទពីរ ច្រើនក្រុម (two or more categorical groups or variables)
- លក្ខខណ្ឌទី៣: ត្រូវមានភាពឯករាជ្យ ឬមិនមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុម ឬរវាងក្រុម (no relationship between the observations in each group or between the groups themselves)។ ឧទាហរណ៍ ម្នាក់ចូលរួមបានតែមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះមិនអាចចូលពីរប្រើក្រុមបាន ឡើយ។ បើសិនជាលក្ខខណ្ឌទី៣ មិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ អ្នកមិនអាចប្រើ The Kruskal-Wallis H Test បានឡើយ ហើយអ្នកអាចប្រើតេស្តផ្សេង ឧទាហរណ៍ដូចជា a Friedman Test ជាដើម²²។

រូបមន្ត The Kruskal-Wallis H Test ត្រូវបានកំណត់ដោយសមីការ 9.14៖

$$H = \left[\frac{12}{n(n+1)} \sum_{j=1}^c \frac{T_j^2}{n_j} \right] - 3(n+1) \quad (9.14)$$

ហើយ n = តម្លៃសរុបនៃប៉ាន់តម្លៃដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នា

n_j = តម្លៃសរុបនៃប៉ាន់តម្លៃទី j ($j = 1, 2 \dots c$)

T_j = ផលបូកនៃរង្វង់ដែលបានដាក់ឲ្យប៉ាន់តម្លៃទី j

T_j^2 = ផលបូកនៃរង្វង់ដែលបានដាក់ឲ្យប៉ាន់តម្លៃទី j លើកជាការ៉េ

c = ចំនួនក្រុម

បើសិនចំនួនប៉ាន់តម្លៃ (យ៉ាងតិចបំផុតគឺ 5) H-test មានបំណែងចែកប្រហាក់ប្រហែល ឆាយឈ្នួ ដែលមាន $df=c-1$ ។ ហើយយើងនឹងបដិសេធ H_0 ប្រសិន H-test $> \chi^2_\alpha$ ។

ឧទាហរណ៍ 9.8 The Kruskal-Wallis H Test: គណៈកម្មការប្រកួតចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបពិន្ទុគណៈវិទ្យារបស់និស្សិតទាំងបីក្រុម ហើយក្រុមនីមួយៗមានសមាជិកប្រាំនាក់។ ហើយគណៈកម្មការបានធ្វើការ កត់ត្រាពិន្ទុសមាជិកក្រុមនីមួយៗរួចដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឬ រង្វង់ដូចនៅក្នុងតារាង 9.23 ៖

ចំឡើយ៖

- ជំហានទី១: កំណត់សម្មតិកម្ម

²² Derived from <https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/kruskal-wallis-h-test-using-spss-statistics.php>

H_0 : ពិន្ទុគណិតវិទ្យារបស់ក្រុមទាំងបីស្មើគ្នា

H_1 : ពិន្ទុគណិតវិទ្យារបស់ក្រុមទាំងបីស្មើគ្នា

• **ជំហានទី២:** រកតម្លៃស្ថិតិគោល

បើ $\alpha = 5\%$ ត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយឆាយវិធីដែលមាន $df=c-1=3-1=2$ នោះ យោងតាមតារាង Chi-square distribution យើងបាន $\chi^2_{0.05,2}=5.991$

• **ជំហានទី៣:** បានកំណត់រង្វង់សម្រាប់ពិន្ទុនីមួយៗ

ចំពោះពិន្ទុដែលទាបជាងគេគឺ 40 គឺត្រូវបានដាក់រង្វង់លេខ 1 ហើយរង្វង់លេខ 2 ត្រូវបានដាក់លើពិន្ទុ 41 ចំណែកពិន្ទុ 50 មានរហូតដល់ទៅ 2 ត្រូវបានកំណត់ទី $(5+6)/2 = 5.5$ សម្រាប់ពិន្ទុ 50 ទាំងពីរ និងរង្វង់ដទៃទៀត ត្រូវបានកំណត់តាមវិធីសាស្ត្រដូចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ (មើលតារាង 9.23 ខាងលើ)។

• **ជំហានទី៤:** គណនាតម្លៃតេស្ត

a. គណនាផលបូកនៃរង្វង់សម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ។

$$T_1 = 7+11+1+9.5+15 = 43.5$$

$$T_2 = 13+8+3+14+5.5 = 43.5$$

$$T_3 = 5.5+4+12+9.5+2 = 33$$

តារាង 9.23 ពិន្ទុគណិតរបស់និស្សិតទាំង 3 ក្រុម

ចំនួន	ពិន្ទុ	ក្រុម	រង្វង់
1	51	1	7
2	70	1	11
3	40	1	1
4	65	1	9.5
5	80	1	15
6	75	2	13
7	55	2	8
8	46	2	3
9	76	2	14
10	50	2	5.5
11	50	3	5.5
12	48	3	4
13	72	3	12
14	65	3	9.5
15	41	3	2

បញ្ជាក់៖ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាការគណនាផលបូករង់នីមួយៗត្រឹមត្រូវដែរឬយ៉ាងណា អ្នកអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើរូបមន្ត៖

$$T_1 + T_2 + T_3 = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$43.5 + 43.5 + 33 = \frac{15(15+1)}{2}$$

$$120 = 120 \text{ (ការដាក់រង់គឺត្រឹមត្រូវ)}$$

b. គណនា H-test

$$H = \left[\frac{12}{n(n+1)} \sum_{j=1}^c \frac{T_j^2}{n_j} \right] - 3(n+1)$$

$$H = \left[\frac{12}{15(15+1)} \left(\frac{43.5^2}{5} + \frac{43.5^2}{5} + \frac{33^2}{5} \right) \right] - 3(15+1)$$

$$H = 0.05 (974.7) - 48 = 0.735$$

- **ជំហានទី៥:** ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

ដោយ H-test = -0.735 < $\chi^2_{0.05,2} = 5.991$ ដូច្នេះ H_0 មិនត្រូវបានបដិសេធទេ។

- **ជំហានទី៦:** សន្និដ្ឋាន

មិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា ពិន្ទុគណិតវិទ្យារបស់ក្រុមទាំងបីខុសគ្នានោះឡើយ។

តារាង 9.24 គឺជាលទ្ធផល The Kruskal-Wallis H Test របស់ SPSS។ សូមបញ្ជាក់ថា លទ្ធផលនេះគឺដូចជាមួយលទ្ធផលដែលចេញមកពីរូបមន្ត 9.14 ដែរ។

តារាង 9.24 គឺជាលទ្ធផល The Kruskal-Wallis ទៅលើពិន្ទុគណិតវិទ្យា

Test Statistics ^{a,b}	
	Math score
Chi-Square	.738
df	2
Asymp. Sig.	.692

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Group

សេចក្តីសង្ខេប

នៅក្នុងជំពូកនេះអ្នកបានសិក្សាប្រភេទឆាយឈ្នួតេស្តជាច្រើនដែលអនុវត្តលើស្ថានភាពផ្សេងគ្នាដូចជា៖ ឆាយឈ្នួតេស្តចំពោះការអនុលោមតាម ឬភាពសម្របតាម ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់តេស្តដើម្បីចង់ដឹងថាបំណែងចែកប្រភេទអនុលោមតាម ឬគោរពតាមទំរង់ណាមួយជាក់លាក់ដែរឬយ៉ាងណា។ លើសពីនេះទៅទៀតអ្នកបានសិក្សាអំពីការប្រើឆាយឈ្នួតេស្តទៅលើតម្លៃខុសគ្នារវាងសមាមាត្រពីឬច្រើនដោយផ្អែកលើតារាងខ្វែង និងឆាយឈ្នួតេស្តដែលចង់ដឹងអំពីភាពទាក់ទងគ្នារវាងសមាមាត្រពីរ។

ក្រៅពីនេះអ្នកក៏បានសិក្សាអំពីការប្រើម៉ាកណេម៉ាតេស្តដើម្បីសិក្សាលើស្ថានភាពប៉ាន់គំរូពីមិនឯករាជ្យពីគ្នា ពេលដែលទិន្នន័យបំពានលើលក្ខខណ្ឌបំណែងចែកធម្មតា។ លើសពីនេះទៅទៀតអ្នកបានសិក្សាលើផលបូករ៉ង់វីកូសុនតេស្ត និងវីកូសុនសញ្ញារ៉ង់តេស្ត ពេលដែលជីតេស្ត បំពានលើលក្ខខណ្ឌបំណែងចែកធម្មតា។ ហើយ ចុងក្រោយអ្នកបានសិក្សាគ្រួសារលំដាប់លីសតេស្តពេលដែលលក្ខខណ្ឌ One Way ANOVA F-test ត្រូវបានបំពាន។

សំណួរនិងលំហាត់

I. សំណួរ

- តើនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វីស្ទើរដែលអ្នកគួរតែប្រើតេស្តដើម្បីកំណត់ថាសមាមាត្រនៃចំនួនសកលពីរដែលឯករាជ្យពីគ្នា មានតម្លៃស្មើគ្នាឬយ៉ាងណា?
- តើនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វីស្ទើរដែលអ្នកគួរតែប្រើតេស្តដើម្បីកំណត់ថាសមាមាត្រនៃចំនួនសកលពីរប្រើនៃដែលឯករាជ្យពីគ្នា ខុសគ្នាឬយ៉ាងណា?
- តើនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វីស្ទើរដែលអ្នកគួរតែប្រើតេស្តដើម្បីកំណត់ថាចំនួនសកលពីរ ឯករាជ្យពីគ្នា?
- តើនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វីស្ទើរដែលអ្នកគួរតែប្រើ McNemar តេស្ត?
- អ្វីខ្លះគឺជានីតិវិធីនៃការធ្វើតេស្តមិនមែនជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្ត?
- តើនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វីស្ទើរដែលអ្នកគួរតែប្រើ Wilcoxon rank sum តេស្តជំនួស t តេស្តដើម្បីកំណត់តម្លៃមធ្យមពីរខុសគ្នា?

II. លំហាត់

- ក្នុងចំណោមអ្នកទិញទំនិញតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត 400 នាក់ ត្រូវបានគេធ្វើការស្ទង់មតិដើម្បីចង់ដឹងអំពីឥរិយាបថរបស់ពួកគាត់។ មានសំណួរជាច្រើនត្រូវបានសួរ ក្នុងនោះមានសំណួរមួយទាក់ទងទៅនឹង “តើអ្នកពេញចិត្តទៅនឹងការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតដែរឬទេ?” លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងតារាងខ្វែងដូចខាងក្រោម៖

ពេញចិត្តទៅនឹងការទិញទំនិញ	ភេទ		សរុប
	បុរស	ស្រី	
បាទ	60	200	260
ទេ	40	100	140
សរុប	100	300	400

- នៅកំរិតអាល់ហ្វា 1% តើសមាមាត្រនៃការពេញចិត្តទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់បុរសនិងស្រីខុសគ្នាដែរឬទេ?
- ចូលកំណត់ p-value នៅចំឡើយ (a) និងបកស្រាយអត្ថន័យរបស់វា។
- ចូលគណនាចំឡើយរបស់អ្នកនៅចំនួន (a) និង (b) បើបុរស 40 ចូលចិត្តនិង 60 នាក់មិនចូលចិត្តវិញ?

8. ធនាគារមួយចង់ដឹងថា តើមានទំនាក់ទំនងរវាងការងារថែមម៉ោងនិង កំរិតនៃ stress ដែរឬយ៉ាងណា។ ការសិក្សាមួយបានប្រមូលទិន្នន័យទៅលើបុគ្គលិកចំនួន 100 នាក់ បានបង្ហាញទិន្នន័យដូចតទៅ៖

រយៈពេលថែមម៉ោង	កំរិតស្ត្រេស			សរុប
	ខ្លាំង	មធ្យម	តិច	
តិចជាង 30 នាទី	10	8	10	28
30 < 60 នាទី	12	10	10	32
60 នាទីឡើងទៅ	18	12	10	40
សរុប	40	30	30	100

a. នៅកំរិតអាល់ហ្វា 1% តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានទំនាក់ទំនងរវាងរយៈពេលថែមម៉ោងនិងកំរិតស្ត្រេសដែរឬទេ ?

b. តើចំលើយ (a) ទៅជាយ៉ាងណាបើអាល់ហ្វាស្មើនឹង 0.05 ?

9. ធនាគារមួយចង់ដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយនៃការផ្តល់កម្ចីថ្មីរបស់ខ្លួន។ មុនកែប្រែគោលនយោបាយចាស់ ធនាគារសួរអតិថិជន 100 នាក់ 60 នាក់ឆ្លើយថា “ខ្លី” ហើយ 40 ឆ្លើយថា “មិនខ្លី”។ ក្រោយពីកែប្រែលក្ខខណ្ឌឲ្យខ្លី 70 នាក់ឆ្លើយថា “ខ្លី” ហើយ 30 ឆ្លើយថា “មិនខ្លី”។ ទិន្នន័យទាំងនេះបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

មុនកែប្រែលក្ខខណ្ឌឲ្យខ្លី	ក្រោយពីកែប្រែលក្ខខណ្ឌឲ្យខ្លី		សរុប
	ខ្លី	មិនខ្លី	
ខ្លី	55	5	60
មិនខ្លី	15	25	40
សរុប	70	30	100

a. នៅកំរិតអាល់ហ្វា 5% តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាការកែប្រែលក្ខខណ្ឌឲ្យខ្លីមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ ? (សមាមាត្រយល់ព្រមខ្លីមុនកែប្រែលក្ខខណ្ឌ តិចជាងសមាមាត្រយល់ព្រមខ្លីក្រោយការកែប្រែលក្ខខណ្ឌ)

b. ចូលកំណត់ p-value នៅចំលើយ (a) និងបកស្រាយអត្ថន័យ

10. អ្នកស្រាវជ្រាវថយន្តម្នាក់ចង់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចំណាយនិងចំងាយបើបររបស់អ្នកប្រើក្ដុ។ គាត់បានសួរទៅលើអតិថិជនចំនួន 30 នាក់ ហើយបានគណនាចំងាយប្រើប្រាស់ជាមធ្យមរបស់ថយន្តមួយឬអតិថិជនម្នាក់គឺ 10,000 គីឡូម៉ែត្រ និងគម្លាតស្តង់ដារ 2,400 គីឡូម៉ែត្រ។ តាមបទពិសោធកន្លងមក គម្លាតស្តង់ដារគឺតែ 2,000 គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ។

a. នៅកំរិតអាល់ហ្វា 5% តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាគម្លាតស្តង់ដាររបស់ចំនួនសកលខុសពី 2,000 គីឡូម៉ែត្រដែរឬទេ ?

b. តើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលតម្រូវឲ្យមានចំពោះការធ្វើតេស្តនេះ ?

c. ចូលកំណត់ p-value នៅចំណុច (a) និងបកស្រាយអត្ថន័យ។

11. ខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងប៉ាន់គំរូពីរដែលឯករាជ្យពីគ្នា ហើយមានទម្រង់ប្រហែលគ្នា៖

n_1	2.2	2.3	2.9	3.6	12	
n_2	2.7	4.4	4.6	5.6	7	16

a. ចូលដាក់រង្វង់ (rank ឲ្យប៉ាន់គំរូ) 1 ដល់តួចជាងគេ ហើយប៉ាន់គំរូ $n = n_1 + n_2 = 11$

b. គណនាតម្លៃ តេស្តស្តីពី T_1

c. គណនាតម្លៃ តេស្តស្តីពី T_2 (ផលបូកប៉ាន់គំរូដែលធំជាងគេ)

d. ចូលផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃចំណុចដាក់រង្វង់របស់អ្នកដោយប្រើរូបមន្តដូចតទៅ៖

$$T_1 + T_2 = \frac{n(n+1)}{2}$$

12. អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍វៀកឡានរបស់ក្រសួងសាធារណៈចង់ធ្វើការសិក្សាទៅលើរយៈពេលរងចាំវៀកឡានមួយលើកៗ ក្នុងគោលបំណងកែលំអររយៈពេលវៀកឡានមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ។ គាត់បានធ្វើការកត់ត្រារយៈពេលរងចាំ (គិតជានាទី) រហូតដល់វៀកចប់ របស់ស្ថានីយ៍បួនកន្លែង ដោយមួយកន្លែងជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូចំនួន 10 ឡាន។ ទិន្នន័យទាំងនេះត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ស្ថានីយ៍ទី 1	ស្ថានីយ៍ទី 2	ស្ថានីយ៍ទី 3	ស្ថានីយ៍ទី 4
60.20	61.33	37.18	38.82
78.15	46.40	68.13	36.35
63.13	53.44	51.08	32.33
75.45	72.30	50.21	52.34
47.24	53.09	58.47	34.13
70.18	27.27	86.29	69.37
48.53	52.46	62.10	78.52
55.43	40.24	44.14	55.15
64.06	53.50	64.17	49.21
64.28	37.28	50.28	66.40

a. នៅកម្រិតអាល់ហ្វា 5% តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថារយៈពេលវៀកនៃស្ថានីយ៍នីមួយៗខុសគ្នាឬទេ?

គោលបំណង

- កំណត់អថេរឯករាជ្យ និងអថេរមិនឯករាជ្យ
- ការអនុវត្តសមីការលីនេអ៊ែរដើម្បីប៉ាន់ស្មានទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់រវាងអថេរពីរ
- ការគណនាមេគុណប៉ាន់ស្មាន
- ការបកស្រាយអំពីមេគុណទំនាក់ទំនង
- ការបកស្រាយលទ្ធផលសមីការលីនេអ៊ែរ
- ការវាស់វែងអំពីបម្រែបម្រួល
- ការគណនាអ៊ែកាវ៉េ ជីតេស្ត និងអែហ្វតេស្ត
- ការវាយតម្លៃលើលក្ខខណ្ឌលីនេអ៊ែរ
- វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយពេលមានលក្ខខណ្ឌត្រូវបានបំពាន
- ការព្យាករណ៍ជាតម្លៃមធ្យមនិងចន្លោះជឿជាក់របស់អថេរឯករាជ្យ
- កំហុសនៃការប៉ាន់ស្មានសមីការលីនេអ៊ែរ

10.1 ការវិភាគសមីការលីនេអ៊ែរ


ការវិភាគសមីការលីនេអ៊ែរ (linear regression analysis) គឺជានីតិវិធីនៃការប៉ាន់ស្មានទំនាក់ទំនងរវាងអថេរឯករាជ្យ (dependent variable, regressand or outcome variable) និងអថេរមិនឯករាជ្យមួយឬច្រើន (independent variable, repressor, explanatory, covariate or predictor variable)។ ឧទាហរណ៍ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងការលក់និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

ការលក់ = អថេរឯករាជ្យ ហើយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម = អថេរមិនឯករាជ្យ។

ដើម្បីប៉ាន់ស្មានទំនាក់ទំនងរវាងអថេរទាំងពីរ ជំហានដំបូងគេត្រូវយកទិន្នន័យរបស់ប៉ាន់គំរូមកដាក់បង្ហាញលើរូបភាពស្ថាតីស្តិច (មើលក្នុងជំពូក 2) បន្ទាប់គេធ្វើការអង្កេតលើចំណុចទាំងឡាយដែលមាននៅលើរូបនោះដើម្បីងាយស្រួលកំណត់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់អថេរទាំងពីរនោះជាបន្ទាត់ឬយ៉ាងណា។ បើសិនជាស្ថាតីស្តិចបង្ហាញថាមានទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់ហើយ បន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជ្រើសរើសម៉ូដែលគណិតឡាយណាដែលស័ក្តិសមទៅនឹងរូបនោះមកអនុវត្ត។

រូប (a) និង (b) បង្ហាញទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់ (វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន) ហើយចំណែករូប (c), (d) និង (e) បង្ហាញទំនាក់ទំនងជាខ្សែកោង និងចុងក្រោយរូប (f) បង្ហាញថាមិនមានទំនាក់ទំនងរវាងអថេរទាំងពីរ។

រូប 10.1 ស្ថាតិស្តិក (scatter plot) បង្ហាញអំពីទម្រង់ផ្សេងៗនៃទំនាក់ទំនងរវាងអថេរ



10.2 សមីការលីនេអ៊ែរ

តាមរយៈរូប Scatter plot ខាងលើបង្ហាញឲ្យឃើញថា ទំនាក់ទំនងរវាងអថេរឯករាជ្យនិងមិនឯករាជ្យ គឺមានទម្រង់ច្រើន ចាប់ពីទម្រង់សាមញ្ញរហូតដល់ស្មុគស្មាញ។ ទំនាក់ទំនងធម្មតាគឺជាទំនាក់ទំនងជា បន្ទាត់ ឬ លីនេអ៊ែរ (simple linear relationship) ដូចបានបង្ហាញក្នុងរូប 10.2 ហើយសមីការលីនេអ៊ែរត្រូវ បានកំណត់នៅក្នុងសមីការ 10.1។

សមីការលីនេអ៊ែរធម្មតា (simple linear regression model)

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \quad (10.1)$$

ហើយ

Y_i = អថេរឯករាជ្យ (dependent variable)


β_0 = ចំនួនថេរ (intercept or constant)

β_1 = មេគុណរបស់ចំនួនសកល (slope of population)

X_i = អថេរមិនឯករាជ្យ (independent)

ε_i = អ៊ែររឺ ឬលំអៀង (error term)

រូប 10.2 ទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់រវាងអថេរ X និង Y



10.3 ការកំណត់ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ

មានវិធីសាស្ត្រពីរដែលមានដែលត្រូវបាននិយមជាងគេក្នុងការប៉ាន់ស្មានម៉ូដែលលីនេអ៊ែរ (linear regression model) គឺ (Ordinary Least Square, OLS) និង ម៉ាស់ស៊ីម៉ាយឡាយលីហ្គត (Maximize Likelihood Estimation, MLE)។ គោលការណ៍របស់ OLS គឺធ្វើឲ្យផលបូកគីតជាការរំខានតម្លៃអ៊ែរវ៉េ (តម្លៃអង្កត់ដកតម្លៃព្យាករណ៍) តូចបំផុតនៃសំណុំទិន្នន័យដែលបានមក (minimizing the sum of the squares of residuals in given data set) រីឯ MLE គឺជាវិធីសាស្ត្រប៉ាន់ស្មានប៉ារ៉ាម៉ែត្រដោយផ្អែកលើកាសន្ទត់លើបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអ៊ែរវ៉េ (an assumption about the probability distribution of the disturbance term, u_i) តាមរយៈការធ្វើអតិបរមាមុនលើមុខងារប្រូបាប៊ីលីតេ (maximizing the probability function) ហើយ MLE គឺមានសភាពស្មុគស្មាញជាង OLS។ ទាំង OLS និង MLE ត្រូវការអ៊ែរវ៉េ (errors or residuals) មានបំណែងចែកធម្មតា (normally distributed)។ បើស្ថិត្យឡែក normal distribution ត្រូវបានបំពេញ លោក Hayashi (2000) អះអាងថា OLS មានប្រសិទ្ធភាពជាង²³ ហើយចំណុចមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យ OLS ខុសពី MLE គឺថា OLS អាចប៉ាន់ស្មានបានល្អលុះត្រាតែទំនាក់ទំនងនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនោះជាបន្ទាត់ ក៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រ MLE អាចអនុវត្តបានដូច OLS ដែរ ហើយថែមទាំងទំនាក់ទំនងនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រនោះមិនមែនជាបន្ទាត់ក៏បាន (can also be applied to regression models that are nonlinear in the parameters²⁴) ។ ដោយឡែកលោក Gujarati (2008) បានអះអាងថា ការប្រើ OLS និង MLE ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានលើមេគុណរបស់ ឬប៉ារ៉ាម៉ែត្រ X គឺមានលទ្ធផលដូចគ្នា ទាំងលីនេអ៊ែរដែលមាន X តែមួយ និង X ច្រើន (simple multiple regression) ប៉ុន្តែ ML estimator នៃ $\sigma^2 = \sum \hat{u}_i^2 / n$ គឺលំអៀង (biased) ដោយឡែក OLS estimator នៃ $\sigma^2 = \sum \hat{u}_i^2 / (n - 2)$ គឺមិនលំអៀង (unbiased) នោះឡើយ។ MLE ជាទូទៅ ត្រូវបានគេហៅថា វិធីសាស្ត្រដែលប្រើប៉ាន់គំរូធំ (a large sample method) បើ

²³ Hayashi, Fumio (2000). *Econometrics*. Princeton University Press. p. 15.

²⁴ ដកស្រង់ពី <https://openclassrooms.com/en/courses/5873596-design-effective-statistical-models-to-understand-your-data/>

សិនជា ចំនួនប៉ាន់គំរូ n កាន់តែធំ វិធីសាស្ត្រទាំងពីរគឺដូចគ្នា (ពីព្រោះ $n \approx n-2$) ប៉ុន្តែការណ៍ n តូច OLS មានប្រសិទ្ធភាពជាង²⁵។ លើសពីនេះទៅទៀត OLS បានដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមមួយទៀតគឺ អ៊ែររី (errors or residuals, u_i) ត្រូវមានបំណែងចែកធម្មតា (normal distribution) ដែលជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធ្វើការប៉ាន់ស្មាន និងតេស្តសម្មតិកម្មនៃសមីការលីនេអ៊ែរ។

ដូច្នេះសម្រាប់សៀវភៅនេះយើងនឹងធ្វើការវិភាគលើសមីការលីនេអ៊ែរដែលប្រើវិធីសាស្ត្រ OLS តែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះ 1) OLS ងាយយល់ ងាយអនុវត្តជាង 2) ការប្រើ MLE និង OLS ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានលើ β_0 និង β_1 គឺបានលទ្ធផលដូចគ្នា (រួមទាំងប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់សមីការលីនេអ៊ែរដែលមាន X ច្រើនផង) 3) ដោយសារយើងប្រើចំនួនប៉ាន់គំរូទំហំមធ្យម (moderately large sample) ការប្រើ OLS ឬ MLE ដើម្បីប៉ាន់ស្មានលើវ៉ារីយ៉ង់ σ^2 គឺមិនខុសគ្នានោះទេ។

10.3.1 វិធីសាស្ត្រអ័រឌីនេរីលីសស្កេរ (Ordinary Least Square)

សមីការ 10.1 គឺជាសមីការតំណាងឧបទ្ទវសកល ជាទូទៅតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (β_0 និង β_1) របស់សមីការនោះគឺយើងមិនស្គាល់នោះទេ ដូច្នេះដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានលើតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនោះ យើងត្រូវផ្អែកលើប៉ាន់គំរូ (sample)។ សមីការរបស់ប៉ាន់គំរូ ត្រូវបានហៅថាសមីការព្យាករណ៍ (the prediction line equation) ដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងសមីការ 10.2។

សមីការព្យាករណ៍:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i \quad (10.2)$$

ហើយ

$$\hat{Y}_i = \text{តម្លៃព្យាករណ៍សម្រាប់ប៉ាន់គំរូទី}(i)$$

$$b_0 = \text{ចំនួនថេររបស់ } Y$$

$$b_1 = \text{មេគុណនៃប៉ាន់គំរូ}$$

$$X_i = \text{តម្លៃ } X \text{ សម្រាប់ប៉ាន់គំរូទី}(i)$$

ដូចបានជជែកខាងលើមកហើយ យើងនឹងប្រើវិធី OLS ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មាន b_0 និង b_1 ។ សូមរំលឹកថា វិធីសាស្ត្រ OLS គឺធ្វើឲ្យអ៊ែររីគិតជាការអប្បបរមា៖

$$\text{Minimize } u_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 + b_1 X_i)^2 \quad (10.3)$$

- ជំហានទី 1: បន្ទាប់មកយើងធ្វើដេរីវេតាមផ្នែកលើសមីការ (10.3) (take partial derivative) ដោយឲ្យដេរីវេនេះស្មើសូន្យ។ ជំហាននេះយើងសន្មតថា b_0 Y_i និង X_i គឺជាចំនួនថេរ ហើយ b_1 គឺជាអថេរ។

$$\text{សូមព្យាក យើងមានរូបមន្តដេរីវេ } Y = U^n \Rightarrow Y' = nU'U^{n-1}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \sum u_i^2}{\partial b_1} = 2 \sum (0 - 0 - X_i)(Y_i - b_0 - b_1 X_i) = 0$$

²⁵ Gujarati D. N, & Porter D. C (2008) Basic Econometrics. Fifth Edition. McGraw-Hill. p. 102.

$$= 2 \sum (-X_i Y_i + b_0 X_i + b_1 X_i^2) = 0$$

តាមពិត b_0 និង b_1 គឺជាចំនួនថេរ យើងអាចទាញចេញពីសញ្ញាផលបូកបាន ហើយ 2 សំរួលចោលរួច ឲ្យដេរីវេទីមួយស្មើសូន្យ ដូច្នេះយើងបាន៖

$$\sum (-X_i Y_i) + b_0 \sum X_i + b_1 \sum X_i^2 = 0$$

ដោយ $\bar{X} = \frac{\sum X}{n} \Rightarrow \sum X = n\bar{X}$ ជំនួសតម្លៃផលបូកនេះចូលសមីការខាងលើ យើងបាន៖

$$\sum (-X_i Y_i) + b_0 n\bar{X} + b_1 \sum X_i^2 = 0$$

$$\Rightarrow b_0 n\bar{X} = \sum (X_i Y_i) - b_1 \sum X_i^2$$

$$\Rightarrow b_0 = \frac{\sum (X_i Y_i) - b_1 \sum X_i^2}{n\bar{X}} \quad \text{ឬ} \quad \frac{\sum (X_i Y_i)}{n\bar{X}} - \frac{b_1 \sum X_i^2}{n\bar{X}} \quad (10.4)$$

- ជំហានទី២: បន្ទាប់យើងធ្វើដេរីវេដោយផ្នែកលើសមីការ (10.3) ម្តងទៀត ស្រដៀងទៅនឹងករណីទីមួយ ដោយចាត់ទុក $b_1 Y_i$ និង X_i គឺជាចំនួនថេរ ហើយ b_0 គឺជាអថេរវិញម្តង។

$$\text{Minimize } u_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 + b_1 X_i)^2 \quad (10.3)$$

$$\Rightarrow \frac{\delta \sum u_i^2}{\delta b_1} = 2 \sum (0 - 1 - 0)(Y_i - b_0 - b_1 X_i) = 0$$

$$= 2 \sum (-Y_i + b_0 + b_1 X_i) = 0$$

ដោយសារ b_0 និង b_1 គឺជាចំនួនថេរ យើងអាចទាញចេញពីសញ្ញាផលបូកបាន ហើយ 2 សំរួលចោលរួចឲ្យដេរីវេទីមួយស្មើសូន្យ ដូច្នេះយើងបាន៖

$$-\sum Y_i + b_0 \sum 1 + b_1 \sum X_i = 0$$

ដោយយើងបានដឹងហើយថា $\sum 1 = n$, $\sum X = n\bar{X}$ និង $\sum Y = n\bar{Y}$ ជំនួសទិន្នន័យទាំងនេះចូលដេរីវេខាងលើ យើងបាន៖

$$-n\bar{Y} + b_0 n + b_1 n\bar{X} = 0$$

សំរួល n ចោល យើងបាន

$$\bar{Y} = b_0 + b_1 \bar{X} \quad (10.5)$$

- ជំហានទី៣: ជំនួសសមីការ 10.4 $b_0 = \frac{\sum (X_i Y_i)}{n\bar{X}} - \frac{b_1 \sum X_i^2}{n\bar{X}}$ ចូលក្នុងសមីការ 10.5 យើងបាន៖

$$\bar{Y} = \frac{\sum (X_i Y_i)}{n\bar{X}} - \frac{b_1 \sum X_i^2}{n\bar{X}} + b_1 \bar{X}$$

ទាញ b_1 ជាកត្តា យើងបាន

$$\bar{Y} = \frac{\sum (X_i Y_i)}{n\bar{X}} + b_1 \left(\bar{X} - \frac{\sum X_i^2}{n\bar{X}} \right)$$

បន្ទាប់មកតម្រូវភាគបែងរួចលប់ភាគបែងចោល

$$n\bar{X}\bar{Y} = \sum X_i Y_i + b_1 (n\bar{X}^2 - \sum X_i^2)$$

$$\Rightarrow b_1 = \frac{n\bar{X}\bar{Y} - \sum X_i Y_i}{(n\bar{X}^2 - \sum X_i^2)} \quad (10.6)$$

ដោយ $\sum X = n\bar{X}$ និង $\sum Y = n\bar{Y}$ ដូច្នេះសមីការ (10.6) អាចសរសេរទៅជា៖

$$b_1 = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad (10.7)$$

សមីការ 10.4 និង 10.7 ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាឧបករណ៍ប៉ាន់ស្មានរបស់ OLS (OLS estimators) សំគាល់៖

1. សមីការ (10.6) អាចសរសេរជា៖

$$\bar{Y} = b_0 + b_1 \bar{X} \quad (10.8)$$

2. សមីការ (10.8) អាចសរសេរទៅជា៖

$$b_0 = \frac{\sum Y}{n} - b_1 \frac{\sum X}{n} \quad (10.9)$$

3. ផលគុណនៃអថេរ X ជាមួយនិងផលបូកនៃអ៊ីរី ឬសំណល់គឺស្មើសូន្យ

$$\sum u_i X_i = 0 \quad (10.10)$$

4. ផលគុណនៃអថេរ Y ជាមួយនិងផលបូកនៃអ៊ីរី ឬសំណល់គឺស្មើសូន្យ

$$\sum u_i Y_i = 0 \quad (10.11)$$

5. i = ប៉ាន់គំរូទី i ដែលស្ថិតនៅក្នុងទិន្នន័យប្រមូលក្នុងគ្រាតែមួយ (cross sectional data) តែបើទិន្នន័យនោះជាស៊េរីពេលវេលា i ត្រូវបានជំនួសដោយ t វិញ។

ឧទាហរណ៍ 10.1 ការលក់ Online និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវម្នាក់ចង់ធ្វើការពិនិត្យទំនាក់ទំនងរវាងការលក់និងការចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈ Facebook Boost page ហើយគាត់ធ្វើការកត់ត្រានូវចំណូលពីការលក់និងចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរយៈពេល 16 ខែចុងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ ហើយទិន្នន័យទាំងនោះមានដាក់ក្នុងតារាង 10.1។

តារាង 10.1 ចំណូលនិងចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

t	Y(\$1,000)	X (\$)	t	Y(\$1,000)	X (\$)
1	245	140	9	319	140
2	312	150	10	255	160
3	279	170	11	282	170
4	308	180	12	308	190
5	199	110	13	199	120
6	219	155	14	223	158
7	405	235	15	405	280
8	324	245	16	324	220


Y= ចំណូលពីការលក់គិតជា (\$1000)

X= ចំណាយលើការ Facebook Boost page ឬផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគិតជា (\$)

t = គិតជាខែ

ជំហានទី១៖ សង់ Scatter Plot

រូប 10.3 Scatter Plot



តារាង 10.2 ជាទិន្នន័យសម្រាប់គណនា b_0 និង b_1

t	Y_i	X_i	X_i^2	Y_i^2	$X_i Y_i$
1	245	140	19600	60025	34300
2	312	150	22500	97344	46800
3	279	170	28900	77841	47430
4	308	180	32400	94864	55440
5	199	110	12100	39601	21890
6	219	155	24025	47961	33945
7	405	235	55225	164025	95175
8	324	245	60025	104976	79380
9	319	140	19600	101761	44660
10	255	160	25600	65025	40800
11	282	170	28900	79524	47940
12	308	190	36100	94864	58520
13	199	120	14400	39601	23880
14	223	158	24964	49729	35234
15	405	280	78400	164025	113400
16	324	220	48400	104976	71280
Total	$\Sigma Y=4606$	$\Sigma X=2823$	$\Sigma X^2= 531139$	$\Sigma Y^2= 1386142$	$\Sigma XY= 850074$

ជំហានទី២៖ គណនា b_0 និង b_1

ដើម្បីរៀបរៀងភាពស្មុគស្មាញក្នុងគណនា b_0 និង b_1 យើងត្រូវអនុវត្តតាមរូបមន្ត 10.7 និង 10.9។ តារាង 10.2 គឺជាទិន្នន័យដែលនឹងយកទៅជំនួសក្នុងរូបមន្តទាំងពីរ។

○ គណនា b_1

$$b_1 = \frac{n \sum X_t Y_t - \sum X_t \sum Y_t}{n \sum X_t^2 - (\sum X_t)^2} = \frac{16(850074) - (2823)(4606)}{16(531139) - (2823)^2} = \frac{598446}{528895} = 1.13$$

○ គណនា b_0

$$b_0 = \frac{\sum Y}{n} - b_1 \frac{\sum X}{n} = \frac{4606}{16} - 1.13 \frac{2823}{16} = 88.23$$

បង្កើតសមីការប៉ាន់ស្មាន (predicted line)

$$\hat{Y}_t = 88.23 + 1.13 X_t \quad (10.12)$$

តារាង 10.3 លទ្ធផលសង្ខេបរបស់ Excel

SUMMARY OUTPUT						
Regression Statistics						
Multiple R	0.83853					
R Square	0.70313					
Adjusted R Square	0.68193					
Standard Error	35.7254					
Observations	16					
ANOVA						
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Sig. F</i>	
Regression	1	42321.45	42321.45	33.1593	4.9E-05	
Residual	14	17868.3	1276.307			
Total	15	60189.75				
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	88.2355	35.8011	2.4646	0.0272	11.449	165.021
Ads	1.13150	0.19649	5.7584	4.9E-05	0.7100	1.55294

តារាង 10.3 បានផ្តល់លទ្ធផល $b_0 = 88.23$ (coefficient of intercept) និង $b_1 = 1.13$ (coefficient of X) ដូចទៅនឹងលទ្ធផលដែលយើងបានគណនាខាងលើ។

- ជំហានទី៣៖ សរសេរសមីការប៉ាន់ស្មាននិងធ្វើការបកស្រាយ។

សមីការប៉ាន់ស្មាន: $\hat{Y}_t = 88.23 + 1.13 X_t$

- ការបកស្រាយ b_1 : មេគុណរបស់ X ត្រូវបានបកស្រាយថា តម្លៃប៉ាន់ស្មានរបស់ Y គិតជាមធ្យម ពេលដែល X កើនឡើងមួយឯកតា។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង ពេលដែលការចំណាយទៅលើការការពារពាណិជ្ជកម្មកើនឡើង \$1 ការលក់គិតជា មធ្យមកើនឡើង 1.13 ឯកតា ឬ \$1,130 (ការលក់ត្រូវបានកត់ត្រាជា \$1000)។ លទ្ធផលនេះគឺជាព័ត៌មានល្អមួយពីព្រោះវាស្របទៅនឹងទ្រឹស្តី ឬដូចអ្វីដែលយើងបានរំពឹងទុក បើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកើនឡើង ការលក់រំពឹងថានឹងកើនឡើង។ បើសិន

ជាសញ្ញានៃមេគុណរបស់ X ឬ b_1 ផ្ទុយទៅនឹងទ្រឹស្តី លទ្ធផលនៃការប៉ាន់ស្មានប្រាកដជាមានបញ្ហា អ្នកត្រូវរកដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់តាមរយៈការពិនិត្យទិន្នន័យឡើងវិញ ថែមទិន្នន័យ ឬថែមអថេរ X ឬអ្នកត្រូវការរកឯកសារយោងដើម្បីមកការពារលទ្ធផលនេះ។

- ការបកស្រាយ b_0 : ចំនួនថ្លៃត្រូវបានបកស្រាយថា តម្លៃប៉ាន់ស្មានរបស់ Y គិតជាមធ្យមពេលដែល $X=0$ ។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង ពេលដែលការចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្មើសូន្យ ការលក់គិតជាមធ្យមគឺ 88.23 ឯកតា ឬ \$88,230 (ការលក់កត់ត្រា \$1000) មានន័យថាការលក់ Online អាចលក់បាន \$88,230 ក្នុងមួយខែដោយមិនបាច់ចំណាយទៅលើ Boost Page។ ពេលខ្លះ ការបកស្រាយ b_0 អាចមានន័យសេដ្ឋកិច្ច ហើយពេលខ្លះក៏មិនមានន័យសេដ្ឋកិច្ចដែរ ឧទាហរណ៍ យើង មានសមីការប៉ាន់ស្មានមួយ: $\widehat{\text{តម្លៃផ្ទះ}} = 100 + 500 * \text{ផ្ទៃក្រឡា} (m^2)$ ។ ដើម្បីបកស្រាយចំនួនថ្លៃ (100) គេត្រូវឲ្យផ្ទៃក្រឡាស្មើសូន្យ។ ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ បើផ្ទះមួយមានផ្ទៃក្រឡាស្មើ 0 ម៉ែត្រការ៉េ តម្លៃផ្ទះគិតជាមធ្យមគឺ \$100។ តាមការពិភាក្សាន័យជាសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ ពីព្រោះមិនមានផ្ទះណា ដែលមានផ្ទៃក្រឡាស្មើសូន្យនោះឡើយ។

10.3.2 ការវាស់វែងបម្រែបម្រួល

ពេលប្រើវិធីសាស្ត្រ OLS ដើម្បីកំណត់មេគុណរបស់អថេរ អ្នកត្រូវធ្វើការវាស់វែងអំពីបម្រែបម្រួល (measurement of variation)។ បម្រែបម្រួលសរុប (total variation) ត្រូវបានចែកជាពីរផ្នែក៖ មួយផ្នែកពន្យល់បាន (explained variation) រីឯមួយផ្នែកទៀតគឺពន្យល់មិនបាន (unexplained variation) ឬអ៊ែររី (errors or residuals)។ ជាទូទៅការវាស់បម្រែបម្រួលគឺត្រូវបានលើកជាការវាស់ពីព្រោះមានបម្រែបម្រួល (អ៊ែររី) ខ្លះវិជ្ជមាន ខ្លះទៀតអវិជ្ជមាន ដែលអាចធ្វើឲ្យផលបូកបម្រែបម្រួលស្មើសូន្យដោយសារតែបញ្ហា សញ្ញា ដូច្នេះអ្នកត្រូវលើកវាជាការវាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

- បម្រែបម្រួលសរុបគិតជាការ៉េ (total sum square, TSS) ស្មើនឹងបម្រែបម្រួលការ៉េដែលពន្យល់បាន (regression sum square, SSR) បូកនឹងបម្រែបម្រួលពន្យល់មិនបាន ឬអ៊ែររី (residuals or error sum square, SSE)។ រូប 10.4 បង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងនេះ។

$$TSS = SSR + SSE \quad (10.13)$$


- $TSS = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$
- $SSR = \sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2$
- $SSE = \sum (Y_i - \hat{Y})^2$

ហើយ Y = តម្លៃអង្កតរបស់ Y

$\bar{Y}$ = តម្លៃមធ្យមរបស់ Y

$\hat{Y}$ = តម្លៃព្យាករណ៍របស់ Y

រូប 10.4 រង្វាស់បម្រែបម្រួល



10.3.3 ការគណនាបម្រែបម្រួល

ឥឡូវយើងត្រូវបំបែកពិនិត្យឧទាហរណ៍របស់យើង ហើយធ្វើការគណនាបម្រែបម្រួល។ លទ្ធផលនៃការគណនាបម្រែបម្រួលទាំងនោះមានបង្ហាញក្នុងតារាង 10.4។

តារាង 10.4 គណនាបម្រែបម្រួល

n	Y_i	X_i	$\bar{Y}$	$\hat{Y}$	$(Y_i - \hat{Y})^2$	$(\hat{Y} - \bar{Y})^2$	$(Y_i - \bar{Y})^2$
1	245	140	287.875	246.65	2.709	1700	1838
2	312	150	287.875	257.96	2920	894.9	582
3	279	170	287.875	280.59	2.531	53.06	78.77
4	308	180	287.875	291.91	259	16.25	405
5	199	110	287.875	212.70	187.7	5651	7899
6	219	155	287.875	263.62	1991	588.4	4744
7	405	235	287.875	354.14	2587	4391	13718
8	324	245	287.875	365.45	1718	6018	1305
9	319	140	287.875	246.65	5235	1700	968.8
10	255	160	287.875	269.28	203.8	345.9	1081
11	282	170	287.875	280.59	1.985	53.06	34.52
12	308	190	287.875	303.22	22.84	235.5	405
13	199	120	287.875	224.02	625.8	4078	7899
14	223	158	287.875	267.01	1937	435.2	4209
15	405	280	287.875	405.06	0.003	13731	13718
16	324	220	287.875	337.17	173.3	2430	1305
	$\bar{Y} = 287.87$				SSE=17,868	SSR=42,321	SST=60,190

- $SSE = \sum (Y_i - \hat{Y})^2 = 17,868$
- $SSR = \sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2 = 42,321$


- $TSS = \sum(Y_i - \bar{Y})^2 = 17,868 + 42,321 = 60,190$

10.3.4 គណនាអ៊ីការេ

អ៊ីការេ (R^2) គឺជាផ្នែកមួយនៃបម្រែបម្រួលសរុបរបស់អថេរឯករាជ្យ ដែលត្រូវបានពន្យល់ដោយបម្រែបម្រួលរបស់អថេរមិនឯករាជ្យ។ ផ្អែកតាមនិយមន័យនេះ អ៊ីការេគឺត្រូវស្ថិតនៅចន្លោះ 0 និង 1 វាវាស់អំពីភាពល្អឬសុក្រិតរបស់ម៉ូដែល (model fit) បើតម្លៃអ៊ីការេរីកលើខិតជិត 1 មានន័យថាភាពល្អរបស់ម៉ូដែលគឺមានកម្រិតខ្ពស់ ហើយបើអ៊ីការេរីកលើទៅ 0 នោះបញ្ជាក់ថា ម៉ូដែលមិនសូវល្អ (រូប 10.5 តំណាងឲ្យតម្លៃផ្សេងៗនៃអ៊ីការេ)។

តើអ៊ីការេត្រូវមានតម្លៃប៉ុន្មានទើបយកជាការបាន? មិនមានចំណេះច្បាស់លាស់នោះទេ។ តម្លៃអ៊ីការេដែលត្រឹមត្រូវគឺអាស្រ័យលើការសិក្សា។ បើការសិក្សាទៅលើវត្ថុអរូបិយ ឧទាហរណ៍ដូចឥរិយាបថរបស់មនុស្ស គឺអ៊ីការេតិចជាង 50% ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាលើរូបិយវិញ គឺអ៊ីការេតិចជាង 90%²⁶។ ជាញឹកញាប់ការសិក្សាលើទិន្នន័យជាសេរី អ៊ីការេតែងតែខ្ពស់ជានិច្ច រហូតដល់ជាង 90% ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាលើទិន្នន័យដែលប្រមូលតែមួយគ្រា អ៊ីការេកាត់ច្រើនទាបជា 90%។

រូប 10.5 តម្លៃផ្សេងៗនៃអ៊ីការេ



²⁶ ដកស្រង់ចេញពី: <https://statisticsbyjim.com/regression/how-high-r-squared/>

- វិភាគត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្ត 10.13 ខាងក្រោម៖

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} \quad (10.14)$$

- សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង វិភាគគឺ៖

$$R^2 = \frac{42,321}{60,190} = 0.70 \quad (\text{សូមមើលតម្លៃវិភាគក្នុងតារាង 10.3})$$

- **បំណកស្រាយ៖** បម្រែបម្រួលនៃការលក់ត្រូវបានពន្យល់ដោយបម្រែបម្រួលនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រហែល 70% ហើយនៅសល់ប្រហែល 30% ទៀតដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនអាចពន្យល់បាននេះបណ្តាលមកពីកត្តាផ្សេងទៀតដែលយើងមិនបានបញ្ចូលក្នុងម៉ូដែល។

10.3.5 អ៊ែរឺស្តង់ដារ

អ៊ែរឺស្តង់ដារ (standard error, SE) គឺជាការវាស់គម្លាតរបស់តម្លៃ x_i ចេញពីបន្ទាត់ព្យាករណ៍ឬប៉ាន់ស្មាន ($\hat{Y}$)។ ចំពោះវីហ្គេស៊ីនណាដែលមានអ៊ែរឺស្តង់ដារតូច ម៉ូដែលនោះព្យាករណ៍បានល្អ និងផ្ទុយមកវិញ បើមានអ៊ែរឺស្តង់ដារធំ គឺម៉ូដែលមិនសូវល្អ។ សូមកុំយល់ច្រឡំអ៊ែរឺស្តង់ដារទៅនឹងគម្លាតស្តង់ដារ (standard deviation)។ គម្លាតស្តង់ដារគឺវាស់បម្រែបម្រួលចេញពីតម្លៃមធ្យម ហើយវាមានគោដៅចង់ដឹងអំពីភាពល្អ ឬភាពរាយប៉ាយនៃសំណុំទិន្នន័យកំរិតណា។ ដោយឡែកអ៊ែរឺស្តង់ដារគឺ វាស់គម្លាតចេញពីបន្ទាត់ព្យាករណ៍ ហើយវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍ ដូចជាការព្យាករណ៍តម្លៃអចលនវត្ថុករដ្ឋដោយប្រើវិធីសាស្ត្រចន្លោះជឿជាក់ជាដើម (predict interval for Y)។ អ៊ែរឺស្តង់ដារត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងរូបមន្ត 10.15។

$$SE_{YX} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} \quad (10.15)$$

ហើយ

SSE = ផលបូកអ៊ែរឺគីតជាការ

n = ចំនួនប៉ាន់ស្មាន

ចំពោះឧទាហរណ៍របស់យើង អ៊ែរឺស្តង់ដារគឺ៖

$$SE_{YX} = \sqrt{\frac{17,868}{16-2}} = 35.725$$

អ៊ែរឺស្តង់ដារ ក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងគឺ 35.725 ឬ \$35,725 (សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងតម្លៃ standard error ក្នុងតារាង 10.3 ខាងលើ)។ ដោយសារតែតម្លៃរបស់ Y គឺនៅចន្លោះពីរ \$199,000 ទៅ \$405,000 ហើយ អ៊ែរឺស្តង់ដារស្មើនឹង \$35,725 គឺត្រូវបានចាត់ទុកថាតូចនៅឡើយ។

10.4 ការសន្និដ្ឋានអំពីមេគុណប្រាប់ទិស

ដើម្បីកំណត់ថាអថេរ X មានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាករណ៍អថេរ Y ដែរឬអត់ អ្នកត្រូវតែធ្វើតេស្តទៅលើមេគុណរបស់ X ឬហៅថាស្លូប (slope of the regression) ដែលតាងដោយ β_1 ។ ជាទូទៅ ការកំណត់សារៈសំខាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបីបែប 1) t-test និង 2) p-value 3) ការប៉ាន់ស្មានចន្លោះជឿជាក់នៃមេគុណ។

- ជីតេស្តសម្រាប់មេគុណ

ជាទូទៅស្លូបរបស់ចំនួនសកល (slope of the population regression) គឺត្រូវបានសន្មតថាស្មើសូន្យ ដូច្នេះសម្មតិកម្មមោឃៈនិងសម្មតិកម្មផ្ទុយគឺ៖

$$H_0: \beta_1 = 0 \text{ (មិនមានទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់រវាង X និង Y ឬ ស្លូបស្មើសូន្យ)}$$

$$H_0: \beta_1 \neq 0 \text{ (មានទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់រវាង X និង Y ឬ ស្លូបខុសពីសូន្យ)}$$

ដើម្បីតេស្តលើសម្មតិកម្មនេះអ្នកអាចប្រើ t-test ដូចដែលបានកំណត់ក្នុងសមីការ 10.16 ខាងក្រោម៖

$$t_{Statistic} = \frac{b_1 - \beta_1}{S_{b_1}} \quad (10.16a)$$

$$t \text{ មាន } df. = n - 2$$

ហើយ

$$b_1 = \text{ស្លូបរបស់ regression}$$

$$\beta_1 = \text{សម្មតិកម្មរបស់ស្លូប (} \beta_1 = 0 \text{)}$$

$$S_{b_1} = \text{អ៊ែរីស្តង់ដាររបស់ស្លូប ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយសមីការ 10.16b}$$

$$S_{b_1} = \frac{S_{YX}}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2}} \quad (10.16b)$$

$$\text{និង } S_{YX} = \text{អ៊ែរីស្តង់ដារនៃការប៉ាន់ស្មាន ដែលកំណត់ដោយសមីការ 10.15 ខាងលើ៖}$$

$$S_{EYX} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} \quad (10.15)$$

ឥឡូវយើងពិនិត្យឧទាហរណ៍ 10.1 របស់យើងឡើងវិញ $S_{YX} = 35.726$, $b_1 = 1.1315$ (លទ្ធផលខាងលើ) $\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2} = 181.8129$ (គណនាដោយខ្លួនឯង)។ ជំនួសទិន្នន័យទាំងនេះចូលក្នុងសមីការ 10.16b យើងបាន៖

$$S_{b_1} = \frac{S_{YX}}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2}} = \frac{35.726}{181.8129} = 0.1965$$

បន្ទាប់មកទៀតយើងគណនា ត្រីតេស្ត

$$t_{Stat} = \frac{b_1 - \beta_1}{S_{b_1}} = \frac{1.1315 - 0}{0.1965} = 5.7583$$

បើ $\alpha = 0.05$ ត្រូវបានគេជ្រើសរើស $df = 16 - 2 = 14$ តាមតារាង t-distribution យើងបាន $t_{0.05/2, 14} = 2.1448$ ។ ដោយសារ $t_{Stat} = 5.7583 > t_{0.05/2, 14} = 2.1448$ ដូច្នេះ $H_0: \beta_1 = 0$ ត្រូវបានបដិសេធនូវកំរិត $\alpha = 0.05$ ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថា ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានឥទ្ធិពលលើការលក់។

- វិធីសាស្ត្រក៏វៃលយូ (p-value)

ក្រៅពីការប្រៀបធៀបតម្លៃ t-statistic ទៅនឹង t-critical យើងអាចមើលតម្លៃ p រួចធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹង α ។ បើ $p\text{-value} < \alpha$ បញ្ជាក់ថា H_0 ស្ថិតនៅតំបន់បដិសេធ ហើយផ្ទុយមកវិញ បើ $p\text{-value} > \alpha$ គឺ បញ្ជាក់ថា H_0 ស្ថិតនៅតំបន់មិនបដិសេធ។ សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង p-value សម្រាប់ t-statistic = $4.9E-05$ ឬ $= 0.000049$ (មើលតារាង 10.3) ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធគ្រប់កំរិតនៃអាល់ហ្វា ទោះជា $\alpha = 0.01$, $\alpha = 0.05$ ឬ $\alpha = 0.10$ ក៏ដោយ។ សូមបញ្ជាក់ថា ការជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រ p-value មកធ្វើការវិនិច្ឆ័យគឺមានលក្ខណៈទូលាយជាងការប្រើ t-statistic ធៀបទៅនឹង t-critical។

- ចន្លោះជឿជាក់របស់ស្តូប

ក្រៅពីវិធីសាស្ត្រ t-statistics និង p-value យើងមានវិធីមួយផ្សេងទៀតក្នុងការកំណត់សារៈសំខាន់របស់អថេរ X គឺចន្លោះជឿជាក់ (confidence interval, CI for β_j) របស់ស្តូប ដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងរូបមន្ត 10.17។

$$CI \text{ for } \beta_1 = b_1 \pm t_{\alpha/2} S_{b_1} \quad (10.17)$$

t មាន $df. = n - 2$

សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង បើ $\alpha = 0.05$ ត្រូវបានគេជ្រើសរើស យើងបាន $t_{0.05/2, 14} = 2.1448$ ហើយ $S_{b_1} = 0.1965$ នោះយើងបាន ចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់ β_1 គឺ៖

$$CI \text{ for } \beta_1 = 1.1315 \pm 2.1448(0.1965)$$

$$0.7100 \leq \beta_1 \leq 1.5529$$

ពីព្រោះថាការកត់ត្រាការលក់ជាខ្ទង់ \$1000 ដូច្នេះយើងជឿជាក់ថា 95% ថា β_1 នៅចន្លោះពី 0.7100 (000) ទៅ 1.5529 (000) ឬមានន័យថា ក្នុងមួយដុល្លារនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានឥទ្ធិពលលើការលក់នៅចន្លោះ \$710 ទៅ \$1,552.9។ ដោយសារនៅចន្លោះនេះមិនមានលេខសូន្យ ដូច្នេះយើងសន្និដ្ឋានថា ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានឥទ្ធិពលលើការលក់។

10.5 តេស្តសម្រាប់ម៉ូដែលទាំងមូល

ជាគោលការណ៍ F-test គឺជាតេស្តជាក្រុម (group test) ហើយត្រូវបានកំណត់ក្នុងរូបមន្ត 10.18។ សម្រាប់សមីការលីនេអ៊ែរ F-test សម្រាប់ម៉ូដែលទាំងមូល (overall significance test) ហើយតេស្តលើសម្មតិកម្មដូចខាងក្រោម៖

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_j = 0 \text{ (ម៉ូដែលទាំងមូលមិនមានសារៈសំខាន់)}$$

$$H_0: \text{យ៉ាងហោចណាស់មាន } \beta \neq 0 \text{ (ម៉ូដែលទាំងមូលមានសារៈសំខាន់)}$$

$$F - \text{Statistic} = \frac{\frac{SSR}{K}}{\frac{SSE}{n-k-1}} = \frac{MSR}{MSE} \quad (10.18)$$

F-statistic មានដឺគ្រីហ្វ្រីខ្លីម $df.$ របស់ភាគយក (numerator) ស្មើ k និង ភាគបែង $n-k-1$

n = ចំនួនប៉ាន់គំរូ

k = អថេរឯករាជ្យ

សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង តាមតារាង 10.3 យើងបាន $MSR=42,321.45$, $MSE=1,276.307$, $n=16$, $k=1$ នោះយើងបាន៖

$$F - \text{Statistic} = \frac{42,321.45}{1,276.307} = 33.1593 \quad (p=4.9E-05)$$

ដោយ $p\text{-value} = 4.5E-05$ ឬ $=0.000049 < 0.05$ ដូច្នេះ H_0 ត្រូវបានបដិសេធ ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា ម៉ូដែលទាំងមូលគឺមានសារៈសំខាន់ (significance)។

10.5 លក្ខខណ្ឌនៃសមីការលីនេអ៊ែរ (Regression's Assumptions)

នៅក្នុងជំពូកមុនៗ អ្នកបានសិក្សាអំពីការតេស្តលើសម្មតិកម្ម ហើយដើម្បីឲ្យតេស្តទាំងនោះមានសុពលភាព វាត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជា៖ ទិន្នន័យត្រូវតែមានបំណែងចែកធម្មតា ឬវាវិយ៉ង់ត្រូវ

តែស្មើគ្នាជាដើម។ ស្រដៀងគ្នានោះដែរ ដើម្បីឲ្យលីនេអ៊ែរអាចទុកចិត្តបាន វាត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- ទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់ (linearity)
- អ៊ែររឺត្រូវតែឯករាជ្យ (independence of errors)
- អ៊ែររឺត្រូវតែមានលក្ខណៈនីម៉ាល់ (normality of errors)
- អ៊ែររឺត្រូវតែថេរឬដូចគ្នា (equality of variance or errors)

ដូចបានដឹងពីខាងដើមមកហើយ អ៊ែររឺ ឬ រេស៊ីតូយ៉ូល (errors or residuals, u_i) គឺជាតម្លៃខុសគ្នារវាងតម្លៃអង្កេត (Y_i) និងតម្លៃព្យាករណ៍ ($\hat{Y}_i$)។ ការដាក់លក្ខខណ្ឌគឺសំដៅលើតែអ៊ែររឺមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះ។

10.5.1 ការវាយតម្លៃទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់

ពាក្យថា ទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់ (linearity) សម្រាប់សមីការលីនេអ៊ែរគឺសំដៅទៅលើពីរចំណុច៖

- ទី១: ទំនាក់ទំនងរវាង X និង Y ត្រូវមានលក្ខណៈជាបន្ទាត់ (X មិនមានស្វ័យគុណ) មិនមែនជាសមីការដឺក្រេទី២ ទី៣ ឬជា exponential នោះឡើយ។ នោះហៅថា ទំនាក់ទំនងរវាងអថេរនិងអថេរ (ឧទាហរណ៍ X និង Y) ត្រូវមានលក្ខណៈជាបន្ទាត់ (linearity in variables)
- ទី២: ទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់ក៏ចង់សំដៅទៅលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ដូចជា $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_j$ ផលដែរ។ ដូច្នេះប៉ារ៉ាម៉ែត្រមិនត្រូវមានស្វ័យគុណនោះទេ។ ក្នុងករណីដែលប៉ារ៉ាម៉ែត្រមានជាប់ស្វ័យគុណ ឧទាហរណ៍ សមីការ Cobb–Douglas (CD) production function: $Q_i = \beta_1 L_i^{\beta_2} K_i^{\beta_3}$ ដែល Q= ទិន្នផល (output), L= កំលាំងពលកម្ម (Labor) និង K=មូលធន (capital)។ សមីការបែបនេះមិនមានលក្ខណៈបន្ទាត់នោះទេ ដូច្នេះប៉ាន់ស្មានសមីការនេះ គេត្រូវបំប្លែងវាឲ្យទៅជាបន្ទាត់សិន៖

$\ln(Q_i) = \ln(\beta_1) + \beta_2 \ln(L_i) + \beta_3 \ln(K_i)$ ។ ចំណែកឯការប៉ាន់ស្មាននិងការបកស្រាយលទ្ធផលនៃសមីការនេះ សូមអានសៀវភៅ Econometrics By Examples របស់លោក Gujarati (2012)។

សម្រាប់លោក Gujarati គឺថា ម៉ូដែលដែលមានរាងជាបន្ទាត់ (Linear Regression Model) លុះត្រាតែម៉ូដែលនោះ៖

- រាងជាបន្ទាត់ទាំងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនិងទាំងអថេរ
- រាងជាបន្ទាត់តែប៉ារ៉ាម៉ែត្រមិនចាំបាច់អថេរក៏បាន

ហើយការកំណត់ម៉ូដែលដែលមានរាងជាបន្ទាត់បានរៀបរាប់ក្នុងតារាង 10.5។

តារាង 10.5 ការកំណត់ម៉ូដែលដែលមានរាងជាបន្ទាត់

ម៉ូដែលដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាបន្ទាត់ ?	ម៉ូដែលដែលមានអថេរជាបន្ទាត់ ?	
	Yes	No

Yes	LRM	LRM
No	NLRM	NLRM

LRM= Linear Regression Model (លីនេអ៊ែរម៉ូដែល)

NLRM= Non-Linear Regression Model (មិនលីនេអ៊ែរម៉ូដែល)

ប្រភព: Gujarati (2008) ទំព័រ 39


រូប10.6

ទម្រង់ផ្សេងៗនៃ

Scatter

Plotរបស់

Residuals



ដើម្បីវាយតម្លៃទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់នៃសមីការលីនេអ៊ែរ គេមានវិធីសាស្ត្រវាយដំសាមញ្ញមួយគឺ បន្ទាប់ពីបានស្ថានសមីការព្យាបាករណ៍រួច អ្នកត្រូវយកអ៊ែរី ឬ អ៊ែរីតយូល (residuals, $u_i = Y_i - \hat{Y}_i$) មក តាងជា Scatter Plot ដោយដាក់អ៊ែរីតយូលស្ថិតលើអ័ក្សឈរ ហើយ Xស្ថិតនៅលើអ័ក្សដេក (មើលរូប10.6) រួចធ្វើការអង្កេតលើរូបរាង ឬទម្រង់នៃ Scatter Plot នោះ។ បើ residuals មានរាងដូចរូប A B និង C យើង អាចសន្និដ្ឋានថា ទំនាក់ទំនងរវាង X និង Y មានលក្ខណៈជាបន្ទាត់ ហើយបើមានរាងដូចរូប D E និង F នោះ ទំនាក់ទំនងរវាង X និង Y មិនមានលក្ខណៈជាបន្ទាត់ អាចជាសមីការដឺក្រេទី2 ទី3 ឬ exponentialបែបទៀត ផង។

សម្រាប់ឧទាហរណ៍របស់យើង residuals គឺបានគណនាក្នុងតារាង10. 6 (ជួរឈរទី5) ដាក់ងាយ ញ្ចូលរូប 10.7។


តាមរយៈ residuals ក្នុងរូប 10.7 យើងអាចអង្កេតឃើញថា ទំនាក់ទំនងរវាង X និង Y មាន រាងដូចរូប10.6 C ដូច្នេះយើងសន្និដ្ឋានថា ទំនាក់ទំនងរវាង X និង Y គឺប្រហែលជាបន្ទាត់។

តារាង10. 6 លទ្ធផលនៃ residuals

n	Y_i	X_i	$\hat{Y}$	$\hat{u}_t = Y_i - \hat{Y}$
---	-------	-------	-----------	-----------------------------

1	245	140	246.65	-1.646
2	312	150	257.96	54.039
3	279	170	280.59	-1.591
4	308	180	291.91	16.094
5	199	110	212.7	-13.7
6	219	155	263.62	-44.62
7	405	235	354.14	50.861
8	324	245	365.45	-41.45
9	319	140	246.65	72.354
10	255	160	269.28	-14.28
11	282	170	280.59	1.409
12	308	190	303.22	4.779
13	199	120	224.02	-25.02
14	223	158	267.01	-44.01
15	405	280	405.06	-0.056
16	324	220	337.17	-13.17

រូប 10.7 គំនូសតាងScatter Plot នៃ Residuals



10.5.2 ការវាយតម្លៃលើភាពឯករាជ្យ

ភាពឯករាជ្យគឺជាសំដៅលើអ្វីដែល (residuals) នៃគ្រានីមួយៗមិនទាក់ទងគ្នា ឬនិយាយមួយបែបទៀតគឺ ក្នុងរយៈពេលរបស់អ្វីដែល ស្មើសូន្យ $[Cov(u_i, u_j | X_i, X_j) = Cov(u_i, u_j) = 0]$ បើ អ្វីដែល មិនឯករាជ្យឬទាក់ទងគ្នា គេហៅថាអ្នកត្រួតពិនិត្យ ឬស៊ីរាលក្នុងលេខ (auto-correlation or serial

correlation)។ ឧទាហរណ៍ កូដកម្មនៅត្រីមាសទីមួយមិនជះឥទ្ធិពលទៅលើផលិតផលនៅត្រីមាសទីពីរ។ ដូច្នេះយើងមិនជឿថា បើផលិតផលទាបនៅត្រីមាសទីមួយ វានឹងទាបនៅត្រីមាសទីពីរនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ ទាំងពីរនេះគឺបញ្ជាក់ថាវ៉េស៊ីតយូលនៃគ្រានីមួយៗមិនទាក់ទងគ្នា។

នៅក្នុងទិន្នន័យដែលប្រមូលតែមួយគ្រា (cross sectional data) វ៉េស៊ីតយូលអាចមានទំនាក់ទំនងពីអង្គភាពមួយទៅអង្គភាពមួយទៀត។ ទំនាក់ទំនងនេះហៅថាស្ពាស័លកូរីលេសិន (spatial correlation)។ មិនមែនទាក់ទងជាមួយពេលវេលានេះទេ តែវាទាក់ទងជាមួយនឹងចន្លោះ ពីអង្គភាពមួយទៅមួយទៀត (correlation in space rather than over time)។ ករណីនេះច្រើនតែកើតចេញពីការប្រមូលទិន្នន័យជាក្រុម (cluster sampling) ជាពិសេសទាក់ទងជាមួយរង្វាស់ដូចគ្នា វាស់វែងលើអថេរតែមួយគ្នាយ៉ាងដូចជា ការសាកសួរសមាជិកច្រើននាក់នៅក្នុងគ្រួសារតែមួយ ឬក្រុមហ៊ុនជាច្រើនធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីផ្សារតែមួយ។ ឧទាហរណ៍ទី១ អ្នកធ្វើការសាកសួរដោយចៃដន្យទៅលើមនុស្សបីនាក់ទាក់ទងនឹងការចំណាយក្នុងគ្រួសារ ហើយមនុស្សទាំងបីនាក់នោះហូបបាយរួមគ្នាក្នុងគ្រួសារតែមួយ ដូច្នេះចំណាយក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងបីគឺតែមួយ (ទាក់ទងគ្នា) ។ ឧទាហរណ៍ទី២ ចំណូលរបស់ថៅកែនិងបុគ្គលិកគឺទាក់ទងគ្នា បើសិនជាថៅកែប្រើវិធីសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកតាមរយៈបរិមាណលក់ បើលក់បានច្រើន បុគ្គលិកបាន bonus ច្រើន។ អ្នកទាំងពីរហាក់ដូចជាធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងទីផ្សារតែមួយ។ ដូច្នេះដើម្បីឲ្យការវិភាគលីនេអ៊ែរមានន័យ អ្នកត្រូវកំណត់ថា ស្ពាស័លកូរីលេសិន មានវត្តមាននៅក្នុងទិន្នន័យរបស់ដែរអត់។ ការធ្វើតេស្តលើស្ពាស័លកូរីលេសិន គឺមានភាពស្មុគស្មាញជាងការធ្វើតេស្តលើទិន្នន័យជាសេរី ហើយមិនបានបរិយាយក្នុងសៀវភៅនេះទេ បើអ្នកអានមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមមើលសៀវភៅរបស់លោក Anselin (1988)។

ដោយឡែកចំពោះទិន្នន័យជាសេរី (time series data) វិញ ការប្រមូលទិន្នន័យមានទំនាក់ទំនងតាមពេលវេលា ឬទាក់ទងពីគ្រាមួយ ទៅគ្រាមួយទៀត ជាពិសេសចន្លោះគ្រានីមួយៗខ្លី ដូចជា មួយថ្ងៃ ម្តង ឬមួយសប្តាហ៍ម្តង ជាដើម។ ទិន្នន័យទាំងនេះហាក់ដូចបង្ហាញថាមានទំនាក់ទំនងនិងគ្នា (inter-correlation) ។ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ លក្ខខណ្ឌ no auto-correlation ហាក់ដូចត្រូវបានបំពាន។ ឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតដូចជា ការធ្វើជាកូដកម្មនៅត្រីមាសមុនជះ ឥទ្ធិពលទៅលើផលិតផលនៃត្រីមាសក្រោយ ឬ ចំណូលគ្រួសារមួយនៅគ្រាមុនទាក់ទងទៅនឹងចំណូលគ្រួសារនោះនៅពេលក្រោយ គេហៅថា serial correlation ឬ auto-correlation។

- មូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានស៊ីរ៉ាលកូរីលេសិន (serial correlation²⁷):
 - a. ប្រើទម្រង់មិនត្រឹមត្រូវ (functional form)
 - b. ភ្លេចអថេរសំខាន់នៅក្នុងម៉ូដែល (specification error)

²⁷ ដកស្រង់ចេញពី Gujarati D. N & Porter D. C (2008) Basic Econometrics. Fifth Edition. McGraw-Hill (p.452)

- c. បាតុភូតខូបវែប (Cobweb) ឧទាហរណ៍ការសំរេចចិត្តដាំដំណាំរបស់កសិករឆ្នាំនេះ គឺរងឥទ្ធិពលពីតម្លៃកាលពីឆ្នាំមុន
- d. បំលែងទិន្នន័យ (data massaging or manipulation) ឧទាហរណ៍យើងអាចគណនាទិន្នន័យប្រចាំខែតាមរយៈទិន្នន័យត្រីមាសចែកនិងបី ឬ បំលែងទិន្នន័យ (data transformation) ដូចជាការបំលែងទិន្នន័យដែលកត់ត្រាធម្មតាឲ្យទៅជាទិន្នន័យបម្រែបម្រួល (taking first difference) ។

- ផលវិបាកដែលបណ្តាលមកពីសីរាលកូរីលេសិន: ទោះបីជាមានវត្តមានរបស់ serial ឬ auto-correlation នៅក្នុងទិន្នន័យ ក៏មិនធ្វើអោយមេគុណប៉ាន់ស្មានលំអៀងដែរ (unbiased estimator) ក៏ប៉ុន្តែមេគុណប៉ាន់ស្មានគ្មានប្រសិទ្ធភាព (no longer efficient) ទីបំផុតបណ្តាលឲ្យ t-test, F-test និង χ^2 អនុវត្តមិនស្របតាមលក្ខខណ្ឌ (cannot legitimately applied) ដូច្នេះអ្នកត្រូវរកដំណោះស្រាយ។
- រកដំណោះស្រាយពេលមាន សីរាលកូរីលេសិន គឺអាស្រ័យលើភាពទាក់ទងគ្នាជាមួយវ៉េស៊ីតយូលដោយសារតែ សីរាលកូរីលេសិនគឺបណ្តាលមកពី វ៉េស៊ីតយូលជាប់ទាក់ទងគ្នាពីគ្រាមួយទៅគ្រាមួយទៀត ដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយ សីរាលកូរីលេសិនក្នុងករណីដែលយើងដឹងមេគុណទំនាក់ទំនង (ρ) យើងអាចប្រើយន្តការលំដាប់ទីមួយនៃអូតូរេស្រីវ (first order auto-regressive, AR(1)) ឬអូតូរេស្រីវច្រើនដង AR(p) វាជាទម្រង់របស់នីតិវិធីបម្រែបម្រួល (differencing procedure) ជំរើសទីពីរគឺយើងអាចប្រើយន្តការមូលិកាអេវែរ (moving average, MA) ឬ MA លាយជាមួយ AR យន្តការនេះហៅថា ARMA។ បើករណីដែលយើងមិនដឹងមេគុណទំនាក់ទំនង (ρ) យើងអាចប៉ាន់ស្មានវាតាមរយៈ Durbin-Watson ឬវិធីសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត និង ជំរើសដោយឡែកមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើយន្តការ Newey–West HAC ។ យន្តការចុងក្រោយនេះមិនត្រឹមតែកែ serial correlation ប៉ុណ្ណោះទេ តែអាចកែហិរេតេរូស្កេស្តីស៊ីតី (Heteroscedasticity) ថែមទៀត។ សម្រាប់សៀវភៅនេះ មិនបាននិយាយដល់ដំណោះស្រាយទាំងនេះទេ បើអ្នកអានមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអានសៀវភៅរបស់លោក Gujarati (2008) ជំពូកទី12។

ដើម្បីវាយតម្លៃលើលក្ខខណ្ឌនេះយើងមានវិធីសាស្ត្រពីរ: ការដាក់បង្ហាញ residuals លើរូបភាព (graphical method) និង ប្រើតេស្តស្ថិតិ (statistic test) ដូចជា the Run test (តេស្តនេះមិនត្រូវការលក្ខខណ្ឌ normality of error term), the Durbin-Watson D test, និង the Breusch–Godfrey test ឬ ហៅថា Lagrange multiplier (LM) test ជាដើម។ តែសម្រាប់សៀវភៅនេះ និងលើកយកតែវិធីសាស្ត្ររូបភាព និង Durbin-Watson មកបរិយាយតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯតេស្តដ៏ទៃទៀត អ្នកអានអាចមើលក្នុងសៀវភៅរបស់លោក Gujarati។


វិធីសាស្ត្ររូបភាព (graphical method)

បន្ទាប់ពីបានសមីការប៉ាន់ស្មានរួច អ្នកយកវេស៊ីតយួលរបស់សមីការនោះទៅដាក់លើរូបស្កាត់ផ្លុំ (Scatter Plot) ដោយយក វេស៊ីតយួល ($u, \hat{u}$) ដាក់លើអ័ក្សឈរ និងពេលវេលា (time) ដាក់លើអ័ក្សដេក (មើលរូប 10.8) រួចធ្វើការអង្កេតទម្រង់រូបទាំងនោះ។


ក្នុងរូប 10.8 រូប A និង B បង្ហាញពីទម្រង់ឡើងចុះ ហើយ C និង D បង្ហាញទម្រង់ជាសមីការដឺក្រេទីពីរ និងរូប E បង្ហាញទម្រង់ឡើងចុះ ហើយមានតែរូប F មួយទេ ដែលមិនមានទម្រង់អ្វីទាំងអស់។ រូប F បង្ហាញថា គ្មានបញ្ហាអូតូគូរីលេសិន (no autocorrelation) ។

ចំពោះឧទាហរណ៍ 10.1 របស់យើង វេស៊ីតយួល ត្រូវបានដាក់បង្ហាញលើរូប 10.9។ តាមរយៈរូបនេះបង្ហាញថា វេស៊ីតយួលហាក់ដូចមានទម្រង់រូប F ដែលចំណុចនីមួយៗមានលក្ខណៈឆ្លាស់ចុះឡើងយ៉ាងទៀងទាត់ ឬ មានលក្ខណៈចៃដន្យ (random) ដូច្នេះយើងសន្និដ្ឋានថា មិនមានវត្តមាន អូតូគូរីលេសិនក្នុងវេស៊ីតយួលនោះទេ។

រូប 10.8 ទម្រង់ auto-correlation និង non-autocorrelation



រូប 10.9 Residuals Plot



ដីប៊ីនវតសុនតេស្ត

តេស្តភាគច្រើនដែលរកទំនាក់ទំនងជាស៊េរី (serial correlation) គឺ ដីប៊ីនវតសុនតេស្ត (Durbin –Watson d statistic)។ តេស្តនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្ថិតិហើយត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងសមីការ 10.19។


$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \hat{u}_t^2} \quad (10.19)$$

ហើយ $\hat{u}_t$ = Residuals នៅគ្រា t ($\hat{u}_t = Y_t - \hat{Y}_t$)

$\hat{u}_{t-1}$ = Residuals នៅគ្រា $t-1$ ឬក្រោយមួយគ្រា

បន្ទាប់ពីបានគណនាតម្លៃ ដីប៊ីនវតសុន (d) រួចមក អ្នកយកវាទៅធៀបជាមួយដីប៊ីនវតសុនក្នុងតារាង 10.7។ បើសិនតម្លៃ d នៅចន្លោះជួរឈរទី1 និងទី5 គឺមិនបដិសេធអូ H_0 ហើយសន្និដ្ឋានថា មានស្តុតាងបញ្ជាក់ថា វ៉េស៊ីតយូលមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាន (positive serial correlation) ហើយបើ d នៅចន្លោះជួរឈរទី2 និងទី4 មិនច្បាស់លាស់ ហើយ d នៅចន្លោះជួរឈរទី3 គឺមិនបដិសេធអូ H_0 ឬ/និង H_0^* រួចសន្និដ្ឋានថា មិនមានវត្តមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានក្នុងវ៉េស៊ីតយូលនោះទេ (no positive serial correlation or negative serial correlation)។

តារាង 10.7 ដីប៊ីនវតសុន (Durbin –Watson d statistic)



H_0 = មិនមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានដោយស្វ័យប្រវត្តិ (no positive autocorrelation)

H_0^* = មិនមានទំនាក់ទំនងអវិជ្ជមានដោយស្វ័យប្រវត្តិ (no negative autocorrelation)

d_L = តម្លៃក្នុងតារាងដឺប៊ីនវតសុនកំរិតទាប (Durbin-Watson Statistic lower bound)

d_U = តម្លៃក្នុងតារាងដឺប៊ីនវតសុនកំរិតខ្ពស់ (Durbin-Watson Statistic upper bound)

ឥឡូវយើងវិលមកឧទាហរណ៍ 10.1 របស់យើងបន្តទៀត ដើម្បីចង់ដឹងថា វ៉េស៊ីតយួលរបស់ សមីការលីនេអ៊ែររបស់យើងឯករាជ្យឬយ៉ាងណា។ តារាង 10.8 បង្ហាញពីទិន្នន័យដើម្បីគណនា ដឺប៊ីនវតសុនតេស្ត។

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \hat{u}_t^2} = \frac{50057.4}{17868} = 2.80$$

បន្ទាប់មកយើងតម្លៃ Durbin $d=2.80$ នេះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងតារាង ដឺប៊ីនវតសុន (តារាង 10.9) ត្រង់ $K=1$, $d_L = 1.10$ និង $d_U = 1.37$, នោះយើងបានតារាង 10.8 វ៉េស៊ីតយួលនៃសមីការប៉ាន់ស្មាន (10.12)

n	$\hat{u}_t$	$\hat{u}_{t-1}$	$\hat{u}_t^2$	$(\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2$
1	-1.646	NA	2.7089	NA
2	54.039	-1.646	2920.2	3100.82
3	-1.591	54.039	2.5311	3094.7
4	16.094	-1.591	259.02	312.76
5	-13.7	16.094	187.71	887.73
6	-44.62	-13.7	1990.8	955.89
7	50.861	-44.62	2586.9	9116.39
8	-41.45	50.861	1718.4	8522.06
9	72.35	-41.45	5235.1	12952.2
10	-14.28	72.354	203.8	7504.77
11	1.41	-14.28	1.98	246.02
12	4.78	1.409	22.84	11.35
13	-25.02	4.78	625.79	887.73
14	-44.01	-25.02	1937.1	360.89
15	-0.06	-44.01	0.003	1932.19
16	-13.17	-0.06	173.35	171.87
			$\sum \hat{u}_t^2 = 17868$	$\sum (\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2 = 50057.4$

- $4-d_U = 4-1.37 = 2.63$, និង $4-d_L = 4-1.10 = 2.90$ ដូច្នេះ $d=2.80$ គឺនៅចន្លោះ
- $4-d_U = 2.63 < d = 2.80 < 4-d_L = 2.90$ ដែលជាតំបន់មិនច្បាស់លាស់។ ដូច្នេះត្រូវប្រមូលទិន្នន័យបន្ថែមសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះ។

តារាង 10.9 រកតម្លៃគោលរបស់ដឺប៊ីនវ៉តស៊ុន (Durbin-Watson Statistic)

$\alpha = 0.05$										
n	$k = 1$		$k = 2$		$k = 3$		$k = 4$		$k = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
15	1.08	1.36	.95	1.54	.82	1.75	.69	1.97	.56	2.21
→ 16	1.10	1.37	.98	1.54	.86	1.73	.74	1.93	.62	2.15
17	1.13	1.38	1.02	1.54	.90	1.71	.78	1.90	.67	2.10
18	1.16	1.39	1.05	1.53	.93	1.69	.82	1.87	.71	2.06

រូប 10.10 លទ្ធផលសមីការលីនេអ៊ែរ

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/25/21 Time: 14:20
Sample: 2020M01 2021M04
Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	88.23553	35.80115	2.464600	0.0273
X	1.131502	0.196496	5.758410	0.0000
R-squared	0.703134	Mean dependent var	287.8750	
Adjusted R-squared	0.681929	S.D. dependent var	63.34548	
S.E. of regression	35.72545	Akaike info criterion	10.10607	
Sum squared resid	17868.30	Schwarz criterion	10.20265	
Log likelihood	-78.84858	Hannan-Quinn criter.	10.11102	
F-statistic	33.15929	Durbin-Watson stat	2.801463	
Prob(F-statistic)	0.000050			

កម្មវិធី Eviews បានបញ្ចូលតម្លៃ ដឺប៊ីនវ៉តស៊ុនតេស្តនៅក្នុងលទ្ធផលសមីការលីនេអ៊ែរតែម្តង។ តារាង 10.10 បង្ហាញអំពីលទ្ធផលសមីការលីនេអ៊ែរដែលបូករ វ៉េស៊ីតយូល គិតជាការ៉េ និងតម្លៃ ដឺប៊ីនវ៉តស៊ុនតេស្តគឺដូចលទ្ធផលខាងលើដែលបានគណនារួច (សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយខ្លួនឯង)។

10.5.3 ការវាយតម្លៃភាពថេរនៃវ៉ារីយ៉ង់និងដំណោះស្រាយ

I. ការវាយតម្លៃភាពថេរនៃវ៉ារីយ៉ង់

ភាពដូចគ្នានៃវ៉ារីយ៉ង់ (homogeneity of variance) ឬវ៉ារីយ៉ង់ថេរ គឺជាលក្ខខណ្ឌដ៏សំខាន់សម្រាប់ការប្រៀបធៀបវ៉ារីយ៉ង់ ឬហៅថា analysis of variance (ANOVA) បើសិនវ៉ារីយ៉ង់មិនថេរ ឬលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានបំពាន ប្រូបាប៊ីលីតេដែលបដិសេធសម្មតិកម្មមោឃៈ (H_0 : វ៉ារីយ៉ង់ស្មើគ្នា) ទាំងមានកំហុសគឺមានច្រើន។ នៅក្នុងសមីការលីនេអ៊ែរវិញ លក្ខខណ្ឌប្រភេទនេះត្រូវបានដាក់កំហិតទៅលើអ៊ែររ៉េ ឬ វ៉េស៊ីតយូល (u_i) ដែលតម្រូវឲ្យ មានវ៉ារីយ៉ង់ដូចគ្នា (homogeneity) ហើយបើលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានបំពាន គេចាត់ទុកថាមានបញ្ហាហេតុរូស្តេតជាស្លឹកស៊ីដី (heteroscedasticity) នៅក្នុងវ៉េស៊ីតយូល។ ប្រសិនបើ ហេតុរូស្តេតជាស្លឹកស៊ីដីកើតឡើង OLS នៅតែមិនលំអៀង (unbiased) និងនៅតែស៊ីសង្វាក់ឬរលូនដដែល


(consistency) ប៉ុន្តែវាមិនបានធ្វើឲ្យវាវិជ្ជមានតូចបំផុតនោះឡើយ (estimators are no longer minimum variance) ដូច្នេះ OLS ដែលជាបន្ទាត់ប្រសើរបំផុតទៀតហើយ (not BLUE: not best linear unbiased estimator) ទៀតហើយ។ ដោយសារតែ ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីជី គឺទាក់ទងជាមួយវាវិជ្ជមានមិនថេរ ដូច្នេះផលប៉ះពាល់មួយផ្សេងទៀតគឺ F-test និង t-test មិនអាចទុកចិត្តបានដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងមានការយល់ច្រឡំឬសន្និដ្ឋានខុស²⁸ ។

អ្នកអាចវាយតម្លៃភាពជាដូចគ្នានៃវាវិជ្ជមានតាមរយៈវិធីសាស្ត្ររូបភាពនិងតេស្តស្ថិតិ។

1) វិធីសាស្ត្ររូបភាព (Graphical Method)

បន្ទាប់ពីធ្វើការប៉ាន់ស្មានសមីការបន្ទាត់រួចមក អ្នកទទួលបានរ៉េស៊ីតយួល បន្ទាប់មកលើកវាជាការ៉េ ($\hat{u}_i^2$) ហើយយកវាទៅតាងជាមួយតម្លៃព្យាករណ៍ ($\hat{Y}_i$) ដោយដាក់ $\hat{u}_i^2$ នៅលើអ័ក្សឈរ ហើយដាក់ $\hat{Y}_i$ នៅលើអ័ក្សដេក (ដូចរូប 10.12) ។

រូប 10.12 ទម្រង់ផ្សេងៗនៃរ៉េស៊ីតយួលដែលប៉ាន់ស្មាន




បន្ទាប់មកទៀត ធ្វើការអង្កេតលើទំនាក់ទំនងរបស់វា។ បើសិនទំនាក់ទំនង $\hat{u}_i^2$ និង $\hat{Y}_i$ មានរៀងដូចរូប (a) យើងអាចសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជារ៉េស៊ីតយួលជាប់គ្នា។ ហើយបើទំនាក់ទំនង $\hat{u}_i^2$ និង $\hat{Y}_i$ មានរៀងដូចរូប b ដល់ e ប្រហែលជារ៉េស៊ីតយួលមិនដូចគ្នាទេ ឬមានបញ្ហាហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីជី។

²⁸ បញ្ហាហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីជី បង្កឲ្យមានផលវិបាកស្រដៀងទៅនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាស៊េរីដែរ ក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងជាស៊េរីភាគច្រើនកើតមានតែក្នុងទិន្នន័យជាស៊េរីតែប៉ុណ្ណោះ រីឯបញ្ហាហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីជី វិញអាចកើតមានលើទិន្នន័យទាំងពីរប្រភេទ គឺទិន្នន័យជាស៊េរីផងនិងទិន្នន័យប្រមូលក្នុងគ្រាតែមួយផង។ ហើយបញ្ហាទាំងពីរសុទ្ធតែទាក់ទងជាមួយរ៉េស៊ីតយួលទាំងអស់។ ទំនាក់ទំនងជាស៊េរីទាក់ទងជាមួយបញ្ហា រ៉េស៊ីតយួលជាប់ទាក់ទងគ្នាពីគ្រាមួយទៅគ្រាមួយទៀត រីឯ ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីជី ទាក់ទងជាមួយរ៉េស៊ីតយួលមិនថេរ។

វិធីសាស្ត្ររូបភាពមួយផ្សេងទៀតស្រដៀងទៅនឹងវិធីនេះដែរ ដោយអ្នកគ្រាន់តែយក u_i^2 ទៅតាងជាមួយអថេរឯករាជ្យ (X) ណាមួយដែលអ្នកសង្ស័យថាអថេរនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយ វ៉េស៊ីតយួល រួចធ្វើការអង្កេតទំនាក់ទំនងរបស់វា ហើយការសន្និដ្ឋានស្រដៀងទៅនឹងទំនាក់ទំនង u_i^2 និង $\hat{Y}_i$ ដែរ។

ចំពោះឧទាហរណ៍របស់យើង ការវាយតម្លៃនៃភាពដូចគ្នា ឬថេរនៃវ៉េស៊ីតយួលគឺត្រូវបានយក u_i^2 មកដាក់បង្ហាញជាមួយ (X) ដូចក្នុងរូប 10.13។ តាមរយៈរូបនេះ យើងអាចអង្កេតឃើញថា ចំណុចទាំងអស់ក្នុងរូបមិនមានរាងទម្រង់ណាមួយដូចក្នុងរូប 10.2 ចាប់ពី b ដល់ c ឡើយ។ ប៉ុន្តែវាមានប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរូប a ទៅវិញ។ ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថា វ៉េស៊ីតយួល ក្នុងសមីការប៉ាន់ស្មាន 10. 12 ប្រហែលជាថេរ ឬដូចគ្នា។

រូប 10.13 ទំនាក់ទំនងវ៉េស៊ីតយួលលើកជាការវ៉េជាមួយ X



2) ការប្រើតេស្តស្ថិតិជាផ្លូវការ

មានតេស្តជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតេស្តលើហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីធី ហើយក្នុងចំណោមតេស្ត ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីធីខាងក្រោម មានតែតេស្តរបស់លោក Park មួយទេដែលប្រើទំនាក់ទំនងរវាង (u_i) ជាមួយ Y ចំណែកតេស្តដ៏ទៃទៀតគឺប្រើ ទំនាក់ទំនង វ៉េស៊ីតយួល (u_i) ជាមួយ X ។

i. Park Test

បន្ទាប់ពីប៉ាន់ស្មានសមីការ 10.12 រួចមក អ្នកត្រូវប៉ាន់ស្មានសមីការលីនេអ៊ែរជំនួយ (auxiliary regression) មួយដោយយក u_i^2 តំណាងឲ្យ Y ហើយ អថេរឯករាជ្យតំណាងដោយដោយតម្លៃប៉ាន់ដ ($\hat{Y}_i$)។ ដូច្នេះយើងបានសមីការ Part Test: $u_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \hat{Y}_i$ បើ α_1 មានសារៈសំខាន់ (significance) មានន័យថា u_i^2 មានទំនាក់ទំនងជាមួយ $\hat{Y}_i$ ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា វ៉េស៊ីតយួលរបស់សមីការប៉ាន់ស្មានគឺមិនដូចគ្នានោះទេ ឬសមីការ 10.12 មានបញ្ហា ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីធី។

ii. Harvey Test

Harvey Test គឺយកលោកនេពែនៃ វ៉េស៊ីតយួលលើកជាការវ៉េជំនួស Y ហើយអថេរឯករាជ្យគឺនៅដដែល: $\ln(u_i^2) = \alpha_0 + \alpha_1 X_i$ បើ α_1 មានសារៈសំខាន់ (significance) នោះមានន័យថា u_i^2 មាន

ទំនាក់ទំនងជាមួយ X ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា វ៉ារីយ៉ង់របស់សមីការប៉ាន់ស្មានគឺមិនដូចគ្នានោះទេ ឬ មានន័យថាសមីការប៉ាន់ស្មានបញ្ហា ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីធី។

iii. Glejser Test

ស្រដៀងទៅនឹងនីតិវិធីរបស់ Harvey ដែរ គឺ Y ជំនួសដោយតម្លៃដាច់ខាតនៃ រេស៊ីតយួល ហើយហើយអថេរឯករាជ្យគឺនៅដដែល: $|u_i| \alpha_0 + \alpha_1 X_i$ បើ α_1 ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីធី នោះមាន ន័យថា រេស៊ីតយួលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ X ហើយយើងសន្និដ្ឋានថា វ៉ារីយ៉ង់របស់សមីការប៉ាន់ ស្មានគឺបញ្ហា ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីធី។

iv. Breusch–Pagan–Godfrey តេស្តរកបញ្ហាហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីធី ដោយយក n^2 តំណាង Y ដូចលោក Park ដែរ ក៏ប៉ុន្តែអថេរឯករាជ្យ មិនមែនតំណាងដោយ $\hat{Y}_i$ នោះទេ តែរក្សាអថេរ X ដូច ដើម។ រីឯ White's heteroscedasticity ស្រដៀងទៅនឹង Breusch–Pagan–Godfrey ដែរ ដោយយក n^2 តំណាង Y ហើយរក្សាអថេរ X នៅដដែល ដោយថែម X^2 មួយទៀត ក្នុងករណី សមីការលីនេអ៊ែរដែលមាន X តែមួយ (simple regression) ហើយបើករណីសមីការលីនេអ៊ែរដែល មាន X ច្រើន (multiple regression) គឺបន្ថែមអន្តរកម្ម (interaction term) ដូចជា $X_1 * X_2$ ថែមទៀត។ តេស្តទាំងពីរនេះចង់កំណត់ទំនងរវាងរេស៊ីតយួលជាមួយ X ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈស្មុគ ស្មាញជាងតេស្តបីខាងដើម ហើយប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមអានសៀវភៅ Basic Econometrics (2008) របស់លោក Gujarati។ សូមបញ្ជាក់ថាតេស្តទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវ បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Eviews។

10.6 ដំណោះស្រាយពេលវ៉ារីយ៉ង់មិនថេរ

ជាទូទៅដំណោះស្រាយចំពោះវ៉ារីយ៉ង់មិនថេរត្រូវបានចែកជាពីរ៖ ករណីវ៉ារីយ៉ង់បានដឹង និង មិនបានដឹង។

1. ករណីវ៉ារីយ៉ង់បានដឹង (when σ_i^2 is known)

ករណីនេះយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រសមាមាត្រគិតជាការដែលធ្វើឲ្យអ៊ែរវ៉ិចបំផុត (The Method of Weighted Least Square, WLS)។ ឧបមាថា យើងមានសមីការដូចខាងក្រោម៖

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i \quad (10.16)$$

ឥឡូវសន្មតថា វ៉ារីយ៉ង់របស់ ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីធី ត្រូវបានដឹង σ_i^2 បន្ទាប់មកយើងចែកស មីការ 10.16 ជាមួយ σ_i (អាចធ្វើនៅក្នុង Excel បាន)

$$\frac{Y_i}{\sigma_i} = \frac{\beta_0}{\sigma_i} + \beta_1 \frac{X_i}{\sigma_i} + \frac{u_i}{\sigma_i} \quad (10.17)$$

សូមបញ្ជាក់ថា សមីការ (10.17) គឺជាសមីការកាត់តាមគល់ ០។ សមីការនេះត្រូវបានស្គាល់ ថា WLS estimator ឬ the Generalized Least Square (GLS)។ ក្នុងបរិបទហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីធី ពាក្យ ទាំងពីរអាចប្រើជំនួសគ្នាបាន (Gujarati & Porter, 2008)។ ពេលប៉ាន់ស្មានសមីការ (10.17) រួចរាល់ យើងគុណសមីការនេះនឹង σ_i ពេលនោះយើងនឹងទទួលបានមេគុណ β_0 និង β_1 ជាស្រេច។

ឧទាហរណ៍ 10.2 អ្នកសិក្សាម្នាក់ចង់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចំណាយលើការស្រាវជ្រាវនិងប្រាក់ចំណេញរបស់ឧស្សាហកម្ម។ ទិន្នន័យទាំងអស់មានដាក់បង្ហាញក្នុងតារាង 10.11។

តារាង 10.11 ប្រាក់ចំណេញនិងចំណាយលើការស្រាវជ្រាវ

n	Y	X	σ_i	Y_i/σ_i	X_i/σ
1	190	6400	1200	0.16	5.33
2	1570	11700	230	6.83	50.86
3	280	14700	1750	0.16	8.40
4	2830	22000	200	14.15	110
5	230	26500	2760	0.08	9.60
6	3750	32400	280	13.39	115.71
7	2890	35000	800	3.61	43.75
8	4650	40500	530	8.77	76.41
9	5040	70800	1500	3.36	47.20
10	13900	80600	6500	2.138462	12.40

ហើយ Y = ប្រាក់ចំណេញជាមធ្យមគិតជា \$1000 របស់ឧស្សាហកម្មទាំង10

X = ចំណាយលើការស្រាវជ្រាវគិតជាមធ្យមរបស់ឧស្សាហកម្មទាំង10

σ_i = គម្លាតស្តង់ដារនៃប្រាក់ចំណេញរបស់ឧស្សាហកម្មទាំង10

- ជំហានទី1: បង្កើតសមីការប៉ាន់ស្មាន

ជំហាននេះយើងធ្វើការប៉ាន់ស្មានសមីការដែលតំណាងឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រាក់ចំណេញនិងការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍន៍ជាមុនសិន បន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើតេស្តលើសមីការនោះដើម្បីកំណត់ថា តើវាមានបញ្ហាហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីធី ដែរឬអត់។

លទ្ធផលនៃការប៉ាន់ស្មានទំនាក់ទំនងប្រាក់ចំណេញនិងចំណាយលើការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញដោយសមីការ 10.17។

$$\hat{Y}_i = -1,363.94 + 0.1438X_i \quad (10.17)$$


$$se = (1,202.78) \quad (0.0292)$$

$$t = (-1.1340) \quad (2.9293)$$

- ជំហានទី 2: បង្កើតគំនូសតាងរេស៊ីឌូល (plot residuals)

បន្ទាប់មកយើងលើ រេស៊ីឌូល ជាការ៉េ (u_i^2) រួច ដាក់បង្ហាញនៅលើក្រាហ្វិកជាមួយតម្លៃប៉ាន់ស្មាន $\hat{Y}_i$ (Y-estimated) យើងបាន រូប 10.14។

រូប 10.4 ទំនាក់ទំនង u_i^2 និង តម្លៃប៉ាន់ស្មាន $\hat{Y}_i$



តាមរយៈរូបនេះយើងសង្ស័យថាមានបញ្ហា ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីជី ក្នុង OLS របស់យើង។

- ជំហានទី3: សន្មតថាយើងជ្រើសរើស Glejser test ដើម្បីរកបញ្ហា ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីជី តាមរយៈនៃការប៉ាន់ស្មានសមីការ: $|u_i| = \alpha_0 + \alpha_1 X_i$ នោះយើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

$$|u_i| = 15.768 + 0.042 X_i \quad (10.18)$$

$$se = (496.37) \quad (0.0120)$$

$$t = (0.0317) \quad (3.4929)$$

តាមរយៈលទ្ធផលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថា មេគុណរបស់ X គឺ មានសារៈសំខាន់ (significance) ខ្លាំងតែម្តង ដូច្នេះយើងសន្និដ្ឋានថា មានបញ្ហា ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីជី នៅក្នុង OLS របស់យើង

- ជំហានទី4: ប្រើ WLS ដើម្បីដោះស្រាយ ហេតុអ្វីស្តេតជាស្លឹកស៊ីជី តាមរយៈការប៉ាន់ស្មានសមីការ

$$10.17: \frac{Y_i}{\sigma_i} = \frac{\beta_0}{\sigma_i} + \beta_1 \frac{X_i}{\sigma_i} \text{ ។ នោះយើងបាន៖}$$

$$\frac{Y_i}{\sigma_i} = 566.20 \left(\frac{1}{\sigma_i} \right) + 0.0953 \left(\frac{X_i}{\sigma_i} \right) \quad (10.19)$$

$$se = (323.94) \quad (0.01316)$$

$$t = (1.7479) \quad (7.2421)$$

រួចយើងគុណសមីការ 10.19 និង σ_i រួចសំរួល σ_i ចោល នោះយើងទទួលបានសមីការ 10.20

$$Y_i = 566.20 + 0.0953 X_i \quad (10.20)$$

ជំហានទី 5: យើងប្រើ Glejser test ដើម្បីរកបញ្ហា ហេតុអ្វីស្ថេរជាស្លឹកស៊ីដី ឡើងវិញ នោះយើងបាន លទ្ធផលសមីការ 10.20៖

$$|\hat{u}_i| = 0.6702 + 5.44E-06 X_i \quad (10.21)$$

$$se = (0.2064) \quad (5.01E-06)$$

$$t = (3.2465) \quad (1.0864)$$

នៅកំរិត $\alpha = 0.05$ $df = 10 - 2 = 8$ តេស្តកន្ទុយសងខាង (two-tailed test) យើងបាបតម្លៃគោល t -critical $= 2.3060$ ។ ដោយ t -statistic $= 1.0864 < t$ -critical $= 2.3060$ ដូច្នេះមេគុណរបស់ X គឺមិនសំខាន់ (insignificance)។ យើងសន្និដ្ឋានថា សមីការប៉ាន់ស្មាន 10.20 លែងមានបញ្ហាហេតុអ្វីស្ថេរជាស្លឹកស៊ីដី ទៀតហើយ។ ដូច្នេះតេស្តកត់ទាំងឡាយដូចជា F -test និង t -test នៅក្នុងសមីការនេះអាចទុកចិត្តបាន។

2. ករណីវ៉ារីយ៉ង់មិនដឹង (unknown σ_i^2)

មានករណីជាច្រើន ការសិក្សាមិនទាក់ទងជាមួយតម្លៃមធ្យមរបស់ Y ឬ X នោះទេ មានន័យយើង មិនអាច ដឹង σ_i^2 ហើយបើសមីការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកជួបបញ្ហា ហេតុអ្វីស្ថេរជាស្លឹកស៊ីដី ថែមទៀត អ្នកត្រូវប្រើ នីតិវិធីស្រដៀងទៅនឹង WLS ឬ GLS ប៉ុន្តែមិនមែនចែកសមីការនឹង σ_i នោះទេ តែត្រូវចែក $\sqrt{X_i}$, X_i , ឬ X_i^2 ពេលចែករួចរាល់ហើយ ទើបយើងធ្វើការប៉ាន់ស្មានសមីការលីនេអ៊ែរ។ បើចែក $\sqrt{X_i}$ ពេលប៉ាន់ស្មានរួចអ្នក ត្រូវគុណនឹង $\sqrt{X_i}$ មកវិញ បើចែកជាមួយអថេរណា ពេលប៉ាន់ស្មានរួចត្រូវគុណជាមួយអថេរនោះ ដើម្បីឲ្យ បានសមីការដើមវិញ ។ ពេលខ្លះអ្នកក៏ត្រូវការចែកនឹង $\hat{v}_i$ ហើយគុណនឹង $\hat{v}_i$ វិញក៏មាន (សូមអានសៀវភៅ Basic Econometrics របស់លោក Gujarati, 2008)។ ជំរើសមួយទៀតពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហា ហេតុអ្វី ស្ថេរជាស្លឹកស៊ីដីក្នុងការប៉ាន់ស្មាន OLS អ្នកអាចប្រើ សមីការរបស់លោក White ដែលជាទូទៅគេហៅថា “White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance”។ លទ្ធផលនៃការប្រើសមីការ នេះ គឺអ្នកនឹងទទួលបានមេគុណដូច OLS ធម្មតា តែខុសគ្នាត្រង់ អ៊ែររើស្តង់ដារ (standard error) និង t -test ។ សមីការនេះមាននៅក្នុងកម្មវិធី Eviews ដោយអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសមុខងារនេះមកប្រើជាការស្រេច។


10.5.4 ការវាយតម្លៃន័រម៉ាល់លីតធី

ន័រម៉ាល់លីតធី (Normality) តេស្តគឺមានគោលដៅកំណត់ថាតើ វ៉េស៊ីតយូល ដែលបានមកពីសមី ការប៉ាន់ស្មាននោះមានលក្ខណៈន័រម៉ាល់លីតធី ឬអត់។ មានតេស្តមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានលក្ខណៈ ន័រម៉ាល់លីតធី ដូចជា t -test និង F -test ជាដើម។ ដោយសារតែនៅក្នុងសមីការលីនេអ៊ែរគឺមានប្រើប្រាស់ t -test និង F -test (យើងនឹងធ្វើការរៀបរាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះ) ហេតុដូច្នេះហើយបានជាការវាយតម្លៃលើ ន័រម៉ាល់លីតធី ទៅលើវ៉េស៊ីតយូល គឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់។


ដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើលក្ខខណ្ឌ ន័រម៉ាល់លីតធី អ្នកមានជំរើសច្រើន ដូចជាការយកវ៉េស៊ីតយូល មកដាក់បង្ហាញជាគំនូសហ៊ីស្តូក្រាមនិងគំនូសដើមនិងស្លឹក (Histogram, Stem and Leave) ឬ ដាក់ជា គំនូសន័រម៉ាល់លីតធី (normality plot) ជាដើម។

សម្រាប់ឧទាហរណ៍ 10.1 របស់យើងវ៉េស៊ីតយូលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅលើ គំនូសហ៊ីស្តូក្រាម និង គំនូសន័រម៉ាល់លីតធី ក្នុងរូប 10.8 និង 10.9។

រូប 10.8 គំនូសហ៊ីស្តូក្រាម (Histogram)



រូប10.9 គំនូសនំរម៉ាល់លីតជី



រូប10.8 គំនូសហ៊ីស្តូក្រាម មានរាងមិនសូវច្បាស់ថាគឺដូចរូបជួង ឬមិនដូច ហើយមានចំណុចមួយចំនួននៃ វ៉េស៊ីតយួលក្នុងរូប 10.9 ស្ថិតនៅជិតបន្ទាត់ ហើយខ្លះក៏នៅឆ្ងាយពីបន្ទាត់ ដែលធ្វើឲ្យពិបាកកំណត់ថា វ៉េស៊ីតយួល របស់សមីការប៉ាន់ស្មាន 10.12 មានលក្ខណៈ នំរម៉ាល់លីតជី ដែរឬអត់។ ក្នុងករណីបែបនេះមានតែតេស្តស្ថិតិទេដែលអាចអារកាត់បាន។ ចាកបេរ៉ាតេស្ត (Jarque-Bera, JB) គឺត្រូវបានបរិយាយនៅជំពូកមុនម្តងហើយ វាគឺជាតេស្តមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេក្នុងកំណត់អំពី នំរម៉ាល់លីតជី របស់វ៉េស៊ីតយួល។ JB តេស្តគឺងាយយល់និងងាយអនុវត្ត ប៉ុន្តែតេស្តនេះអាចប្រើប្រាស់បានសមស្របក្នុង

ករណីដែលចំនួនប៉ាន់គំរូមានចំនួនច្រើនតែប៉ុណ្ណោះ ហើយក្នុងករណីដែលប៉ាន់គំរូមានចំនួនតិច តេស្តនេះមិនស័ក្តិសមឡើយ²⁹។

JB តេស្ត គឺតេស្តលើសម្មតិកម្ម H_0 : វ៉េស៊ីតយួល គឺមានលក្ខណៈ នំម៉ាល់លីតជី ហើយ JB តេស្តត្រូវបានកំណត់ដូចក្នុងសមីការ 10.5។

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right] \sim \chi^2_2 \quad (10.5)$$

ហើយ n = ចំនួនប៉ាន់គំរូ

S = ភាពឆៀង (Skewness)


K = កំពស់របស់ហ៊ីស្តូក្រាម (Kurtosis)

χ^2_2 = JB មានបំណែងចែកដូចឆាយឈ្នួដែលមាន $df=2$

ពេលដែលកំរិតវិលយូ (p-value) របស់ឆាយឈ្នួធំជាង 0.05 វ៉េស៊ីតយួល គឺមានលក្ខណៈនំម៉ាល់លីតជី ហើយផ្ទុយមកវិញពេល $p < 0.05$ វ៉េស៊ីតយួលគឺមានលក្ខណៈមិន នំម៉ាល់លីតជី ។

ឥឡូវយើងសន្មត់ថានៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងមានចំនួនប៉ាន់គំរូធំគ្រប់គ្រាន់ ដូច្នេះយើងអាចប្រើ JB តេស្តបាន។

រូប10.11 លទ្ធផល JB តេស្ត



តាមរយៈស្ថិតិបែបវិយាយរបស់ វ៉េស៊ីតយួលយើងបាន $S=0.3381$, $K=1.7855$, និង $n=10$

$$JB = 16 \left[\frac{0.676^2}{6} + \frac{(2.699-3)^2}{24} \right] = 1.279 \quad (p=0.5275)$$

²⁹ ដកស្រង់ចេញពី Gujarati. D (2012) Econometrics by Example, First Edition, Palgrave Macmillan, UK (p.128)

យើងបាន $JB=1.279$ ឬ $\chi^2=1.279$ ហើយមាន $p\text{-value}=0.5275$ ដូច្នេះ H_0 : រ៉េស៊ីតយួលមានលក្ខណៈនាំម៉ាល់លីតធី គឺត្រូវបានខកខានមិនបានបដិសេធ ហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានថារ៉េស៊ីតយួល គឺមានលក្ខណៈនាំម៉ាល់លីតធី។ លទ្ធផលនៃការតេស្ត នាំម៉ាល់លីតធី ដែលផ្តល់ដោយ Eviews មានបង្ហាញក្នុងរូប 10.11 ។

10.7 ការព្យាករណ៍

បន្ទាប់ពីបានសមីការប៉ាន់ស្មានរួច អ្នកអាចយកសមីការនេះទៅធ្វើការព្យាករណ៍បានលុះត្រាណាតែមិនមានលក្ខខណ្ឌលីនេអ៊ែរណាមួយត្រូវបានបំពាន។ ជាទូទៅការព្យាករណ៍មានពីរបៀប៖ ការព្យាករណ៍ជាចំណុច (point estimate) និងការព្យាករណ៍ជាចន្លោះជឿជាក់របស់ Y (interval estimate for Y)។ ហើយការព្យាករណ៍ជាចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់ Y ត្រូវបានបែងចែកជាពីរទៅទៀតគឺ ការព្យាករណ៍ចន្លោះជឿជាក់តម្លៃមធ្យម Y (confidence interval estimate for mean of Y) និងការព្យាករណ៍ចន្លោះជឿជាក់តម្លៃបុគ្គលរបស់ Y (confidence interval estimated for individual value of Y)។ សម្រាប់ពេលនេះយើងធ្វើការពិភាក្សាតែការព្យាករណ៍ជាចំណុច ហើយចំពោះការព្យាករណ៍ជាចន្លោះជឿជាក់នៃតម្លៃមធ្យមរបស់ Y តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះថា ការព្យាករណ៍ជាចន្លោះជឿជាក់តម្លៃមធ្យម Y មានប្រជាប្រិយភាពជាងការព្យាករណ៍ចន្លោះជឿជាក់តម្លៃបុគ្គលរបស់ Y ។

1. ការព្យាករណ៍ជាតម្លៃមធ្យម (point estimate)

ឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលឧទាហរណ៍របស់យើងឡើងវិញ ឧបមាថា អ្នកលក់ចង់ដឹងថា បើសិនជាគាត់ចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចំនួន \$200 តើការលក់ជាមធ្យមគឺប៉ុន្មាន?

ចម្លើយ៖

យើងមានសមីការប៉ាន់ស្មាន $\hat{Y}_i = 88.23 + 1.13 X_i$ បន្ទាប់មកយើងជំនួស $X=\$200$ ចូលក្នុងសមីការនេះយើងបាន៖ $\hat{Y}_i = 88.23 + 1.13(200) = \$314.23$ (000) ឬ \$314,230 គិតជាមធ្យមក្នុងមួយខែ។

ជាទូទៅការប្រើសមីការប៉ាន់ស្មានដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍មួយគឺ អ្នកអាចព្យាករណ៍ក្នុងរង្វង់ឬដែនកំណត់របស់ប៉ាន់គំរូតែប៉ុណ្ណោះ (only interpolation) ហើយអ្នកមិនអាចធ្វើការព្យាករណ៍ក្រៅរង្វង់ឬដែនកំណត់នោះបានឡើយ (extrapolation)។ ចំពោះឧទាហរណ៍របស់យើង តម្លៃប៉ាន់គំរូ X គឺនៅចន្លោះពី \$110 ទៅ \$280 តែប៉ុណ្ណោះ (មើលតារាង 10.1) ដូច្នេះអ្នកមិនអាចយកតម្លៃ X ក្រៅពីចន្លោះនេះ (តូចជាង \$110 ឬ ធំជាង \$280) មកព្យាករណ៍ការលក់បានឡើយ ពីព្រោះតម្លៃទាំងនោះជាករណីពិសេសដែលអ្នកមិនបានសិក្សា។

2. ការព្យាករណ៍ចន្លោះជឿជាក់

ការព្យាករណ៍ចន្លោះជឿជាក់ចំពោះតម្លៃមធ្យម (μ) របស់ Y ត្រូវបានកំណត់ដូចរូបមន្ត 10.19។

$$\text{Confidence Interval for } \mu_{Y|X=X_i}: \hat{Y} \pm t_{\alpha/2} S_{YS} \sqrt{h_i} \quad (10.19)$$

$$\text{ហើយ} \quad h_i = \frac{1}{n} + \frac{(X_i - \bar{X})^2}{SSX}$$

$$SSX = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$\hat{Y}_i$ = តម្លៃព្យាករណ៍

S_{YX} = អ៊ែរីស្តង់ដាររបស់ Y

n = ប៉ាន់គំរូ

X_i = តម្លៃ X ដែលចង់ព្យាករណ៍ Y

$\mu_{Y|X=X_i}$ = តម្លៃមធ្យមរបស់ Y ពេល $X=X_i$

ឥឡូវយើងបន្តការព្យាករណ៍ក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងពេល $X_i = \$200$ នោះ $\hat{Y} = \$314.23$ និង $\bar{X} = 176.4375$ ។ បើ $\alpha=0.05$, $df=16-2=14$ នោះយើងបានតម្លៃជីតោល $t_{\frac{0.05}{2},14}=2.1448$ និង $S_{YX}=35.72$ (មើលតារាង 10.3)

$SSX = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = 33,055.94$ (គណនាខ្លួនឯង) បន្ទាប់មកយើងគណនា h_i :

$$h_i = \frac{1}{n} + \frac{(X_i - \bar{X})^2}{SSX} = \frac{1}{16} + \frac{(200 - 176.4375)^2}{33,055.94} = 0.0793$$

គណនាចន្លោះជឿជាក់សម្រាប់តម្លៃមធ្យមរបស់ Y:

$$\begin{aligned}\hat{Y} \pm t_{\alpha/2} S_{YS} \sqrt{h_i} &= \$314.23 \pm 2.1448 (35.72) \sqrt{0.0793} \\ &= \$314.23 \pm 21.57\end{aligned}$$

$$292.66 \leq \mu_{Y|X=X_i} \leq 335.80$$

ដូច្នេះ 95% យើងជឿជាក់ថា ពេល $X = \$200$ Y គិតជាមធ្យមគឺនៅចន្លោះពី 292.66 ទៅ 335.8 ឬ \$292,600 ដល់ \$335,800

10.7 កំហុសក្នុងការវិភាគលីនេអ៊ែរ

- ការប្រើសមីការលីនេអ៊ែរសិនមិនដឹងលក្ខខណ្ឌឬ បើសិនលក្ខខណ្ឌមួយនៃសមីការលីនេអ៊ែរត្រូវបានបំពាន ហើយអ្នកសិក្សាមិនដឹងវិធីដោះស្រាយ ឬខកខានមិនបានដំណោះស្រាយ នោះការប៉ាន់ស្មាន និងការព្យាករណ៍អាចមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយ។
- ការប្រើសមីការលីនេអ៊ែរមិនមានទ្រឹស្តី ឬមានចំណេះដឹងដែលទាក់ទងជាមួយកម្មវត្ថុនៃសមីការលីនេអ៊ែរ ហាក់ដូចជារមូលនៅក្នុងបាទសមុទ្រអញ្ចឹង
- ការព្យាករណ៍ត្រូវធ្វើឡើងតែនៅក្នុងរង្វង់របស់ប៉ាន់គំរូ (interpolation) តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនគួរធ្វើការព្យាករណ៍នៅខាងក្រៅរង្វង់របស់ប៉ាន់គំរូនៃ X (extrapolation) នោះទេ ពីព្រោះវាជាករណីពិសេសដែលអ្នកមិនបានសិក្សា។

សេចក្តីសង្ខេប

នៅក្នុងជំពូកនេះអ្នកបានស្គាល់សមីការលីនេអ៊ែរ និងមិនលីនេអ៊ែរ ការទាញយករូបមន្តគណនាមេគុណរបស់អថេរកករដ្ឋាននិងគណនាចំនួនថេររបស់សមីការបន្ទាត់។ ហើយបន្ទាប់មកអ្នកបានស្គាល់អំពីការគណនានិងការបកស្រាយ អ៊ែកាវ៉េ F-test, និង t-test ថែមទៀត។ ក្នុងជំពូកនេះអ្នកបានដឹងផងដែរអំពីរបៀបវាយតម្លៃលើលក្ខខណ្ឌទាំងប្រាំរបស់សមីការលីនេអ៊ែរនិងរបៀបដោះស្រាយ បើសិនជាមានលក្ខខណ្ឌមួយត្រូវបានបំពាន ជាពិសេសវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយករណីដែលមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាស៊ីរី និង បញ្ហាហេតុ

រ៉េស្កេតជាស្ថិតស្ថីតធីតាម WLS ឬ GLS ដើម្បី។ ហើយចុងក្រោយអ្នកបានសិក្សាអំពីរបៀបព្យាករណ៍ជាចំណុច និងចន្លោះជឿជាក់ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌនៃការព្យាករណ៍ថែមទៀត។

សំណួរនិងលំហាត់

I. សំណួរ

1. ចូលធ្វើការបកស្រាយចំនួនថេររបស់ Y និង មេគុណ X នៃសមីការលីនេអ៊ែរដែលមានមួយអថេរ?
2. តើអ៊ីការេ (R-square) មានន័យដូចម្តេច?
3. ពេលណាដែលបម្រែបម្រួលមិនអាចពន្យល់បានស្មើសូន្យ?
4. ពេលណាដែលបម្រែបម្រួលដែលអាចពន្យល់បានស្មើសូន្យ?
5. ហេតុអ្វីបានជាយើងគួរវិភាគទៅលើរេស៊ីដូល (residuals) របស់សមីការលីនេអ៊ែរ?
6. តើលក្ខខណ្ឌ (assumption) របស់សមីការលីនេអ៊ែរមានអ្វីខ្លះ?
7. តើពេលណាដែលអ្នកប្រើស្ថិតិ Durbin-Watson និងប្រើយ៉ាងដូចម្តេច?

II. លំហាត់

8. ភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុមួយចង់ធ្វើការព្យាករណ៍តម្លៃជួលអចលនវត្ថុប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) ទៅលើ អាប៉ាតឺម៉ង់ដោយផ្អែកលើផ្ទៃក្រឡាអាប៉ាតឺម៉ង់ (ម៉ែត្រការ៉េ)។ គាត់បានប្រមូលប៉ាន់គំរូចំនួន 20 អាប៉ាតឺម៉ង់ ដែលបានកត់ត្រាដូចខាងក្រោម៖

ប៉ាន់គំរូ	ថ្លៃជួល	ម៉ែត្រការ៉េ	ប៉ាន់គំរូ	ថ្លៃជួល	ម៉ែត្រការ៉េ
1	960	840	11	1700	1258
2	1500	1450	12	1400	1175
3	1200	1000	13	1440	1235
4	1400	1230	14	1200	1255
5	970	720	15	1800	1262
6	1650	1486	16	1300	1250
7	1550	1400	17	1250	996
8	939	724	18	1500	1261
9	775	710	19	1650	1040
10	1250	956	20	1200	965

- a. ចូលសង់គំនូស scatter plot.
- b. ចូលប្រើវិធីសាស្ត្រលិសស្វ័យ (least-squares) ដើម្បីកំណត់ចំនួនថេរ (b_0) និងមេគុណ X (b_1)
- c. ចូលបកស្រាយ (b_0) និងមេគុណ X (b_1)
- d. ព្យាករណ៍ថ្លៃជួលប្រចាំខែចំពោះអាប៉ាតឺម៉ង់មួយដែលមានផ្ទៃក្រឡា 1,000 ម៉ែត្រការ៉េ
- e. ចូលគណនា អ៊ីការេ និងបកស្រាយអត្ថន័យរបស់វា។

f. ចូលគណនាអ៊ែរវ៉េស្តង់ដារ

g. តើអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះសមីការលីនេអ៊ែរនេះពេលដែលប្រើវាដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍?

f. ចូលធ្វើការវាយតម្លៃលក្ខខណ្ឌរបស់សមីការលីនេអ៊ែរតើមានការបំពានដែរឬទេ?

9. អ្នកលក់តាមអ៊ីនធឺណែតកម្នាក់ចង់កំណត់ទំនាក់ទំនងរវាងការចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (boost page) និងចំណូលដែលបានមកពីការលក់ប្រចាំខែ។ គាត់ធ្វើការកត់ត្រាចំណូលនិងចំណាយ (គិតជាដុល្លារ) នេះរយៈពេល 24 ខែដូចខាងក្រោម៖

ខែ	ចំណាយ	ចំណូល	ខែ	ចំណាយ	ចំណូល
1	50	4020	13	63	3980
2	70	3810	14	72	4430
3	90	5310	15	59	3965
4	60	4260	16	80	4580
5	70	4300	17	95	5590
6	80	4100	18	60	3450
7	50	3215	19	91	5100
8	75	4810	20	94	5750
9	80	5240	21	69	4300
10	79	4730	22	54	3720
11	71	4415	23	90	5390
12	52	2920	24	67	4100

a. សន្មតថាមានទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់ ចូលប្រើវិធីសាស្ត្រលិសស្វ៊ែរ (LS) ដើម្បីកំណត់ចំនួនថេរ (b_0) និងមេគុណ X (b_1)

b. ចូលធ្វើការព្យាករណ៍ការលក់ពេលដែលចំណាយទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្មើនឹង 80 ដុល្លារ។

c. ចូលបង្កើតគំនូសតាង (plot) residuals ជាមួយនឹងពេលវេលា

d. ចូលគណនាស្ថិតិ Durbin-Watson។ នៅកំរិតអាល់ហ្វា 0.05 តើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា មានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាស៊េរីនៅក្នុងរ៉េស៊ីឌូលដែរឬទេ?

e. ផ្អែកតាមចំលើយ (c) និង (d) តើអ្នកសន្និដ្ឋានសុពលភាពរបស់ម៉ូដែលយ៉ាងដូចម្តេច?

10. ចូលប្រើទិន្នន័យក្នុងលំហាត់មុនដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខាងក្រោម៖

a. ចូលគណនា តម្លៃ F-ស្ថិតិ

b. ផ្អែកលើចំលើយ (a) និង (b), តើអ្នកសំរេចចិត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

c. ចូលគណនា អ៊ែកវ៉េ (R-square)

d. ចូលបង្កើតចន្លោះជឿជាក់ 95% ដើម្បីប៉ាន់ស្មានតម្លៃមធ្យមរបស់ចំនួនសកលពេលដែល
ចំណាយ = 70 ដុល្លារ។

ឯកសារយោង

I. Book

- Allan G. B (2009) Elementary Statistics: A Step by Step Approach. Eight Edition. McGraw-Hill
- Berenson M. L, Levine D. M, & Krehbiel T. C. (2012). Basic Business Statistics: Concepts and Applications. Twelfth Edition. Prentice Hall
- Brooks C. (2014) Introductory Econometrics for Finance. Third Edition, Cambridge University Press, UK
- Brooks G. P & Barcikowsk. R. S (2012) Multiple Linear Regression Viewpoints, 2012, Vol. 38(2)
- Gujarati. D (2012) Econometrics By Example, First Edition, Palgrave Macmillan, UK
- Gujarati D. N, & Porter D. C (2008) Basic Econometrics. Fifth Edition. McGraw-Hill
- [Hayashi, Fumio](#) (2000). *Econometrics*. Princeton University Press.
- Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2013). *Applied multivariate research: Design and interpretation* (2nd ed.). Sage Publications, Inc.[Hayashi, Fumio](#) (2001). *Econometrics*. Princeton University Press
- Pollant J. (2011) SPSS SURVIVAL MANUAL: A step by step guide to data analysis using SPSS. 4th edition. Allen & Unwin, Australia
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). *Using multivariate statistics* (5th ed.). Allyn & Bacon/Pearson Education.

II. Web Base

- Binomial distribution derived from <https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/binomial-theorem/binomial-distribution-formula/>
- Descriptive statistics derived from <https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-mean-mode-median.php>
- Nonlinear in the parameters derived from
- Kruskal-Wallis-test derived from <https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/kruskal-wallis-h-test-using-spss-statistics.php>
- McNemar's test for paired nominal data derived from [http://rasbt.github.io/mlxtend/user_guide/evaluate/mcnemar/#:~:text=The%20McNemar%20test%20statistic%20\(%22chi,with%20one%20degree%20of%20freedom.](http://rasbt.github.io/mlxtend/user_guide/evaluate/mcnemar/#:~:text=The%20McNemar%20test%20statistic%20(%22chi,with%20one%20degree%20of%20freedom.)

- Nonlinear in the parameters in regression model derived from <https://openclassrooms.com/en/courses/5873596-design-effective-statistical-models-to-understand-your-data/>
- Non-probability Sampling derived from <https://www.questionpro.com/blog/judgmental-sampling/>
- Probability and Non-probability Sampling derived from <https://www.scribbr.com/methodology/sampling>
- R-square value derived from <https://statisticsbyjim.com/regression/how-high-r-squared/>
- Variability or spread definition derived from [https://www.investopedia.com/terms/d/descriptive_statistics.asp#:~:text=Descriptive%20statistics%20are%20brief%20descriptive,measures%20of%20variability%20\(spread\).](https://www.investopedia.com/terms/d/descriptive_statistics.asp#:~:text=Descriptive%20statistics%20are%20brief%20descriptive,measures%20of%20variability%20(spread).)
- What is statistic ? The definition is adapted from <https://www.investopedia.com/terms/s/statistics.asp>
- Wilcoxon-Signed Test derived from <https://www.statisticshowto.com/wilcoxon-signed-rank-test/>
- William S. Gosset's t-distribution derived from https://en.wikipedia.org/wiki/William_Sealy_Gosset

ឧបសម្ព័ន្ធ

Table A: A Binomial Probability Distribution

n	r	0.01	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95
20	0	0.82	0.36	0.12	0.04	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0.17	0.38	0.27	0.14	0.06	0.02	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0.02	0.19	0.29	0.23	0.14	0.07	0.03	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0.06	0.19	0.24	0.21	0.13	0.07	0.03	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	0	0.01	0.09	0.18	0.22	0.19	0.13	0.07	0.04	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0.03	0.1	0.18	0.2	0.18	0.13	0.08	0.04	0.02	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0.01	0.05	0.11	0.17	0.19	0.17	0.12	0.08	0.04	0.02	0.01	0	0	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	0.02	0.06	0.11	0.16	0.18	0.17	0.12	0.07	0.04	0.02	0.01	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	0	0.01	0.02	0.06	0.11	0.16	0.18	0.16	0.12	0.07	0.04	0.01	0	0	0	0	0	0
	9	0	0	0	0	0.01	0.03	0.07	0.12	0.16	0.18	0.16	0.12	0.07	0.03	0.01	0	0	0	0	0
	10		0	0	0	0	0.01	0.03	0.07	0.12	0.16	0.18	0.16	0.12	0.07	0.03	0.01	0	0	0	0
	11		0	0	0	0	0	0.01	0.03	0.07	0.12	0.16	0.18	0.16	0.12	0.07	0.03	0.01	0	0	0
	12		0	0	0	0	0	0	0.01	0.04	0.07	0.12	0.16	0.18	0.16	0.11	0.06	0.02	0.01	0	0
	13		0	0	0	0	0	0	0.01	0.02	0.04	0.07	0.12	0.17	0.18	0.16	0.11	0.06	0.02	0	0
	14		0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.02	0.04	0.08	0.12	0.17	0.19	0.17	0.11	0.05	0.01	0
	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.02	0.04	0.08	0.13	0.18	0.2	0.18	0.1	0.03	0
	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.04	0.07	0.13	0.19	0.22	0.18	0.09	0.01
	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.03	0.07	0.13	0.21	0.24	0.19	0.06
	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.03	0.07	0.14	0.23	0.29	0.19
	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.02	0.06	0.14	0.27	0.38
	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.04	0.12	0.36

<https://www.sjsu.edu/people/saul.cohn/courses/stats/s0/BinomialProbabTable.pdf>

Table B: The Poisson Cumulative Distribution

		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.4	1.6	1.8
x=	0	0.9048	0.8187	0.7408	0.6703	0.6065	0.5488	0.4966	0.4493	0.4066	0.3679	0.3012	0.2466	0.2019	0.1653
	1	0.9953	0.9825	0.9631	0.9384	0.9098	0.8781	0.8442	0.8088	0.7725	0.7358	0.6626	0.5918	0.5249	0.4628
	2	0.9998	0.9989	0.9964	0.9921	0.9856	0.9769	0.9659	0.9526	0.9371	0.9197	0.8795	0.8335	0.7834	0.7306
	3	1	0.9999	0.9997	0.9992	0.9982	0.9966	0.9942	0.9909	0.9865	0.981	0.9662	0.9463	0.9212	0.8913
	4	1	1	1	0.9999	0.9998	0.9996	0.9992	0.9986	0.9977	0.9963	0.9923	0.9857	0.9763	0.9636
	5	1	1	1	1	1	1	0.9999	0.9998	0.9997	0.9994	0.9985	0.9968	0.994	0.9896
		2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.5	5	5.5
x=	0	0.1353	0.1108	0.0907	0.0743	0.0608	0.0498	0.0408	0.0334	0.0273	0.0224	0.0183	0.0111	0.0067	0.0041
	1	0.406	0.3546	0.3084	0.2674	0.2311	0.1991	0.1712	0.1468	0.1257	0.1074	0.0916	0.0611	0.0404	0.0266
	2	0.6767	0.6227	0.5697	0.5184	0.4695	0.4232	0.3799	0.3397	0.3027	0.2689	0.2381	0.1736	0.1247	0.0884
	3	0.8571	0.8194	0.7787	0.736	0.6919	0.6472	0.6025	0.5584	0.5152	0.4735	0.4335	0.3423	0.265	0.2017
	4	0.9473	0.9275	0.9041	0.8774	0.8477	0.8153	0.7806	0.7442	0.7064	0.6678	0.6288	0.5321	0.4405	0.3575
	5	0.9834	0.9751	0.9643	0.951	0.9349	0.9161	0.8946	0.8705	0.8441	0.8156	0.7851	0.7029	0.616	0.5289
		6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	11	10	12	14	15
x=	0	0.0025	0.0015	0.0009	0.0006	0.0003	0.0002	0.0001	0.0001	0	0	0	0	0	0
	1	0.0174	0.0113	0.0073	0.0047	0.003	0.0019	0.0012	0.0008	0.0005	0.0002	0.0005	0.0001	0	0
	2	0.062	0.043	0.0296	0.0203	0.0138	0.0093	0.0062	0.0042	0.0028	0.0012	0.0028	0.0005	0.0001	0
	3	0.1512	0.1118	0.0818	0.0591	0.0424	0.0301	0.0212	0.0149	0.0103	0.0049	0.0103	0.0023	0.0005	0.0002
	4	0.2851	0.2237	0.173	0.1321	0.0996	0.0744	0.055	0.0403	0.0293	0.0151	0.0293	0.0076	0.0018	0.0009
	5	0.4457	0.369	0.3007	0.2414	0.1912	0.1496	0.1157	0.0885	0.0671	0.0375	0.0671	0.0203	0.0055	0.0028

https://www.math.uh.edu/~dlabate/poisson_cdf.pdf




Table C: The Normal Distribution

0.25	0.0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
3.6	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.8	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



$P(Z > 1.25)$


Table C: The Normal Distribution

z	0.0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
3.6	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.8	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Table B: The Poisson Cumulative Distribution

		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.4	1.6	1.8
$x=$	0	0.9048	0.8187	0.7408	0.6703	0.6065	0.5488	0.4966	0.4493	0.4066	0.3679	0.3012	0.2466	0.2019	0.1653
	1	0.9953	0.9825	0.9631	0.9384	0.9098	0.8781	0.8442	0.8088	0.7725	0.7358	0.6626	0.5918	0.5249	0.4628
	2	0.9998	0.9989	0.9964	0.9921	0.9856	0.9769	0.9659	0.9526	0.9371	0.9197	0.8795	0.8335	0.7834	0.7306
	3	1	0.9999	0.9997	0.9992	0.9982	0.9966	0.9942	0.9909	0.9865	0.981	0.9662	0.9463	0.9212	0.8913
	4	1	1	1	0.9999	0.9998	0.9996	0.9992	0.9986	0.9977	0.9963	0.9923	0.9857	0.9763	0.9636
	5	1	1	1	1	1	1	0.9999	0.9998	0.9997	0.9994	0.9985	0.9968	0.994	0.9896
		2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.5	5	5.5
$x=$	0	0.1353	0.1108	0.0907	0.0743	0.0608	0.0498	0.0408	0.0334	0.0273	0.0224	0.0183	0.0111	0.0067	0.0041
	1	0.406	0.3546	0.3084	0.2674	0.2311	0.1991	0.1712	0.1468	0.1257	0.1074	0.0916	0.0611	0.0404	0.0266
	2	0.6767	0.6227	0.5697	0.5184	0.4695	0.4232	0.3799	0.3397	0.3027	0.2689	0.2381	0.1736	0.1247	0.0884
	3	0.8571	0.8194	0.7787	0.736	0.6919	0.6472	0.6025	0.5584	0.5152	0.4735	0.4335	0.3423	0.265	0.2017
	4	0.9473	0.9275	0.9041	0.8774	0.8477	0.8153	0.7806	0.7442	0.7064	0.6678	0.6288	0.5321	0.4405	0.3575
	5	0.9834	0.9751	0.9643	0.951	0.9349	0.9161	0.8946	0.8705	0.8441	0.8156	0.7851	0.7029	0.616	0.5289
		6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	11	10	12	14	15
$x=$	0	0.0025	0.0015	0.0009	0.0006	0.0003	0.0002	0.0001	0.0001	0	0	0	0	0	0
	1	0.0174	0.0113	0.0073	0.0047	0.003	0.0019	0.0012	0.0008	0.0005	0.0002	0.0005	0.0001	0	0
	2	0.062	0.043	0.0296	0.0203	0.0138	0.0093	0.0062	0.0042	0.0028	0.0012	0.0028	0.0005	0.0001	0
	3	0.1512	0.1118	0.0818	0.0591	0.0424	0.0301	0.0212	0.0149	0.0103	0.0049	0.0103	0.0023	0.0005	0.0002
	4	0.2851	0.2237	0.173	0.1321	0.0996	0.0744	0.055	0.0403	0.0293	0.0151	0.0293	0.0076	0.0018	0.0009
	5	0.4457	0.369	0.3007	0.2414	0.1912	0.1496	0.1157	0.0885	0.0671	0.0375	0.0671	0.0203	0.0055	0.0028

https://www.math.uh.edu/~dlaibate/poisson_cdf.pdf



$P(Z > 1.25)$

Table C: The Normal Distribution

0.25	0.0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
3.6	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.8	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Table D: The t-Distribution



t df	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	Two tails test
	0.005	0.01	0.025	0.05	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	One tail test
1	63.657	31.821	12.706	6.314	3.078	1.963	1.000	0.510	0.158	
2	9.925	6.965	4.303	2.920	1.886	1.386	0.816	0.445	0.142	
3	5.841	4.541	3.182	2.353	1.638	1.250	0.765	0.424	0.137	
4	4.604	3.747	2.776	2.132	1.533	1.190	0.741	0.414	0.134	
5	4.032	3.365	2.571	2.015	1.476	1.156	0.727	0.408	0.132	
6	3.707	3.143	2.447	1.943	1.440	1.134	0.718	0.404	0.131	
7	3.499	2.998	2.365	1.895	1.415	1.119	0.711	0.402	0.130	
8	3.355	2.896	2.306	1.860	1.397	1.108	0.706	0.399	0.130	
9	3.250	2.821	2.262	1.833	1.383	1.100	0.703	0.398	0.129	
10	3.169	2.764	2.228	1.812	1.372	1.093	0.700	0.397	0.129	
11	3.106	2.718	2.201	1.796	1.363	1.088	0.697	0.396	0.129	
12	3.055	2.681	2.179	1.782	1.356	1.083	0.695	0.395	0.128	
13	3.012	2.650	2.160	1.771	1.350	1.079	0.694	0.394	0.128	
14	2.977	2.624	2.145	1.761	1.345	1.076	0.692	0.393	0.128	
15	2.947	2.602	2.131	1.753	1.341	1.074	0.691	0.393	0.128	
16	2.921	2.583	2.120	1.746	1.337	1.071	0.690	0.392	0.128	
17	2.898	2.567	2.110	1.740	1.333	1.069	0.689	0.392	0.128	
18	2.878	2.552	2.101	1.734	1.330	1.067	0.688	0.392	0.127	
19	2.861	2.539	2.093	1.729	1.328	1.066	0.688	0.391	0.127	
20	2.845	2.528	2.086	1.725	1.325	1.064	0.687	0.391	0.127	
21	2.831	2.518	2.080	1.721	1.323	1.063	0.686	0.391	0.127	
22	2.819	2.508	2.074	1.717	1.321	1.061	0.686	0.390	0.127	
23	2.807	2.500	2.069	1.714	1.319	1.060	0.685	0.390	0.127	
24	2.797	2.492	2.064	1.711	1.318	1.059	0.685	0.390	0.127	
25	2.787	2.485	2.060	1.708	1.316	1.058	0.684	0.390	0.127	
26	2.779	2.479	2.056	1.706	1.315	1.058	0.684	0.390	0.127	
27	2.771	2.473	2.052	1.703	1.314	1.057	0.684	0.389	0.127	
28	2.763	2.467	2.048	1.701	1.313	1.056	0.683	0.389	0.127	
29	2.756	2.462	2.045	1.699	1.311	1.055	0.683	0.389	0.127	
30	2.750	2.457	2.042	1.697	1.310	1.055	0.683	0.389	0.127	
40	2.704	2.423	2.021	1.684	1.303	1.050	0.681	0.388	0.126	
60	2.660	2.390	2.000	1.671	1.296	1.045	0.679	0.387	0.126	
120	2.617	2.358	1.980	1.658	1.289	1.041	0.677	0.386	0.126	
∞	2.577	2.327	1.960	1.645	1.282	1.037	0.675	0.385	0.126	




Table E: The Chi-Square Distribution

α	0.001	0.005	0.01	0.02	0.025	0.05	0.1	0.2	0.3	0.7	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999
1	10.828	7.879	6.635	5.412	5.024	3.841	2.706	1.642	1.074	0.148	0.016	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000
2	13.816	10.597	9.210	7.824	7.378	5.991	4.605	3.219	2.408	0.713	0.211	0.103	0.051	0.020	0.010	0.002
3	16.266	12.838	11.345	9.837	9.348	7.815	6.251	4.642	3.665	1.424	0.584	0.352	0.216	0.115	0.072	0.024
4	18.467	14.860	13.277	11.668	11.143	9.488	7.779	5.989	4.878	2.195	1.064	0.711	0.484	0.297	0.207	0.091
5	20.515	16.750	15.086	13.388	12.833	11.070	9.236	7.289	6.064	3.000	1.610	1.145	0.831	0.554	0.412	0.210
6	22.458	18.548	16.812	15.033	14.449	12.592	10.645	8.558	7.231	3.828	2.204	1.635	1.237	0.872	0.678	0.381
7	24.322	20.278	18.475	16.622	16.013	14.067	12.017	9.803	8.383	4.671	2.833	2.167	1.690	1.239	0.989	0.598
8	26.124	21.955	20.090	18.168	17.535	15.507	13.362	11.030	9.524	5.527	3.490	2.733	2.180	1.646	1.344	0.857
9	27.877	23.589	21.696	19.679	19.023	16.919	14.684	12.242	10.656	6.393	4.169	3.325	2.700	2.088	1.735	1.152
10	29.588	25.188	23.209	21.161	20.483	18.307	15.987	13.442	11.781	7.267	4.865	3.940	3.247	2.558	2.155	1.479
11	31.264	26.757	24.725	22.618	21.920	19.675	17.275	14.631	12.899	8.148	5.578	4.575	3.816	3.053	2.603	1.834
12	32.909	28.300	26.217	24.054	23.337	21.026	18.540	15.812	14.011	9.034	6.304	5.208	4.404	3.571	3.074	2.214
13	34.528	29.819	27.688	25.472	24.736	22.362	19.812	16.985	15.119	9.926	7.042	5.892	5.009	4.107	3.565	2.617
14	36.123	31.319	29.141	26.873	26.119	23.685	21.064	18.151	16.222	10.821	7.790	6.571	5.629	4.680	4.075	3.041
15	37.697	32.801	30.578	28.259	27.488	24.996	22.307	19.311	17.322	11.721	8.547	7.281	6.282	5.229	4.601	3.483
16	39.252	34.267	32.000	29.633	28.845	26.296	23.542	20.465	18.418	12.624	9.312	7.962	6.908	5.812	5.142	3.942
17	40.790	35.718	33.409	30.995	30.191	27.587	24.769	21.615	19.511	13.531	10.085	8.672	7.564	6.408	5.697	4.416
18	42.312	37.156	34.805	32.346	31.526	28.869	25.989	22.760	20.601	14.440	10.865	9.390	8.231	7.015	6.265	4.905
19	43.820	38.582	36.191	33.687	32.852	30.144	27.204	23.900	21.689	15.352	11.651	10.117	8.907	7.633	6.844	5.407
20	45.315	39.997	37.566	35.020	34.170	31.410	28.412	25.038	22.775	16.266	12.443	10.851	9.591	8.260	7.434	5.921
21	46.797	41.401	38.932	36.343	35.479	32.671	29.615	26.171	23.859	17.182	13.240	11.591	10.283	8.897	8.034	6.447
22	48.268	42.798	40.289	37.659	36.781	33.924	30.813	27.301	24.939	18.101	14.041	12.338	10.982	9.542	8.643	6.983
23	49.728	44.181	41.638	38.968	38.076	35.172	32.007	28.429	26.018	19.021	14.848	13.091	11.689	10.196	9.260	7.529
24	51.179	45.550	42.980	40.270	39.364	36.415	33.196	29.553	27.098	19.943	15.659	13.848	12.401	10.855	9.885	8.085
25	52.620	46.928	44.314	41.566	40.646	37.652	34.382	30.675	28.172	20.867	16.473	14.611	13.120	11.524	10.520	8.649
26	54.052	48.290	45.642	42.856	41.923	38.885	35.563	31.795	29.245	21.792	17.292	15.379	13.844	12.198	11.190	9.222
27	55.476	49.645	46.963	44.140	43.195	40.113	36.741	32.912	30.319	22.719	18.114	16.151	14.573	12.879	11.808	9.803
28	56.892	50.993	48.278	45.419	44.461	41.337	37.916	34.027	31.391	23.647	18.939	16.928	15.308	13.565	12.481	10.391
29	58.301	52.336	49.588	46.693	45.722	42.557	39.087	35.139	32.461	24.577	19.768	17.708	16.047	14.256	13.121	10.986
30	59.703	53.672	50.892	47.962	46.979	43.773	40.256	36.260	33.530	25.508	20.599	18.493	16.791	14.953	13.787	11.588
40	73.402	66.766	63.691	60.438	59.342	55.758	51.805	47.259	44.165	34.872	29.051	26.509	24.433	22.164	20.707	17.916
50	86.561	79.490	76.154	72.813	71.420	67.505	63.167	58.164	54.723	44.313	37.689	34.764	32.357	29.707	27.991	24.674
60	99.507	91.952	88.379	84.580	83.298	79.082	74.397	68.972	65.227	53.809	46.459	43.188	40.482	37.485	35.534	31.738
70	112.317	104.215	100.425	96.388	95.023	90.531	85.527	79.715	75.889	63.346	55.329	51.739	48.758	45.442	43.275	39.036
80	124.839	116.321	112.329	108.069	106.629	101.879	96.578	90.405	86.120	72.915	64.278	60.391	57.153	53.540	51.172	46.520
90	137.208	128.299	124.116	119.648	118.136	113.145	107.565	101.054	96.524	82.511	73.291	69.126	65.647	61.754	59.196	54.155
100	149.440	140.169	135.807	131.142	129.561	124.342	118.498	111.967	106.906	92.129	82.358	77.929	74.222	70.065	67.328	61.918




Table F: The F-Distribution

	$\alpha=0.05$									
Denominator	The numerator Degrees of Freedom									
df	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	241.98	243.91	245.95	248.01	249.05	250.10	251.14	252.20	253.25	254.29
2	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.48	19.47	19.49	19.49	19.50
3	9.79	9.74	9.70	9.66	9.64	9.62	9.59	9.57	9.55	9.53
4	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.37
6	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.41
12	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.66
29	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.28
5000	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.40	1.32	1.22	1.05





Table F: The F-Distribution

$\alpha=0.025$										
Denominator	The numerator Degrees of Freedom									
df	1	2	3	4	5	6	7	8	9	∞
1	647.79	799.50	984.16	999.59	921.65	937.11	949.22	958.66	963.29	1
2	39.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	2
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.98	14.73	14.62	14.54	14.47	3
4	12.22	10.85	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	4
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.69	5
6	8.91	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	6
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	7
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	8
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	9
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	10
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	11
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	12
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	13
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	14
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	15
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	16
17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.99	17
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	18
19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.89	19
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	20
21	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	21
22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	22
23	5.75	4.35	3.75	3.41	3.19	3.02	2.90	2.81	2.73	23
24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	24
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	25
26	5.66	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.65	26
27	5.63	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	27
28	5.61	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	28
29	5.59	4.20	3.61	3.27	3.04	2.88	2.76	2.67	2.59	29
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	30
40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	40
60	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	60
120	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	120
5000	5.03	3.69	3.12	2.79	2.57	2.41	2.29	2.19	2.12	5000

Table F: The F-Distribution



$\alpha=0.01$									
Denominator	The numerator Degrees of Freedom								
df	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4052.18	4999.50	5403.35	5624.58	5763.65	5858.99	5929.36	5981.07	6022.47
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35
4	21.20	18.00	16.69	15.99	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91
9	10.58	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35
23	7.89	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56
5000	6.64	4.61	3.79	3.32	3.02	2.81	2.64	2.51	2.41

Table G: Critical Values for the Wilcoxon Signed-Rank Test

n	Two-Tailed Test		One-Tailed Test	
	$\alpha = .05$	$\alpha = .01$	$\alpha = .05$	$\alpha = .01$
5	--	--	0	--
6	0	--	2	--
7	2	--	3	0
8	3	0	5	1
9	5	1	8	3
10	8	3	10	5
11	10	5	13	7
12	13	7	17	9
13	17	9	21	12
14	21	12	25	15
15	25	15	30	19
16	29	19	35	23
17	34	23	41	27
18	40	27	47	32
19	46	32	53	37
20	52	37	60	43
21	58	42	67	49
22	65	48	75	55
23	73	54	83	62
24	81	61	91	69
25	89	68	100	76
26	98	75	110	84
27	107	83	119	92
28	116	91	130	101
29	126	100	140	110
30	137	109	151	120

http://users.stat.ufl.edu/~winner/tables/wilcox_signrank.pdf

គាំទ្រលើថវិការៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អដោយ
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា



មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍

