





គីមីសរីរាង្គទំនើប ភាគ២



រៀបរៀងដោយ
ស៊ុន វិចិត្រ
២០២២



គីមីសរីរាង្គទំនើប ភាគ២



រៀបរៀងដោយ
ស៊ិន វិចិត្រ
២០២២

សាកលវិទ្យាល័យស៊ីមន៍ប្រាក់
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ
ដេប៉ាតឺម៉ង់គីមី

គណៈកម្មការនីតិវិធី

លោក ស៊ាន វិចិត្រ

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ

លោក ជ័យ ថាវី

លោក ជួន ណែន

មុព្វកថា

ដំណើរអភិវឌ្ឍន៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ ជាមេរៀនដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយដែលចាប់បួសគល់ចេញពីការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ការបញ្ចប់សង្គ្រាម ការផ្សះផ្សារជាតិ ការកសាងមូលដ្ឋានវិស័យនៃសន្តិភាពនិងស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្រោយពេលដែលសន្តិភាពត្រូវបានកើតឡើងដោយបរិបូណ៌នៅឆ្នាំ១៩៩៨ កម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គឺប្រមាណ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀត អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពីប្រមាណ៥៣% នៅឆ្នាំ២០០៤ មកនៅទាបជាង១០% នៅឆ្នាំ២០១៩។ ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជាតិជាសកម្មភាពដែលបន្តទៅមុខជាប់ជានិច្ច ហើយគោលនយោបាយថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈអន្តរវិស័យគ្របដណ្តប់ ក៏កំពុងលេចរូបរាងឡើង ដើម្បីតម្រង់ទិសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងឈានឡើងជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០។ ការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនៃនិម្មុបនកម្មពិភពលោកនិងតំបន់ រួមទាំងទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងបន្តពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅរកការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ឱ្យស្របទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំម៉ូដែលធុរកិច្ចថ្មីៗ។ ដើម្បីចាប់យកកាលានុវត្តភាពពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងផុសផុលឡើង ប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្សីដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មី នវានុវត្តន៍ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវតែមានការកែលម្អ។

បណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងនាំមុខក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ដោយ មានភាគហ៊ុនប្រមាណ៤៤% នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក។ ប្រទេសចិនកំពុងបន្តកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅ វិញ ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង និងអាហ្វ្រិក កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការវិនិយោគនេះ ហើយជាលទ្ធផល ប្រទេសទាំងនោះក៏ពុំមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែរ។ ទុនវិនិយោគសរុបលើការស្រាវ ជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិក មានប្រមាណ៥%នៃការវិនិយោគ ទាំងមូលរបស់ពិភពលោក ក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំង២នេះមានប្រជាជនប្រមាណ២០%នៃប្រជាជន ពិភពលោក។ ប្រទេសចំនួន៦ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ឥណ្ឌា និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលស្មើនឹងប្រមាណ ៧០%នៃទុនវិនិយោគសរុបរបស់ពិភពលោក។

តើចំណេះដឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីទាំងនេះកើតឡើងពីអ្វី? ហើយកើតឡើងដោយរបៀបណា? ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែកសាងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទទួល និងប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើពុទ្ធិ ហើយដែលប្រការនេះចាំបាច់តម្រូវឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា ត្រូវក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋឌីជីថល ពលរដ្ឋសកល និងពលរដ្ឋដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធដើម្បីទទួលបានមនុស្សធម៌ និងរួមចំណែកក្នុង កំណើន។ ធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់តាំងពីឆ្នាំ២០០២នូវបម្លាស់ប្តូរនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចពី សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម និងធនធានអតិកម្ម (Labour and Resource Based Economy) ទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិ (Knowledge Based-Economy) ដែលក្នុងន័យនេះ ពុទ្ធិគឺជាកន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅលើគន្លងដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល សង្គមកម្ពុជាត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ជ្រើសរើស បន្សុំ បង្កើតមុខរបរ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិ ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃកំណើន និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅ។ សមត្ថភាពទាំងនេះ អាចកើតឡើងនៅពេល ពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការស្រាវជ្រាវ ការបណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិត និងការ ស្វែងរកនវានុវត្តន៍។

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ គឺជាការត្រួសត្រាយមាត់សម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ និងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពរស់រវើក។ តាមរយៈមូលដ្ឋានអប់រំ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិនឹងប្រមូលផ្តុំ បង្កើត និងចែករំលែក ទៅកាន់សមាជិកក្នុងសង្គមនូវសម្បទាអប់រំ ពិសេសគឺពុទ្ធិសម្បទា ក្នុងបុព្វហេតុនៃ មនុស្សជាតិនិងឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេស។ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ គឺពុំគ្រាន់តែជាសង្គមដែលសម្បូរ ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ តែជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបរិវត្តកម្មព័ត៌មានទៅជា មូលធនប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព។ ការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់នៃបច្ចេកវិទ្យានិងតំណភ្ជាប់ បានពង្រីកព្រំដែននៃការចូលទៅ កាន់ និងការទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ហើយដែលក្នុងន័យនេះ ការអប់រំនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខនិងមានការ ផ្លាស់ប្តូរ។ សង្គមមួយដែលមានអំណាន និងរបាប់ជាបុរេលក្ខខណ្ឌនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាពលរដ្ឋ ពេល នោះបំណិននៃអំណាន និពន្ធ និងការគណនាលេខនព្វន្ត គឺជាចលករនៃការរៀនរបស់សិស្ស។ ធាតុដ៏ចម្បង មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការកសាងសង្គមដែលប្រកបដោយ ពុទ្ធិគឺសៀវភៅសិក្សា ហើយការរៀបរៀង និពន្ធ និង កែលម្អសៀវភៅសិក្សាជាប្រចាំគឺជានវានុវត្តន៍នៃវិស័យអប់រំដែលនាំទៅរកការសិក្សាពេញមួយជីវិត ការអភិវឌ្ឍ សម្បទាអប់រំ និងការចែករំលែកចំណេះដឹង។ មូលដ្ឋានអប់រំ ជាពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវមានតួនាទី ដែលប្រកបដោយការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការខាងលើនេះ។ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំត្រូវ បន្តសិក្សាជាប់ជានិច្ច តាមរយៈការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ហើយដែលសៀវភៅសិក្សាទាំង នេះនឹងក្លាយជា ស្ថាននៃទំនាក់ទំនងរវាងនវានុវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា និងការរៀននិងបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

សង្គមដែលប្រកបពុទ្ធិក៏ជាសង្គមដែលបណ្តុះឱ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធទន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិ ដែរ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃបែបផែននេះរួមមាន Silicon Valley នៃសហរដ្ឋអាមេរិក សួនឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រអាកាសយានយន្តនិងយានយន្តនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ តំបន់ជីវបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌា តំបន់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងសារគមនាគមន៍ ឌីជីថលនៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក៏ដូចជាសួនឧស្សាហកម្មថាមពល និងឥន្ធនគីមីសាស្ត្រនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ហើយក៏នៅ មានទីក្រុងនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃទីក្រុងទាំងនេះគឺការប្រើប្រាស់ និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍដែលជុំវិញ និងតម្រង់ទិសដោយចំណេះ ដឹង ហើយដែលចំណេះដឹងទាំងនោះកើតចេញ ជាដំបូងពីការវិនិយោគទៅលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃជំនាញជាន់

ខ្ពស់ ការប្រកួតប្រជែងដោយគុណាធិបតេយ្យ និង ជាពិសេសគឺការបណ្តុះវប្បធម៌អំណាននិងនិពន្ធសៀវភៅ។ ល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែកពុទ្ធិ និងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងមានសន្ទុះលឿនជាងអ្វីដែលសិស្ស និងនិស្សិតអាចទទួលបានពីគ្រូនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលធ្វើឱ្យគោលដៅនៃការអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានការប្រឈមខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយឆ្នាំ មានសៀវភៅជាង២,២លានចំណងជើង ត្រូវបានសរសេរនិងបោះពុម្ព ដែលក្នុងនោះប្រទេសចិនមាន៤៤០ពាន់ ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមាន ៣០៥ពាន់ និងប្រទេសរុស្ស៊ីមាន ១២០ពាន់ចំណងជើង។

ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ មធ្យោបាយសម្រាប់អំណានក៏មានច្រើនជម្រើសសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជន រួមមានការអានសៀវភៅ ការអានលើឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិក ការអានដោយប្រើទូរសព្ទវីដេអូ និងការអានលើកុំព្យូទ័រ ដែលសុទ្ធសឹងជាមធ្យោបាយសំខាន់ៗដែលនាំអ្នកអានទាំងឡាយឱ្យសម្រេចគោលបំណងអានរបស់ខ្លួន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អំណានដោយប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ចំណាយពេលតិច ងាយស្រួលអាន និងជួយដល់បរិស្ថានមួយកម្រិតទៀត។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់អំណានកំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអំណានទាំងនេះ។ បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសជឿនលឿន ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណា អំណានតាមរយៈសៀវភៅនៅតែមានសន្ទុះដដែល។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បច្ចេកវិទ្យាអានបែបទំនើបតាមរយៈឧបករណ៍ទំនើប អាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃធនធានអប់រំឌីជីថល និងមាតិកាឌីជីថលគ្រប់គ្រាន់ដែលបានផលិតនិងបង្ហាញចែកចាយសម្រាប់អំណាន។

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងបរិការណ៍នៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជំរុញឱ្យមានបរិក្ខណៈឌីជីថលនៅក្នុងអេកូស៊ីស្តែមនៃការអប់រំ ជាពិសេស ការអប់រំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការអប់រំពីចម្ងាយដើម្បីលើកកម្ពស់អំណានតាមរយៈការផលិតមាតិកាឌីជីថល ដែលមានភាពសម្បូរបែប ការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកតំណភ្ជាប់និងវេទិកាឌីជីថល ការពង្រីកវិសាលភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផលិតធនធានអប់រំឌីជីថល គួបផ្សំជាមួយការចែកសន្លឹកកិច្ចការឱ្យសិស្សយកទៅរៀននៅផ្ទះ និងការចុះទៅជួបជាមួយសិស្សជាបណ្តុំនៅតាមសហគមន៍។ ក្នុងន័យលើកកម្ពស់អំណាន និងភាពសម្បូរបែបនៃធនធានសៀវភៅសិក្សា ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពសក្តិសិទ្ធិ និងផ្តល់ឱកាសអំណានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជនក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាលើកទឹកចិត្តនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

១. សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំ សូមបន្តនិងបង្កើនការបោះពុម្ពស្នាដៃបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យធនធានសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប ជាពិសេសធនធានអំណានជាខេមរភាសា
២. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សូមផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចចូលរួមអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមគ្រប់លទ្ធភាពជាមួយធនធានអំណាន ជាពិសេសការរៀបចំឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់សហសិក្សា និងអំណានក្នុងបណ្ណាល័យ

៣. សាស្ត្រាចារ្យតាមមុខវិជ្ជា និងអ្នកស្រាវជ្រាវតាមជំនាញឬវិស័យ ត្រូវរៀបចំដំណើរការរៀន បង្រៀន និងស្រាវជ្រាវដែលមានដាក់បញ្ចូលកិច្ចការស្វ័យសិក្សា សហសិក្សា ឬការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យ ដែលតម្រូវឱ្យនិស្សិត ត្រូវអាននិងស្រាវជ្រាវជាមួយធនធានអំណាន
៤. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតបណ្ណាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាឯកសារ ឬមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឌីជីថល ជាដើម ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ ថ្នាក់និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សា អាចទទួលបាន និងស្វែងរកប្រភពសម្រាប់អំណាន កាន់តែ សម្បូរបែប និងមានភាពបត់បែន ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអ្នកអាន
៥. និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សា ត្រូវខិតខំនិងចំណាយពេលអាន និងចាត់ទុកវប្បធម៌ និងអកប្បកិរិយា អំណានជាផ្នែកមួយ នៃពេលវេលានិងភាពស៊ីវិល័យនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
៦. បងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលជាមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល សូមជួយជំរុញនិងបង្កលក្ខណៈ កាន់តែ ច្រើនថែមទៀត ជាពិសេស ការលែងកំណាយនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ការទិញសម្ភារៈសិក្សា សៀវភៅអាន និងឧបករណ៍សម្រាប់អំណានដល់កូនៗ ដែលចាត់ទុកជាការវិនិយោគ មួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់ បង្កើនចំណេះដឹង និងអនាគតរបស់ពួកគេ។

ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលហៅកាត់ថា “មូលនិធិ ស.គ.ន” និងហៅជា ភាសាអង់គ្លេសថា The Research Creativity and Innovation Fund ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា “RCI Fund”។ គោលដៅចម្បងនៃមូលនិធិនេះ គឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិត ច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្តន៍ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅ នឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលកាប្រនីយកម្ម។ មូលនិធិ ស.គ.ន បានសម្រេចកំណត់ប្រធានបទជាអាទិភាព សម្រាប់គាំទ្រដោយមូលនិធិចំនួន៣ រួមាន ឌីជីថលនីយកម្មសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ (Digitalization for IR.4.0) ការស្រាវជ្រាវអនុវត្តលើវិស័យកសិកម្ម (Applied Agricultural Research) និងការស្រាវជ្រាវ គរុកោសល្យសតវត្សទី២១ (21st Century Pedagogy Research)។

ដោយមានការធ្វើអាទិភាពរូបនីយកម្មទៅលើទិសដៅនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការរៀបរៀង **និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សា (Text book)** ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ គោលបំណង នៃការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា គឺដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់ គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូនដល់និស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និង ត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ លើសពីនេះទៀតការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅ សិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា មានគោលដៅដូចខាងក្រោម ៖

- ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិតនៅកម្រិត ឧត្តមសិក្សា

- លើកកម្ពស់ទំនើបការបន្ថែម និងឧត្តមានុវត្តន៍នៃការរៀននិងបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវនៅលើមុខវិជ្ជា កម្មវិធីសិក្សា ឬមុខជំនាញជាក់លាក់
- បង្កើនភាពស៊ីជម្រៅក្នុងការកសាងវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវ
- រួមចំណែកដល់ការកសាងភាពជាសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងវប្បធម៌នៃការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបោះជំហានប្រកបដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំ រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សាដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រឹងសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូននិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងជាធនធានសិក្សាដែលជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការគាំទ្រដល់ការបង្រៀន និងរៀន ហើយត្រូវមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ និងតម្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាគោលការណ៍ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ ត្រូវមានសៀវភៅសិក្សាដែលប្រើជាគោលសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ។ ចំនួនសៀវភៅសិក្សាដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សារបស់និស្សិត ត្រូវមានយ៉ាងតិចមួយចំណងជើងក្នុងមួយមុខវិជ្ជា ហើយត្រូវតម្កល់យ៉ាងតិច២ច្បាប់ នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ឬអាចរកបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតជូនដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនដែលបានស្នើសុំថវិកាមូលនិធិរួច សូមចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនចំណងជើងសៀវភៅ។ ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនដែលពុំទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំ សូមចូលរួម ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់តម្រូវការដ៏ទទួច និងថ្លៃថ្លារនៃនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

សេចក្តីបញ្ជាក់

របស់មូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍

សៀវភៅសិក្សានេះជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំអនុវត្តបរិកាមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងគម្រោងរៀបរៀង និង កែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សានេះត្រូវបានរៀបរៀង និង កែលម្អដោយមានការធានាអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ ផ្ទាល់ និងបានឆ្លងកាត់ត្រួតពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងវាយតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សាអប់រំ ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ឬ ក្រុមប្រឹក្សាដែលមានតម្លៃស្មើនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងតាមរយៈកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើង និងដែលបាន តម្កល់ទុកនៅមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។ រាល់ខ្លឹមសារ ការបកស្រាយ និងរូបភាពគឺ ជាជំហរនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ ហើយ ពុំឆ្លុះបញ្ចាំង ឬជាតំណាងដល់មូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃ ប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឡើយ។

អារម្ភកថា

សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិតនិងនវានុវត្តន៍ សម្រាប់ទុកជាសៀវភៅសិក្សាគោលដើម្បីបម្រើឲ្យការរៀននិងបង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីសរីរាង្គក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់គីមីនៃ មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

សៀវភៅ គីមីសរីរាង្គទំនើប ភាគ២ ជាភាសាជាតិនេះត្រូវបានបកប្រែ និងរៀបរៀងចងក្រងឡើងសម្រាប់បង្រៀន ដល់និស្សិតដែលសិក្សាមុខជំនាញគីមីសរីរាង្គ និងសម្រាប់និស្សិតដែលចង់ស្វែងយល់អំពីគីមីសរីរាង្គ។ សៀវភៅនេះ មានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់និស្សិតដែលទើបតែចាប់ផ្តើមសិក្សាមុខវិជ្ជាគីមីសរីរាង្គដំបូង ព្រោះជាការពិត អ្នកសិក្សា ដំបូងមិនទាន់យល់ពាក្យបច្ចេកទេសជាភាសាបរទេសឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចភាសាកំណើតទេ។ សៀវភៅនេះ បង្ហាញអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គីមីសរីរាង្គរួមមាន៖

- មេរៀនទី១១រៀបរាប់អំពី៖ ទម្រង់ លក្ខណៈនិងការហៅឈ្មោះអាល់កុល និងអេនែរស៊ីសំខាន់ៗ ម៉ូលេគុល សំខាន់ៗដែលមានបង្គុំនាទីទាំងនេះ ព្រមទាំងប្រតិកម្មភាពរបស់អាល់កុល អេនែរ និងក្រុមពិសេសនៃ អេនែរ ដែលគេហៅថាអេប៉ូកស៊ីត។
- មេរៀនទី១២រៀបរាប់អំពី៖ ទម្រង់ លក្ខណៈ និងប្រតិកម្មភាពរបស់សមាសធាតុកាបូនីល ការបម្លែងទៅ វិញទៅមកនៃក្រុមបង្គុំនាទីកាបូនីល និងអាល់កុលតាមប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម-អេដុកម្ម ព្រមទាំងការ កកើតសម្ព័ន្ធ C-Cថ្មីដោយប្រតិកម្មនៃក្រុមកាបូនីលជាមួយអេក្លីបសរីរាង្គលោហៈ។
- មេរៀនទី១៣រៀបរាប់អំពី៖ ប្រព័ន្ធគ្រាប់ និងផលរស្មីណាង់អាស្រ័យលើរ៉ាឌីកាល់សេរី កាចុង និងអាញុង រួមទាំងលក្ខណៈរូបរបស់ប្រព័ន្ធគ្រាប់ ជាពិសេសត្រូវបានសង្កេតដោយស្បៀងត្រួសពីUV-Vis និងការ បម្លែងពិសេស ហៅថាប្រតិកម្មDiels-Alder ដែលអាចផ្តុំម៉ូលេគុលគ្រាប់ ហៅថា1,3-ឌីអែនជាមួយនឹង ដៃគូជាក់លាក់ដើម្បីបង្កើតវ៉ែនមានមណ្ឌលគីរ៉ាល់រហូតដល់បួន។
- មេរៀនទី១៤រៀបរាប់អំពី៖ គោលការណ៍ទម្រង់ដែលធ្វើឱ្យមានការប្រើប្រាស់ពាក្យអារ៉ូម៉ាទិច និងដើម ហេតុដំបូងនៃការកំណត់ទម្រង់ត្រឹមត្រូវរបស់បង់សែន រួមទាំងច្បាប់មួយជួយយើងឱ្យប៉ាន់ស្មានពី ប្រភេទម៉ូលេគុលដែលមានលក្ខណៈពិសេសនៃភាពអារ៉ូម៉ាទិច និងក្រុមពិសេសនៃម៉ូលេគុលដែលមាន លក្ខណៈអារ៉ូម៉ាទិចដែរ។
- មេរៀនទី១៥រៀបរាប់៖ អំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រទូទៅដែលធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មជំនួសនៃបង់សែន របៀបដែលក្រុម ជួសលើវ៉ែនបង់សែនមួយអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រតិកម្មភាព និងលទ្ធភាពធ្វើប្រតិកម្មជំនួស ព្រមទាំង ប្រតិកម្មដែលអាចបម្លែងក្រុមជួសមួយទៅជាក្រុមបង្គុំនាទីថ្មីផងដែរ។
- មេរៀនទី១៦រៀបរាប់អំពី៖ ទម្រង់ លក្ខណៈ និងប្រតិកម្មភាពរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន រួមទាំងវិធី សាស្ត្រសំយោគពួកវាពីក្រុមបង្គុំនាទីផ្សេងទៀត និងក្រុមបង្គុំនាទីដែលអាចទទួលបានពីអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន។

- មេរៀនទី១៧រៀបរាប់អំពី៖ ទម្រង់ និងប្រតិកម្មភាពរបស់ស្រលាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីច ឧទាហរណ៍ជាច្រើនរបស់ប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូកីលអាស៊ីលដែលនាំឱ្យកើតផលិតផលខុសៗគ្នា និងវិធីសាស្ត្រទង្វើស្រលាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចពីក្រុមបង្គុំនាទីផ្សេងទៀត ដូចជានីទ្រីល។
- មេរៀនទី១៨រៀបរាប់អំពី៖ ប្រតិកម្មដែលបានមកពីភាពអាស៊ីតខ្សោយរបស់អាតូមអ៊ីដ្រូសែនលើអាតូមកាបូនជាប់នឹងក្រុមកាបូនីល ដំណើរការដែលអាចបង្កើតអែណូល និងអែណូឡាត បញ្ញត្តិនៃប្រភូតកម្មស៊ីនេទិច និងទែម៉ូឌីណាមិចដើម្បីបង្កើតអែណូឡាតខុសៗគ្នាពីសមាសធាតុដើមដូចគ្នា អាល់គីលកម្មអាល់ស៊ីលកម្ម និប្រតិកម្មបូកអេឡិចត្រូកីលផ្សេងទៀតលើអែណូល និង អែណូឡាត ព្រមទាំងប្រតិកម្មដូចគ្នាដោយប្រើស្រលាយអាស៊ីតរបស់អែណូល គឺអេណាមីន។
- មេរៀនទី១៩រៀបរាប់អំពី៖ ការសិក្សាបន្ថែមនៃអែណូឡាតជាមួយម៉ូលេគុលដែលមានកាបូនីលជាអេឡិចត្រូកីលក្នុងប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម និងប្រតិកម្មបូកឆ្លាស់ ប្រតិកម្មដែលប្រើបញ្ញត្តិទាំងនេះដែលអាចសំយោគវង់ផ្សេងៗ និងវគ្គពិសេសនៃប្រតិកម្មទាំងនេះទាក់ទងនឹងអាសូតដែលអាចបង្កើតអាមីនមានក្រុមកាបូនីល មួយ។
- មេរៀនទី២០រៀបរាប់អំពី៖ លក្ខណៈ ទម្រង់ និងការហៅឈ្មោះអាមីន លទ្ធភាពរបស់អាមីនក្នុងតួនាទីជាបាស អំបិល និងអែក់ទីប ការសំយោគ និងប្រតិកម្មភាពអាមីន។
- មេរៀនទី២១រៀបរាប់អំពី៖ ការសំយោគ និងលក្ខណៈរបស់ផេណូល ការសំយោគ និងលក្ខណៈរបស់អាវីលអាឡូសែន ការបម្លែងដោយប្រើបង្គុំនាទីរបស់ផេណូល និងអាវីលអាឡូសែនដូចជាប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំង Claisen និងប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូកីលអាវ៉ូម៉ាទិច។
- មេរៀនទី២២រៀបរាប់ខ្លីៗអំពី៖ ការបង្កើតសម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូនតាមប្រតិកម្មពិសេសៗជាច្រើនប្រតិកម្មផ្សេងៗទៀតរបស់សមាសធាតុសរីរាង្គលោហៈឆ្លង។

ទោះបីជាមានការខិតខំព្យាយាមយ៉ាងនេះក្តី សៀវភៅដំបូងនេះប្រាកដជាមានការខ្វះខាតខ្លះៗដែលមិនអាចជៀសផុត។ ដូចនេះ ខ្ញុំរង់ចាំទទួលការរិះគន់ដើម្បីកែលម្អសៀវភៅនេះគ្រប់ពេលវេលា។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ខ្ញុំបាទ ស៊ាន វិចិត្រ សាស្ត្រាចារ្យដេប៉ាតឺម៉ង់គីមីនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ និងជាអ្នករៀបរៀងសៀវភៅសិក្សាដែលមានចំណងជើងថា “គីមីសរីរាង្គទំនើប ភាគ២”។ ខ្ញុំបាទ សូមសម្តែងនូវការកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ និងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណ និងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ៖

- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានផ្តល់ថវិកាមកក្រសួងអប់រំ ដើម្បីបង្កើតជាមូលនិធិ សម្រាប់គាំទ្រដល់ការសរសេរសៀវភៅសិក្សាសម្រាប់កម្រិតឧត្តមសិក្សារបស់ខ្ញុំបាទនេះ។

- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលមាន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រី ហង់ជួន ណារ៉ុន ជាប្រមុខ ដែលលោកបានដឹកនាំបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតឆ្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ឡើង ដើម្បីគាំទ្រទាំង ស្រុងដល់ដំណើរការសរសេរសៀវភៅនេះ ដែលជាចំណែកមួយក្នុងបេសកកម្មកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំឧត្តម សិក្សារបស់លោក។

- ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សាន វឌ្ឍនា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលក្នុងនាមលោក ជាតំណាងមូលនិធិ លោកបានយកអស់កម្លាំងការចិត្ត ជួយចាត់ចែងនិងជ្រោមជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹង ព្រមទាំងផ្តល់ជាអនុសាសន៍និងដំណោះស្រាយនានា ដើម្បីជំនះនូវរាល់ឧបសគ្គដែលកើតមានក្នុងដំណើរការ សរសេរសៀវភៅនេះ។

- ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជេត ជាលី សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ដែលបានយកអស់ កម្លាំងកាយចិត្ត ព្រមទាំងពេលវេលាដ៏មមាញឹកនិងមានតម្លៃរបស់លោកក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្ត ជួយខ្លះខ្លែង ដោះស្រាយ និងផ្តល់អនុសាសន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាបង្គុលក្នុងការងាយស្រួលនានា ទាំងផ្នែករដ្ឋបាល និងទាំង ផ្នែកបច្ចេកទេស ដើម្បីឲ្យដំណើរការរៀបរៀងសៀវភៅនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនរហូតចប់ចុងចប់ដើម។

- លោក លួន ពេជ្របូរី និង អស់លោក-លោកស្រី ជាក្រុមការងារសម្របសម្រួលទាំងអស់របស់មូល និធិស្រាវជ្រាវ គំនិតឆ្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្ត ជួយឈឺឆ្កាលក្នុង ការដោះ ស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាទីបំផុត ដោយមិនគួញត្រូវ និងមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បី ឲ្យការសរសេរសៀវភៅនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន។

- ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស្រី ថារិទ្ធ អ្នកសម្របសម្រួលសាលាក្រោយឧត្តម និង លោកបណ្ឌិត សុខ សិរី អនុប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវ ដែលតែងជួយឈឺឆ្កាល ជួយសម្របសម្រួល និងផ្តល់សេវាសម្រាប់ ការប្រជុំ បច្ចេកទេសនានាតាមអនឡាញតាំងពីដើមរៀងមក។

- លោក ជ័យ ថារី ជាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់គីមី ដែលបានជួយត្រួតពិនិត្យរាល់កំហុសខុសឆ្គងលើអក្ខរាវិរុទ្ធ ក៏ដូចជាខ្លឹមសារបច្ចេកទេសទាំងឡាយ។

- អស់លោក-លោកស្រី ជាសមាជិក-សមាជិកាគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍសៀវភៅសិក្សា ក៏ដូចជាគណៈ កម្មការត្រួតពិនិត្យសៀវភៅសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ដែលបានជួយផ្តល់ធាតុចូលដល់ សៀវភៅនេះឲ្យកាន់តែមានគុណភាពប្រសើរថែមទៀត។

- ជាចុងក្រោយ និងជាពិសេស លោក ជូ វណ្ណ ប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវនៃ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ ដែលតែងជួយផ្តល់ធាតុចូលចំពោះរាល់ឯកសារការងារ ទាំងផ្នែករដ្ឋបាលនិងទាំងផ្នែក

បច្ចេកទេស លោកថែមទាំងជួយសម្រួលរាល់បញ្ហាប្រឈមនានាយ៉ាងដិតដល់បំផុត ដោយមិនប្រកាន់
ពេលវេលា និងដោយចិត្តជ្រះថ្លា រហូតការសរសេរសៀវភៅនេះទទួលបានជោគជ័យជាស្ថាពរ។

មាតិកា

បុព្វបទ.....	i
សេចក្តីបញ្ជាក់.....	vi
អារម្ភកថា	vii
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ	x
មេរៀនទី១១៖ អាល់កុល និងអេទែរ.....	១
១. ទម្រង់ និងការហៅឈ្មោះ.....	១
២. លក្ខណៈរូបនៃអាល់កុល និងអេទែរ	៣
៣. សារសំខាន់អាល់កុល និងអេទែរ	៥
៤. ការសំយោគអាល់កុលពីអាល់សែន	៨
៥. ប្រតិកម្មរបស់អាល់កុល.....	១០
៦. អាល់កុលជាអាស៊ីត	១១
៧. ការបង្កើនពីអាល់កុលទៅអាល់គីលអាឡុយសែន	១២
៨. អាល់គីលអាឡុយសែនពីប្រតិកម្មអាល់កុលជាមួយអ៊ីដ្រូសែនអាឡុយសែន	១៣
៩. អាល់គីលអាឡុយសែនពីប្រតិកម្មអាល់កុលជាមួយ PBr_3 ឬ $SOCl_2$	១៦
១០. តូស៊ីឡាត មេស៊ីឡាត និងទ្រីផ្លាត ៖ ស្រឡាយក្រុមចាកចេញរបស់អាល់កុល	១៨
១១. ការសំយោគអេទែរ	២០
១២. ប្រតិកម្មរបស់អេទែរ	២៦
១៣. អេប៉ូកស៊ីត	២៧
១៤. ប្រតិកម្មរបស់អេប៉ូកស៊ីត	២៩
១៥. ប្រតិកម្មអង់ទី 1,2-ឌីអ៊ីដ្រូកស៊ីលកម្មនៃអាល់សែនដោយអេប៉ូកស៊ីត	៣២
១៦. អេទែរមុជ	៣៣
១៧. សង្ខេបប្រតិកម្មអាល់សែន អាល់កុល និងអេទែរ	៣៤
លំហាត់មេរៀនទី១១	៣៦
រំលឹក និងសង្ខេប	៤៣
មេរៀនទី១២៖ អាល់កុលពីសមាសធាតុកាបូនីល	៤៤
១. ទម្រង់របស់កាបូនីល	៤៤
២. ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម-អ៊ុកស៊ីតកម្មសរីរាង្គ	៤៥
៣. សំយោគអាល់កុលដោយប្រតិកម្មអ៊ុកស៊ីតកម្មសមាសធាតុកាបូនីល	៤៨
៤. អុកស៊ីតកម្មអាល់កុល	៥១
៥. សមាសធាតុសរីរាង្គលេហៈ.....	៥៧
៦. ទង្វើសមាសធាតុសរីរាង្គលីចូម និងម៉ាញ៉េស្យូម	៥៨

៧.	ប្រតិកម្មសមាសធាតុសរីរាង្គលីចូម និងម៉ាញ៉េស្យូម	៦០
៨.	អាល់កុលពីរ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ	៦៣
៩.	ក្រុមការពារ.....	៧០
	លំហាត់មេរៀនទី១២	៧១
	សង្ខេប និងរំលឹក	៧៩
មេរៀនទី១៣៖ ប្រព័ន្ធគ្រួសមិនផ្អែក		៨១
១.	សេចក្តីផ្តើម.....	៨១
២.	ស្ថេរភាពរបស់រ៉ាឌីកាល់សេរីអាលីល.....	៨១
៣.	កាចុងអាលីល	៨៥
៤.	រំលឹកទ្រឹស្តីស្តេសូណង់	៨៦
៥.	អាល់កាឌីអែន និងអ៊ីដ្រូកាបូប៉ូលីមិនផ្អែក.....	៩១
៦.	1,3-ប៊ុយតាឌីអែន៖ ការមិនដៅកន្លែងរបស់អេឡិចត្រុង	៩២
៧.	ស្ថេរភាពរបស់ឌីអែនឆ្លាស់	៩៥
៨.	ស្បៀងត្រួសពី UV-Vis	៩៦
៩.	ការប្រយុទ្ធនុយក្លេអូកីលលើឌីអែនឆ្លាស់ ៖ បូក-1,4.....	១០៤
១០.	ប្រតិកម្មDiels-Alder ៖ ប្រតិកម្មបូកវែង-1,4-នៃឌីអែន	១០៧
	លំហាត់មេរៀនទី១៣	១១៧
	ផែនទីបញ្ញត្តិ	១២៤
មេរៀនទី១៤៖ សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច		១២៥
១.	រកគំហើញបង់សែន.....	១២៥
២.	ការហៅឈ្មោះស្រលាយបង់សែន.....	១២៦
៣.	ប្រតិកម្មរបស់បង់សែន.....	១២៩
៤.	ទម្រង់Kekuléបង់សែន.....	១៣០
៥.	ស្ថេរភាពទែម៉ូឌីណាមិចរបស់បង់សែន.....	១៣១
៦.	ទ្រឹស្តីទំនើបនៃទម្រង់បង់សែន	១៣៣
៧.	ច្បាប់ Huckel ៖ ច្បាប់ $4n+2$ អេឡិចត្រុង π	១៣៦
៨.	សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចផ្សេងទៀត	១៤៦
៩.	សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចអេតេរ៉ូស៊ីក្លិច	១៥១
១០.	សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចក្នុងគីមីជីវៈ	១៥៣
១១.	ស្បៀងត្រួសពីរបស់សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច	១៥៥
	លំហាត់មេរៀនទី១៤	១៦០
	ផែនទីបញ្ញត្តិ	១៦៦

មេរៀនទី១៥៖ ប្រតិកម្មសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច	១៦៧
១. ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអារ៉ូម៉ាទិច	១៦៧
២. ចលនការទូទៅរបស់ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអារ៉ូម៉ាទិច	១៦៨
៣. ប្រតិកម្មអាឡូសែនកម្មបង់សែន	១៧១
៤. ប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មបង់សែន	១៧៣
៥. ប្រតិកម្មស៊ុលផួនកម្មបង់សែន	១៧៤
៦. ប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម Friedel-Crafts	១៧៥
៧. ប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Crafts.....	១៧៧
៨. លីមីតនៃប្រតិកម្ម Friedel-Crafts	១៧៩
៩. ការអនុវត្តន៍សំយោគនៃប្រតិកម្ម Friedel-Crafts	១៨១
១០. ឥទ្ធិពលនៃក្រុមជួសលើប្រតិកម្មភាពវង់ និងដំណាទិសក្រុមចំណូល.....	១៨៤
១១. របៀបដែលក្រុមជួសមានឥទ្ធិពលលើប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអារ៉ូម៉ាទិច	១៨៩
១២. ប្រតិកម្មខ្សែខាងរបស់អាល់គីលបង់សែន	២០១
១៣. អាល់សែនីលបង់សែន	២០៣
១៤. ការអនុវត្តសំយោគ	២០៦
១៥. អាលីលអាឡូសែន និងបង់ស៊ីលអាឡូសែនក្នុងប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូកីល	២០៩
១៦. ប្រតិកម្មអ៊ុកស៊ីតកម្មសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច	២១១
លំហាត់មេរៀនទី១៥	២១៤
ផែនទីបញ្ញត្តិ	២១៨

មេរៀនទី១៦៖ អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន	២១៩
១. សេចក្តីផ្តើម.....	២១៩
២. ការហៅឈ្មោះអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន.....	២១៩
៣. លក្ខណៈរូប.....	២២០
៤. ការសំយោគអាល់ដេអ៊ីត.....	២២២
៥. ការសំយោគសេតូន	២២៦
៦. ប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលលើសម្ព័ន្ធពីរជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែន.....	២២៨
៧. ប្រតិកម្មបូករបស់អាល់កុល៖ អេមីអាសេតាល់ និងអាសេតាល់.....	២៣២
៨. ប្រតិកម្មបូកអាមីនថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២	២៣៨
៩. ប្រតិកម្មបូកអ៊ីដ្រូសែនស្យាង្គ៖ ស្យាណូអ៊ីឌ្រីន.....	២៤២
១០. ប្រតិកម្មបូករបស់អ៊ីល្ល៖ ប្រតិកម្ម Wittig	២៤៤
១១. ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មអាល់ដេអ៊ីត.....	២៤៨
១២. អុកស៊ីតកម្ម Baeyer-Villiger.....	២៤៨

១៣. ការវិភាគគីមីនៃអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន	២៥០
១៤. លក្ខណៈស្បៀងរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន	២៥០
១៥. សង្ខេបប្រតិកម្មបូករបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន.....	២៥៣
លំហាត់មេរៀនទី១៦	២៥៦
សង្ខេបចលនការប្រតិកម្ម	២៦៤
ខ្សែសំយោគ.....	២៦៥

មេរៀនទី១៧៖ អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងស្រលាយរបស់វា **២៦៦**

១. សេចក្តីផ្តើម.....	២៦៦
២. ការហៅឈ្មោះ និងលក្ខណៈរូប	២៦៦
៣. ទង្វើអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច	២៧៥
៤. ប្រតិកម្មជំនួសអាស៊ីល ៖ ប្រតិកម្មបូក - បណ្តាច់នុយក្លេអ៊ូកីលលើកាបូនអាស៊ីល	២៧៩
៥. អាស៊ីលក្លរ	២៨១
៦. អានីទ្រីតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច	២៨៤
៧. អេស្ត័រ	២៨៥
៨. អាមីត	២៩២
៩. ស្រលាយអាស៊ីតកាបូនិច	២៩៨
១០. ដេកាបូកស៊ីលកម្មរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច.....	៣០១
១១. តេស្តគីមីរបស់សមាសធាតុអាស៊ីល.....	៣០៣
១២. ប៉ូលីអេស្ត័រ និងប៉ូលីអាមីត	៣០៣
១៣. សង្ខេបប្រតិកម្មអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងស្រលាយរបស់វា	៣០៥
លំហាត់មេរៀនទី១៧	៣០៩

មេរៀនទី១៨ ៖ ប្រតិកម្មលើកាបូន៤របស់សមាសធាតុកាបូនីល..... **៣១៦**

១. សេចក្តីផ្តើម.....	៣១៦
២. ភាពអាស៊ីតរបស់អ៊ីដ្រូសែននៃសមាសធាតុកាបូនីល ៖ អាញ្ច័ងអែណូឡាត	៣១៦
៣. តូមេរេសេតូ និងអែណុល.....	៣១៨
៤. ប្រតិកម្មតាមអែណុល និងអែណូឡាត.....	៣១៩
៥. លីចូមអែណូឡាត.....	៣២៥
៦. អែណូឡាតរបស់សមាសធាតុ-ឌីកាបូនីល	៣២៨
៧. ការសំយោគមេទីលសេតូន៖ ការអេស្ត័រសំយោគអាសេតូអាសេទិច	៣២៩
៨. ការសំយោគអាស៊ីតអាសេទិចជួស៖ ការសំយោគអេស្ត័រម៉ាឡូនិច	៣៣៤
៩. ប្រតិកម្មបន្ថែមនៃសមាសធាតុអ៊ីដ្រូសែនសកម្ម.....	៣៣៨
១០. ការសំយោគអែណាមីន៖ ប្រតិកម្មអែណាមីន STORK.....	៣៣៩

១១. សង្ខេបប្រតិកម្មរបស់អែណូឡាត.....	៣៤២
លំហាត់មេរៀនទី១៨	៣៤៥

មេរៀនទី១៩ ៖ ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម និងប្រតិកម្មបូកកាបូនីល របស់សមាសធាតុកាបូនីល ៣៥០

១. សេចក្តីផ្តើម	៣៥០
២. ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen ៖ ការសំយោគអេស្ត័រ-សេតូ.....	៣៥០
៣. សមាសធាតុ-ឌីកាបូនីលដោយប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្មនៃអែណូឡាតសេតូ.....	៣៥៦
៤. ប្រតិកម្មអាល់ដូល៖ ប្រតិកម្មបូកអែណូឡាត និងអែណូលលើអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូ.....	៣៥៨
៥. ប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដូលខ្វែង	៣៦២
៦. ប្រតិកម្មបិទរង្វង់តាមរយៈប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដូល	៣៦៧
៧. ប្រតិកម្មបូកអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូ- α,β -មិនផ្អែត.....	៣៦៩
៨. ប្រតិកម្ម Mannich	៣៧៣
៩. សង្ខេបប្រតិកម្មសំខាន់ៗ	៣៧៤
លំហាត់មេរៀនទី១៩	៣៧៦
សង្ខេបចលនការប្រតិកម្ម	៣៨៤
ខ្សែសំយោគ	៣៨៤

មេរៀនទី២០៖ អាមីន ៣៨៥

១. ការហៅឈ្មោះ	៣៨៥
២. លក្ខណៈរូប និងទម្រង់របស់អាមីន	៣៨៦
៣. កម្រិតបាសរបស់អាមីន៖ អំបិលអាមីន.....	៣៨៨
៤. ទង្វើអាមីន	៣៩៦
៥. ប្រតិកម្មរបស់អាមីន	៤០៥
៦. ប្រតិកម្មរបស់អាមីនជាមួយអាស៊ីតនីត្រី	៤០៧
៧. ប្រតិកម្មជំនួសរបស់អំបិលអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូម	៤១០
៨. ប្រតិកម្មបង្កើតរបស់អំបិលអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូម	៤១៤
៩. ប្រតិកម្មរបស់អាមីនជាមួយស៊ុលផួនីលក្លរ	៤១៧
១០. ការសំយោគថ្នាំស៊ុលផា	៤១៩
១១. ការវិភាគអាមីន	៤២០
១២. ប្រតិកម្មបណ្តាច់ទាក់ទងនឹងសមាសធាតុអាម៉ូញ៉ូម.....	៤២២
១៣. សង្ខេបទង្វើ និងប្រតិកម្មរបស់អាមីន	៤២៣
លំហាត់មេរៀនទី២០	៤២៧


មេរៀនទី២១៖ ផេណុល និងអាល់អាឡូសែន្ន.....	៤៣៤
១. ទម្រង់ និងការហៅឈ្មោះរបស់ផេណុល	៤៣៤
២. ផេណុលកើតក្នុងធម្មជាតិ	៤៣៥
៣. លក្ខណៈរូបរបស់ផេណុល	៤៣៥
៤. ការសំយោគផេណុល	៤៣៦
៥. ប្រតិកម្មផេណុលជាអាស៊ីត.....	៤៣៨
៦. ប្រតិកម្មផ្សេងទៀតរបស់ក្រុម O-H របស់ផេណុល	៤៤១
៧. បណ្តាច់អាល់គីលអាល់អែទែរ	៤៤២
៨. ប្រតិកម្មនៃវ៉ង់បង់សែនរបស់ផេណុល.....	៤៤២
៩. ប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងClaisen.....	៤៤៤
១០. គីណូន.....	៤៤៥
១១. អាល់អាឡូសែន្ន និងប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូកីលអារ៉ូម៉ាទិច	៤៤៧
១២. ការវិភាគស្បិចរបស់ផេណុល និងអាល់អាឡូសែន្ន.....	៤៥៣
១៣. ការសិក្សាអំពីអាល់អាឡូសែន្ន៖ បម្រើបម្រាស់ និងបញ្ហាបរិស្ថាន	៤៥៤
លំហាត់មេរៀនទី២១	៤៥៨
ផែនទីបញ្ញត្តិ	៤៦៣
មេរៀនទី២២៖ ការបង្កើតសម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូន និងប្រតិកម្មផ្សេងទៀតរបស់សមាសធាតុសរីរាង្គលោហៈឆ្លង ...	៤៦៤
១. សេចក្តីផ្តើម.....	៤៦៤
២. ប្រតិកម្មបង្កើតកាតាលីករលោហៈឆ្លង.....	៤៦៤
៣. មេតាតេស៊ីសអូលេកីន៖ កំផ្លិចកាប៉ែនរុយតេញ៉ូម និងកាតាលីករ Grubbs.....	៤៦៨
៤. ប្រតិកម្ម Corey-Posner, Whitesides-House	៤៧០
៥. មូលដ្ឋានគ្រឹះខ្លះលើធាតុ និងកំផ្លិចលោហៈឆ្លង	៤៧១
៦. ការរាប់អេឡិចត្រុងក្នុងកំផ្លិចលោហៈ.....	៤៧២
៧. ដំណាក់កាលចលនាក្នុងប្រតិកម្មរបស់កំផ្លិចលោហៈឆ្លងខ្លះ	៤៧៤
៨. ចលនាការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មស្មើសាច់៖ កាតាលីករ Wilkinson.....	៤៧៦
៩. ចលនាការសម្រាប់ឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្មបង្កើតខ្វែង៖ ប្រតិកម្ម Heck-Mizoroki	៤៧៨
១០. វីតាមីន B12៖ ជីវមូលេគុលលោហៈឆ្លងមួយ	៤៧៩
តារាងតម្លៃpKaអាស៊ីត-បាស	៤៨០
តារាងបង្កនាទីសរីរាង្គ.....	៤៨១
តារាងស្បិចIRរបស់បង្កនាទីសំខាន់ៗ	៤៨២
ឯកសារយោង	៤៨៤

មេរៀនទី១១


អាល់កុល និងអេនែរ

១. ទម្រង់ និងការហៅឈ្មោះ


អាល់កុលមានក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីល (-OH) ចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមកាបូផ្លែតមួយ។ អាតូមកាបូនរបស់អាល់កុលអាចជាផ្នែករបស់ក្រុមអាល់គីលធម្មតាមួយ ដូចមាននៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោម ឬវា អាចជាផ្នែកមួយរបស់ម៉ូលេគុលសំប្រាំមួយ ដូចជាកូលេស្តេរ៉ូល។ អាល់កុលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាថ្នាក់ 1° , 2° និង 3° អាស្រ័យលើចំនួនអាតូមកាបូនដែលចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមកាបូនអាល់កុល។




អាតូមកាបូនអាល់កុលអាចជាអាតូមកាបូនផ្នែកមួយនៅជាប់ជាមួយក្រុមអាល់សែនីល ឬអាល់ស៊ីនីល មួយ ឬអាចជាអាតូមកាបូនផ្នែកមួយដែលចងជាមួយវ៉ង់បង់សែន។



សមាសធាតុដែលមានក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលចងជាមួយវ៉ង់បង់សែនមួយត្រូវបានគេហៅថាផេណុល។



អេទែរខុសពីអាល់កុលត្រង់អាតូមអុកស៊ីសែនរបស់អេទែរមួយចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមកាបូនពីរ។ ក្រុម អ៊ីដ្រូកាបូអាចជា អាល់គីល អាល់សែនីល វីនីល អាល់ស៊ីនីល ឬអាវីល។ ឧទាហរណ៍៖




១.១ ការហៅឈ្មោះអាល់កុល

យើងបានសិក្សាអំពីការហៅឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធ IUPAC នៃអាល់កុលក្នុងមេរៀនទី២ ផ្នែកទី៦ និងមេរៀនទី៤ ផ្នែកទី៣រួចហើយ។

- ក្រុមអ៊ីដ្រូកស៊ីលមានឧត្តមភាពជាងសម្ព័ន្ធពីជាន់ និងបីជាន់ក្នុងការសម្រេចហៅក្រុមបង្គំនាទីជាមជ្ឈិមបទ។

ឧទាហរណ៍៖




ក្នុងការហៅឈ្មោះក្រុមបង្គំនាទីធម្មតា អាល់កុលត្រូវបានគេហៅថា **អាល់គីលអាល់កុល** ដូចជាមេទីលអាល់កុល អេទីលអាល់កុល ។ល។

លំហាត់អនុវត្ត៩១.១៖ តើមានអ្វីខុសបើយើងប្រើឈ្មោះអ៊ីសូប្រូប៉ាណុល និង ទែរ-ប៊ុយតាណុល?


១.២ ការហៅឈ្មោះអេទែរ

គេតែងតែហៅឈ្មោះអេទែរជាឈ្មោះអសធារណៈនាម។ ក្នុងការហៅឈ្មោះនេះ គេគ្រាន់តែហៅក្រុមទាំងពីរ ដែលចងជាមួយ អុកស៊ីសែនតាមលំដាប់អក្សរ និងបូកបន្ថែមពាក្យថា **អេទែរ**។ ឧទាហរណ៍៖




តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ គេគួរប្រើការហៅឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធថ្មតា IUPAC ចំពោះអេទែរសំប្លាញ់ និងសមាសធាតុដែលមានខ្លែងច្រើន។ ក្នុងប្រព័ន្ធ IUPAC អេទែរត្រូវបានគេហៅថាឈ្មោះជា **អាល់កុកស៊ីអាល់កាន** អាល់កុកស៊ីអាល់សែន អាល់កុកស៊ីអារ៉ែន ។ល។ ក្រុម RO - ជាក្រុមអាល់កុកស៊ី។

ឧទាហរណ៍៖



មេតុកស៊ីប៉ង់តាន



1-អេតុកស៊ី-4-មេទីលបង់សែន



1,2-ឌីមេតុកស៊ីអេតាន (DME)


គេអាចហៅអេទែរវែងតាមមធ្យោបាយជាច្រើន។ មធ្យោបាយងាយមួយគឺប្រើការហៅឈ្មោះជំនួស (replacement nomenclature) ដែលក្នុងករណីនេះ យើងធ្វើទំនាក់ទំនងអេទែរវែងជាមួយប្រព័ន្ធវែងអ៊ីដ្រូកាបូដែលត្រូវគ្នា និងប្រើមជ្ឈិមបទ **អុកសា-** ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអាតូមអុកស៊ីសែនជំនួសក្រុមCH₂មួយ។ ក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត អេទែរសមាជិកវែងបីត្រូវបានគេហៅថា**អុកស៊ីរ៉ាន** (oxirane) និងអេទែរសមាជិកវែងបួនត្រូវបានគេហៅថា **អុកសែតាន** (oxetane)។ អេទែរវែងងាយមួយចំនួនក៏មានឈ្មោះអសធារណៈដែរ ដូចដែលមានក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម (ឈ្មោះក្នុងវង់ក្រចក)។ តេត្រាអ៊ីដ្រូផ្លូរ៉ាន (THF) និង 1,4-ឌីអុកសានជាធាតុរំលាយមាន ប្រយោជន៍ណាស់៖




អុកស៊ីស៊ីតូប្រូប៉ាន
ឬ អុកស៊ីរ៉ាន
(អេទីឡែនអុកស៊ីត)




អុកសាស៊ីតូប៊ុយតាន
ឬ អុកស៊ីតាន



អុកសាស៊ីតូប៉ង់តាន
(តេត្រាអ៊ីដ្រូផ្លូរ៉ាន THF)



1,4-ឌីអុកសាស៊ីតូអិចសាន
(1,4-ឌីអុកសាន)



ប៉ូលីអេទីឡែន អុកស៊ីត (PEO)

(ប៉ូលីមែររលាយក្នុងទឹកមួយបង្កើតពីអេទីឡែនអុកស៊ីត)

អេទីឡែនអុកស៊ីតជាសសារធាតុផ្ដើមរបស់ប៉ូលីអេទីឡែនអុកស៊ីត (PEO, ត្រូវបានគេហៅថា**ប៉ូលីអេទីឡែនត្រីកុល** (PEG) ផងដែរ)។ ប៉ូលីអេទីឡែនអុកស៊ីតមានបម្រើបម្រាស់ជាច្រើន រួមទាំងការភ្ជាប់ដោយសម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់ជាមួយប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ព្យាបាល ដូចជាអាំងទែផេរ៉ូន ដែលជាបម្រើបម្រាស់មួយដែលត្រូវបានរកឃើញសម្រាប់បង្កើនរយៈពេលនៃប្រសិទ្ធភាពឱសថក្នុងប្រព័ន្ធរបត់ឈាម។ PEOក៏ត្រូវបានប្រើក្នុងក្រែមលាបស្បែកខ្លះ។

លំហាត់អនុវត្តន៍១១.២ ៖ ចូរគូររូបមន្តសម្ព័ន្ធ-បន្ទាត់ និងឈ្មោះសមស្របរបស់អាល់កុល និងអេទែរទាំងអស់ដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុល៖

a. C₃H₈O

b. C₄H₁₀O

២. លក្ខណៈរូបនៃអាល់កុល និងអេទែរ


លក្ខណៈរូបរបស់អាល់កុល និងអេទែរមួយចំនួនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង១១.១ និង ១១.២។

- អេទែរមានចំណុចរំពុះប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ៊ីដ្រូកាបូដែលមានម៉ាសម៉ូលេគុល (MW) ដូចគ្នា។
ឧទាហរណ៍ សីតុណ្ហភាពរំពុះរបស់ឌីអេទីលអេទែរ (MW = 74) គឺ 34.6°C ហើយប៉ងតាន (MW=72) គឺ 36°C។
- អាល់កុលមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងអេទែរ ឬអ៊ីដ្រូកាបូខ្លាំងណាស់។
ឧទាហរណ៍ ចំណុចរំពុះរបស់ប៊ុយទីលអាល់កុល (MW = 74) គឺ 117.7°C ។


តារាង១១.១ លក្ខណៈរូបរាងសំខាន់ៗមួយចំនួន

ឈ្មោះ	រូបមន្ត	mp (°C)	bp (°C) (1atm)	កម្រិតរលាយ (g/100mL H ₂ O)
មេតាណុល	CH ₃ OH	-97	64.7	∞
អេតាណុល	CH ₃ CH ₂ OH	-117	78.3	∞
ប្រព័លអាល់កុល	CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH	-126	97.2	∞
អ៊ីសូប្រព័លអាល់កុល	CH ₃ CH(OH)CH ₃	-88	82.3	∞
ប៊ុយទីលអាល់កុល	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ OH	-90	117.7	8.3
អ៊ីសូប៊ុយទីលអាល់កុល	CH ₃ CH(CH ₃)CH ₂ OH	-108	108.0	10.0
សិក-ប៊ុយទីលអាល់កុល	CH ₃ CH ₂ CH(OH)CH ₃	-114	99.5	26.0
ទែរ-ប៊ុយទីលអាល់កុល	(CH ₃) ₃ COH	25	82.5	∞
ឌីអុល និងទ្រីអុល				
អេទីឡេនឌីអុល	CH ₂ OHCH ₂ OH	-12.6	197	∞
ប្រព័ឡេនឌីអុល	CH ₃ CHOHCH ₂ OH	-59	187	∞
ទ្រីមេទីឡេនឌីអុល	CH ₂ OHCH ₂ CH ₂ OH	-30	215	∞
ឌីសេរ៉ុល	CH ₂ OHCHOHCH ₂ OH	18	290	∞

- ម៉ូលេគុលអាល់កុលអាចផ្តុំចូលគ្នាដោយការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន តែម៉ូលេគុលអេទែរ និងអ៊ីដ្រូកាបូមិនអាចទេ។



ការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរបស់
ម៉ូលេគុលមេតាណុល




ប្រព័លឡេនឌីអុលត្រូវបានប្រើជាសារធាតុធ្វើឱ្យត្រជាក់ម៉ាស៊ីន ពីព្រោះវាអាចបំបែកដោយខ្លួនវា (biodegradable) មានចំណុចរំពុះខ្ពស់ និងរំលាយទៅមកទៅវិញ (miscible) ជាមួយទឹក។

ប៉ុន្តែអេទែរអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនជាមួយសមាសធាតុជាច្រើនដូចជាទឹក។ ដូចនេះ អេទែរមាន កម្រិតរលាយនៅក្នុងទឹកស្រដៀងគ្នានឹងអាល់កុលដែលមានម៉ាសម៉ូលេគុលដូចគ្នា តែវាខុសពីពពួកអ៊ីដ្រូកាបូ។

ឧទាហរណ៍ ឌីអេទីលអេទែរ និង 1-ប៊ុយតាណុលមានកម្រិតរលាយក្នុងទឹកដូចគ្នា ប្រហែល 8g ក្នុងទឹក 100mL នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។ ផ្ទុយមកវិញ ប៉ង់តានមិនរលាយក្នុងទឹកទេ។


មេតាណុល អេតាណុល ប្រូពីលអាល់កុលទាំងពីរ និងទែរមីលអាល់កុលរលាយទាំងស្រុងក្នុងទឹក (តារាង 11.1)។ កម្រិតរលាយរបស់អាល់កុលក្នុងទឹកតែងតែថយចុះនៅពេលខ្សែអ៊ីដ្រូកាបូរបស់វាកាន់តែវែង ដូចនេះ អាល់កុលខ្សែវែងមានលក្ខណៈដូចអាល់កានជាងដូចទឹក។

តារាង ១១.២ លក្ខណៈរូបរបស់អេទែរសំខាន់ៗមួយចំនួន			
ឈ្មោះ	រូបមន្ត	mp(°C)	bp(°C)(1atm)
ឌីអេទីលអេទែរ	CH_3OCH_3	-138	-24.9
អេទីលមេទីលអេទែរ	$\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_3$		10.8
ឌីអេទីលអេទែរ	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$	-116	34.6
1,2-ឌីមេតុកស៊ីអេតាន (DME)	$\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$	-68	83
អុកស៊ីរ៉ាន		-112	12
តេត្រាអ៊ីដ្រូផូរ៉ាន (THF)		-108	65.4
1,2-ឌីអុកសាន		11	101

៣. សារសំខាន់រាល់គ្នា និងអេទែរ

៣.១ មេតាណុល

ពីមុន មេតាណុលស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតដោយបំណិតឈើ (គឺ កម្ដៅឈើនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដោយគ្មានវត្ថុមានខ្យល់)។ ដោយសារតែគេបង្កើតវាតាមមធ្យោបាយនេះហើយ ទើបគេហៅវាថាអាល់កុលឈើ (wood alcohol) ។ សព្វថ្ងៃនេះ មេតាណុលស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតដោយប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មដោយ កាតាលីករនៃកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត។ ប្រតិកម្មកើតឡើងនៅសំពាធខ្ពស់ និងសីតុណ្ហភាពប្រហែល 300–400°C:




មេតាណុលមានកម្រិតពុលខ្ពស់។ ការលេបមេតាណុលចូលសូម្បីតែក្នុងបរិមាណបន្តិចបន្តួចក៏ដោយ អាចបណ្តាលឱ្យងងឹតភ្នែកបាន ហើយបើបរិមាណច្រើនអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់បាន។ ការពុលមេតាណុលក៏អាចកើតឡើងដោយការស្រូបចំហាយ ឬការប៉ះពាល់ដោយស្បែកដែរ។

៣.២ អេតាណុល

អេតាណុលអាចត្រូវបានបង្កើតដោយល្បឿងរបស់ស្ករ (fermentation of sugars) ហើយវាជាអាល់កុលដែលមាន នៅក្នុងភេសជ្ជៈអាល់កុលទាំងអស់។ ការសំយោគអេតាណុលក្នុងទម្រង់ជាស្រាដោយល្បឿងរបស់


ស្ករក្នុងទឹកផ្លែឈើជាសមិទ្ធផលដំបូងនៃការសំយោគសរីរាង្គរបស់យើង។ ស្ករបានពីទឹកផ្លែឈើផ្សេងៗអាចត្រូវបានប្រើក្នុងការទង្វើភេសជ្ជៈអាល់កុល។ ជារឿយៗ ស្ករបានមកពីគ្រាប់ធុញជាតិ ហើយវាជាវិសគល់ដែលគេហៅវាថា **អាល់កុលធុញជាតិ** (grain alcohol) ។

គេតែងតែធ្វើល្បឿងដោយបន្ថែមមេដំបែរ (yeast) ទៅលើល្បាយស្ករ និងទឹក។ មេដំបែរមានអង់ស៊ីមដែលអាចជំរុញស៊ីរីវែងនៃប្រតិកម្មមួយដែលបម្លែងស្ករដោយ ($C_6H_{12}O_6$) ទៅជាអេតាណុលនិងកាបូនឌីអុកស៊ីត៖



ល្បឿងតែងមិនអាចបង្កើតភេសជ្ជៈដែលមានកម្រិតអាល់កុលខ្ពស់ជាង 12-15% ទេ ពីព្រោះអង់ស៊ីមរបស់មេដំបែរត្រូវបានធ្វើឱ្យអស់កម្មនៅកំហាប់ខ្ពស់ជាងនេះ។ ដើម្បីបង្កើតភេសជ្ជៈដែលមានកម្រិតអាល់កុលខ្ពស់ជាងនេះ គេត្រូវធ្វើបំណិតសសូលុយស្យុងទឹកនេះ។

អេតាណុលជាសារធាតុគីមីសំខាន់មួយ។ ក្នុងឧស្សាហកម្ម អេតាណុលត្រូវបានបង្កើតពីប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្មកាតាលីករអាស៊ីតនៃអេតែន៖



5% នៃអាល់កុលលើពិភពលោកត្រូវបានផលិតតាមមធ្យោបាយនេះ។

អេតាណុលគឺជាភ្នាក់ងារអ៊ីបណូទិច (hypnotic) មួយ (អ្នកធ្វើឱ្យងងុយដេក)។ វាកាត់បន្ថយសកម្មភាព របស់ខួរក្បាលផ្នែកខាងលើ។ អេតាណុលក៏ជាសារធាតុពុលដែរ ប៉ុន្តែវាមានកម្រិតពុលទាបជាងមេតាណុល។ ក្នុងសត្វកណ្តុរព្រៃ (rats) ដូស (dose) នៃអេតាណុលគឺ 13.7 g. kg^{-1} នៃទម្ងន់ខ្លួន។

អេតាណុលជាថាមពលឥន្ធនៈមួយ

អេតាណុលត្រូវបានគេហៅថាជាប្រភពថាមពលដែលអាចបង្កើតថ្មី (renewable energy source) ពីព្រោះវាអាចត្រូវបានបង្កើតដោយល្បឿងនៃគ្រាប់ធុញជាតិ និងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀត ដូចជាស្រូវ សាលី និងអំពៅ។ ជាការពិត ពួករបស់វាលូតលាស់ដោយបម្លែងថាមពលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យជាថាមពលគីមីដោយរស្មីសំយោគ (photosynthesis) ។ នៅពេលគេទទួលបាន គេអាចលាយអេតាណុលជាមួយសាំងក្នុងប្រភាគផ្សេងៗ និងប្រើ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនយានយន្ត។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ សហរដ្ឋអាមេរិចឈានមុខគេក្នុងការផលិតអេតាណុលប្រហែល 6.5 កោដិហ្គាលុន (gallons) បន្ទាប់មកគឺប្រេស៊ីល 5 កោដិហ្គាលុន។

នៅពេលគេប្រើវាជំនួសសាំង អេតាណុលមានថាមពលទាបជាង ប្រហែល 34% ក្នុង១ឧតមាឌ។ កត្តានេះ និងកត្តាផ្សេងទៀត ដូចជាតម្លៃថាមពលដែលត្រូវការសម្រាប់បង្កើតផលិតផលកសិកម្មជាពិសេស ពោត បានធ្វើឱ្យគេស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្កើតអេតាណុលជាប្រភពថាមពល។ ការបង្កើតអេតាណុលពីពោតមានប្រសិទ្ធភាពទាបជាង៥ទៅ៦ដងនៃការបង្កើតពីអំពៅ ហើយវាជាការបម្លែងពីអាហារទៅជាប្រភពថាមពលមួយ។ ស្បៀងអាហារពិភពលោក អាចនឹងខ្វះខាត។

៣.៣ អេទីឡេន និងប្រូពីឡេនក្លីកុល


អេទីឡេនក្លីកុល ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) មានម៉ាស់ម៉ូលេគុលទាប ចំណុចរំពុះខ្ពស់ និងរំលាយទៅវិញទៅមកជាមួយទឹក (តារាង១១.១)។ លក្ខណៈទាំងនេះធ្វើឱ្យអេទីឡេនក្លីកុលជាសារធាតុប្រឆាំងកំណកក្នុងយានយន្តល្អមួយ (automobile antifreeze)។ ប៉ុន្តែអេទីឡេនក្លីកុលជាសារធាតុពុល។ ឥឡូវនេះគេប្រើប្រូពីឡេនក្លីកុល (1,2-ប្រូប៉ានឌីអុល) យ៉ាងទូលំទូលាយជំនួសឱ្យអេទីឡេនក្លីកុលពីព្រោះវាមានកម្រិតពុលទាបជាង។

៣.៤ ឌីអេទីលអេទែរ


ឌីអេទីលអេទែរ ជាសារធាតុរាវងាយឆេះ មានចំណុចរំពុះទាប។ នៅពេលគេប្រើអេទីលអេទែរក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ គេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ពីព្រោះអណ្តាតភ្លើង ឬព្រាចផ្កាភ្លើងពីកុងតឺន័រអាចបណ្តាលឱ្យល្បាយអេទីលអេទែរ និងខ្យល់អាចឆាបឆេះបាន។

អេទែរភាគច្រើនមានប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីសែនយឺតតាមដំណើរការរ៉ាឌីកាល់សេរីមួយហៅថា **អុតូអុកស៊ីតកម្ម** បង្កើតជាអ៊ីដ្រូពែរអុកស៊ីត និងពែរអុកស៊ីត៖


ដំណាក់កាលទី១៖



ដំណាក់កាលទី២៖




ដំណាក់កាលទី៣a៖



ឬ

ដំណាក់កាលទី៣b៖



អ៊ីដ្រូពែរអុកស៊ីត និងពែរអុកស៊ីតទាំងនេះតែងតែផ្តុំគ្នាក្នុងអេទែរដែលបានស្តុកទុករាប់ខែ ឬវែងជាងនេះទៀត អាចប៉ះខ្យល់ (ខ្យល់នៅផ្នែកខាងលើរបស់ធុងគ្រប់គ្រាន់) និងអាចផ្ទុះឡើងបាន។ ពួកវាតែងតែផ្ទុះ ដោយយើងមិនដឹងមុន នៅពេលសូលុយស្យុងអេទែរត្រូវបានបិទឱ្យជិតស្នូត។ ដោយសារតែ គេតែងតែប្រើ


អេទែរក្នុងការធ្វើយោបក គេត្រូវយកចិត្តទុកក្នុងការធ្វើតេស្តរកមើលវត្ថុមានពែរអុកស៊ីតក្នុងអេទែរនោះមុនពេលធ្វើបំណិត។

ពីមុនឌីអេទីលអេទែរត្រូវបានគេប្រើជាថ្នាំស្លឹកសម្រាប់វះកាត់។ ថ្នាំស្លឹកទំនើប និងនិយមប្រើជាងគេគឺអាឡូតាន (CF_3CHBrCl)។ អាឡូតានមិនឆាបឆេះដូចឌីអេទីលអេទែរទេ។

៤. ការសំយោគអាល់កុលពីអាល់សែន

យើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្មកាតាលីករអាស៊ីតនៃអាល់សែន ប្រតិកម្មអុកស៊ីមែត្រាស្យុង-ដេមែត្រាស្យុង និងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូប័រ៉ាស្យុង-អុកស៊ីតកម្មជាវិធីសាស្ត្រសំយោគអាល់កុលពីអាល់សែន (មើលមេរៀនទី៨)។ ខាងក្រោមនេះ យើងសង្ខេបខ្លីៗអំពីវិធីសាស្ត្រទាំងនេះ៖


១. ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្មកាតាលីករអាស៊ីតនៃអាល់សែន៖ អាល់សែនបូកទឹកក្រោមវត្ថុមានកាតាលីករអាស៊ីតមួយបង្កើតជាអាល់កុល។ ប្រតិកម្មបូកកើតឡើងតាមកម្រិតជ្រើសតំបន់ Markovnikov ។ ប្រតិកម្មអាចត្រឡប់មកវិញ ហើយចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្មកាតាលីករអាស៊ីតនៃអាល់សែនជាធម្មតាប្រាសជាមួយនឹងចលនការប្រតិកម្មដេស៊ីដ្រាតកម្មអាល់កុលមួយ។




ប៉ុន្តែគេមិនសូវប្រើប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្មកាតាលីករអាស៊ីតនៃអាល់សែននេះជាវិធីសាស្ត្រសំយោគ ពីព្រោះអង្គធាតុកាបូកាចុងអាចធ្វើបណ្តូរទីតាំង បើសិនជាអាចកើតកាបូកាចុងមួយមានស្ថេរភាពជាងដោយការរំកិលអ៊ីដ្រូ ឬអាល់កាន។ ដូចនេះ ផលិតផលដែលទទួលបានជាល្បាយអ៊ីសូមែរអាល់កុលមួយ។

២. ប្រតិកម្មអុកស៊ីមែត្រាស្យុង-ដេមែត្រាស្យុង៖ អាល់សែនមានប្រតិកម្មជាមួយសំណអាសេតាតក្នុងល្បាយនៃទឹក និងតេត្រាអ៊ីដ្រូផ្សាន (THF) បង្កើតជាសមាសធាតុប្រតិកម្មអ៊ីដ្រុកស៊ីលអាល់គីល។ សមាសធាតុរងរេដុកកម្មទៅជាអាល់កុលដោយសូដ្យូមប័រអ៊ីដ្រូ និងទឹក។


អុកស៊ីមែត្រាស្យុង



ដេមែត្រាស្យុង



៣. ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូប័រ៉ាតុង-អុកស៊ីតកម្ម៖ អាស់សែនមួយប្រតិកម្មជាមួយ $\text{BH}_3:\text{THF}$ ឬ ឌីប៉ានបង្កើតជាអាស់គីលប៉ានមួយ។ អុកស៊ីតកម្ម និងអ៊ីដ្រូលីសរបស់អាស់គីលប៉ានដោយអ៊ីដ្រូសែនពែរអុកស៊ីត និងបាស បង្កើតជាអាស់កូលមួយ។







$\text{H}_2\text{O}_2, \text{HO}^-$
 -OH ជំនួសបរិយាកាស
 រក្សាកុងហ្វីក្វរ៉ាស្យុង

3 អេណងត្យូមែរ

លំហាត់អនុវត្តន៍១១.៣៖ ចូរទស្សន៍ទាយផលិតផលឧត្តមភាពរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



លំហាត់អនុវត្តន៍១១.៤៖ ប្រតិកម្មខាងក្រោមមិនបង្កើតផលិតផលដូចបានបង្ហាញនេះទេ។




- ចូរទស្សន៍ទាយផលិតផលឧត្តមភាពពីលក្ខខណ្ឌប្រតិកម្មខាងលើ និងសរសេរចលនការនៃប្រតិកម្មនេះ
- តើលក្ខខណ្ឌប្រតិកម្មណាដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីសំយោគផលិតផលខាងលើ (3,3-ឌីមេទីល-2-ប៊ុយតាណុល)

៥. ប្រតិកម្មរបស់អាល់កុល

ប្រតិកម្មរបស់អាល់កុលកើតទៅតាមកត្តាខាងក្រោម៖

- អាតូមអុកស៊ីសែននៃក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលជាបាស និងនុយក្លេអូភីលខ្សោយ
- អាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់ក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលជាអាស៊ីតខ្សោយ
- ក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលអាចត្រូវបានបម្លែងជាក្រុមចាកចេញមួយ ដូចនេះ វាធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មជំនួស ឬ បណ្តាច់កើតឡើង។


ការយល់ពីប្រតិកម្មនៃអាល់កុលរបស់យើងមានជំនួយពីការគិតអំពីរបាយអេឡិចត្រុងក្នុងក្រុមបង្គុំ នាទីអាល់កុល និងអំពីរបៀបដែលរបាយនេះប៉ះពាល់លើប្រតិកម្មភាពរបស់វា។ អាតូមអុកស៊ីសែនរបស់អាល់កុល ប៉ូលែទាំងក្នុងសម្ព័ន្ធ C-O និងសម្ព័ន្ធ O-H ៖




សម្ព័ន្ធ C-O និង O-H របស់អាល់កុលរងប៉ូលែកម្ម

ភាពប៉ូលែកម្មរបស់សម្ព័ន្ធ O-H ធ្វើឱ្យអ៊ីដ្រូសែនមានបន្ទុកវិជ្ជមានដោយផ្នែក និងពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលអាល់កុលជាអាស៊ីតខ្សោយ។ ប៉ូលែកម្មនៃសម្ព័ន្ធ C-O ធ្វើឱ្យអាតូមកាបូនមានបន្ទុកវិជ្ជមានដោយផ្នែក ដូចនេះ HO⁻ ជាបាសខ្លាំងមួយ និងជាក្រុមចាកចេញខ្សោយណាស់ អាតូមកាបូននេះអាចរងការប្រយុទ្ធពីនុយក្លេអូភីល។

ទ្វេតាអេឡិចត្រុងលើអាតូមអុកស៊ីសែនធ្វើឱ្យវាមានលក្ខណៈបាសផង និងនុយក្លេអូភីលផង។ ក្រោមវត្តមានអាស៊ីតខ្លាំង អាល់កុលមានអំពើជាបាស និងទទួលប្រូតុងតាមមធ្យោបាយខាងក្រោម៖




- ប្រូតុងកម្មនៃអាល់កុលបម្លែងក្រុមចាកចេញអន់មួយ (OH⁻) ជាក្រុមចាកចេញល្អមួយ (H₂O)។ ប្រូតុងកម្មក៏ធ្វើឱ្យអាតូមកាបូនកាន់តែវិជ្ជមាន (ពីព្រោះ - OH₂⁺ ទាញអេឡិចត្រុងខ្លាំងជាង-OH) ដូចនេះ កាន់តែងាយស្រួលទទួលការប្រយុទ្ធពីនុយក្លេអូភីល។
- នៅពេលអាល់កុលរងប្រូតុងកម្ម ប្រតិកម្មជំនួសអាចកើតឡើង (S_N2 ឬ S_N1 អាស្រ័យលើថ្នាក់របស់អាល់កុល)។



អាល់កុលរងប្រូតុងកម្ម

ដោយសារតែអាល់កុលជានុយក្លេអូភីល ពួកវាក៏អាចមានប្រតិកម្មជាមួយអាល់កុលរងប្រូតុងកម្មនេះដែរ ប្រតិកម្មនេះយើងនឹងឃើញក្នុងផ្នែកទី១១នៃមេរៀននេះ ដែលជាប្រតិកម្មសំខាន់មួយក្នុងការសំយោគអេទែរ



អេទែររងប្រូតុងកម្ម

នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់មួយ ហើយគ្មានវត្ថុមាននុយក្លេអូភីលល្អណាមួយ អាល់កុលរងប្រូតុងកម្មអាចធ្វើប្រតិកម្ម E1 ឬ E2។ ប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មអាល់កុល។

អាល់កុលក៏អាចមានប្រតិកម្មជាមួយ PBr_3 និង SOCl_2 បង្កើតជាអាល់គីលប្រូម និងអាល់គីលស្លរដែរ។ ប្រតិកម្មទាំងនេះ ដូចដែលយើងនឹងឃើញក្នុងផ្នែកទី៩ នៃមេរៀននេះ ត្រូវបានចាប់ផ្តើមដោយអាល់កុលដែលប្រើ ទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីរបស់វាមានអំពើជានុយក្លេអូភីល។

៦. អាល់កុលជាអាស៊ីត

- អាល់កុលមានកម្រិតអាស៊ីតស្រដៀងនឹងទឹក។

មេតាណុលជាអាស៊ីតខ្លាំងជាងទឹកតិចតួច ($\text{pK}_a=15.7$) ប៉ុន្តែអាល់កុលស្ទើរតែទាំងអស់ជាអាស៊ីត ខ្សោយជាងទឹក។ តម្លៃ pK_a របស់អាល់កុលមួយចំនួនមានក្នុងតារាង១១.៣។

- អាល់កុលដែលមានរបាំងស្តេរីចង្អុលជាទែរ-ប៊ុយទីលអាល់កុល មានកម្រិតអាស៊ីតទាប ហើយបានឆ្លាស់របស់វាមានកម្រិតបានខ្លាំងជាងអាល់កុលមានរបាំងស្តេរីតិចដូចជាអេតាណុល ឬមេតាណុល។

តារាង១១.៣ តម្លៃ pK_a របស់អាស៊ីតខ្សោយខ្លះ	
អាស៊ីត	pK_a
CH_3OH	15.5
H_2O	15.74
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	15.9
$(\text{CH}_3)_3\text{COH}$	18



អាល់កុល


អ៊ីយ៉ុងអាល់កុកស៊ីត

(បើសិន R ជាក្រុមធំច្រើនជាង តើមានការបន្ស៊ីបក្រុមអាល់កុកស៊ីតដោយស៊ីលវ៉ាតកម្មតិច ហើយវាមិនស៊ីបដោយសារផលអាំងឌុចទីវ។ ជាវិបាក លំនឹងនឹងរំកិលទៅខាងអាល់កុល)

មូលហេតុមួយនៃភាពខុសគ្នាក្នុងកម្រិតអាស៊ីតនេះ គឺដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃផលស៊ីលវ៉ាតកម្ម។ ជាមួយអាល់កុលមិនមានរបាំងស្តេរី មូលេគុលទឹកអាចរំពៃទ្វេ ធ្វើស៊ីលវ៉ាតកម្មយ៉ាងងាយ និងបន្ស៊ីបអាញ៉ុងអាល់កុកស៊ីតដែលទទួលបានពីការបោះបង់ប្រូតុងមួយទៅជាបាសមួយ។ ជាវិបាកនៃការបន្ស៊ីបនេះ ការកើតបានឆ្លាស់របស់អាល់កុលកាន់តែងាយស្រួល កម្រិតអាស៊ីតរបស់វាកាន់តែកើនឡើង។ បើសិនជាក្រុម R របស់


អាល់កុលជាក្រុមធំប្រេងប្រដាប់ ការធ្វើស៊ីលីកាតកម្មលើអាញ់ដាអាល់កុលស៊ីតត្រូវបានរារាំង។ ការបន្សំបាសឆ្លាស់នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ ដូចនេះអាល់កុលដែលមានរបាំងធំជាអាស៊ីតខ្សោយជាង។ មូលហេតុមួយទៀត ដែលអាល់កុលមានរបាំងមានកម្រិតអាស៊ីតទាប គឺដោយសារតែផលអាំងឌុចទីវីតីក្រុមអាល់គីលឱ្យអេឡិចត្រុង។ ក្រុមអាល់គីលរបស់អាល់កុលមានរបាំងមួយឱ្យដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុង ធ្វើឱ្យការកើតអាញ់ដាអាល់កុលស៊ីតកាន់តែពិបាកជាងអាល់កុលដែលមានរបាំងតិច។

- អាល់កុលទាំងអស់ជាអាស៊ីតខ្លាំងជាងអាល់ស៊ីនចុងខ្សែ និងជាអាស៊ីតខ្លាំងជាអ៊ីដ្រូសែន អាម៉ូញាក់ និង អាល់កានខ្លាំងណាស់ (តារាង៣.១)។




គេអាចទង្វើសូដ្យូម និងប៉ូតាស្យូមអាល់កុលស៊ីតដោយដាក់អាល់កុលឱ្យមានប្រតិកម្មជាលោហៈសូដ្យូម ឬប៉ូតាស្យូម ឬជាមួយលោហៈអ៊ីដ្រូ (មេរៀនទី៦)។ ដោយសារតែអាល់កុលស្ទើរតែទាំងអស់ជាអាស៊ីតខ្សោយជាងទឹក អ៊ីយ៉ុងអាល់កុលស៊ីតជាបាសខ្លាំងជាងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូកស៊ីត។

- បាសឆ្លាស់របស់សមាសធាតុដែលមានតម្លៃ pKa ធំជាងអាល់កុលអាចដកយកប្រូតុងពីអាល់កុល។



លំហាត់អនុវត្ត៍១១.៥៖ ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាសដែលអាចកើតឡើង បើសិនអេតាណូលត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងសូលុយស្យុងនីមួយៗខាងក្រោម។ ក្នុងប្រតិកម្មនីមួយៗ ចូរសម្គាល់អាស៊ីតខ្លាំងបាសខ្លាំង អាស៊ីតខ្សោយ បាសខ្សោយ ដោយប្រើតារាង៣.១។



គេតែងប្រើសូដ្យូម និងប៉ូតាស្យូមអាល់កុលស៊ីតជាបាសក្នុងការសំយោគសរីរាង្គ។ យើងប្រើអាល់កុលស៊ីតដូចជា អេតុកស៊ីត និងទែរ-ប៊ុយតុកស៊ីត នៅពេលយើងធ្វើប្រតិកម្មដែលត្រូវការបាសខ្លាំងជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូកស៊ីត ប៉ុន្តែមិនត្រូវការបាសខ្លាំងពេក ដូចជាអ៊ីយ៉ុងអាមីដ្យូ ឬអាញ់ដាអាល់កានមួយ។ យើងក៏អាចប្រើអ៊ីយ៉ុងអាល់កុលស៊ីត នៅពេលយើងត្រូវការធ្វើប្រតិកម្មមួយក្នុងធាតុរំលាយជាអាល់កុល មិនមែនជាទឹក។

៧. ការបង្កើនពីរលំហូរទៅរាល់គីលអាឡូសែន

ក្នុងផ្នែកខាងក្រោមនេះ យើងនឹងសិក្សាអំពីប្រតិកម្មដែលទាក់ទងនឹងការជំនួសក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីលរបស់អាល់កុល។


- ក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីលមួយជាក្រុមចាកចេញអន់ (វាអាចចេញជាអ៊ីដ្រូកស៊ីត) ដូចនេះលក្ខណៈសំខាន់មួយនៃប្រតិកម្មទាំងនេះគឺត្រូវបង្កើនក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីតទៅជាក្រុមដែលអាចចាកចេញជាបាសខ្សោយមួយ។

ដំណើរការទាំងនេះចាប់ផ្តើមដោយប្រតិកម្មរបស់អុកស៊ីសែនអាល់កុលដែលជាបាស ឬនុយក្លេអូភីល មួយ បន្ទាប់មកក្រុមអុកស៊ីសែននេះរងប្រតិកម្មជំនួស។ ជាដំបូង យើងត្រូវពិចារណាលើប្រតិកម្មដែលបម្លែង អាល់កុលទៅជាអាល់គីលអាឡូសែនស្នូសិន។

អ្នកកំណត់ដែលគេនិយមប្រើជាងគេសម្រាប់បម្លែងអាល់កុលទៅជាអាល់គីលអាឡូសែនមានដូចខាង ក្រោម៖

- អ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែន (HCl, HBr, HI)
- ផូស្វរទ្រីប្រូម (PBr₃)
- ទីអូនីលក្លរ (SOCl₂)

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់អ្នកកំណត់មានដូចខាងក្រោម។ ប្រតិកម្មទាំងអស់នេះមានការបណ្តាច់ សម្ព័ន្ធ C – O របស់អាល់កុល។ ក្នុងករណីនីមួយៗ ដំបូង ក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីលត្រូវបានបម្លែងជាក្រុមចាកចេញល្អ មួយ។ យើងនឹងឃើញពីរបៀបដែលប្រតិកម្មទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលយើងសិក្សាលំអិតអំពីប្រភេទប្រតិកម្ម នីមួយៗ។




៨. អាល់គីលអាឡូសែនពីប្រតិកម្មអាល់កុលជាមួយអ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែន

នៅពេលអាល់កុលធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែនមួយ ប្រតិកម្មជំនួសកើតឡើងបង្កើតអាល់ គីលអាឡូសែន និងទឹក៖



- លំដាប់ប្រតិកម្មភាពអាល់កុលគឺ $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ < \text{មេទីល}$
- លំដាប់ប្រតិកម្មភាពរបស់អ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែនគឺ $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$ (HF គ្មានប្រតិកម្មទេ)

ប្រតិកម្មនេះរងកាតាលីករអាស៊ីត។ អាល់កុលប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែនដែលជាអាស៊ីត ខ្លាំង HCl, HBr, និង HI ប៉ុន្តែពួកវាមិនមានប្រតិកម្មជាមួយ NaCl, NaBr ឬ NaI ដែលគ្មានលក្ខណៈអាស៊ីត ទេ។ អាល់កុលថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២អាចបម្លែងជាអាល់គីលក្លរ និងប្រូមដោយឱ្យពួកវាប្រតិកម្មជាមួយល្បាយ សូដ្យូមអាឡូសែន និងអាស៊ីតស៊ុលផ្សិច៖




➢ ចលនការប្រតិកម្មអាល់កុលជាមួយ HX

- អាល់កុលថ្នាក់ទី២ ថ្នាក់ទី៣ អាសីលិច និងបង់ស៊ីលិចមានប្រតិកម្មតាមចលនការដែលទាក់ទងនឹងការកើតកាបូកាចុងមួយ ជាចលនការមួយដែលយើងឃើញដំបូងក្នុងមេរៀនទី៣ ហើយដែលយើងសម្គាល់ថាជាប្រតិកម្ម S_N1 ដែលមានអាល់កុលរងប្រតិកម្មមានអំពើជាអង្គធាតុមេប្រតិកម្ម។

យើងបង្ហាញចលនការនេះម្តងទៀត ដោយប្រើប្រតិកម្មរវាងទែរ-ប៊ុយទីលអាល់កុល និងសូលុយស្យុងទឹកនៃអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច (H_3O^+ , Cl^-)។


ដំណាក់កាលទី១ ដំបូងក្នុងចលនការប្រតិកម្មជំនួស S_N1 ដូចគ្នាទៅនឹងចលនការនៃប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្មអាល់កុលមួយ (មេរៀនទី៧)។

ដំណាក់កាលទី១៖



អាល់កុលទទួលយកប្រូតុងមួយ


ដំណាក់កាលទី២៖



ក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលរងប្រតិកម្មចាកចេញជាក្រុមចាកចេញបង្កើតជាកាបូកាចុងមួយ

ក្នុងដំណាក់កាលទី៣ ចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្មអាល់កុលមួយ និងការកើតអាល់គីលអាឡូសែនខុសគ្នា។ ក្នុងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្ម កាបូកាចុងបោះបង់ប្រូតុងមួយក្នុងប្រតិកម្ម $E1$ បង្កើតជាអាល់សែន។ ក្នុងការកើតអាល់គីលអាឡូសែនមួយ កាបូកាចុងមានប្រតិកម្មជាមួយនុយក្លេអូភីល (អ៊ីយ៉ុងអាឡូសែនមួយ) ក្នុងប្រតិកម្ម S_N1 ។

ដំណាក់កាលទី៣៖



អាញ្វង់អាឡូសែនប្រតិកម្មជាមួយកាបូកាចុង

តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឱ្យដឹងថាមានប្រតិកម្មជំនួស S_N1 ក្នុងករណីនេះ និងប្រតិកម្មបណ្តាច់ $E1$ ក្នុងករណីផ្សេងទៀត?

នៅពេលយើងធ្វើអ៊ីដ្រាតកម្មអាល់កុល យើងតែងតែធ្វើប្រតិកម្មក្នុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិចខាប់ និងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលផាត (HSO_4^-) ដែលមានវត្តមានបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មអាល់កុលជានុយក្លេអូភីលខ្សោយមួយ ហើយនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ កាបូកាចុងដែលមានប្រតិកម្មភាពខ្លាំងបង្កើតប្រភេទស្តេរ៉ោភាពជាងមួយដោយបោះបង់ប្រូតុងមួយ និងក្លាយជាអាល់សែន។ បន្ថែមនេះទៀត អាល់សែនតែងតែជា

សមាសធាតុហើរ និងត្រូវបានបំណិតពីល្បាយប្រតិកម្ម នៅពេលវាត្រូវបានបង្កើត ដូចនេះធ្វើឱ្យលំនឹងទាញទៅខាងការកើតអាល់សែន។ ដូចនេះប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅតាមចលនការ E1។


ក្នុងប្រតិកម្មបញ្ជ្រាសគ្នាដែលជាប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្មនៃអាល់សែន (មេរៀនទី៨) កាបូកាចុងមិនធ្វើប្រតិកម្ម ជាមួយនុយក្លេអូភីលទេ។ វាប្រតិកម្មជាមួយទឹក។ គេធ្វើអ៊ីដ្រាតកម្មអាល់សែនក្នុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិចរាវដែលទឹកមានកំហាប់ខ្ពស់។ ក្នុងករណីខ្លះ កាបូកាចុងអាចមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីយ៉ុង HSO_4^- ឬជាមួយអាស៊ីតស៊ុលផួរិចខ្លួនវា។ នៅពេលពួកវាធ្វើប្រតិកម្មនេះ ពួកវាបង្កើតអាល់គីលអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលផាត ($\text{R-OSO}_2\text{OH}$)។

នៅពេលយើងបម្លែងអាល់កុលពីអាល់គីលអាឡូសែន យើងធ្វើប្រតិកម្មក្រោមវត្តមានអាស៊ីត និងក្រោមវត្តមានអ៊ីយ៉ុងអាឡូសែន និងមិនស្ថិតនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ទេ។ ជារឿយៗ ក្នុងការបម្លែងពីអាល់កុលទៅអាល់គីលអាឡូសែន យើងរកឃើញថា ប្រតិកម្មកើតឡើងជាមួយការកើតឡើងនៃអាល់សែនខ្លះ (គឺដោយប្រតិកម្មបណ្តាច់)។ ថាមពលសេរីសកម្មប្រតិកម្មទាំងពីរបស់កាបូកាចុងនេះមិនខុសគ្នាខ្លាំងទេ។ ដូចនេះ មិនមែនកាបូកាចុងទាំងអស់ក្លាយជាផលិតផលស្ថេរភាពដោយប្រតិកម្មជាមួយនុយក្លេអូភីលទេ កាបូកាចុងខ្លះបោះបង់ប្រូតុង β បង្កើតជាអាល់សែនមួយ។

អាល់កុលថ្នាក់ទី១៖ មិនមែនការបម្លែងកាតាលីកអាស៊ីតនៃអាល់កុលទៅជាអាល់គីលអាឡូសែនឆ្លងកាត់ការកើតកាបូកាចុងទាំងអស់ទេ។


- អាល់កុលថ្នាក់ទី១ និងមេតាណុលប្រតិកម្មបង្កើតអាល់គីលអាឡូសែនក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតតាមចលនការ $\text{S}_\text{N}2$ ។

ក្នុងប្រតិកម្មទាំងនេះ គួនាទីរបស់អាស៊ីតគឺដើម្បីបង្កើតអាល់កុលរងប្រូតុងកម្មមួយ។ បន្ទាប់មក អ៊ីយ៉ុងអាឡូសែនជំនួសម៉ូលេគុលទឹកមួយ (ក្រុមចាកចេញល្អមួយ) ពីកាបូន បង្កើតជាអាល់គីលអាឡូសែនមួយ៖



តម្រូវការអាស៊ីត៖ ទោះបីជាអ៊ីយ៉ុងអាឡូសែន (ជាធម្មតាជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូដូ និងប្រូម) ជានុយក្លេអូភីលខ្លាំង ពួកវាមិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើប្រតិកម្មជំនួសជាមួយអាល់កុលទេ។


- ប្រតិកម្មដូចបង្ហាញខាងក្រោមមិនកើតឡើងទេ ពីព្រោះក្រុមចាកចេញជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីត ដែលជាបាសខ្លាំង៖



ឥឡូវនេះ យើងអាចឃើញអំពីមូលហេតុដែលប្រតិកម្មអាល់កុលជាមួយអ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែនត្រូវបានជំរុញដោយអាស៊ីត។

- អាស៊ីតធ្វើប្រូតុងកម្មលើក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលអាល់កុល បង្កើតជាក្រុមចាកចេញល្អមួយ។


ដោយសារតែអ៊ីយ៉ុងក្លរីដមានលក្ខណៈអ៊ីយ៉ុងប្រូមូអ៊ីយ៉ុង អ៊ីដ្រូសែនក្លរីដមិនមានប្រតិកម្មជាមួយអាល់កុលថ្នាក់ទី១ ឬថ្នាក់ទី២ លុះត្រាតែមានការបន្ថែមសំងំស៊ីក្លូ ឬអាស៊ីតឡឺវីសទៅលើល្បាយប្រតិកម្ម។ អាស៊ីតឡឺវីសបង្កើតជាកំនើចមួយជាមួយអាល់កុលតាមរយៈការបន្សុំគ្នាជាមួយទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីលើអាតូមអុកស៊ីសែន។ នេះធ្វើឱ្យមានការបង្កើនប៉ូតង់ស្យែលនៃក្រុមចាកចេញ ដែលក្លរអាចចូលមកជំនួសវាបាន។



- ដូចដែលយើងរំពឹងទុក ប្រតិកម្មជាច្រើនរបស់អាល់កុលជាមួយអ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែន ដែលឆ្លងកាត់កាបូកាចុង តែងតែមានប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងកើតឡើងជាមួយ។
តើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងថាប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងអាចកើតឡើងនៅពេលអាល់កុលថ្នាក់ទី២រងប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែន?

ដោយសារតែប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងអាចកើតឡើង នៅពេលអាល់កុលខ្លះត្រូវបានដាក់ជាមួយអ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែន តើយើងអាចបម្លែងអាល់កុលថ្នាក់ទី២ទៅជាអាល់គីលអាឡូសែនមួយដោយគ្មានបណ្តូរទីតាំងតាមរបៀបណា? ចម្លើយនេះត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងផ្នែកបន្ទាប់ នៅពេលយើង សិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់អ័រអាត់ទីបដូចជាទីអូស៊ីលក្លរី (SOCl₂) និងផូស្វរទ្រីប្រូម (PBr₃) ។

លំហាត់អនុវត្តន៍១១.៦ ៖ ចូរសរសេរចលនការរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១១.៧៖

- តើកត្តាណាដែលពន្យល់អំពីការសង្កេតដែលអាល់កុលថ្នាក់ទី៣ធ្វើប្រតិកម្មជាមួយ HX លឿនជាងអាល់កុលថ្នាក់ទី២?
- តើកត្តាណាដែលពន្យល់អំពីការសង្កេតដែលមេតាណុលប្រតិកម្មជាមួយ HX លឿនជាងអាល់កុលថ្នាក់ទី១?

៩. អាល់គីលអាឡូសែនពីប្រតិកម្មអាល់កុលជាមួយ PBr₃ ឬ SOCl₂

អាល់កុលថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២ប្រតិកម្មជាមួយផូស្វរទ្រីប្រូមបង្កើតជាអាល់គីលប្រូម។



- ប្រតិកម្មអាល់កុលមួយជាមួយ PBr_3 មិនទាក់ទងនឹងការកើតឡើងនៃកាបូកាចុង ហើយ តែងតែកើតឡើងដោយគ្មានបណ្តាញទីតាំងរបស់ខ្សែកាបូន (ជាពិសេសបើសិនជាគេរក្សាសីតុណ្ហភាពក្រោម 0°C)។
- ជាធម្មតា ផូស្វរទ្រីប្រូមតែងតែសំដៅលើអាក់ទីបមួយសម្រាប់បង្កើនអាល់កុលមួយទៅជាអាល់គីលប្រូមមួយ។


ចលនការប្រតិកម្មទាក់ទងនឹងការជំនួសអាតូមប្រូមរបស់ PBr_3 ដោយម៉ូលេគុលបីរបស់អាល់កុលពីទ្រីអាល់គីលផូស្វរ P(OR)_3 និងម៉ូលេគុល HBr បី។




ទ្រីអាល់គីលផូស្វរមានប្រតិកម្មជាមួយម៉ូលេគុល HBr បីបង្កើតជាម៉ូលេគុលអាល់គីលប្រូមបី និងម៉ូលេគុលអាស៊ីតផូស្វរិចមួយ។



ទីអូនីលក្លរ (SOCl_2) បង្កើនអាល់កុលថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២ទៅជាអាល់គីលក្លរ។ គេតែងប្រើពីរីឌីន ($\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$) ដើម្បីជម្រុញប្រតិកម្មនេះ។ អង្គធាតុមេប្រតិកម្មអាល់កុលប្រយុទ្ធលើទីអូនីលក្លរ ដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម បង្កើតជាអាញ្ច័ងក្លរ និងបោះបង់ប្រូតុងរបស់វាមួយទៅជាម៉ូលេគុលពីរីឌីនមួយ លទ្ធផលគឺកើតអាល់គីលក្លរីស៊ីលផ្ទុំ។




បន្ទាប់មក អង្គធាតុកណ្តាលអាល់គីលក្លរីស៊ីលផ្ទុំមានប្រតិកម្មយ៉ាងរហ័សជាមួយម៉ូលេគុលពីរីឌីនមួយទៀតក្នុងទម្រង់ដូចគ្នានឹងអាល់កុលដើម បង្កើតជាអង្គធាតុកណ្តាលពីរីឌីនីញ៉ូមអាល់គីលស៊ីលផ្ទុំមួយដែលបង្កើតអាញ្ច័ងក្លរីទី២។ បន្ទាប់មក អាញ្ច័ងក្លរីប្រយុទ្ធលើកាបូនអង្គធាតុមេប្រតិកម្ម ដោយជំនួសក្រុមចាកចេញស៊ីលផ្ទុំ ដែលបំបែកទៅជាឧស្ម័ន SO_2 និងពីរីឌីន (ក្នុងអវត្តមាននៃពីរីឌីន ប្រតិកម្មកើតឡើងដោយរក្សាក្នុងក្រុមស្យុង)។





១០. តូស៊ីឡាត មេស៊ីឡាត និងទ្រីផ្លាត ៖ ស្រឡាយក្រុមចាតចេញរបស់អាល់កុល

ក្រុមអ៊ីដ្រិកស៊ីលរបស់អាល់កុលមួយអាចបម្លែងទៅជាក្រុមចាតចេញល្អមួយ ដោយបម្លែងទៅជាស្រឡាយអេស្តេរស៊ីលផ្សេងៗ។ អេស្តេរស៊ីលផ្សេងៗដែលជាក្រុមសំខាន់ជាងគេគឺ អេស្តេរមេតាស៊ីលផ្សេងៗ (មេស៊ីឡាត), p-តូលុយអែនស៊ីលផ្សេងៗ (តូស៊ីឡាត) និង ទ្រីក្លុយអ័រមេតាស៊ីលផ្សេងៗ (ទ្រីផ្លាត)។



គេតែងតែបង្កើតអេស្តេរស៊ីលផ្សេងៗ ដោយប្រតិកម្មរបស់អាល់កុលក្នុងពីរីឌីនជាមួយស៊ីលផ្សេងៗនីមួយៗ ណាមួយ ដូចជា មេតាស៊ីលផ្សេងៗ (មេស៊ីលផ្សេងៗ) សម្រាប់មេស៊ីឡាតមួយ p-តូលុយអែនស៊ីលផ្សេងៗ (តូស៊ីលផ្សេងៗ) សម្រាប់តូស៊ីឡាត ឬទ្រីក្លុយអ័រមេតាស៊ីលផ្សេងៗ ឬទ្រីក្លុយអ័រមេតាស៊ីលផ្សេងៗនិចអាស៊ីត (ទ្រីក្លុយអ័រអាស៊ីត)]សម្រាប់ទ្រីផ្លាត។ ពីរីឌីន(C₅H₅N, pyr)មាននាទីជាធាតុរំលាយ និងសម្រាប់បន្សាបអាស៊ីត ក្លរីឌ្រីចដែលកកើត។ ឧទាហរណ៍ អេតាណុលប្រតិកម្មជាមួយមេតាស៊ីលផ្សេងៗ បង្កើតជាអេទីលមេតាស៊ីលផ្សេងៗ និងប្រតិកម្មជាមួយ p-តូលុយអែនស៊ីលផ្សេងៗ បង្កើតជាអេទីលp-តូលុយអែនស៊ីលផ្សេងៗ៖






វាមានសារសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថា ការកើតនៃអេស្ទែរមិនប៉ះពាល់ស្តេរ៉េអូគីមីរបស់កាបូនអាល់កុលទេ ពីព្រោះសម្ព័ន្ធ C–O មិនទាក់ទងនឹងដំណាក់កាលនេះទេ។ ដូចនេះ បើសិន កាបូនអាល់កុលជាមណ្ឌលគីរ៉ាល់មួយមិនមានបម្រែបម្រួលក្នុងកំឡុងពេលកើតឡើងក្នុងការកើតអេស្ទែរស៊ុលផ្គុំណាត (ប្រតិកម្មដំណើរការដោយរក្សាក្នុងកំឡុងពេល)។ ក្នុងប្រតិកម្មអេស្ទែរស៊ុលផ្គុំណាតជាមួយនុយក្លេអូភីលមួយទាក់ទងនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយនៃប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីល។

អង្គធាតុមេប្រតិកម្មរបស់ប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីល

អង្គធាតុមេប្រតិកម្មរបស់ប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីលជា មេស៊ីឡាត តូស៊ីឡាត និងទ្រីផ្លាត ពីព្រោះពួកវាជាក្រុមចាកចេញល្អ ដែលតែងតែត្រូវបានប្រើជាអង្គធាតុមេប្រតិកម្មសម្រាប់ប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីល។ ពួកវាជាក្រុមចាកចេញល្អ ពីព្រោះអាញ៉ុងស៊ុលផ្គុំណាតដែលវាកើត នៅពេលវាចាកចេញជាបាសខ្សោយណាស់។ អាញ៉ុងទ្រីផ្លាតជាបាសខ្សោយជាងគេបង្អស់ក្នុងសេរីនេះ ដូចនេះវាក្រុមចាកចេញល្អជាងគេ។




អាល់គីលស៊ុលផ្គុំណាត

អ៊ីយ៉ុងស៊ុលផ្គុំណាត

(តូស៊ីឡាត, មេស៊ីឡាត, ។ល។) (បាសខ្សោយណាស់, ក្រុមចាកចេញល្អ)

- ដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីលលើអាល់កុលមួយ ដំបូងយើងត្រូវបម្លែងអាល់កុលទៅជាអ៊ីយ៉ុងស៊ុលផ្គុំណាត ហើយបន្ទាប់មក ក្នុងប្រតិកម្មទី២ ធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនុយក្លេអូភីលមួយ។
- បើសិនចលនការប្រតិកម្ម $\text{S}_{\text{N}}2$ ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងប្រតិកម្មទី២នៃឧទាហរណ៍ខាងក្រោមចម្រាសក្នុងកំឡុងពេលកើតឡើងលើកាបូនដែលដំបូងចងជាមួយក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលៈ

ដំណាក់កាលទី១៖




ដំណាក់កាលទី២៖




ការពិតដែលសម្ព័ន្ធ C–O របស់អាល់កុលមិនបានដាច់ក្នុងពេលកើតអេស្ទែរស៊ុលផ្គុំណាត ត្រូវបានគេបង្ហាញតាមចលនការខាងក្រោម។ មេតានស៊ុលផ្គុំនីលក្លរត្រូវបានប្រើក្នុងឧទាហរណ៍នេះ។


➢ ចលនការប្រតិកម្មបង្កើនអាល់កុលទៅជាមេស៊ីឡាត



លំហាត់អនុវត្តន៍១១.៨៖ ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកទង្វើសមាសធាតុខាងក្រោមពីស៊ុលផ្លួនីលក្លរូសមស្រប៖



លំហាត់អនុវត្តន៍១១.៩៖ ចូរឱ្យទម្រង់ផលិតផល X, Y, A និង B និងបង្ហាញស្តេរ៉េអូគីមីផង។




លំហាត់អនុវត្តន៍១១.១០៖ ចូរលើកការពិសោធន៍ដោយប្រើអាល់កុលស្លាកអ៊ីសូតូបដែលអាចបង្ហាញថា ការ កកើតអាល់គីលស៊ុលផ្លួនាតមិនបណ្តាលឱ្យសម្ព័ន្ធ C – O របស់អាល់កុលជាប់ទេ។


១១. ការសំយោគអេទែរ

១១.១ សំយោគអេទែរដោយប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មអន្តរម៉ូលេគុលនៃអាល់កុល

ម៉ូលេគុលអាល់កុលពីរអាចបង្កើតអេទែរមួយដោយបោះបង់ទឹកតាមប្រតិកម្មជំនួសកាតាលីករអាស៊ីត។




ប្រតិកម្មនេះប្រណាំងប្រជែងជាមួយប្រតិកម្មដេស៊ីដ្រាតកម្មអាល់កុលកាតាលីករអាស៊ីតដោយប្រើអាល់សែន (មេរៀនទី៧)។ ប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មអន្តរម៉ូលេគុលនៃអាល់កុលតែងតែកើតឡើងនៅសីតុណ្ហភាពទាបជាងប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មបង្កើតអាល់សែនមួយ ហើយប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មបង្កើតអេទែរអាចមានជំនួយពី ការធ្វើបំណិតយកអេទែរចេញនៅពេលវាកកើត។ ឧទាហរណ៍ ឌីអេទីលអេទែរត្រូវបានបង្កើតនៅលើទីផ្សារ ដោយប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មនៃអេតាណុល។ ឌីអេទីលអេទែរជាផលិតផលឧត្តមភាពនៅ 140°C អេតែនជា ផលិតផលបន្តិចបន្តួចនៅ 180°C។




ការកើតអេទែរកើតឡើងតាមចលនការ $\text{S}_\text{N}2$ មួយ ដែលម៉ូលេគុលអាល់កុលមួយមានអំពើជានុយក្លេអូភីល និងម៉ូលេគុលមួយទៀតដែលរងប្រតិកម្មមានអំពើជាអង្គធាតុមេប្រតិករ។

➢ ចលនការប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មអន្តរម៉ូលេគុលនៃអាល់កុលបង្កើតជាអេទែរមួយ
 ដំណាក់កាលទី១៖




នេះជាប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាសដែលមានអាល់កុលទទួលយកប្រតិកម្មមួយពីអាស៊ីតស៊ុលផួរិច
 ដំណាក់កាលទី២៖



ម៉ូលេគុលអាល់កុលមួយទៀតមានអំពើជានុយក្លេអូភីល
 ប្រយុទ្ធលើអាល់កុលរងប្រតិកម្មតាមប្រតិកម្ម $\text{S}_\text{N}2$

ដំណាក់កាលទី៣៖




ប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាសមួយទៀតបង្កើនអេទែររងប្រតិកម្មទៅជាអេទែរមួយដោយផ្ទេរប្រូតុង
 មួយទៅឱ្យម៉ូលេគុលទឹកមួយ (ឬទៅឱ្យម៉ូលេគុលអាល់កុលមួយទៀត)


ភាពស្មុគស្មាញនៃប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មអន្តរម៉ូលេគុល

វិធីសាស្ត្រក្នុងការសំយោគអេទែរឬដោយប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មមានលីមីតសំខាន់ៗខ្លះ៖

- គោលបំណងក្នុងការសំយោគអេទែរដោយប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មអន្តរម៉ូលេគុលនៃអាល់កុលថ្នាក់ទី២ តែងតែមិនអាចធ្វើបាន ពីព្រោះអាល់សែនកកើតងាយស្រួលជាង។
- គោលបំណងក្នុងបង្កើតអេទែរដោយប្រើក្រុមអាល់គីលថ្នាក់ទី៣ នឹងនាំឱ្យបង្កើតអាល់សែនជាផលិតផលឧត្តមភាព។
- ប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មអន្តរម៉ូលេគុលមិនមានសារប្រយោជន៍ក្នុងការទង្វើអេទែរអស៊ីមេទ្រីពីអាល់កុលថ្នាក់ទី១ទេ ពីព្រោះប្រតិកម្មនឹងបង្កើតជាល្បាយផលិតផល៖



លំហាត់អនុវត្តទី១១.១១៖ ករណីលើកលែងមួយដែលយើងទើបតែបានលើកឡើងខាងលើគឺការសំយោគអេទែរអស៊ីមេទ្រីដែលក្រុមអាល់គីលមួយជាក្រុមអែលីមីន និងក្រុមមួយទៀតជាក្រុមថ្នាក់ទី១។ ឧទាហរណ៍ការសំយោគអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបន្ថែមអែលីមីនអាល់កុលទៅលើល្បាយនៃអាល់កុលថ្នាក់ទី១ជាមួយ H_2SO_4 នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់



ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មនេះ និងពន្យល់ថាហេតុអ្វីក៏វាអាចសម្រេចបាន។

១១.២ ការសំយោគអេទែរ Williamson


មធ្យោបាយសំខាន់នាំឱ្យកើតអេទែរអស៊ីមេទ្រីមួយ គឺប្រតិកម្មជំនួសសន្ទុយក្លេអូកីល ដែលគេហៅថា ការសំយោគអេទែរ Williamson ។

- ការសំយោគអេទែរ Williamson ជាប្រតិកម្ម $\text{S}_{\text{N}}2$ នៃសូដ្យូមអាល់កុលស៊ីតជាមួយអាល់គីលអាឡុសែន អាល់គីលស៊ីលផ្សាណាត ឬអាល់គីលស៊ីលផាតមួយ។


➢ ចលនការប្រតិកម្មសំយោគអេទែរ Williamson



អ៊ីយ៉ុងអាល់កុលស៊ីតប្រតិកម្មជាមួយអង្គធាតុមេប្រតិកម្មក្នុងប្រតិកម្ម $\text{S}_{\text{N}}2$ មួយ បង្កើតជាអេទែរមួយ អង្គធាតុមេប្រតិកម្មត្រូវតែគ្មានរបាំង និងមានក្រុមចាកចេញល្អមួយ។ អង្គធាតុមេប្រតិកម្មជាអាល់គីលអាឡុសែនថ្នាក់ទី១ ឬ២ អាល់គីលស៊ីលផ្សាណាត និងអាល់គីលស៊ីលផាត៖




ប្រតិកម្មខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្មសំយោគអេទែរ Williamson ។ គេអាចទង្វើសូដ្យូមអាល់កុលស៊ីតដោយឱ្យអាក់កុលប្រតិកម្មជាមួយ NaH ៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១១.១២ ៖

- ចូរសរសេរវិធីសាស្ត្រពីសម្រាប់ទង្វើអ៊ីសូប្រូពីលមេទីលអេទែដោយប្រតិកម្មសំយោគ Williamson
- វិធីសាស្ត្រមួយឱ្យទិន្នផលល្អជាងវិធីសាស្ត្រមួយទៀត។ ចូរពន្យល់ថាហេតុអ្វីមិនទទួលបានអេប៉ូកស៊ីតក្នុង (C)។


តេត្រាអ៊ីដ្រូផ្កានអេទែរ៉ង់ (THF) អាចត្រូវបានសំយោគដោយដាក់ 4-ក្លរ៉ូ-1-ប៊ុយតាណុលជាមួយ សូលុយស្យុងសូដ្យូអ៊ីដ្រុកស៊ីតរាវ។




ប្រតិកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមចលនការខាងក្រោម៖



លំហាត់អនុវត្តន៍១១.១៣៖ អេប៉ូកស៊ីតអាចសំយោគដោយដាក់អាឡូអ៊ីឌ្រីនជាមួយបាសរាវ។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មរបស់ (a) និង (b) ហើយពន្យល់ថាហេតុអ្វីមិនទទួលបានអេប៉ូកស៊ីតក្នុង (C)។



លំហាត់អនុវត្តន៍១១.១៤៖ ចូរគូរទម្រង់ផលិតផល A, B, C និង D និងបង្ហាញស្តេរ៉េអូគីមីផង (គន្លឹះ៖ B និង D ជាអ៊ីសូមែរ)




១១.៣ សំយោគអេទែរដោយប្រតិកម្មអាល់គីលមេក្លូរ៉ាស្យុង-ដេមេក្លូរ៉ាស្យុង

ប្រតិកម្មអាល់គីលមេក្លូរ៉ាស្យុង-ដេមេក្លូរ៉ាស្យុងជាវិធីសាស្ត្រមួយផ្សេងទៀតក្នុងការសំយោគអេទែរ។


- ប្រតិកម្មរបស់អាល់សែនជាមួយអាល់កុលក្រោមវត្តមានអំបិលបារតដូចជាបារតអាសេតាត ឬទ្រីក្លុយអ៊ុរអាសេតាតបង្កើតជាអង្គធាតុកណ្តាលបារតអាល់កុកស៊ី ដែលធ្វើប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូមបរីដ្យូបង្កើតជាអេទែរមួយ។

នៅប្រតិកម្មអាល់កុលដើរតួជាធាតុរំលាយផង វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានគេហៅថាស៊ីលីមេក្លូរ៉ាស្យុង-ដេមេក្លូរ៉ាស្យុង។




១១.៤ ទែរ-ប៊ុយទីលអេទែរដោយប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មអាល់កុល៖ ក្រុមការពារ

អាល់កុលថ្នាក់ទី១អាចត្រូវបានបម្លែងទៅជាទែរ-ប៊ុយទីលអេទែរ ដោយរំលាយពួកវាក្នុងអាស៊ីតខ្លាំងមួយ ដូចជាអាស៊ីតស៊ុលផួរិច ហើយបន្ទាប់មកបន្ថែមអ៊ីសូប៊ុយទីទ័រទៅក្នុងល្បាយ (ដំណើរការនេះធ្វើឱ្យប្រតិកម្មឌីមេក្លូរ៉ាស្យុង និងប៉ូលីមេក្លូរ៉ាស្យុងអ៊ីសូប៊ុយទីទ័រកើតឡើងអប្បបរមា)។




- ទែរ-ប៊ុយទីលអេទែរអាចត្រូវបានប្រើដើម្បី ការពារ ក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលរបស់អាល់កុលថ្នាក់ទី១ នៅពេលប្រតិកម្មមួយទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងលើផ្នែកផ្សេងទៀតនៃម៉ូលេគុលនេះ។
- ក្រុមការពារ (protecting group) ទែរ-ប៊ុយទីលអាចត្រូវបានដកចេញយ៉ាងងាយដោយដាក់អេទែរនេះ ជាមួយអាស៊ីតរាវ។


ឧទាហរណ៍ ឧបមាថាយើងចង់ធ្វើ 4-ប៉ង់ទីល-1-អុល ពី 3-ប្រូម៉ូ-1-ប្រូប៉ាណុល និងសូដ្យូមអាសេទីលេន្ន បើសិនជាយើងឱ្យពួកវាប្រតិកម្មផ្ទាល់ជាមួយគ្នា បានខ្លាំងសូដ្យូមអាសេទីលេន្ននឹងប្រតិកម្មជាមួយក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីតមុនគេ ធ្វើឱ្យប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មបរាជ័យ៖



អាល់គីលកម្មមិនអាចកើតឡើងដោយមានការប្រណាំងប្រជែងពីប្រតិកម្មអាស៊ីតបានប៉ុន្តែ បើសិនជាយើងការពារក្រុម -OH សិន ការសំយោគនេះនឹងងាយស្រួល៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១១.១៥៖ ចូរសរសេរចលនការរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




១១.៥ ក្រុមការពារអេទែរស៊ីលីល

- ក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលអាចត្រូវបានការពារដោយប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាសដោយបម្លែងទៅជាក្រុមអេទែរ ស៊ីលីល (silyl ether group) មួយ។

ក្រុមអេទែរស៊ីលីលសំខាន់ជាងគេបំផុតមួយគឺ ក្រុមអេទែរទែរ-ប៊ុយទីលឌីមេទីលស៊ីលីល [ទែរ-ប៊ុយទីល (Me)₂Si-O-R ឬ TBS-O-R] ទោះបីជាគេអាចប្រើទ្រីអេទីលស៊ីលីល ទ្រីអ៊ីសូប្រូពីលស៊ីលីល ទែរ-ប៊ុយទីលឌីមេទីលស៊ីលីល និងអេទែរផ្សេងទៀតក៏ដោយ។ ទែរ-ប៊ុយទីលឌីមេទីលអេទែរមានស្ថេរភាពក្នុងចន្លោះ pH=4–12។ ក្រុមTBS មួយអាចត្រូវបានបូកដោយឱ្យអាល់កុលប្រតិកម្មជាមួយទែរ-ប៊ុយទីលឌីមេទីលស៊ីលីល ក្លាយក្រោមវត្តមានអាមីនអរូម៉ាទិចមួយ (បាសមួយ) ដូចជាអ៊ីមីដាសុល ឬពីរីឌីន៖



- គេអាចដកក្រុមTBS ដោយដាក់ជាមួយអ៊ុយ៉ុងក្លរួអ៊ុយអ៊ែរ (គេនិយមប្រើតេត្រាប៊ុយទីលអាម៉ូញ៉ូម ក្លរួអ៊ុយ ឬ HF រាវ)។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនប៉ះពាល់ក្រុមបង្កនាទីផ្សេងទៀតទេ ហើយនេះជាមូលហេតុដែលអេទែរ TBS ជាក្រុមការពារល្អ។




ការបម្លែងអាល់កុលមួយទៅជាស៊ីលីលអេទែរមួយ ក៏អាចធ្វើឱ្យវាកាន់តែរំហើរកាន់តែខ្លាំងដែរ។ កម្រិតរំហើរ (volatility) កើនឡើងធ្វើឱ្យអាល់កុល (ដូចជាស៊ីលីលអេទែរ) ងាយស្រួលវិភាគដោយក្រម៉ាក្រាហ្វីឌស្ត័ន គេតែងតែប្រើទ្រីមេទីលស៊ីលីលអេទែរក្នុងគោលបំណងនេះ។ ប៉ុន្តែក្រុមទ្រីមេទីលស៊ីលីលអេទែរជាក្រុមដែល គេតែងតែប្រើជាក្រុមការពារក្នុងប្រតិកម្មជាច្រើន។

១២. ប្រតិកម្មរបស់អេទែរ


ឌីអាល់គីលអេទែរប្រតិកម្មជាមួយអ្នកកំទេចទឹកក្រៅពីអាស៊ីត។ មណ្ឌលប្រតិកម្មដែលម៉ូលេគុលឌីអាល់គីលអេទែរមានសម្រាប់សមាសធាតុផ្សេងទៀតជាសម្ព័ន្ធ C-H របស់ក្រុមអាល់គីល និងក្រុម-O-របស់តំណអេទែរ។ អេទែរឆ្លងការប្រយុទ្ធដោយនុយក្លេអូភីល (ហេតុអ្វី?) និងដោយបាស។ ប្រតិកម្មភាពខ្សោយផ្ទុបជាមួយនឹងលទ្ធភាពធ្វើស៊ីលវ៉ាតកម្មកាចុងរបស់អេទែរ (ដោយផ្ទេរទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីពីអាតូមអុកស៊ីសែនរបស់ពួកវា) ធ្វើឱ្យអេទែរមានសារប្រយោជន៍ពិសេសជាធាតុរំលាយសម្រាប់ប្រតិកម្មជាច្រើន។

អុកស៊ីសែនរបស់តំណអេទែរធ្វើឱ្យអេទែរមានភាពបាសខ្សោយ។ អេទែរអាចប្រតិកម្មជាមួយភ្នាក់ងារផ្តល់ប្រូតុងបង្កើតជាអំបិលអុកសូនីញ៉ូម (oxonium salt) ៖



❖ ប្រតិកម្មបណ្តាច់អេទែរ


ការកម្តៅឌីអាល់គីលអេទែរជាមួយអាស៊ីតខ្លាំង (HI, HBr, និង H_2SO_4) ធ្វើឱ្យពួកវារងប្រតិកម្មដែលសម្ព័ន្ធកាបូន-អុកស៊ីសែនដាច់។ ឧទាហរណ៍ ឌីអេទែរអេទែរប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតអ៊ីដ្រូប្រូមិចខាប់ក្តៅបង្កើតម៉ូលេគុលប្រូម៉ូមេតានពីរ៖




បណ្តាច់អេទែរ

ចលនការរបស់ប្រតិកម្មនេះចាប់ផ្តើមដោយការកើតកាចុងអុកសូនីញ៉ូមមួយ។ បន្ទាប់មក ប្រតិកម្ម $\text{S}_{\text{N}}2$ ដែលមានអ៊ីយ៉ុងប្រូម៉ូម៉ាណូយក្លេអូភីលបង្កើតអេតាណុល និងប្រូម៉ូមេតាន។ HBr លើសប្រតិកម្មជាមួយអេតាណុលដែលកើតបង្កើតជាម៉ូលេគុលប្រូម៉ូមេតានទី២។


- ចលនការប្រតិកម្មបណ្តាច់អេទែរដោយអាស៊ីតខ្លាំង
ជំណាក់កាលទី១៖




ជំណាក់កាលទី២៖ អេតាណុលដែលទើបកើតប្រតិកម្មជាមួយ HBr លើសបង្កើតជាប្រូម៉ូមេតានទី២




លំហាត់អនុវត្តន៍១១.១៦: នៅពេលអេទែរមួយត្រូវបានគេដាក់ជាមួយ HI ខាត់ត្រជាក់ បណ្តាច់កើតឡើងដូចខាងក្រោម៖




នៅពេលល្បាយអេទែរត្រូវបានប្រើ អាល់កុល និងអាល់គីលអ៊ីយ៉ូដួដែលកកើតអាស្រ័យលើធម្មជាតិនៃក្រុមអាល់គីល។ ចូរប្រើចលនការពន្យល់អំពីការសង្កេតដូចខាងក្រោម៖



លំហាត់អនុវត្តន៍១១.១៧: ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១១.១៨: ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



១៣. អេប៉ូកស៊ីត

អេប៉ូកស៊ីត (epoxide) ជាអេទែររង់បី។ តាមប្រព័ន្ធ IUPAC អេប៉ូកស៊ីតត្រូវបានគេហៅថាអុកស៊ីរ៉ាន។ អេប៉ូកស៊ីតងាយជាងគេគឺអេទីឡែនអុកស៊ីត៖



អេប៉ូកស៊ីត




ឈ្មោះ IUPAC : អុកស៊ីរ៉ាន

ឈ្មោះអសធារណៈ : អេទីឡែនអុកស៊ីត

១៣.១ ការសំយោគអេប៉ូកស៊ីត៖ អេប៉ូកស៊ីតកម្ម

អេប៉ូកស៊ីតត្រូវបានសំយោគដោយប្រតិកម្មនៃអាល់សែនជាមួយអាស៊ីតពែអុកស៊ីសរីរាង្គមួយ (RCO_3H ជួនកាលគេហៅឱ្យងាយថាពែអុកស៊ីត) ដែលជាដំណើរមួយដែលគេហៅថា**អេប៉ូកស៊ីតកម្ម** (epoxidation)។ អាស៊ីតមេតាគ្លូរ៉ូពែអុកស៊ីបង់សូអ៊ិច (mCPBA) ជាអ្នកដឹកនាំពែអុកស៊ីសំខាន់មួយប្រើសម្រាប់ប្រតិកម្មអេប៉ូកស៊ីតកម្ម។ ប្រតិកម្មខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍មួយ៖




1-អុកតែន

mCPBA

81% អាស៊ីតមេតា-ក្លរ៉ូបង់សូអ៊ីច


អាស៊ីតមេតា-ក្លរ៉ូបង់សូអ៊ីចគឺជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំនៃប្រតិកម្ម។ ជាធម្មតា គេមិនសរសេរនៅក្នុងសមីការតាងប្រតិកម្ម ដូចបង្ហាញក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖



(77%)

ដូចដែលឧទាហរណ៍ទី១បានបង្ហាញ អាស៊ីតពែអុកស៊ីផ្ទេរអាតូមអុកស៊ីសែនមួយទៅឱ្យអាល់សែន។ គេបានស្នើចលនការប្រតិកម្មដូចខាងក្រោម៖

➢ ចលនការប្រតិកម្មអប្បកស៊ីតកម្មអាល់សែន




អាស៊ីតពែអុកស៊ីបោះបង់អាតូមអុកស៊ីសែនមួយទៅឱ្យអាល់សែនក្នុងចលនការដ៏១ដំណាក់កាល។ លទ្ធផលគឺ បូកស៊ុននៃអុកស៊ីសែនលើអាល់សែន ដោយមានកកើតអប្បកស៊ីត និងអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីច

១៣.២ ស្តេរ៉េអូគីមីរបស់ប្រតិកម្មអប្បកស៊ីតកម្ម

- ប្រតិកម្មរបស់អាល់សែនជាមួយអាស៊ីតពែអុកស៊ីជាប្រតិកម្មបូកស៊ុន ហើយវាជាស្តេរ៉េអូជាក់លាក់។ បន្ថែមនេះទៀត អាតូមអុកស៊ីសែនអាចបូកលើមុខទាំងសងខាងរបស់អាល់សែន។


ឧទាហរណ៍ ត្រង់-2-ប៊ុយតែនបង្កើតល្បាយវ៉ាសេមិចនៃត្រង់-2,3-ឌីមេទីលអុកស៊ីរ៉ាន ពីព្រោះការបូកអាតូមអុកស៊ីសែនលើមុខនីមួយៗរបស់អាល់សែនបង្កើតជាអេណង់តូមែរមួយ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ស៊ីស-2-ប៊ុយតែនបង្កើតតែស៊ីស-2,3-ឌីមេទីលអុកស៊ីរ៉ានទេ មិនថាវាបូកអាតូមអុកស៊ីសែនពីមុខខាងណារបស់អាល់សែនទេ ដោយសារតែមានប្លង់ស៊ីមេទ្រីទាំងក្នុងអង្គធាតុប្រតិករ និងផលិតផល។ បើសិន មណ្ឌលគីរ៉ាល់មានវត្តមានក្នុងអង្គធាតុប្រតិករមួយ នោះជុំវិញស្តេរ៉េអូមែប្រមាចកើតឡើង។



ស៊ីស-2-ប៊ុយតែន

ស៊ីស-2,3-ឌីមេទីលអុកស៊ីរ៉ាន

(សមាសធាតុមេសូ)



ត្រង់-2-ប៊ុយតែន

អេណង់តូមែរ


ត្រង់-2,3-ឌីអេមីលអុកស៊ីវ៉ាន

១៤. ប្រតិកម្មរបស់អេប៉ូកស៊ីត

- រមួលសម្ព័ន្ធនៃប៊ីបេសអេប៉ូកស៊ីតធ្វើឱ្យពួកវាមានប្រតិកម្មភាពខ្លាំងចំពោះប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូក្លីលជាអេទែរផ្សេងទៀត។

កាតាលីករអាស៊ីតជួយឱ្យអេប៉ូកស៊ីតបើកវង់ដោយផ្តល់ក្រុមចាកចេញល្អមួយ (អាល់កុលមួយ) នៅលើអាតូមកាបូនដែលរងការប្រយុទ្ធពីនុយក្លេអូក្លីល។ កាតាលីសនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស បើសិនជាគេប្រើនុយក្លេអូក្លីលខ្សោយដូចជាទឹក ឬអាល់កុលមួយ។ ឧទាហរណ៍មួយគឺប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសកាតាលីករអាស៊ីតនៃអេប៉ូកស៊ីត។


➢ ចលនការប្រតិកម្មបើកវង់អេប៉ូកស៊ីតកាតាលីករអាស៊ីត



អេប៉ូកស៊ីត

អេប៉ូកស៊ីតរងប្រតិកម្ម

អាស៊ីតប្រតិកម្មជាមួយអេប៉ូកស៊ីតបង្កើតអេប៉ូកស៊ីតរងប្រតិកម្មមួយ



អេប៉ូកស៊ីតរង
ប្រតិកម្ម

នុយក្លេអូក្លីល
ខ្សោយ

1,2-ឌីអុលរងប្រតិកម្ម


1,2-ឌីអុល

អេប៉ូកស៊ីតរងប្រតិកម្មជាមួយនុយក្លេអូក្លីលខ្សោយ (ទឹក) បង្កើតជា 1,2-ឌីអុលរង

ប្រតិកម្មមួយ បន្ទាប់មកវាផ្ទេរប្រតិកម្មឱ្យទឹកបង្កើតជា 1,2-ឌីអុល និងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូម

អេប៉ូកស៊ីតក៏អាចរងប្រតិកម្មបើកវង់ដោយកាតាលីករបានដែរ។ ប្រតិកម្មបែបនេះមិនកើតឡើងចំពោះ អេទែរផ្សេងទៀតទេ ប៉ុន្តែវាអាចកើតឡើងជាមួយអេប៉ូកស៊ីត (ពីព្រោះតែរមួលវង់) ដោយសារតែនុយក្លេអូក្លីល ដែលប្រយុទ្ធក៏ជាបានខ្លាំងដូចអ៊ីយ៉ុងអាល់កុលស៊ីត ឬអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូកស៊ីត។

➢ ចលនការប្រតិកម្មបើកវង់អេប៉ូកស៊ីតកាតាលីករបាន




នុយក្លេអូក្លីលខ្លាំង អេប៉ូកស៊ីត

អ៊ីយ៉ុងអាល់កុលស៊ីត

នុយក្លេអូក្លីលខ្លាំងដូចជាអ៊ីយ៉ុងអាល់កុលស៊ីត ឬអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូកស៊ីតអាចបើកវង់អេប៉ូកស៊ីត


តាមលទ្ធភាពប្រតិកម្ម S_N2 ដោយផ្ទាល់

- ប្រតិកម្មបើកវង់កាតាលីការបានរបស់អេប៉ូកស៊ីតអស៊ីមេទ្រីកើតឡើងជាចំបងដោយការប្រយុទ្ធរបស់នុយក្លេអូភីល **លើអាតូមកាបូនមានក្រុមជួសតិច**។
ឧទាហរណ៍ មេទីលអុកស៊ីរ៉ានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីយ៉ុងអាល់កុកស៊ីតលើកាបូនថ្នាក់ទី១របស់វា៖




នេះគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងរំពឹងទុក ៖ ប្រតិកម្មជាប្រតិកម្ម S_N2 មួយ ហើយយើងបានសិក្សាក្នុងមេរៀនទី៦ រួចហើយ អង្គធាតុមេប្រតិកម្មថ្នាក់ទី១មានប្រតិកម្ម S_N2 រហ័ស ពីព្រោះវាមានរបាំងស្តេរីយ៉ាតិច។


- ប្រតិកម្មបើកវង់កាតាលីការអាស៊ីតនៃអេប៉ូកស៊ីតអស៊ីមេទ្រីកើតឡើងដោយការប្រយុទ្ធរបស់នុយក្លេអូភីល **លើអាតូមកាបូនមានក្រុមជួសច្រើន**។
ឧទាហរណ៍៖






មូលហេតុ៖ ការចងសម្ព័ន្ធក្នុងអេប៉ូកស៊ីតរងប្រតិកម្ម (មើលប្រតិកម្មខាងក្រោម) គឺអស៊ីមេទ្រី ដែលអាតូមកាបូនជួសច្រើនមានបន្ទុកវិជ្ជមាន ប្រតិកម្មនេះស្រដៀងគ្នានឹងប្រតិកម្ម S_N1 ។ ដូចនេះនុយក្លេអូភីលប្រយុទ្ធលើអាតូមកាបូននេះទោះបីជាវាមានក្រុមជួសច្រើនក៏ដោយ៖




អាតូមកាបូនក្រុមជួសច្រើនជាងមានបន្ទុកវិជ្ជមានធំជាង ពីព្រោះវាដូចគ្នាទៅនឹងកាបូកាចុងថ្នាក់ទី៣។
លំហាត់អនុវត្តន៍១១.១៩៖ ចូរឱ្យទម្រង់ផលិតផលនីមួយៗខាងក្រោមដែលបានមកពីអុកស៊ីរ៉ាន (អេទីឡែនអុកស៊ីត) ៖






លំហាត់អនុវត្តន៍១១.២០៖ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១១.២១៖ នៅពេលសូដ្យូមអេតុកស៊ីតប្រតិកម្មជាមួយ 1-(ក្លរូមេទីល)អុកស៊ីរ៉ាន (ឬហៅថា អេពី ក្លរូអ៊ីឌ្រីន) ដែលបានដាក់ស្លាកដោយ¹⁴C តាងដោយសញ្ញាផ្កាយក្នុងម៉ូលេគុល I ផលិតផលឧត្តមភាពគឺ II។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មនេះ។



❖ ប៉ូលីអេទីឡែនពីអេប៉ូកស៊ីត

នៅពេលគេដាក់អេទីឡែនអុកស៊ីតឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូមអេតុកស៊ីត (ក្រោមវត្តមានបរិមាណបន្តិចបន្តួចនៃមេតាណុល) អាចបង្កើតប៉ូលីអេទីឡែន៖




ប៉ូលីអេទីឡែនក្លីកុល (ប៉ូលីអេទីឡែន)

នេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្មប៉ូលីមែរកម្មអាញ៉ុង។ ខ្សែប៉ូលីមែរបន្តលូតលាស់រហូតមេតាណុលធ្វើប្រតិកម្មលើក្រុមអាល់កុកស៊ីតនៅចុងខ្សែ។ ដូចនេះ ខ្សែមធ្យមរបស់ខ្សែប៉ូលីមែរនេះ ម៉ាសម៉ូលេគុលមធ្យម របស់ប៉ូលីមែរអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយបរិមាណអាល់កុល។ លក្ខណៈរូបរបស់ប៉ូលីមែរអាស្រ័យលើម៉ាស ម៉ូលេគុលមធ្យមរបស់វា។


ប៉ូលីអេទែរមានកម្រិតរលាយក្នុងទឹកខ្ពស់ ពីព្រោះវាមានលទ្ធភាពបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនជាច្រើន ជាមួយម៉ូលេគុលទឹក។ ប៉ូលីអេទែរមានឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មថា **ក្រូម៉ូនកាបូន** (carbowaxes) មានបម្រើបម្រាស់ ជាច្រើន ពីការប្រើក្នុងកូឡោនក្រូម៉ាតូក្រាហ្វីហ្វូតដល់គ្រឿងសំអាង។

១៥. ប្រតិកម្មអង់ទី 1,2-ឌីអ៊ីដ្រូកស៊ីលកម្មនៃអាល់សែនដោយអេប៉ូកស៊ីត

អេប៉ូកស៊ីតកម្មនៃស៊ីក្លូប៉ង់តែនជាមួយអាស៊ីតពែរីកស៊ីកាបូស៊ីលីចមួយបង្កើត 1,2-អេប៉ូកស៊ីស៊ីក្លូប៉ង់តាន៖



អ៊ីដ្រូលីសកាតាលីកអាស៊ីតនៃ 1,2-អេប៉ូកស៊ីស៊ីក្លូប៉ង់តាន ដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម បង្កើតត្រង់-ឌីអុលមួយ គឺ ត្រង់-1,2-ស៊ីក្លូប៉ង់តានឌីអុល។ ទឹកមានអំពើជានុយក្លេអូភីលមួយប្រយុទ្ធលើអេប៉ូកស៊ីតរង ប្រតិកម្មពីផ្នែកផ្ទុយនឹងក្រុមអេប៉ូកស៊ីត។ អាតូមកាបូនដែលរងការប្រយុទ្ធនេះរងការបម្លែងក្នុងភីក្លូស្យុង។ យើងបង្ហាញកាបូនតែមួយដែលរងការប្រយុទ្ធនៅពេលនេះ។ ការប្រយុទ្ធលើអាតូមកាបូនមួយទៀតនៃប្រព័ន្ធស៊ីមេទ្រីនេះស្មើគ្នា ហើយបង្កើតទម្រង់អេណង់តូមែរនៃត្រង់-1,2-ស៊ីក្លូប៉ង់តានឌីអុល៖




ត្រង់-1,2-ស៊ីក្លូប៉ង់តានឌីអុល

ដូចនេះ ការធ្វើប្រតិកម្មអេប៉ូកស៊ីតកម្ម បន្ទាប់មកប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសកាតាលីកអាស៊ីតជាវិធីសាស្ត្រមួយនៃប្រតិកម្មអង់ទី 1,2-ឌីអ៊ីដ្រូកស៊ីលកម្ម នៃសម្ព័ន្ធពីជាន់មួយ (ផ្ទុយពីប្រតិកម្មស៊ីន 1,2-ឌីអ៊ីដ្រូកស៊ីលកម្មក្នុងមេរៀនទី៨)។ ស្តេអ៊ែរីយ៉ូនៃបច្ចេកទេសនេះស្របទៅនឹងស្តេអ៊ែរីយ៉ូនៃប្រតិកម្មប្រមូលកម្មនៃស៊ីក្លូប៉ង់តែនដែល បានលើកឡើងក្នុងផ្នែកទី13។


លំហាត់អនុវត្តន៍ ១១.២២៖ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មដែលស្រដៀងគ្នានឹងប្រតិកម្មខាងលើ ដែលបង្ហាញអំពី របៀបដែលទម្រង់អេណង់តូមែរនៃត្រង់-1,2-ស៊ីក្លូប៉ង់តានឌីអុលត្រូវបានបង្កើត។

លំហាត់អនុវត្តន៍ ១១.២៣៖ ចូរបំពេញវ៉ាអាក់ទីប និងអង្គធាតុកណ្តាលពី A – E ខាងក្រោម៖



១៦. អេទែរម្ពុជ


អេទែរម្ពុជ (crown ether) ជាសមាសធាតុដែលមានទម្រង់ដូចសមាសធាតុ 18-មុជ-6 ដូចខាងក្រោម។ 18-មុជ-6 អូលីកូមែរវែងមួយនៃអេទីឡែនឆ្លីកុល។ អេទែរម្ពុជត្រូវបានគេហៅឈ្មោះថា **X-មុជ-Y** ដែល X ជាចំនួនអាតូមសរុបក្នុងវង់ និង Y ជាចំនួនអាតូមអុកស៊ីសែន។ លក្ខណៈសំខាន់មួយរបស់អេទែរម្ពុជគឺថាពួកវាអាចចងជាមួយកាចុង ដូចបានបង្ហាញក្នុងខាងក្រោម។



អេទែរម្ពុជធ្វើឱ្យអំបិលជាច្រើនរលាយក្នុងធាតុរំលាយមិនប៉ូលែ។ ហេតុផលនេះហើយ ដែលគេហៅពួកវាថា **កាតាលីករផ្ទេរជាន់** (phase transfer catalysts)។ នៅពេលអេទែរម្ពុជមួយចងសម្ព័ន្ធកូអរឌីណាស្យុងជាមួយលោហៈមួយ រំព័ទ្ធអ៊ីយ៉ុងនោះដោយស្រទាប់ក្រៅដូចអ៊ីដ្រូកាបូមួយ។ 18-មុជ-6 ចងសម្ព័ន្ធកូអរឌីណាស្យុងយ៉ាងមាំមួនជាមួយអ៊ីយ៉ុងប៉ូតាស្យូម ពីព្រោះទំហំប្រយោងរបស់វាត្រូវគ្នា ហើយអាតូមអុកស៊ីសែនទាំង៦ស្ថិតលើទីតាំងដែលអាចផ្តល់ទ្វេតាអេឡិចត្រុងទៅឱ្យអ៊ីយ៉ុងមណ្ឌលក្នុងកំផ្លិតអាស៊ីត-បាសឡឺវីស។

- ទំនាក់ទំនងរវាងអេទែរម្ពុជមួយជាមួយអ៊ីយ៉ុងដែលវាចង ត្រូវបានគេហៅថា **ទំនាក់ទំនងម្ចាស់-ភ្ញៀវ** (host-guest relationship) ។

អំបិលដូចជា KF, KCN និងប៉ូតាស្យូមអាសេតាតអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងធាតុរំលាយអាល្បឌិចដោយ បរិមាណកាតាលីករអេទែរម្ពុជ 18-មុជ-6។ ការប្រើអេទែរម្ពុជមួយជាមួយធាតុរំលាយមិនប៉ូលែមួយ អាចសម្រប សម្រួលប្រតិកម្ម S_N2 យ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះនុយក្លេអូកីល (ដូចជា F^- , CN^- ឬអាសេតាត ពីសមាសធាតុខាងលើ) ត្រូវបានញែកនៅឯកាមិនមានការរំព័ទ្ធជាតុរំលាយក្នុងធាតុរំលាយអាល្បឌិចមួយ ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះ កាចុងត្រូវបានរារាំងដោយអេទែរមិនឱ្យផ្គុំជាមួយនុយក្លេអូកីល។ ឌីស៊ីក្លូអិចសាណូ-18-មុជ-6 ជាឧទាហរណ៍ មួយទៀតនៃកាតាលីករផ្ទេរជាន់មួយ។ វារលាយល្អក្នុងធាតុរំលាយមិនប៉ូលែជាង 18-មុជ-6 ដោយសារតែក្រុម អ៊ីដ្រូកាបូបន្ថែមរបស់វា។ កាតាលីករផ្ទេរជាន់នេះក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រតិកម្មជាច្រើន ដូចជាប្រតិកម្ម អុកស៊ីតកម្ម (មានកាតាលីករផ្ទេរជាន់ដែលមិនមែនជាអេទែរម្ពុជដែរ)។



ឌីស៊ីក្លូអិចសាណូ-18-មុជ-6

លំហាត់អនុវត្តន៍១១.២៤៖ ចូរគូរទម្រង់របស់ ៖

- a. 15-ម៉ូដ-5
- b. 12-ម៉ូដ-4

១៧. សង្ខេបប្រតិកម្មអាល់សែន អាល់កុល និងអេឌែរ

យើងបានសិក្សាប្រតិកម្មក្នុងមេរៀននេះ និងមេរៀនទី៨រួចហើយ ថា ប្រតិកម្មទាំងនេះមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើសំយោគ។ ប្រតិកម្មស្ទើរតែទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងអាល់កុល និងអេឌែរត្រូវបានសង្ខេប ក្នុងរំលឹកសង្ខេបនៅចុងមេរៀន។

- យើងអាចប្រើអាល់កុលដើម្បីបង្កើតអាល់គីលអាឡូសែន អេឌែរស៊ីលផ្សំណាត អេឌែរ និង អាល់សែន។
- យើងអាចធ្វើអុកស៊ីតកម្មអាល់សែន ទៅជាអេប៉ូកស៊ីត ឌីអុល អាល់ដេអ៊ីត សេតូន និងអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច (អាស្រ័យលើអាល់សែន និងលក្ខខណ្ឌ)។
- យើងអាចប្រើអាល់សែនបង្កើតអាល់កាន អាល់កុល និងអាល់គីលអាឡូសែន។
- បើសិនជាយើងចង់បានអាល់ស៊ីនចុងខ្សែ ដូចជាអាល់ស៊ីនចុងខ្សែដែលអាចបង្កើតពីរីក-ឌី អាឡូសែន យើងអាចប្រើអាញ់ដអាល់ស៊ីនដែលបានមកពីវាទៅបង្កើតសម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូន ដោយប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូក្លីល។

សរុបមក យើងមានសេរីប្រតិកម្មដែលអាចប្រើដើម្បីបង្កើនផ្ទាល់ ឬមិនផ្ទាល់នៃបង្គំស្ទើរតែទាំងអស់ដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមក។

❖ របៀបប្រើអាល់សែនក្នុងការសំយោគ

- អាល់សែនជាចំណុចចាប់ផ្តើមដើម្បីបង្កើតបង្កើតក្រុមបង្គំនាទីផ្សេងទៀតដែលយើងបានសិក្សាតាមរយៈហេតុផលនេះ និងដោយសារតែប្រតិកម្មជាច្រើនតម្រូវឱ្យយើងត្រួតពិនិត្យលើស្តេរ៉េអូគីមី និង/ឬកម្រិតជ្រើសតំបន់បង្កើតជាផលិតផល អាល់សែនជាអង្គធាតុកណ្តាលប្រើបានសព្វសម្រាប់ការសំយោគ។
- យើងមានវិធីសាស្ត្រពីរ គឺធ្វើអ៊ីដ្រាតកម្មសម្ព័ន្ធពីរជាន់តាមដំណៅទិសMarkovnikov៖ (1) ប្រតិកម្មអុកស៊ីមេត្រាស្យុង-ដេមេត្រាស្យុង និង (2) ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្មកាតាលីករអាស៊ីត។
ក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រទាំងពីរនេះ ប្រតិកម្មអុកស៊ីមេត្រាស្យុង-ដេមេត្រាស្យុងជាវិធីសាស្ត្រមានប្រយោជន៍ជាងក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ពីព្រោះវាងាយស្រួលអនុវត្ត និងមិនមានប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងកើតឡើង។
- យើងអាចធ្វើអ៊ីដ្រាតកម្មសម្ព័ន្ធពីរជាន់មួយតាមដំណៅទិសផ្ទុយMarkovnikov ដោយប្រតិកម្ម អ៊ីដ្រូបរ៉ាត្យុង-អុកស៊ីតកម្ម។ តាមរយៈប្រតិកម្មនេះ យើងអាចទទួលបាននូវការបូកស៊ុននៃក្រុម-H និង -OH។ ចូរចងចាំថា ក្រុមបរនៃបរ៉ានសរីរាង្គអាចត្រូវបានជំនួសដោយអ៊ីដ្រូសែន ដឺតេរ៉ូម ឬ ទ្រីចូម ហើយប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូបរ៉ាត្យុងខ្លួនវាជាប្រតិកម្មបូកស៊ុននៃក្រុម H- និង -OH។
- យើងអាចបូក HX លើសម្ព័ន្ធពីរជាន់តាមតំណៅទិស Markovnikov ដោយប្រើ HF HCl HBr ឬ HI។
- យើងអាចបូក HBr តាមតំណៅទិសប្រាស Markovnikov មួយដោយដាក់អាល់សែនជាមួយ HBr ក្រោមវត្តមានពែកអុកស៊ីតមួយ (អ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែនផ្សេងទៀតមិនមានប្រតិកម្មនេះទេ សូម្បីតែក្រោមវត្តមានពែកអុកស៊ីតក៏ដោយ)។
- យើងក៏អាចបូកប្រូម ឬក្លរលើសម្ព័ន្ធពីរជាន់ មួយ ហើយប្រតិកម្មជាប្រតិកម្មបូកអង់ទី។







- យើងអាចធ្វើប្រតិកម្មស៊ុន 1,2-ឌីអ៊ីដ្រូកស៊ីលកម្មលើសម្ព័ន្ធពីរជាន់មួយដោយប្រើ KMnO_4 រាវ ត្រជាក់ ក្នុងសូលុយស្យុងបាស ឬ ដោយប្រើ OsO_4 បន្ទាប់មកដាក់ NaHSO_3 ។ ក្នុងចំណោម វិធីសាស្ត្រទាំងពីរនេះ គេតែងប្រើវិធីសាស្ត្រទីពីរ ពីព្រោះការប្រើ KMnO_4 អាចធ្វើឱ្យមាន អុកស៊ីតផ្តុលលើអាល់សែន ហើយផ្តាច់អាល់សែនត្រង់សម្ព័ន្ធពីរជាន់។
- យើងអាចធ្វើប្រតិកម្មអង់ទី 1,2-ឌីអ៊ីដ្រូកស៊ីលកម្មលើសម្ព័ន្ធពីរជាន់មួយដោយបម្លែងអាល់សែន ទៅជា អេប៉ូកស៊ីតមួយ បន្ទាប់មកធ្វើប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសបណ្តាច់កាតាលីករអាស៊ីត។ សមីការប្រតិកម្មទាំងនេះមាននៅក្នុងរំលឹកខ្សែសំយោគរបស់មេរៀនទី៧ និងទី៨ និងមេរៀននេះ។

២២២២២២២

លំហាត់មេរៀនទី១១

ការហៅឈ្មោះ:

១. ចូរឱ្យឈ្មោះ IUPAC របស់អាល់កុលខាងក្រោម៖






២. ចូរគូរទម្រង់សមាសធាតុខាងក្រោម៖



- (Z)-ប៊ុយ-2-អែន-1-អុល
- (R)-ប៊ុយតាន-1,2,4-ទ្រីអុល
- (1R,2R)-ស៊ីក្លូប៉ង់តាន-1,2-ឌីអុល
- 1-អេទីលស៊ីក្លូប៊ុយតាណុល
- 2-ក្លរីអ៊ីច-3-អ៊ីន-1-អុល
- តេត្រាអ៊ីដ្រូផ្លូរ៉ាន
- 2-អេតុកស៊ីប៉ង់តាន
- អេទីលផេនីលអេទែរ
- ឌីអ៊ីសូប្រូពីលអេទែរ

ប្រតិកម្ម និងការសំយោគ

៣. ចូរឱ្យអាល់សែនដែលត្រូវការសំរាប់សំយោគសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោមដោយប្រតិកម្មអុកស៊ីមេគ្លាស្យុង-ដេមេគ្លាស្យុង៖



៤. ចូរឱ្យអាល់សែនដែលត្រូវការសំរាប់សំយោគសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោមដោយប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូប៉ាត្យុង-អុកស៊ីតកម្ម៖







៥. ដោយចាប់ផ្តើមពីសមាសធាតុខាងក្រោម ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសំយោគ 1-ប៊ុយតាណុល៖

- a. 1-ប៊ុយតែន
- b. 1-ក្លរូប៊ុយតាន
- c. 2-ក្លរូប៊ុយតាន
- d. 1-ប៊ុយទីន


៦. ចូរបង្ហាញពីរបៀបទង្វើ 2-ប្រូម៉ូប៊ុយតាន ពី៖

- a. 2-ប៊ុយតាណុល
- b. 1-ប៊ុយតាណុល
- c. 1-ប៊ុយតែន
- d. 1-ប៊ុយទីន



៧. ដោយចាប់ផ្តើមពី 2-មេទីលប្រូប៉ែន (អ៊ីសូប៊ុយទីឡែន) និងប្រើអ្នកកំទេចទីបផ្សេងទៀត ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម៖ (T = ទ្រីចូម, D= ដ៏តេរ៉ូម)





៨. ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើការបម្លែងដូចខាងក្រោម៖




៩. តើសមាសធាតុអ្វីដែលអ្នករំពឹងថានឹងកកើតនៅពេលអេទ្រីខាងក្រោមត្រូវបានធ្វើរ៉េក្លូចជាមួយអាស៊ីតអ៊ីដ្រូប្រូមិចខាប់លើស?












១០. ឧបមាថា A – L តាងឱ្យផលិតផលឧត្តមភាពដែលកើតពីប្រតិកម្មនីមួយៗខាងក្រោម។ ចូរគូរទម្រង់របស់សមាសធាតុពី A ទៅ L ។ បើសិនជាមានផលិតផលច្រើនជាងមួយអាចកើតឡើងពីប្រតិកម្មណាមួយ សូមបញ្ជាក់ផលិតផលទាំងនោះផង។







១១. ដោយចាប់ផ្តើមពីអ៊ីសូប៊ុយតាន ចូរបង្ហាញអំពីរបៀបដែលសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោមអាចត្រូវបាន សំយោគ។

- a. ទែរ-ប៊ុយទីលក្លរ
- b. 2-មេទីលប្រូប៉ែន
- c. អ៊ីសូប៊ុយទីលប្រូម
- d. អ៊ីសូប៊ុយទីលអ៊ីយ៉ូដ







- e. អ៊ីសូប៊ុយទីលអាល់កុល (ពីរផ្លូវ)
- f. ទែរ-ប៊ុយទីលប្រូម
- g. អ៊ីសូប៊ុយទីលមេទីលអែទែរ













១២. ចូរឱ្យដាក់ទីបំបាច់សំរាប់ការសំយោគខាងក្រោម។ ការសំយោគខ្លះអាចត្រូវការច្រើនជាងមួយដំណាក់កាល។




១៣. ចូរឱ្យផលិតផលឧត្តមភាពរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




១៤. ចូរឱ្យផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




១៥. ចូរឱ្យដាក់ទីបំបាច់សំរាប់ការសំយោគខាងក្រោម៖




១៦. ចូរឱ្យដាក់ទីបំបាច់សំរាប់ការសំយោគខាងក្រោម៖



១៧. ចូរឱ្យទម្រង់សមាសធាតុពី A – J ដោយបង្ហាញស្តេអូអ៊ីបេរីមាន។




តើអ្វីទៅជាទំនាក់ទំនងរវាង A និង C?




តើអ្វីទៅជាទំនាក់ទំនងរវាង H និង J?

ចលនការប្រតិកម្ម


១៨. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



១៩. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




២០. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



០០០០០០០០

ខ្សែសំយោគខ្លះរបស់អាល់សែន អាល់ស្ត្រីន អាល់កុល និងអេតែរ




- អាល់ស៊ីនទៅអាល់សែន
- អាល់សែន និងអាល់កុល
- អាល់កុល និងអាល់គីលអាឡូសែន
- អាល់សែន និងអាល់គីលអាឡូសែន
- អាល់កុល និងអេទែរ
- អាល់សែន អេប៉ូកស៊ីត និង1,2-ឌីអុល
- អាល់កានទៅអាល់គីលអាឡូសែន
- ក្រុមការពារស៊ីលីលអាល់កុល
- អាល់កុលទៅក្រុមកាបូនីល

មេរៀនទី១២

អាល់កុលសមាសធាតុកាបូនីល


១. ទម្រង់របស់ក្រុមកាបូនីល

សមាសធាតុកាបូនីល (carbonyl compounds) ជាក្រុមសមាសធាតុធំមួយដែលរួមមានអាល់ដេអ៊ីត សេតូន អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិច អេស្តែរ និងអាមីត៖





ក្រុមកាបូនីល អាល់ដេអ៊ីត សេតូន អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិច អេស្តែរ អាមីត

អាតូមកាបូនកាបូនីលជាកាបូនអ៊ីប្រីត sp^2 ដូចនេះវា និងអាតូមដែលចងជាមួយវាបីទៀតស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយ។ មុំសម្ព័ន្ធរវាងអាតូមទាំងបីភ្ជាប់ជាមួយវា ជាមុំរបស់ត្រីកោណប្លង់ មានតម្លៃប្រហែល 120° ។




សម្ព័ន្ធកាបូន-អុកស៊ីសែនមានអេឡិចត្រុងពីរក្នុងសម្ព័ន្ធទម្រង់ និងអេឡិចត្រុងពីរក្នុងសម្ព័ន្ធន្ទម្យ។ សម្ព័ន្ធន្ទ π ត្រូវបានបង្កើតដោយការគ្របដណ្តប់នៃអរប៊ីតាល់ p របស់កាបូនជាមួយអរប៊ីតាល់ p របស់អុកស៊ីសែន។ ទ្វេតាអេឡិចត្រុងក្នុងសម្ព័ន្ធន្ទស្ថិតនៅក្នុងឡូបទាំងពីរ (ខាងលើ និងខាងក្រោមប្លង់របស់សម្ព័ន្ធទម្រង់)។




អរប៊ីតាល់មូលេគុលសម្ព័ន្ធន្ទ របស់
អាល់ដេអ៊ីត។ ទ្វេតា អេឡិចត្រុង
របស់សម្ព័ន្ធន្ទស្ថិត នៅក្នុងឡូប
ទាំងពីរ

ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត

- អាតូមអុកស៊ីសែនកម្រិតអេឡិចត្រុងវិជ្ជមានប្រទាញអេឡិចត្រុងទាំងពីរសម្ព័ន្ធទម្រង់និងសម្ព័ន្ធន្ទ ធ្វើឱ្យ ក្រុមកាបូនីលមានកម្រិតប៉ូលែខ្ពស់ អាតូមកាបូនដែលចងជាមួយអុកស៊ីសែនមានបន្ទុកវិជ្ជមាន ដោយផ្នែក ហើយអាតូមអុកស៊ីសែនមានបន្ទុកអវិជ្ជមានដោយផ្នែក។ កម្រិតប៉ូលែកម្មនៃសម្ព័ន្ធអាចតាងដោយទម្រង់រេសូណង់របស់ក្រុមកាបូនីលដូចខាងក្រោម៖



កស្មតាងដែលបញ្ជាក់ពីភាពប៉ូលែរបស់សម្ព័ន្ធកាបូន-អុកស៊ីសែនត្រូវបានគេបង្ហាញដោយម៉ូម៉ង់ឌីប៉ូល ដែលមានក្នុងសមាសធាតុកាបូនីល។




ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត $\mu=2.27\text{D}$ អាសេតូន $\mu=2.88\text{D}$

❖ ប្រតិកម្មរបស់សមាសធាតុកាបូនីលជាមួយនុយក្លេអូហ្វីល

ប្រតិកម្មសំខាន់មួយរបស់ក្រុមកាបូនីលគឺប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូហ្វីល (nucleophilic addition) លើក្រុមកាបូនីល។ ក្រុមកាបូនីលអាចទទួលការប្រយុទ្ធពីនុយក្លេអូហ្វីល ពីព្រោះដូចដែលយើងទើបនឹងឃើញរួចហើយ កាបូនកាបូនីលមានបន្ទុកវិជ្ជមានដោយផ្នែកមួយ។

- នៅពេលនុយក្លេអូហ្វីលបូកលើក្រុមកាបូនីល វាប្រើទ្វេតាអេឡិចត្រុងត្រង់បង្កើតសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមកាបូនកាបូនីល ហើយទ្វេតាអេឡិចត្រុងពីសម្ព័ន្ធពីជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែនរំកិលចេញទៅអាតូមអុកស៊ីសែន៖



នៅពេលប្រតិកម្មកើតឡើង អាតូមកាបូនរងការប្រែប្រួលពីធរណីមាត្រត្រីកោណប្លង់ និងអ៊ីប៊្រីត sp^2 ទៅជាធរណីមាត្រត្រីកោណ និងអ៊ីប៊្រីត sp^3 ។

- នុយក្លេអូហ្វីលសំខាន់ពីរដែលបូកលើសមាសធាតុកាបូនីលជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូស៊ីតសមាសធាតុដូចជា NaBH_4 ឬ LiAlH_4 និងកាបាញ៉ុងពីសមាសធាតុដូចជា RLi ឬ RMgX ។

ប្រតិកម្មមួយឈុតផ្សេងទៀតជាប្រតិកម្មដែលអាល់កុល និងសមាសធាតុកាបូនីលរងអុកស៊ីតកម្ម និងអេដុកកម្ម។ ឧទាហរណ៍ អាល់កុលថ្នាក់ទី១ត្រូវបានរងអុកស៊ីតកម្មទៅជាអាល់ដេអ៊ីត ហើយអាល់ដេអ៊ីតអាចរងអេដុកកម្មទៅជាអាល់កុល៖



អាល់កុលថ្នាក់ទី១


អាល់ដេអ៊ីត

ចូរពិចារណាលើគោលការណ៍ទូទៅនៃប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម និងអេដុកកម្មចំពោះសមាសធាតុសរីរាង្គ។


២. ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម-អេដុកកម្មក្នុងគីមីសរីរាង្គ

- ប្រតិកម្មអេដុកកម្មរបស់ម៉ូលេគុលសរីរាង្គតែងតែជាប្រតិកម្ម ដែលធ្វើឱ្យអាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់វាកើនឡើង ឬ អាតូមអុកស៊ីសែនរបស់វាថយចុះ។


ឧទាហរណ៍ ការបង្កើនអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចទៅជាអាល់ដេអ៊ីតមួយគឺជាប្រតិកម្មអេដុកកម្ម ពីព្រោះចំនួនអាតូមអុកស៊ីសែនរបស់វាថយចុះ៖



ការបម្លែងអាល់ដេអ៊ីតមួយទៅជាអាល់កុលគឺជាប្រតិកម្មអុក្ខម្ម៖




ការបម្លែងអាល់កុលមួយទៅជាអាល់សែនក៏ជាប្រតិកម្មអុក្ខម្មដែរ៖



ក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងនេះ យើងបានប្រើសញ្ញា [H] ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ប្រតិកម្មអុក្ខម្មរបស់សមាសធាតុសរីរាង្គមួយបានកើតឡើង។ យើងធ្វើរបៀបនេះនៅពេលដែលយើងចង់សរសេរសមីការទូទៅដោយគ្មានដាក់អេក្រង់ជាក់លាក់ណាមួយ។

- ផ្ទុយពីប្រតិកម្មអុក្ខម្មគឺប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម។ ការកើនឡើងនៃអាតូមអុកស៊ីសែន ឬការថយចុះនៃអាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់ម៉ូលេគុលសរីរាង្គមួយជាប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម។

ប្រតិកម្មបញ្ជ្រាសរបស់ប្រតិកម្មនីមួយៗគឺជាប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មនៃម៉ូលេគុលសរីរាង្គ ហើយយើងអាចសង្ខេបប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម-អុក្ខម្មទាំងនេះដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។ យើងប្រើសញ្ញាជា[O] ដើម្បីបញ្ជាក់ពីករណីទូទៅដែលម៉ូលេគុលសរីរាង្គរងអុកស៊ីតកម្ម។




ចំនួនអុកស៊ីតកម្មទាបបំផុត

ចំនួនអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់បំផុត

- ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មនៃសមាសធាតុសរីរាង្គមួយត្រូវបានគេឱ្យនិយមន័យយ៉ាងធំទូលាយថាជាប្រតិកម្មមួយ ដែលអាចបង្កើនចំនួនអាតូមនៃធាតុដែលមានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខ្ពស់ជាងកាបូនរបស់វា។

ឧទាហរណ៍ ការជំនួសអាតូមអ៊ីដ្រូសែនដោយអាតូមក្លរជាប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មមួយ៖




ជាការពិតណាស់ នៅពេលសមាសធាតុសរីរាង្គមួយរងអុកស៊ីតកម្ម មានសមាសធាតុមួយទៀត ហៅថា **ភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្ម** (oxidizing agent) រងអុកស៊ីតកម្ម។ ហើយនៅពេលសមាសធាតុសរីរាង្គមួយរងអុកស៊ីតកម្ម មានសមាសធាតុមួយទៀត ហៅថា **ភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្ម** (reducing agent) រងអុកស៊ីតកម្ម។ ភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្ម និងអុកស៊ីតកម្មទាំងនេះតែងតែជាសមាសធាតុសរីរាង្គ ហើយក្នុងផ្នែកបន្ទាប់ពីទៀតយើងនឹងឃើញពួកវា។

❖ ចំនួនអុកស៊ីតកម្មក្នុងគីមីសរីរាង្គ


វិធីសាស្ត្រមួយសំរាប់កំណត់ចំនួនអុកស៊ីតកម្មក្នុងសមាសធាតុសរីរាង្គ ស្រដៀងគ្នានឹងវិធីសាស្ត្រដែលយើងប្រើសម្រាប់កំណត់បន្ទុកលើអាតូម(មេរៀនទី១)។ យើងពឹងផ្អែកការកំណត់លើក្រុមដែលចងជាមួយអាតូមកាបូនដែលចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់វាប្រែប្រួលក្នុងប្រតិកម្ម។ រំលឹកបន្ទុកលើអាតូម យើងសន្មតថា អេឡិចត្រុងក្នុងសម្ព័ន្ធជាកំរួមស្មើគ្នា។ នៅពេល **កំណត់ចំនួនអុកស៊ីតកម្មលើអាតូមកាបូន យើងកំណត់អេឡិចត្រុងទៅលើ ធាតុដែលមានកម្រិតអេឡិចត្រុងវិជ្ជមាន (មើលតារាង១.២)។** ឧទាហរណ៍ ការចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយ (ឬជាមួយអាតូមណាមួយដែលមានកម្រិតអេឡិចត្រុងវិជ្ជមានទាបជាងកាបូន) ធ្វើឱ្យកាបូនមាន បន្ទុកស្មើ-1 ហើយការចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមអុកស៊ីសែន អាសូត ឬអាឡូសែនមួយ (F, Cl, និង Br) ធ្វើឱ្យកាបូនមានបន្ទុក +1 ការចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមកាបូនមួយទៀត មិនធ្វើឱ្យកាបូនប្រែប្រួលចំនួនអុកស៊ីតកម្មទេ។

ឧទាហរណ៍ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រនេះ អាតូមកាបូនរបស់មេតានមានចំនួនអុកស៊ីតកម្ម -4 ហើយអាតូមកាបូនរបស់កាបូឌីអុកស៊ីតស្មើ +4។


លំហាត់ឧទាហរណ៍៖ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រខាងលើ ចូរកំណត់ចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់កាបូននៃមេតាណុល (CH₃OH), ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត (HCHO) និងអាស៊ីតផរមិច (HCO₂H) ហើយរៀបសមាសធាតុទាំងនេះ រួមទាំងមេតាន និងកាបូនឌីអុកស៊ីត តាមលំដាប់កើនឡើងនៃចំនួនអុកស៊ីតកម្ម។



មេតាណុល




ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត



អាស៊ីតផរមិច

លំដាប់កើនឡើងនៃចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់កាបូនក្នុងសមាសធាតុនីមួយៗគឺ៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១២.១៖ គេមានប្រតិកម្មដូចខាងក្រោម៖




ចូរកំណត់ចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់កាបូននៃអេតាណុល អាសេតាល់ដេអ៊ីត និងអាស៊ីតអាសេទិច។

លំហាត់អនុវត្តន៍១២.២៖

- a. ទោះបីយើងបានបរិយាយប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មនៃអាល់សែនមួយជាប្រតិកម្មបូក អ្នកគឺមិនរីករានតែងតែហៅវាថា ប្រតិកម្មដុកម្ម។ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ចំនួនអុកស៊ីតកម្មខាងលើ ចូរពន្យល់អំពីការប្រើពាក្យប្រតិកម្មដុកម្មនេះ។




- b. ចូរធ្វើការវិភាគ និងពន្យល់ដូចខាងលើចំពោះប្រតិកម្មនេះ៖



៣. សំយោគអាល់កុលដោយប្រតិកម្មរេដុកម្មសមាសធាតុកាបូនីល


គេអាចសំយោគអាល់កុលថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២ ដោយប្រតិកម្មរេដុកម្មនៃសមាសធាតុជាច្រើនដែលមានក្រុមកាបូនីល។ មានឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖



៣.១ លីចូមអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រីដ


- លីចូមអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រីដ (LiAlH₄ អក្សរកាត់ LAH) រេដុកម្មអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងអេស្ត័រទៅជាអាល់កុលថ្នាក់ទី១។

ឧទាហរណ៍មួយនៃរេដុកម្មលីចូមអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រីដគឺការបម្លែងនៃ អាស៊ីត 2,2-ឌីមេទីលប្រូប៉ាណូអ៊ិច ទៅជា 2,2-ឌីមេទីលប្រូប៉ាណុល (ណេអូប៉ង់ទីលអាល់កុល)។



អាស៊ីត 2,2-ឌីមេទីលប្រូប៉ាណូអ៊ិច 2,2-ឌីមេទីលប្រូប៉ាណុល (92%)

រេដុកម្ម LAH នៃអេស្ត័រមួយបង្កើតអាល់កុលពីរ មួយបានមកពីផ្នែកកាបូនីលនៃក្រុមអេស្ត័រ និងមួយទៀតបានមកពីក្រុមអាល់កុកស៊ីលរបស់អេស្ត័រ។




អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងអេស្តែរពិបាកធ្វើអ្នកជាងអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន។ ប៉ុន្តែ LAH ជាភ្នាក់ងារអ្នកខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្លែងនេះ។ សូដ្យូមប័រអ៊ីដ្រូ (NaBH₄) ដែលយើងនឹងសិក្សាដោយសង្ខេបពេលក្រោយ ត្រូវបានគេនិយមប្រើដើម្បីធ្វើអ្នកអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន ប៉ុន្តែវាមិនអាចធ្វើអ្នកអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងអេស្តែរបានទេ។

នៅពេលប្រើ LAH ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ កុំឱ្យមានវត្ថុមានទឹក ឬធាតុរំលាយមានភាពអាស៊ីតខ្សោយផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ អាល់កុល) LAH ប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាមួយក្រុមឱប្រូតុង បញ្ចេញឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន។ គេនិយមប្រើឌីអេទីលអេទែរស្វីត (Et₂O) ជាធាតុរំលាយសម្រាប់ប្រតិកម្មអ្នកអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន។ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី LAH ត្រូវបានប្រើអស់ដោយដំណាក់កាលអ្នកអាល់ដេអ៊ីត គេអាចបន្ថែមទឹក និងអាស៊ីតដើម្បីបន្សាបអំបិលដែលទទួលបាន និងសម្របសម្រួលក្នុងការព្រែកផលិតផលអាល់កុលចេញ។

៣.២ សូដ្យូមប័រអ៊ីដ្រូ


- អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនរងអ្នកយ៉ាងងាយដោយសូដ្យូមប័រអ៊ីដ្រូ (NaBH₄)។

គេតែងតែប្រើសូដ្យូមប័រអ៊ីដ្រូច្រើនជាង LAH សម្រាប់ប្រតិកម្មអ្នកអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន។ សូដ្យូមប័រអ៊ីដ្រូអាចប្រើដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងទឹក រួមទាំងធាតុរំលាយអាល់កុលដែលគេហាមនៅពេលប្រើ LAH។




អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនអាចរងអ្នកដោយប្រើអ៊ីដ្រូសែន និងកាតាលីករលោហៈមួយ ឬដោយ លោហៈសូដ្យូមក្នុងធាតុរំលាយអាល់កុល។

ដំណាក់កាលសំខាន់ក្នុងប្រតិកម្មអ្នកសមាសធាតុកាបូនីលមួយ ដោយលីចូមអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូ ឬដោយសូដ្យូមប័រអ៊ីដ្រូ គឺជាការបន្ថែមអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូមួយពីលោហៈទៅកាបូនកាបូនីល។ ក្នុងការបន្ថែមនេះ អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូមានអំពើជានុយក្លេអ៊ីកលមួយ។ ចលនការបស់ប្រតិកម្មអ្នកសេតូនមួយដោយសូដ្យូមអ៊ីដ្រូត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម។



៣.៣ សង្ខេបប្រតិកម្មភាព LiAlH_4 និង NaBH_4


សូដ្យូមប៊ូរីដ្យូជាភ្នាក់ងារអ្នកកាត់ដកកម្មខ្សោយជាងលីត្យូមអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រីត។ លីត្យូមអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រីតធ្វើអ្នកកាត់ដកកម្មអាស៊ីត អេស្តែរ និងសេតូន ប៉ុន្តែសូដ្យូមប៊ូរីដ្យូអាចធ្វើអ្នកកាត់ដកកម្មតែអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនប៉ុណ្ណោះ៖




លីត្យូមអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រីតប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាមួយទឹកដូចនេះ គេត្រូវធ្វើអ្នកកាត់ដកកម្មដោយលីត្យូមអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រីតក្នុងសូលុយស្យុងគ្មានទឹក ជាធម្មតាក្នុងអេទ័រស្ព័រត (គេអាចបន្ថែមអេទ័រអាសេតាតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មចប់ដើម្បីបំបែក LiAlH_4 លើស បន្ទាប់មកគេបន្ថែមទឹកដើម្បីបំបែកកំផ្លិចអាលុយមីញ៉ូម) ផ្ទុយមកវិញ ប្រតិកម្មអ្នកកាត់ដកកម្មដោយសូដ្យូមប៊ូរីដ្យូអាចធ្វើឡើងក្នុងសូលុយស្យុងទឹក ឬ អាល់កុល។


៣.៤ អេក្រមរាល់គីលអាឡូសែនទៅជាអ៊ីដ្រូកាបូន៖ $\text{RX} \rightarrow \text{RH}$

ការជំនួសអាតូមអាឡូសែននៃអាល់គីលអាឡូសែនមួយដោយអ៊ីដ្រូសែនអាចធ្វើឡើងដោយដាក់អាល់គីលអាឡូសែនមួយឱ្យប្រតិកម្មជាមួយលីត្យូមអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រីត។ ដោយសារតែអាតូមអាឡូសែនដែលមានចំនួនអុកស៊ីតខ្ពស់ជាងត្រូវបានជំនួសដោយអាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយដែលមានចំនួនអុកស៊ីតកម្រិតទាបជាង ប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មអ្នកកាត់ដកកម្មមួយ។ ស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទនៃអាល់គីលអាឡូសែន (ថ្នាក់ទី១ ទី២ ទី៣) អាចរងអ្នកកាត់ដកកម្មដោយ LiAlH_4 ។ គេអាចប្រើ LiAlD_4 ដើម្បីជំនួសអាតូមអាឡូសែនដោយអាតូមដីតេរ៉ូមមួយ។




លំហាត់អនុវត្តន៍១២.៣៖ តើភ្នាក់ងារអ្នកកាត់ដកកម្ម LiAlH_4 ឬ NaBH_4 ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការបម្លែងដូចខាងក្រោម៖






៤. អុកស៊ីតកម្មអាល់កុល


អាល់កុលថ្នាក់ទី១អាចរងអុកស៊ីតកម្មទៅជាអាល់ដេអ៊ីត ហើយអាល់ដេអ៊ីតអាចរងអុកស៊ីតកម្មទៅជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច៖



អាល់កុលថ្នាក់ទី២អាចរងអុកស៊ីតកម្មទៅជាសេតូន៖



អាល់កុលថ្នាក់ទី៣មិនអាចរងអុកស៊ីតកម្មទៅជាសមាសធាតុកាបូនីលទេ៖




ឧទាហរណ៍ទាំងនេះមានចំណុចរួមមួយ៖ នៅពេលអុកស៊ីតកម្មកើតឡើង អាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយត្រូវបានបោះបង់ពីកាបូនអាល់កុល ឬអាល់ដេអ៊ីត។ អាល់កុលថ្នាក់ទី៣គ្មានអាតូមអ៊ីដ្រូសែននៅលើកាបូនអាល់កុលទេ ដូចនេះវាមិនអាចរងអុកស៊ីតកម្មតាមមធ្យោបាយនេះទេ។

៤.១ ចលនការរួម

អុកស៊ីតកម្មនៃអាល់កុលថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២ ដូចខាងលើ មានចលនការរួមមួយនៅពេលគេប្រើ អ៊ីដ្រូសែនបង្កើតស៊ីលីកា។ អ៊ីដ្រូសែនបង្កើតស៊ីលីកា ដែលខ្លះយើងនឹងសិក្សា ខាងក្រោម បញ្ចូលក្រុមចាកចេញមួយជា បណ្តោះអាសន្នលើអុកស៊ីសែនអ៊ីដ្រូស៊ីលក្នុងពេលប្រតិកម្ម។ ការបាត់បង់អ៊ីដ្រូសែនពីកាបូនអ៊ីដ្រូស៊ីល និង ការចាក ចេញនៃក្រុមចាកចេញពីអុកស៊ីសែនធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មបណ្តាច់ដែលបង្កើតសម្ព័ន្ធ π C=O ។ ការកើតសម្ព័ន្ធ ពីរជាន់នៃក្រុមកាបូនីលកើតឡើងតាមរបៀប ស្រដៀងគ្នានឹងការកើតសម្ព័ន្ធពីរជាន់អាល់សែន ដោយប្រតិកម្ម បណ្តាច់ដែរ។ ចលនការទូទៅត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖


អុកស៊ីតកម្មអាល់កុលដោយបណ្តាច់



អាល់កុល 1^o ឬ 2^o ប្រតិកម្ម ជាមួយអ៊ីដ្រូសែន ក្នុងដំណាក់កាលបណ្តាច់ បានមួយដក អាតូម អ៊ីដ្រូសែនមួយ បញ្ចូល ក្រុមចាកចេញ (LG) អ៊ីដ្រូសែនមួយពីកាបូនអាល់កុល បង្កើតសម្ព័ន្ធ π C=O ហើយក្រុមចាកចេញ ចេញបង្កើតជា ផលិតផលអុកស៊ីតកម្ម

អាល់កុលថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២មានអាតូមអ៊ីដ្រូសែនដែលត្រូវការនៅលើកាបូនអាល់កុល។ ពួកវាក៏មាន អាតូមអ៊ីដ្រូសែនដែលបាត់បង់នៅពេលក្រុមចាកចេញត្រូវបានបញ្ចូលមក ដូចដែលបានបង្ហាញខាងលើ។

អ្នកអាចសួរពីរបៀបដែលអាល់ដេអ៊ីតអាចធ្វើអុកស៊ីតកម្មដោយចលនការនេះយ៉ាងម៉េច ដោយសារតែ អាល់ដេអ៊ីតមិនមានក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីតចូលរួមក្នុងការចលនការខាងលើ។ ចម្លើយគឺអាស្រ័យទៅលើថា ល្បាយ ប្រតិកម្មអាល់ដេអ៊ីតមានទឹកឬអត់។ ក្រោមអវត្តមានទឹក អាល់ដេអ៊ីតមួយអាចបង្កើតទម្រង់អ៊ីដ្រាតមួយ (ដោយប្រតិកម្មបូកដែលយើងនឹងសិក្សាក្នុងមេរៀនទី១៦)។



អាល់ដេអ៊ីត អាល់ដេអ៊ីតអ៊ីដ្រាត អាស៊ីតកាបូកស៊ីលីច


កាបូនរបស់អាល់ដេអ៊ីតអ៊ីដ្រាតមានទាំងក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីល និងអាតូមអ៊ីដ្រូសែនដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើ ប្រតិកម្មបណ្តាច់ ដូចនេះ នៅពេលទឹកមានវត្តមាន អាល់ដេអ៊ីតមួយអាចរងអុកស៊ីតកម្មដោយចលនការខាង លើ។ ទោះបីជាអាល់ដេអ៊ីតអ៊ីដ្រាតអាចមានវត្តមានក្នុងកំហាប់លំនឹងទាប ម៉ូលេគុលក្នុងទម្រង់អ៊ីដ្រាតអាច រងអុកស៊ីតកម្មដោយទាញលំនឹងទៅកាន់ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មនៃម៉ូលេគុលអាល់ដេអ៊ីតទាំងអស់ទៅជាអាស៊ីត កាបូកស៊ីលីចតាមគោលការណ៍ LeChaterlier។

អាល់ដេអ៊ីតមិនអាចរងអុកស៊ីតកម្មដោយចលនការទូទៅខាងលើ នៅពេលមានវត្តមានទឹក។ ប្រតិកម្មនេះអាចបង្ហាញសារប្រយោជន៍នៅពេលការជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានអាល់ដេអ៊ីត ឬអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចពីអាល់កាល់ថ្នាក់ទី១។


ឥឡូវនេះ ចូរយើងពិចារណាលើវិធីសាស្ត្រអុកស៊ីតកម្មដាក់លាក់ដែលអាស្រ័យលើចលនការទូទៅខាងលើ៖ អុកស៊ីតកម្មSwern និងអុកស៊ីតកម្មទាក់ទងនឹងអេស្ទ័រក្រូម៉ាត។

៤.២ ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មSwern

អុកស៊ីតកម្មមានសារប្រយោជន៍សម្រាប់សំយោគអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនពីអាល់កុលថ្នាក់ទី១ និងអាល់កុលថ្នាក់ទី២រៀងគ្នា។ ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានទឹក ដូចនេះអាល់កុលថ្នាក់ទី១បង្កើតអាល់ដេអ៊ីតមិនមែនអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចទេ។ អាល់កុលថ្នាក់ទី២រងអុកស៊ីតកម្មទៅជាសេតូន។



អុកស៊ីតកម្ម Swern នៃអាល់កុលថ្នាក់ទី១បង្កើតអាល់ដេអ៊ីតមួយ




អុកស៊ីតកម្ម Swern នៃអាល់កុលថ្នាក់ទី២បង្កើតសេតូនមួយ

ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានអនុវត្តឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការមានផលវិបាកមួយ។ ជាដំបូង អុកសាលីលក្លរ (ClCOCOCl) ត្រូវបានបន្ថែមលើឌីមេទីលស៊ុលផុកស៊ីត (DMSO) ជាធម្មតានៅសីតុណ្ហភាពទាប បង្កើតជាអំបិលក្លរីឌីមេទីលស៊ុលផុកស៊ីត (រួមទាំង CO₂, CO និង HCl ជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំ)។ បន្ទាប់មកអង្គធាតុមេប្រតិកម្មអាល់កុលត្រូវបានបន្ថែមលើក្លរីឌីមេទីលស៊ុលផុកស៊ីត នៅពេលដែលក្រុមឌីមេទីលស៊ុលផុកស៊ីតត្រូវបានបញ្ចូលជាក្រុមចាកចេញនៅលើអុកស៊ីសេនអ៊ីដ្រូកស៊ីល។ ទី៣ គេបន្ថែមអាមីនជាបាសដើម្បីជំរុញប្រតិកម្មបណ្តាច់។


➤ ចលនការប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម Swern

ដំណាក់កាលទី១៖



DMSO និងអុកសាលីលក្លរធ្វើប្រតិកម្មបង្កើតអំបិលក្លរីឌីមេទីលស៊ុលផុកស៊ីត


ដំណាក់កាលទី២៖



អាល់កុល 1° ឬ 2° ប្រតិកម្មជាមួយ អំបិល ស៊ុលផូនីញ៉ូម ដោយបញ្ចូល ក្រុមចាកចេញ លើអាតូមអុកស៊ីសែន អាល់កុល និងមាន ការបាត់បង់ប្រូតុងអ៊ីដ្រូស៊ីល

ឥទ្ធិអុកស៊ីសែនចងជាមួយ ក្រុម ចាកចេញដែលអាចបាត់ បង់ក្នុង ប្រតិកម្មបណ្តាច់

ដំណាក់កាលទី៣៖




បាត់មួយ (តែងតែជាទ្រីមេទីលអាមីន ឬឌីអ៊ីសូប្រូពីល អាមីន) ដកយកអាតូម អ៊ីដ្រូសែនមួយពីក្រុមមេទីល ដែលភ្ជាប់ ជាមួយស្ថាន់ជីមានបន្ទុកវិជ្ជមាន

ក្រុមមេទីលអាញ៉ុងដកប្រូតុងមួយពីកាបូនអាល់កុល បង្កើតម្ព័ន្ធ π $C=O$ ឌីមេទីលស៊ុលផូនីញ៉ូមចាកចេញជាក្រុមចាកចេញមួយបង្កើត ជាផលិតផលរងអុកស៊ីតកម្ម

វេអាក់ទីបផ្សេងទៀតក្រៅពីអុកសាស៊ីលក្លរ រួមមានទ្រីក្លុយអ៊ុរអាសេទិចអាស៊ីត ត្រូវបានប្រើដើម្បី បង្កើតអំបិលឌីមេទីលស៊ុលផូនីញ៉ូមសម្រាប់ប្រតិកម្មជាមួយអាល់កុល។


លំហាត់អនុវត្ត៩២.៤៖ ចូរឱ្យផលិតផលអុកស៊ីតកម្មរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



៤.៣ អុកស៊ីតកម្មរេនីតក្រូមិច (H₂CrO₄)

អុកស៊ីតកម្មដែលទាក់ទងនឹងវេអាក់ទីបក្រុម (VI) ដូចជា H₂CrO₄ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្ត ហើយត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ប្រតិកម្មទាំងនេះទាក់ទងនឹងការកើតអេស្ទរក្រម៉ាត និងដំណាក់ កាលបណ្តាច់ស្រដៀងគ្នានឹងចលនការទូទៅ ដូចបានបង្ហាញក្នុងផ្នែកក។ ក្រុម(VI)ជាសមាសធាតុកាស៊ីណូ សែន (បង្គុមហារីក) មួយ និងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់លើបរិស្ថាន។ មូលហេតុនេះហើយ វិធីសាស្ត្រដូចជា អុកស៊ីតកម្ម Swern និងវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតកាន់តែមានសារសំខាន់។

វ៉ែអាក់ទីប Jones គឺជាប្រភពនៃ H_2CrO_4 ដ៏ល្បីល្បាញមួយ ជាប្រភេទអុកស៊ីតកម្មក្រូម(VI)។ វាអាចត្រូវបានទង្វើដោយដាក់ CrO_3 ឬ Na_2CrO_4 ទៅក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលផ្សិចរាវ។ វ៉ែអាក់ទីប Jones ត្រូវបានប្រើដោយបន្ថែមទៅកាន់សូលុយស្យុងអាល់កុល ឬអាល់ដេអ៊ីតក្នុងអាសេតូន ឬអាស៊ីតអេសេទិច (ធាតុរំលាយដែលមិនអាចរងអុកស៊ីតកម្ម)។ អាល់កុលថ្នាក់ទី១រងអុកស៊ីតកម្មទៅជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចតាមរយៈអាល់ដេអ៊ីតអ៊ីដ្រាត។ អាល់កុលថ្នាក់ទី២រងអុកស៊ីតកម្មទៅជាសេតូន។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នៃប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មដោយប្រើវ៉ែអាក់ទីប Jones ។




ស៊ីក្លូអុកតាណុល

ស៊ីក្លូអុកតាណុន (92-96%)

ដូចដែលបានលើកឡើងរួចហើយ ចលនការអុកស៊ីតកម្មក្រូម៉ាតដំបូងទាក់ទងនឹងការកើតអេស្តែរក្រូម៉ាតមួយ និងអាល់កុល។ បន្ទាប់មកម៉ូលេគុលមួយនៃ H_2CrO_3 ដើរតួជាក្រុមចាកចេញមួយក្នុងដំណាក់កាលប្រតិកម្មបណ្តាច់ដែលបង្កើតសម្ព័ន្ធ $C=O$ របស់សមាសធាតុកាបូនីល។

➤ **ចលនការប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មអាស៊ីតក្រូមិច**


ដំណាក់កាលទី១៖ ការកើតអេស្តែរក្រូម៉ាត



អាល់កុល 1° ឬ 2° ប្រតិកម្មជាមួយ អាស៊ីតក្រូមិច
បង្កើតអេស្តែរក្រូម៉ាតមួយ បោះបង់ទឹក បញ្ចូល
ក្រុមចាកចេញលើ អុកស៊ីសែនអាល់កុល

ឥឡូវអុកស៊ីសែនចងក្រុមចាកចេញ មួយ
ដែលអាចបោះបង់ក្នុងប្រតិកម្ម បណ្តាច់មួយ

ដំណាក់កាលទី២៖ អុកស៊ីតកម្មដោយបណ្តាច់នៃ H_2CrO_4




ម៉ូលេគុលទឹកមួយដកប្រូតុងមួយពី

កាបូន អាល់កុល បង្កើតសម្ព័ន្ធ $C=O$ អាតូមក្រុមរងអុកស៊ីតកម្ម
នៅពេល H_2CrO_4 ចាកចេញ បង្កើតជាផលិតផលអុកស៊ីតកម្ម



សូលុយស្យុងអាស៊ីតក្រូមិចមានពណ៌ក្រហម-ទឹកក្រូច ហើយល្បាយផលិតផលដែលមាន $Cr(III)$ មានពណ៌ខៀវ។ ដូចនេះ វ៉ែអាក់ទីបដូចជាវ៉ែអាក់ទីប Jones អាចប្រើសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណបង្គំនាទី។ អាល់កុលថ្នាក់ទី១ ឬទី២ និងអាល់ដេអ៊ីតរងប្រតិកម្មយ៉ាងរហ័សដោយវ៉ែអាក់ទីប Jones ដោយប្រែពណ៌សូលុយស្យុងទៅជាខៀវបៃតងក្នុងរយៈពេល២ឬ៣វិនាទី។ បើសិនជាគ្មានក្រុមបង្គំនាទីទាំងនេះទេ (កាបូនីល)

សូលុយស្យុងនៅក្បាច់ពណ៌ក្រហម-ទឹកក្រូច លុះត្រាតែមានប្រតិកម្ម បន្ទាប់បន្សំធ្វើឱ្យមានបម្រែបម្រួលពណ៌។ បម្រែបម្រួលពណ៌នេះជាមូលដ្ឋាននៃ **ឧបករណ៍តេស្តជាតិ អាល់កុល** (breathalyzer alcohol test) ។




៤.៤ ពីរីឌីយ៉ូមក្លរ៉ូក្រូម៉ាត (PCC)

ពីរីឌីយ៉ូមក្លរ៉ូក្រូម៉ាត (PCC) ជាអំបិល Cr(IV) ដែលកើតពី ពីរីឌីន ($\text{C}_6\text{H}_5\text{N}$), HCl និង CrO_3 ។ PCC លាយក្នុងឌីក្លរូមេតាន ដូចនេះវាអាចប្រើក្រោមលក្ខខណ្ឌគ្មានទឹកបាន ដែលអាចមានប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម អាល់កុលថ្នាក់ទី១ទៅជាអាល់ដេអ៊ីត ពីព្រោះអាល់ដេអ៊ីតអ៊ីដ្រាតមិនមានវត្តមានក្រោមលក្ខខណ្ឌគ្មានទឹកនេះទេ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត វេអាក់ទីប Jones ធ្វើអុកស៊ីតកម្មអាល់កុលថ្នាក់ទី១ទៅជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចពីព្រោះវាជាវេអាក់ទីបមានទឹកមួយ។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ទូទៅនៃ អុកស៊ីតកម្ម PCC។




៤.៥ ប៉ូតាស្យូមពែរម៉ង់កាណាត (KMnO_4)

អាល់កុលថ្នាក់ទី១ និងអាល់ដេអ៊ីតអាចរងអុកស៊ីតកម្មដោយប៉ូតាស្យូមពែរម៉ង់កាណាត (KMnO_4) ទៅជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីច។ អាល់កុលថ្នាក់ទី២អាចរងអុកស៊ីតកម្មទៅជាសេតូន។ ប្រតិកម្មនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចលនការដែលបានលើកឡើងខាងលើទេ (ហើយយើងនឹងមិនសិក្សាអំពីចលនការវានៅពេលនេះដែរ)។ ប្រតិកម្មនេះតែងតែត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងសូលុយស្យុងបាសដែលអាចបង្កើតកករ MnO_2 នៅពេលប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មកើតឡើង។ បន្ទាប់ពីប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មនេះចប់ គេអាចច្រោះយក MnO_2 ចេញ ហើយច្រោះដោយធ្វើអាស៊ីតកម្ម (acidification, ធ្វើឱ្យមានមជ្ឈដ្ឋាន អាស៊ីត) ដើម្បីទទួលបានអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីច។



លំហាត់អនុវត្តន៍១២.៥៖ ចូរបង្ហាញអំពីរបៀបបម្លែងសមាសធាតុដូចខាងក្រោម៖



៤.៦ កស្មតាងស្បិចរបស់អាល់កុល

- អាល់កុលឱស្ស័យសម្រាប់វិភាគនៃចលនាទាញសម្ព័ន្ធ O – H ពី 3200cm^{-1} ទៅ 3600cm^{-1} ក្នុងស្បិចអាំងប្រាក្រហម។
- អ៊ីដ្រូសែនអ៊ីដ្រុកស៊ីលអាល់កុលបង្កើតស៊ីញ៉ាល់ ^1H NMR ដែលមានរំកិលគីមីប្រែប្រួល ហើយដែលអាចលុបបំបាត់ដោយប្រើផ្លាស់ប្តូរដោយជីតេរ៉ូមពី D_2O (តារាង៩.១)។
- អាតូមអ៊ីដ្រូសែននៅលើកាបូនអាល់កុលថ្នាក់ទី១ ឬថ្នាក់ទី២បង្កើតស៊ីញ៉ាល់ ^1H NMR ក្នុងចន្លោះ $\delta = 3.3$ ទៅ 4.4 (មើលតារាង៩.១) ដែលមានអាំងតេក្រាល 2 និង 1 រៀងគ្នា។
- ស្បិច ^{13}C NMR របស់អាល់កុលមួយបង្ហាញស៊ីញ៉ាល់មួយនៅចន្លោះ $\delta = 50$ និង 90 ចំពោះអាតូមកាបូនអាល់កុល (មើលតារាង៩.២)។

៥. សមាសធាតុសរីរាង្គលោហៈ

- សមាសធាតុដែលមានសម្ព័ន្ធកាបូន-លោហៈត្រូវបានគេហៅថា **សមាសធាតុសរីរាង្គលោហៈ** (organometallic compounds)។

លក្ខណៈរបស់សម្ព័ន្ធកាបូន-លោហៈប្រែប្រួលពីសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ុងទៅសម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់។ នៅពេលដែលទម្រង់នៃផ្នែកសរីរាង្គរបស់សមាសធាតុសរីរាង្គលោហៈមានឥទ្ធិពលលើសម្ព័ន្ធកាបូន-លោហៈ អត្តសញ្ញាណនៃលោហៈខ្លួនវានឹងកាន់តែមានសារៈសំខាន់។ សម្ព័ន្ធកាបូន-បូតាស្យូម និងកាបូន-សូដ្យូមមានលក្ខណៈអ៊ីយ៉ុងតែសម្ព័ន្ធកាបូន-សំណ កាបូន-សំណប៉ាហាំង កាបូន-តាល្យូម និងកាបូន-បារតមានលក្ខណៈកូវ៉ាឡង់។ សម្ព័ន្ធកាបូន-លីច្យូម និងកាបូន-ម៉ាញ៉េស្យូមស្ថិតនៅចន្លោះសម្ព័ន្ធទាំងពីរនេះ។

$(M = \text{Na}^+ \text{ y } \text{K}^+)$

(M = Mg ă Li)

(M=Pb, Sn, Hg ỹ Tl)


ប្រតិកម្មភាពរបស់សមាសធាតុសរីរាង្គលោហៈកើនឡើងទៅតាមលក្ខណៈអ៊ីយ៉ុងរបស់សម្ព័ន្ធកាបូន-លោហៈ។ សមាសធាតុអាល់គីលសូដ្យូម និងអាល់គីលប៉ូតាស្យូមមានប្រតិកម្មភាពខ្ពស់ ហើយជាបាសខ្លាំងណាស់។ ពួកវាប្រតិកម្មជាមួយទឹកដោយផ្ទុះជាអណ្តាតភ្លើងនៅពេលប៉ះខ្យល់។ សមាសធាតុសរីរាង្គបារត និងសរីរាង្គសំណមានប្រតិកម្មភាពខ្សោយជាងខ្លះ ពួកវាតែងតែជាសមាសធាតុរំហើរ និងស្ថេរភាពក្នុងខ្យល់។ ពួកវាជាសមាសធាតុពុលខ្លាំងណាស់។ ជាទូទៅ ពួកវារលាយក្នុងធាតុរំលាយមិនប៉ូលែ។ ឧទាហរណ៍ តេត្រាអេទីលសំណត្រូវបានគេប្រើជាសមាសធាតុប្រឆាំងការឈ្លក់ (antiknock) ក្នុងសាំង ប៉ុន្តែដោយសារតែកង្វះរបស់សំណលើបរិស្ថាន គេជំនួសវាដោយភ្នាក់ងារប្រឆាំងការឈ្លក់ផ្សេងទៀត។ ទែរប៊ុយទីលមេទីលអេទែរត្រូវបានគេបន្ថែមទៅក្នុងសាំងជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងការឈ្លក់ ទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីវត្តមានរបស់វាក្នុងបរិស្ថានក៏ដោយ។

សមាសធាតុសរីរាង្គលោហៈនៃលីចូម និងម៉ាញ៉េស្យូមមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសំយោគសរីរាង្គ។ ពួកវាមានស្ថេរភាពក្នុងសូលុយស្យុងអេទែរ ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធលោហៈ-កាបូនជាសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ុង។ ដោយសារតែលក្ខណៈអ៊ីយ៉ុងរបស់វា អាតូមកាបូនដែលចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមលោហៈនៃសមាសធាតុសរីរាង្គលីចូម ឬម៉ាញ៉េស្យូម ជាបាសខ្លាំង និងជានុយក្លេអ៊ីលខ្លាំងមួយ។ យើងនឹងឃើញប្រតិកម្មដែលបង្ហាញលក្ខណៈទាំងពីរនេះ។


៦. ទង្វើសមាសធាតុសរីរាង្គលីចូម និងម៉ាញ៉េស្យូម

៦.១ សមាសធាតុសរីរាង្គលីចូម

សមាសធាតុសរីរាង្គលីចូមតែងតែត្រូវបានទង្វើដោយប្រតិកម្មរដ្ឋកម្មអាឡូសែន្តសរីរាង្គជាមួយលោហៈ
សូដ្យូម។ គេតែងតែធ្វើប្រតិកម្មទាំងនេះក្នុងធាតុរំលាយអេទែរ ហើយដោយសារតែសមាសធាតុសរីរាង្គលីចូម
ជាបាសខ្លាំង គេត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដកសំណើមពីល្បាយប្រតិកម្ម (ហេតុអ្វី?)។ អេទែរដែលគេ
និយមប្រើជាងគេគឺឌីអេទីលអេទែរ និងតេត្រាអ៊ីដ្រូផ្កាន។




ឆ្នាំអេទីលអេទី (Et₂O)



តេត្រាអ៊ីដ្រូផ្កូរ៉ាន (THF)

- សមាសធាតុសរីរាង្គលីចូមត្រូវបានទង្វើតាមមធ្យោបាយទូទៅនេះ៖



លំដាប់ប្រតិកម្មភាពរបស់អាឡូសែនគឺ $RI > RBr > RCl$ (គេកម្រប្រើអាស់គីល និងអាវីលក្នុងអង្គការទង្វើសមាសធាតុសរីរាង្គ)។




 ប៊ុយទីលប្រូម + 2 Li $\xrightarrow[-10\text{ }^{\circ}\text{C}]{\text{Et}_2\text{O}}$ ប៊ុយទីលលីត្យូម + LiBr


 (80-90%)

៦.២ រ៉េអាក់ទីបត្រីយ៉ូន


- វេអាក់ទឹបគ្រីញ៉ាដត្រូវបានទង្វើដោយប្រតិកម្មរបស់អាឡូសែន្នសរីរាង្គមួយជាមួយលោហៈម៉ាញ៉េស្យូមក្នុងធាតុរំលាយស្ងួត (គ្មានទឹក) ៖



ទម្រង់ពិតប្រាកដរបស់វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដមានភាពស្មុគស្មាញជាងរូបមន្តទូទៅRMgXដែលបានតាង។ ការពិសោធន៍បានបង្ហាញថា វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដស្ទើរតែអស់ស្ថិតនៅក្នុងលំនឹងរវាងអាល់គីលម៉ាញ៉េស្យូមអាឡូសែន និងឌីអាល់គីលម៉ាញ៉េស្យូម។




អោកទីបត្រីញ៉ាដមួយបង្កើតកុំផ្លិចមួយជាមួយធាតុរំលាយអេទែរបស់វា ទម្រង់របស់កុំផ្លិចនេះត្រូវ
ព្យាបាលដោយក្រោម៖



ការកើតកុំផ្លិចជាមួយម៉ូលេគុលអេទែរជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងការកើត និងស្ថេរភាពរបស់វ៉ែអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ។

ចលនការនៃការកើតវ៉ែអាក់ទីបត្រីញ៉ាដមានភាពស្មុគស្មាញ ហើយមានយោបល់ផ្ទុយគ្នាជាច្រើន។ មានការយល់ស្របទូទៅមួយដែលទាក់ទងនឹងវ៉ាឌីកាល់សេរី ហើយចលនការទំនោងដូចខាងក្រោម៖



៧. ប្រតិកម្មរបស់សមាសធាតុសរីរាង្គលីចូម និងវ៉ែអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ


៧.១ ប្រតិកម្មជាមួយសមាសធាតុដែលមានអាតូមអ៊ីដ្រូសែនអាស៊ីត

- វ៉ែអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ និងសមាសធាតុសរីរាង្គលីចូមជាបានខ្លាំងណាស់។ ពួកវាប្រតិកម្មជាមួយសមាសធាតុណាដែលមានអាតូមអ៊ីដ្រូសែនចងជាមួយអាតូមអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានដូចជាអុកស៊ីសែន អាសូត ឬស្ថាន់ដឺរ។


យើងអាចយល់អំពីរបៀបដែលប្រតិកម្មទាំងនេះកើតឡើង បើសិនជាយើងតាងវ៉ែអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ និងសមាសធាតុសរីរាង្គលីចូមដូចខាងក្រោម៖



នៅពេលយើងធ្វើដូចនេះ យើងអាចឃើញថា ប្រតិកម្មនៃវ៉ែអាក់ទីបត្រីញ៉ាដជាមួយទឹក និងអាល់កុលមិនមានអ្វីក្រៅពីប្រតិកម្មអាស៊ីត-បានទេ។ ប្រតិកម្មទាំងនេះបង្កើតអាស៊ីតឆ្លាស់ និងបានឆ្លាស់ខ្សោយជាង។






បានខ្លាំងជាង អាស៊ីតខ្លាំងជាង អាស៊ីតខ្សោយជាង បានខ្សោយជាង
 $\text{pK}_a = 15.7$ $\text{pK}_a = 40 - 50$




បានខ្លាំងជាង អាស៊ីតខ្លាំងជាង អាស៊ីតខ្សោយជាង បានខ្សោយជាង
 $\text{pK}_a = 15-18$ $\text{pK}_a = 40 - 50$

លំហាត់អនុវត្តន៍១២.៦៖ ចូរឱ្យផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មអាស៊ីត-បានខាងក្រោម។ ដោយប្រើតម្លៃ pK_a ចូរបញ្ជាក់ ថាលំនឹងរំកិលទៅខាងណា និងដាក់ពាក្យអាស៊ីតខ្លាំង និងបានខ្លាំងពីក្រោមសមាសធាតុក្នុង ករណីនីមួយៗ។






លំហាត់អនុវត្តន៍១២.៧៖ ចូរឱ្យអ្នកកំណត់ទីបំផុតដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបង្កើនខាងក្រោម៖



អ្នកកំណត់ទីបំផុត និងសមាសធាតុសរីរាង្គលីចូមដកយកប្រភេទដែលមានលក្ខណៈអាស៊ីតតិចជាង អ៊ីដ្រូសែនរបស់ទឹក និងអាល់កុល។

- អ្នកកំណត់ទីបំផុតមានប្រតិកម្មជាមួយអាតូមអ៊ីដ្រូសែនចុងខ្សែរបស់ 1-អាល់ស៊ីនដោយប្រតិកម្ម អាស៊ីត-បាស ហើយប្រតិកម្មនេះជាវិធីសាស្ត្រមានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ទង្វើអាល់ស៊ីនីល ម៉ាញ៉េស្យូមអាឡូសែន និងអាល់ស៊ីនីលលីចូម។



អាល់ស៊ីនចុងខ្សែ អ្នកកំណត់ទីបំផុត អាល់ស៊ីនីលម៉ាញ៉េស្យូមអាឡូសែន អាល់កាន
(អាស៊ីតខ្លាំង $\text{pK}_a \sim 25$) (បាសខ្លាំង) (បាសខ្សោយ) (អាស៊ីតខ្សោយ $\text{pK}_a = 40-50$)



អាល់ស៊ីនចុងខ្សែ អាល់គីលលីចូម អាល់ស៊ីនីលលីចូម អាល់កាន
(អាស៊ីតខ្លាំង) (បាសខ្លាំង) (បាសខ្សោយ) (អាស៊ីតខ្សោយ)


ការពិតដែលប្រតិកម្មទាំងនេះអាចសម្រេចបានគឺមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលទេ នៅពេលយើងរំលឹកថាអាល់កានមានតម្លៃ $\text{pK}_a = 40-50$ តែអាល់ស៊ីនចុងខ្សែមានតម្លៃ $\text{pK}_a \sim 25$ (តារាង ៣.១)។

- ប្រតិកម្មដែលមានអ្នកកំណត់ទីបំផុតមានអំពើជានុយក្លេអូកីលជាប្រតិកម្មដែលមានសារសំខាន់ណាស់ ហើយយើងនឹងសិក្សានៅពេលក្រោយ។


៧.២ ប្រតិកម្មនៃអ្នកកំណត់ទីបំផុតជាមួយអេប៉ូកស៊ីត (អុកស៊ីវ៉ាន)

- អ្នកកំណត់ទីបំផុតមានអំពើជានុយក្លេអូកីល ប្រតិកម្មជាមួយអេប៉ូកស៊ីត (អុកស៊ីវ៉ាន) ផ្តល់ជាមធ្យោបាយសំយោគអាល់កុលយ៉ាងងាយស្រួលមួយ។

ក្រុមអាល់គីលនុយក្លេអូកីលនៃវ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដប្រយុទ្ធលើកាបូនវិជ្ជមានដោយផ្នែករបស់វ៉ែអ៊ែកស៊ីត។ ដោយសារតែវាមានរង្វង់ធំ ប្រតិកម្មអាចបង្កើតជាអំបិលអាល់កុកស៊ីតរបស់អាល់កុលមួយ។ បន្ទាប់មករង អាស៊ីតកម្មបង្កើតជាអាល់កុល។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ ជាមួយអុកស៊ីរ៉ាន។



- វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដធ្វើប្រតិកម្មលើអាតូមកាបូនជួសតិចរបស់វ៉ែអ៊ែកស៊ីតជួសមួយ។




៧.៣ ប្រតិកម្មនៃវ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដជាមួយសមាសធាតុកាបូនីល

- ប្រតិកម្មសំយោគសំខាន់បំផុតរបស់វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ និងសមាសធាតុសរីរាង្គលីចូមជាប្រតិកម្មដែលពួកវាមានអំពើជានុយក្លេអូកីល និងប្រយុទ្ធលើកាបូនមិនផ្អែត - ជាពិសេសកាបូនលើក្រុមកាបូនីល។


យើងបានឃើញក្នុងចំណុចទី១.ក ដែលសមាសធាតុកាបូនីលទទួលការប្រយុទ្ធពីនុយក្លេអូកីលរួចហើយ។ វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដប្រតិកម្មជាមួយសមាសធាតុកាបូនីល (អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន) តាមចលនការខាងក្រោម៖

- ចលនការប្រតិកម្មរបស់វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដប្រតិកម្ម




ចលនការ

ដំណាក់កាលទី១៖



វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាជនុយក្លេអូកីលខ្លាំងប្រើទ្វេតាអេឡិចត្រុងរបស់វាបង្កើតសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមកាបូន។ ទ្វេតាអេឡិចត្រុងរបស់ក្រុមកាបូនីលរំកិលទៅកាន់អ៊ុកស៊ីសែន។ ប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលលើក្រុមកាបូនីល បង្កើតអ៊ុយ៉ុងអាល់កុកស៊ីតមួយ រួមជាមួយអ៊ុយ៉ុង Mg^{2+} និង X^{-} ។

ដំណាក់កាលទី២៖



អាឡូម៉ាញេស្យូមអាល់កុកស៊ីត

អាល់កុល


ក្នុងដំណាក់កាលទី២ ប្រតិកម្មបូក HX រាវបណ្តាលឱ្យមានប្រូតុងកម្ម

លើអ៊ុយ៉ុងអាល់កុកស៊ីត បង្កើតជាអាល់កុល និង MgX_2

៨. អាល់កុលពីវ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាជ

ប្រតិកម្មបូកត្រីញ៉ាជលើសមាសធាតុបង្កកាបូនីលមានសារប្រយោជន៍ ពីព្រោះគេអាចប្រើពួកវាដើម្បីទង្វើអាល់កុលថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣៖


១. វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាជមានប្រតិកម្មជាមួយផរម៉ាល់ដេអ៊ីតបង្កើតអាល់កុលថ្នាក់ទី១



ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត

អាល់កុល 1°


២. វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាជប្រតិកម្មជាមួយគ្រប់អាល់ដេអ៊ីតផ្សេងទៀតបង្កើតអាល់កុលថ្នាក់ទី២



អាល់ដេអ៊ីត

អាល់កុល 2°

៣. វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាជប្រតិកម្មជាមួយសេតូនបង្កើតអាល់កុលថ្នាក់ទី៣




សេតូន





អាល់កុល 3°

៤. អេស្តែរប្រតិកម្មជាមួយវ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាជ២ម៉ូលសមមូលបង្កើតអាល់កុលថ្នាក់ទី៣ នៅពេលវ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាជមួយបូកលើក្រុមកាបូនីលនៃអេស្តែរមួយ ផលិតផលដំបូងមិនមានស្ថេរភាព ហើយបោះបង់ម៉ាញេស្យូមអាល់កុកស៊ីតបង្កើតសេតូនមួយ។ ប៉ុន្តែសេតូនមានប្រតិកម្មភាពជាមួយវ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាជខ្លាំងជាងអេស្តែរ។ ដូចនេះ នៅពេលម៉ូលេគុលសេតូនកកើតក្នុងល្បាយប្រតិកម្ម វាប្រតិកម្មជាមួយម៉ូលេគុលទីពីររបស់វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាជ។ បន្ទាប់ពីធ្វើអ៊ីដ្រូលីសផលិតផល


គឺជាអាល់កុលថ្នាក់ទី៣មានក្រុមអាល់គីលពីរដូចគ្នា ដែលជាក្រុមបានមកពីផ្នែកអាល់គីលរបស់ អ៊ីម៉ាក់ទីបត្រីញ៉ាដ។



ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃប្រតិកម្មទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១២.៨៖ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម ដោយប្រើចំណេះដឹងនៃប្រតិកម្មរបស់អេស្តេរជាមួយអ័រកាក់ទីបត្រីញ៉ាដ៖



៨.១ របៀបគ្រោងការសំយោគត្រីញ៉ាដ

យើងអាចសំយោគអាល់កុលស្ទើរតែទាំងអស់ដែលយើងចង់បានដោយប្រើអ័រកាក់ទីបត្រីញ៉ាដ។ ក្នុងការគ្រោងសំយោគត្រីញ៉ាដមួយ យើងគ្រាន់តែជ្រើសរើសអ័រកាក់ទីបត្រីញ៉ាដត្រូវ និងអាល់ដេអ៊ីត សេតូន អេស្តេរ ឬអេប៉ូកស៊ីត។ យើងធ្វើរបៀបនេះដោយពិចារណាលើអាល់កុលដែលយើងចង់បាន ហើយយកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមដែលចង់ជាមួយអាតូមកាបូនមានក្រុម-OH។ អាចមានមធ្យោបាយច្រើនក្នុងការអនុវត្តការសំយោគ។ ក្នុងករណីទាំងនេះ ជម្រើសចុងក្រោយរបស់យើងអាចកំណត់ដោយវត្តមាន និងភាពអាចរកបាននៃ សមាសធាតុផ្ដើម។ ចូរយើងពិចារណាលើឧទាហរណ៍មួយ។

សន្មត់ថា យើងចង់ទង្វើ 3-ផេនីល-3-ប៉ង់តាណុល។ យើងពិចារណាលើទម្រង់របស់វា ហើយយើងឃើញថា ក្រុមដែលចង់ជាមួយអាតូមកាបូនមានក្រុម -OH ជាក្រុមផេនីលមួយ និងក្រុមអេទីលពីរ៖




3-ផេនីល-3-ប៉ង់តាណុល


នេះមានន័យថា យើងអាចសំយោគសមាសធាតុនេះ៖

1. យើងអាចប្រើសេតូនជាមួយក្រុមអេទីលពីរ (3-ប៉ង់តាណុន) និងឱ្យវាមានប្រតិកម្មជាមួយផេនីលម៉ាញ៉េស្យូមប្រូម៖


ការកែតម្រូវសំយោគត្រលប់




ការសំយោគ



២. យើងអាចប្រើសេតូនដែលមានក្រុមអេទីលមួយ និងក្រុមផេនីលមួយ (អេទីលផេនីលសេតូន) និង ឱវ៉ាមានប្រតិកម្មជាមួយអេទីលម៉ាញ៉េស្យូមប្រូម៖
ការវិភាគសំយោគត្រលប់




ការសំយោគ




អេទីលម៉ាញ៉េស្យូមប្រូម អេទីលផេនីលសេតូន 3-ផេនីល-3-ប៉ង់តាណុល

៣. យើងអាចប្រើអេស្តែរនៃអាស៊ីតបង់សូអ៊ិច និងឱវ៉ាធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអេទីលម៉ាញ៉េស្យូមប្រូមពីរម៉ូលសមមូល៖

ការវិភាគសំយោគត្រលប់




ការសំយោគ




អេទីលម៉ាញ៉េស្យូមប្រូម មេទីលបង់សូអ៊ាត 3-ផេនីល-3-ប៉ង់តាណុល


វិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះអាចឱ្យយើងផលិតផលសមាសធាតុដែលយើងចង់បានក្នុងទិន្នផលខ្ពស់។

លំហាត់អនុវត្តន៍១២.៩៖ ចូរឱ្យការវិភាគសំយោគត្រលប់ និងការសំយោគរបស់អាល់កុលនីមួយៗខាងក្រោម ដោយចាប់ផ្តើមពីអាល់គីល ឬអាវីលអាឡូសែន្តសមស្រប។





លំហាត់អនុវត្តន៍១២.១០៖ ចូរធ្វើការវិភាគសំយោគត្រលប់ និងការសំយោគសមាសធាតុ។ សារធាតុផ្ដើមអាចជាផេនីលម៉ាញ៉េស្យូមប្រូម អុកស៊ីវ៉ាន ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត និងអាល់កុល ឬអេទែរដែលមានអាតូមកាបូន៤ ឬតិចជាង។ អ្នកអាចប្រើអ្នកកំទីបអស់រីក្លង់ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌអុកស៊ីតកម្ម ដូចជាអុកស៊ីតកម្ម Swern ឬ ពីរីឌីញ៉ូមក្លរីត្រីម៉ាត (PCC)។



៨.២ លីមីតនៃការប្រើអ្នកកំទីបត្រីញ៉ាង

ទោះបីជាអ្នកកំទីបត្រីញ៉ាងជាអ្នកកំទីបដែលល្អសម្រាប់ដំណើរការសំយោគស្ទើរតែទាំងអស់ វាក៏មានលីមីតដែរ។ លីមីតទាំងនេះស្ទើរតែទាំងអស់កើតឡើងពីលក្ខណៈដែលធ្វើឱ្យមានប្រយោជន៍គឺ *ប្រតិកម្មភាពខ្លាំងជាងនុយក្លេអូភីលមួយ និងជាបាសមួយ*។



អ្នកកំទីបត្រីញ៉ាងជាបាសខ្លាំងមួយ ៖ ដោយសារតែវាមានកាបាញ់មួយ។

- គេមិនអាចសំយោគអ្នកកំទីបត្រីញ៉ាងពីសមាសធាតុមួយដែលមានអ៊ីដ្រូសែនអាស៊ីតខ្លាំងជាង អាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់អាល់កាន ឬអាល់សែនមួយទេ។

ឧទាហរណ៍ យើងមិនអាចធ្វើអ្នកកំទីបត្រីញ៉ាងមួយពីសមាសធាតុដែលមានក្រុម -OH ក្រុម -NH ក្រុម -SH ក្រុម -CO₂H ឬ ក្រុម -SO₃H ទេ។ បើសិនជាយើងចង់ធ្វើអ្នកកំទីបត្រីញ៉ាងពីអាឡូសែន សរីរាង្គមួយដែលមានក្រុមណាមួយខាងលើការកកើតអ្នកកំទីបត្រីញ៉ាងមិនអាចកើតឡើងបានទេ (បើសិនជាអ្នកកំទីបត្រីញ៉ាងមួយកកើត វាអាចបន្ស្រាបដោយក្រុមអាស៊ីតភ្លាម)។

- ដោយសារតែអ្នកកំណត់ទីបត្រីញ៉ាដជានុយក្លេអូគីលខ្លាំង យើងមិនអាចធ្វើអ្នកកំណត់ទីបត្រីញ៉ាដមួយ ពីអាឡូសែន្នសរីរាង្គដែលមានក្រុមកាបូនីល អេប៊ុកស៊ី នីត្រូ ឬស្យាណូ ($-\text{CN}$) ទេ។

បើសិនជាយើងចង់ធ្វើប្រតិកម្មប្រភេទនេះ អ្នកកំណត់ទីបត្រីញ៉ាដដែលកើតនឹងមានប្រតិកម្មតែជាមួយសារធាតុផ្ដើមមិនរងប្រតិកម្មតែប៉ុណ្ណោះ៖



អ្នកកំណត់ទីបត្រីញ៉ាដមិនអាចធ្វើក្រោម វត្តមានក្រុមទាំងនេះ ពីព្រោះពួកវានឹងមាន ប្រតិកម្មជាមួយក្រុមទាំងនេះ


នេះមានន័យថា នៅពេលយើងធ្វើអ្នកកំណត់ទីបត្រីញ៉ាដ យើងត្រូវលើកលែងអាល់គីលអាឡូសែន្ន ឬអាឡូសែន្នសរីរាង្គដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់កាបូន-កាបូន សម្ព័ន្ធបីជាន់ សម្ព័ន្ធអេទែរ និងក្រុម $-\text{NR}_2$ ។

ប្រតិកម្មត្រីញ៉ាដរួសទៅនឹងសមាសធាតុអាស៊ីតណាស់ ដែលនៅពេលយើងធ្វើអ្នកកំណត់ទីបត្រីញ៉ាដមួយ យើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្នុងការដកសំណើមពីឧបករណ៍របស់យើង ហើយយើងត្រូវប្រើធាតុរំលាយជាអេទែរស្ងួត។

ដូចដែលយើងទើបនឹងឃើញ អ៊ីដ្រូសែនអាសេទីលេន្នជាមានលក្ខណៈអាស៊ីតគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអ្នកកំណត់ទីបត្រីញ៉ាដ។ នេះគឺជាលីមីតដែលយើងអាចប្រើ។



- យើងអាចធ្វើអ្នកកំណត់ទីបត្រីញ៉ាដអាសេទីលេនិចដោយឱ្យអាល់ស៊ីនចុងខ្សែប្រតិកម្មជាមួយអ្នកកំណត់ទីបត្រីញ៉ាដ។

បន្ទាប់មក យើងអាចប្រើអ្នកកំណត់ទីបត្រីញ៉ាដទាំងនេះដើម្បីធ្វើការសំយោគផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍៖




- នៅពេលយើងធ្វើគម្រោងសំយោគត្រីញ៉ាដមួយ យើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថា អាល់ដេអ៊ីតសេតូន អេប៊ុកស៊ីត ឬអេស្តែរណាមួយដែលយើងប្រើជាអង្គធាតុមេប្រតិកម្មមិនមានក្រុមអាស៊ីត ទេ។

បើសិនជាយើងចង់ធ្វើដូចនេះ វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដនឹងមានប្រតិកម្មដូចបានមួយ ជាមួយអ៊ីដ្រូសែន អាស៊ីត ជាជាងធ្វើប្រតិកម្មលើកាបូនកាបូនីល ឬអេប៉ូកស៊ីត ដូចនុយក្លេអូកីលមួយ។ ឧទាហរណ៍ បើសិនយើង ដាក់ 4-អ៊ីដ្រុកស៊ី-2-ប៉ូយតាណូនជាមួយមេទីលម៉ាញ៉េស្យូមប្រូម ប្រតិកម្មដែលកើតឡើងគឺ៖




បើសិនយើងចង់ទង្វើដោយចោល១ម៉ូលសមមូលនៃវ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ យើងអាចដាក់ 4-អ៊ីដ្រុកស៊ី-2-ប៉ូយតាណូនឱ្យធ្វើប្រតិកម្មជាមួយ២ម៉ូលសមមូលនៃវ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ យើងទទួលបានប្រតិកម្មបូកលើក្រុម កាបូនីល៖



ជួនកាលបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានប្រើជាប្រតិកម្មខ្នាតតូច នៅពេលវ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដមានតម្លៃថោក ហើយវ៉េអាក់ទីបផ្សេងទៀតមានតម្លៃថ្លៃ។

៨.៣ បម្រើបម្រាស់វ៉េអាក់ទីបលីចូម


វ៉េអាក់ទីបសរីរាង្គលីចូម (RLi) មានប្រតិកម្មជាមួយសមាសធាតុកាបូនីលតាមមធ្យោបាយដូចគ្នានឹង វ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ ហើយវាផ្តល់ជាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតក្នុងការទង្វើអាល់កុល។



វ៉េអាក់ទីបសរីរាង្គលីចូមមានអត្ថប្រយោជន៍ត្រង់ថាវាជាវ៉េអាក់ទីបខ្លាំងជាងវ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ ទោះបី ពួកវាមានការលំបាកក្នុងការទង្វើ និងប្រើប្រាស់ក៏ដោយ។

៨.៤ បម្រើបម្រាស់សូដ្យូមអាល់ស៊ីន






សូដ្យូមអាល់ស៊ីនក៏មានប្រតិកម្មជាមួយអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនបង្កើតអាល់កុល។ ឧទាហរណ៍មួយ បង្ហាញខាងក្រោម៖




៩. ក្រុមការពារ

- គេអាចប្រើក្រុមការពារមួយក្នុងករណីខ្លះដែលអង្គធាតុប្រតិកម្មមានក្រុមដែលមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងលក្ខខណ្ឌប្រតិកម្មចាំបាច់សម្រាប់ការបង្កើនមួយ។

ឧទាហរណ៍ បើសិនវាចាំបាច់ក្នុងការទង្វើអាក់ទីបត្រីញ៉ាដមួយពីអាល់គីលអាឡូសែនមួយដែលមានក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលអាល់កុលមួយរួចហើយ អាក់ទីបត្រីញ៉ាដនៅតែអាចទង្វើ បើសិនជាអាល់កុលត្រូវបានការពារសិនដោយការបង្កើនទៅជាក្រុមបង្គុំនាទីមួយមានស្ថេរភាពក្នុងវត្តមានអាក់ទីបត្រីញ៉ាដមួយ ដូចជា ទែរ-ប៊ុយទីលឌីមេទីលស៊ីលីល (TBS) អែរ។ បន្ទាប់មកប្រតិកម្មត្រីញ៉ាដត្រូវបានធ្វើឡើង ហើយក្រុមអាល់កុលដំបូងអាចត្រូវបានដោះមកវិញដោយការបណ្តាច់ស៊ីលីលអែរដោយអ៊ីយ៉ុងក្លរួយអួរ។ ឧទាហរណ៍ មួយគឺការសំយោគ 1,4-ប៉ង់តានឌីអុល។ យុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នានេះអាចត្រូវបានប្រើ នៅពេលអាក់ទីបសរីរាង្គ លីចូម ឬ អាញ់ដអាល់ស៊ីនត្រូវតែបានទង្វើក្រោមវត្តមាននៃក្រុមមិនអាចទ្រាំទ្របាន។ ក្នុងមេរៀនក្រោយ យើងនឹងជួបប្រទះយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដែលអាចប្រើដើម្បីការពារក្រុមបង្គុំនាទីផ្សេងទៀតក្នុងប្រតិកម្មផ្សេងៗ។



ឌីមេទីលផរម៉ាមីត
(ធាតុរំលាយប៉ូលែអាប្រូទិច)










1,4-ប៉ង់តានឌីអុល





លំហាត់មេរៀនទី១២

វ៉េអាក់ទីប និងប្រតិកម្ម


១. តើផលិតផលអ្វីដែលអ្នករំពឹងថាទទួលបានពីប្រតិកម្មរបស់អេទីលម៉ាញ៉េស្យូមប្រូម (CH₃CH₂MgBr) ជាមួយវ៉េអាក់ទីបនីមួយៗខាងក្រោម?




២. តើផលិតផលណាដែលអ្នករំពឹងថាទទួលបានពីប្រតិកម្មលីច្យូម (CH₃CH₂CH₂Li) ជាមួយវ៉េអាក់ទីបនីមួយៗខាងក្រោម?





៣. តើផលិតផល (ឬផលិតផលច្រើន) ដែលអាចកើតពីប្រតិកម្មនៃ 1-ប្រូម៉ូ-2-មេទីលប្រូប៉ាន (អ៊ីសូប៊ុយទីលប្រូម) ក្រោមលក្ខខណ្ឌនីមួយៗខាងក្រោម?

- (a) HO^- , H_2O
- (b) NC^- , ethanol
- (c) $t\text{-BuOK}$, $t\text{-BuOH}$
- (d) MeONa , MeOH
- (e) (1) Li , Et_2O ; (2) ; (3) NH_4Cl , H_2O
- (f) Mg , Et_2O , then , then H_3O^+
- (g) (1) Mg , Et_2O ; (2) ; (3) NH_4Cl , H_2O
- (h) (1) Mg , Et_2O ; (2) ; (3) H_3O^+
- (i) (1) Mg , Et_2O ; (2) ; (3) NH_4Cl , H_2O
- (j) Li , Et_2O ; (2) MeOH
- (k) Li , Et_2O ; (2) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$



៤. តើភ្នាក់ងារដុកម្ម ឬអុកស៊ីតកម្មណាដែលអ្នកត្រូវប្រើសម្រាប់ការបម្លែងខាងក្រោម?






៥. ចូរសរសេរលក្ខខណ្ឌប្រតិកម្ម និងផលិតផលពីអុកស៊ីតកម្មSwernនៃសមាសធាតុខាងក្រោម៖





៦. ចូរឱ្យផលិតផលប្រតិកម្មខាងក្រោម៖






៧. ចូរឱ្យផលិតផលសរីរាង្គពីប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មខាងក្រោម៖








៨. ចូរឱ្យផលិតផលសរីរាង្គពីប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មខាងក្រោម៖







៩. ចូរឱ្យផលិតផលសរីរាង្គដែលបានមកពីប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម និងអេដុកម្មខាងក្រោម៖




១០. ចូរឱ្យផលិតផលសរីរាង្គឧត្តមភាពពីប្រតិកម្មនីមួយៗខាងក្រោម៖






១១. ចូរឱ្យផលិតផលឧត្តមភាពរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




ចលនការប្រតិកម្ម


១២. ចូរធ្វើការសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោមពីស៊ីក្លូអិចសាណូន។ ប្រើ D ដើម្បីបញ្ជាក់អាតូមដីតេរ៉្យូម ក្នុងអ្នកកំទីប ឬធាតុរំលាយសមស្របលើកន្លែងដែលអាចជំនួសអាតូមអ៊ីដ្រូសែន។



១៣. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម។ ចូរដាក់បន្ទុកលើអាតូម និងសញ្ញាព្រួញកោងដើម្បីបង្ហាញចលនាអេឡិចត្រុងក្នុងដំណាក់កាលទាំងអស់។




១៤. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម។ អ្នកអាចប្រើ H^- តាងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រីពី $LiAlH_4$ ក្នុងចលនការរបស់អ្នក។ ចូរដាក់បន្ទុកលើអាតូម និងសញ្ញាព្រួញកោងដើម្បីបង្ហាញចលនារបស់អេឡិចត្រុងក្នុងដំណាក់កាលទាំងអស់។








ការសំយោគ

១៥. ចូរឱ្យផលិតផលសរីរាង្គ A – H ដែលអ្នករំពឹងថានឹងទទួលបានពីប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




១៦. ចូរឱ្យដំណាក់កាលសំយោគទាំងអស់ដែលអាចបម្លែង 2-ប្រូប៉ាណុល (អ៊ីសូប្រូពីលអាល់កុល) ទៅ ជាសមាសធាតុខាងក្រោម៖






១៧. ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែល 1-ប៉ង់តាណុល ត្រូវបានបម្លែងទៅជាសមាសធាតុខាងក្រោម (អ្នកអាចប្រើ វ៉េអាក់ទីបអស់រីក្សដែលត្រូវការ)។

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. 1-ប្រូម៉ូប៊ុយតាន | b. 1-ប៉ង់តែន |
| c. 2-ប៉ង់តាណុល | d. ប៉ង់តាន |
| e. 2-ប្រូម៉ូប៉ង់តាន | f. 1-អ៊ីចសាណុល |
| g. 1-អ៊ីបតាណុល | h. ប៉ង់តាណាល់ |
| i. 2-ប៉ង់តាណុន | j. អាស៊ីតប៉ង់តាណូអ៊ីច |
| k. ឌីអេទីលអេទែរ (២ផ្លូវ) | l. 1-ប៉ង់ទីន |
| m. 2-ប្រូម៉ូ-1-ប៉ង់តែន | n. ប៉ង់ទីលលីចូម |
| o. 4-មេទីល-4-ណូណាណុល | |

១៨. ចូរឱ្យវ៉េអាក់ទីបដែលត្រូវការដើម្បីបម្លែងពី (a)–(g)។ អ្នកអាចត្រូវការច្រើនជាងមួយដំណាក់កាល។



១៩. ចំពោះអាល់កុលនីមួយៗខាងក្រោម ចូរសរសេរការវិភាគសំយោគត្រលប់ និងការសំយោគដែលទាក់ទងនឹងវ៉េអាក់ទីបសរីរាង្គលោហៈ (អាចជាវ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ ឬវ៉េអាក់ទីបអាល់គីលលីចូម)



សរសេរ

សង្ខេប និងរំលឹក

ខ្សែសំយោគរាល់កុល និងសមាសធាតុកាបូនីល

១. ប្រតិកម្មរេដុកម្យកាបូនីល

- អាល់ដេអ៊ីតទៅអាល់កុលថ្នាក់ទី១
- សេតូនទៅអាល់កុលថ្នាក់ទី២
- អេស្តែរទៅអាល់កុល
- អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចទៅអាល់កុលថ្នាក់ទី១

អង្គធាតុមេប្រតិកម្ម	តួអង្គចាររេដុកម្យ	
	NaBH_4	LiAlH_4 (LAH)
អាល់ដេអ៊ីត	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H} \xrightarrow{[\text{H}]} \text{R}-\underset{\text{H}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{H}$	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H} \xrightarrow{[\text{H}]} \text{R}-\underset{\text{H}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{H}$
សេតូន	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}' \xrightarrow{[\text{H}]} \text{R}-\underset{\text{H}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{R}'$	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}' \xrightarrow{[\text{H}]} \text{R}-\underset{\text{H}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{R}'$
អេស្តែរ	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OR}' \xrightarrow{[\text{H}]} \text{---}$	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OR}' \xrightarrow{[\text{H}]} \text{R}-\underset{\text{H}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{H} + \text{R}'-\text{OH}$
អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH} \xrightarrow{[\text{H}]} \text{---}$	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH} \xrightarrow{[\text{H}]} \text{R}-\underset{\text{H}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{H}$


២. ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មរាល់កុល

- អាល់កុលថ្នាក់ទី១ទៅអាល់ដេអ៊ីត
- អាល់កុលថ្នាក់ទី២ទៅសេតូន
- អាល់កុលថ្នាក់ទី៣ទៅអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច

អង្គធាតុមេប្រតិកម្ម	តួអង្គចារអុកស៊ីតកម្ម[O]		
	Swern/PCC	aq. H_2CrO_4	aq. KMnO_4
អាល់កុល ១°	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH} \xrightarrow{[\text{O}]} \text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH} \xrightarrow{[\text{O}]} \text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH} \xrightarrow{[\text{O}]} \text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$
អាល់កុល ២°	$\text{R}-\underset{\text{OH}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{R}' \xrightarrow{[\text{O}]} \text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}'$	$\text{R}-\underset{\text{OH}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{R}' \xrightarrow{[\text{O}]} \text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}'$	$\text{R}-\underset{\text{OH}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{R}' \xrightarrow{[\text{O}]} \text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}'$
អាល់កុល ៣°	$\text{R}-\underset{\text{OH}}{\underset{ }{\text{C}}}(\text{R}')(\text{R}'') \xrightarrow{[\text{O}]} \text{---}$	$\text{R}-\underset{\text{OH}}{\underset{ }{\text{C}}}(\text{R}')(\text{R}'') \xrightarrow{[\text{O}]} \text{---}$	$\text{R}-\underset{\text{OH}}{\underset{ }{\text{C}}}(\text{R}')(\text{R}'') \xrightarrow{[\text{O}]} \text{---}$

៣. ប្រតិកម្មបង្កើតសម្ព័ន្ធភាសន-ភាសន

- ការកើតអាញ់ដាល់ស៊ីន
- ការកើតអ៊ែកទីបត្រីញ៉ាដ
- ការកើតអ៊ែកទីបអាល់គីលលីចូម
- ប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលលើអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន
- ប្រតិកម្មបើកវង់នុយក្លេអូកីលនៃអេប៉ូកស៊ីត




មេរៀនទី១៣

ប្រព័ន្ធគ្រាស់មិនឆ្អែត

១. សេចក្តីផ្តើម

ប្រព័ន្ធគ្រាស់ (conjugated systems) ទាក់ទងនឹងអាតូមមួយមានអរ័ប៊ីតាល់ p នៅជាប់នឹងសម្ព័ន្ធ π ។ អាតូមនៅជាប់គ្នាជាមួយអរ័ប៊ីតាល់ p អាចជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធ π ដូចជាក្នុង 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន ឬ អង្គធាតុកណ្តាល រ៉ាឌីកាល់សេរី កាចុង ឬអាញ៉ុងមួយ។ បើសិនជាឧទាហរណ៍មួយបានមកពីក្រុមប្រូប៉ែនីលឈ្មោះអសធារណៈរបស់ របស់ក្រុមនេះគឺអាលីល។ ជាទូទៅនៅពេលយើងពិចារណាលើរ៉ាឌីកាល់សេរី កាចុង ឬ អាញ៉ុង ដែលនៅជាប់សម្ព័ន្ធ π មួយ ឬច្រើនក្នុងមូលេគុលមួយក្រៅពីប្រូប៉ែន ទីតាំងនៅជាប់នេះត្រូវបានគេហៅថាអាលីលិច។ យើងបង្ហាញរូបមន្តប៊ុយតាឌី អែន អ៊ីប៊្រីតស្តេណុងរបស់រ៉ាឌីកាល់សេរីអាលីល និងកាបូកាចុង អាលីលិច និងតំណាងអរ័ប៊ីតាល់មូលេគុលតាងឱ្យ មូលេគុលនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម។



ប្រតិកម្មជំនួសរ៉ាឌីកាល់សេរីនៅលើទីតាំងអាលីលិចមួយ ដូចដែលយើងឃើញក្នុងមេរៀនទី១០ ត្រូវបាន សម្របសម្រួលយ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះអង្គធាតុកណ្តាលរ៉ាឌីកាល់សេរីជាផ្នែកមួយរបស់ប្រព័ន្ធគ្រាស់មួយ។

២. ស្ថេរភាពរបស់រ៉ាឌីកាល់សេរីអាលីល


ការពន្យល់ពីស្ថេរភាពរបស់រ៉ាឌីកាល់សេរីអាលីលអាចត្រូវបានគេធ្វើឡើងតាមមធ្យោបាយពីរ៖ តាមទ្រឹស្តី អរ័ប៊ីតាល់មូលេគុល និងតាមទ្រឹស្តីស្ថេណុង។ ដូចដែលយើងនឹងឃើញ យុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនេះអាចធ្វើឱ្យយើង បរិយាយពីរ៉ាឌីកាល់សេរីអាលីល។ ទ្រឹស្តីអរ័ប៊ីតាល់មូលេគុលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសង្កេតជាង ដូចនេះយើង ចាប់ផ្តើមដោយប្រើវា។

២.១ ការបរិយាយអរ័ប៊ីតាល់មូលេគុលនៃរ៉ាឌីកាល់សេរីអាលីល

នៅពេលអាតូមអ៊ីដ្រូសែនអាលីលត្រូវបានដកចេញពីប្រូប៉ែន (មើលដ្យាក្រាមខាងក្រោម) អាតូមកាបូន sp^3 នៃក្រុមមេទីលប្រែប្រួលភាពអ៊ីប្រីតកម្មទៅជា sp^2 (មើលមេរៀនទី១០ ផ្នែកទី៦)។ អរ័ប៊ីតាល់ p របស់អាតូមកាបូន អ៊ីប្រីត sp^2 គ្របដណ្តប់ជាមួយអរ័ប៊ីតាល់ p របស់អាតូមកាបូនមណ្ឌល។

- ក្នុងរ៉ាឌីកាល់សេរីអាលីល អរ័ប៊ីតាល់ p បីគ្របដណ្តប់បង្កើតឈុតមួយនៃអរ័ប៊ីតាល់មូលេគុល π ដែល រំពៃអាតូមកាបូនទាំងបី។

- អរ័ប៊ីតាល់p បង្កើនរ៉ាឌីកាល់សេរីត្រូវបានគេនិយាយថាជា *ស្របជាមួយសម្ព័ន្ធពីជាន់* ហើយរ៉ាឌីកាល់សេរីត្រូវបានគេនិយាយថាជា **ប្រព័ន្ធស្របជាមួយមិនព្រួត** (conjugated unsaturated system) ។
- អេឡិចត្រុងសេរីនៃរ៉ាឌីកាល់សេរីអាស៊ីល និងអេឡិចត្រុងពីរនៃសម្ព័ន្ធពីជាន់មិនបោះទីតាំងលើអាតូមកាបូនបី។



អរ័ប៊ីតាល់អ៊ីដ្រូសែន


អន្តរភាព

រ៉ាឌីកាល់អាស៊ីលមិនដោកនៃឆ្នាំង

ការមិនដោកនៃអេឡិចត្រុងសេរីធ្វើឱ្យរ៉ាឌីកាល់សេរីអាស៊ីលមានស្ថេរភាពខ្ពស់ បើប្រៀបធៀបជាមួយរ៉ាឌីកាល់សេរីថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣។ ទោះបីការមិនដោកនៃឆ្នាំងកើតឡើងក្នុងរ៉ាឌីកាល់សេរីថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ក៏ដោយ ការមិនដោកនៃឆ្នាំងនេះមិនមានឥទ្ធិពលទេ ពីព្រោះវាកើតឡើងតែតាមផលអ៊ីពែរកុងជូកាស្យុង (មេរៀនទី៦ ផ្នែកទី១១) តាមសម្ព័ន្ធប៉ូណ្ល្កៈ។


ដ្យាក្រាមក្នុងរូប១៣.១២បង្ហាញពីរបៀបដែលអរ័ប៊ីតាល់p នៃរ៉ាឌីកាល់អាស៊ីលផ្គុំចូលគ្នា បង្កើតជាអរ័ប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលπ បី។ (ចូរចងចាំថា : ចំនួនអរ័ប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលដែលកើតឡើងតែងតែមានចំនួនស្មើទៅនឹងអរ័ប៊ីតាល់អាតូមដែលផ្គុំគ្នានោះ (មេរៀនទី១ ផ្នែកទី១១) ។ អរ័ប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលសម្ព័ន្ធពីជាន់ មានថាមពលទាបជាងគេរ៉ាំរ៉ៃអាតូមទាំងបី និងមានអេឡិចត្រុង១គូមានស្ថានប្រាស។ អរ័ប៊ីតាល់π សម្ព័ន្ធបានមកពីអរ័ប៊ីតាល់p មានឡបផាស ដូចគ្នាគ្របដណ្តប់គ្នាបស់អាតូមកាបូនពីរជាប់គ្នា។ ការគ្របដណ្តប់បែបនេះបង្កើនដង់ស៊ីតេ អេឡិចត្រុងπ ក្នុងតំបន់ចន្លោះអាតូមដែលត្រូវការវាចងសម្ព័ន្ធ។ អរ័ប៊ីតាល់π មិនសម្ព័ន្ធមានអេឡិចត្រុងសេរីមួយ ហើយវាមានល្បឿននៅលើអាតូមកាបូនមណ្ឌល។ ល្បឿននេះមានន័យថា អេឡិចត្រុងសេរីនេះមានទីតាំងរីកលើកាបូន 1 និង 3 ប៉ុណ្ណោះ។ អរ័ប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលπ បង្កើតឡើងនៅពេលឡបអរ័ប៊ីតាល់មានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាគ្របដណ្តប់គ្នា រវាងអាតូមកាបូនជាប់គ្នា។ ការគ្របដណ្តប់នេះមានន័យថា ក្នុងអរ័ប៊ីតាល់បង្កើតសម្ព័ន្ធពីជាន់ មានល្បឿនមួយចន្លោះគូ អាតូមកាបូននីមួយៗ។ អរ័ប៊ីតាល់បង្កើតសម្ព័ន្ធរបស់រ៉ាឌីកាល់សេរីអាស៊ីលមានថាមពលខ្ពស់ជាងគេ ហើយវានៅ ទំនេរក្នុងភាពត្រឹមរបស់រ៉ាឌីកាល់សេរីនេះ។

យើងអាចបង្ហាញរូបភាពរបស់រ៉ាឌីកាល់សេរីតាមទ្រឹស្តីអរ័ប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលដូចខាងក្រោម៖



យើងប្រើបង្ហាញដាច់ដើម្បីសម្គាល់កាបូន-កាបូនទាំងពីរដែលជាសម្ព័ន្ធពីជាន់ដោយផ្នែក។ តាមរូបនេះ ទ្រឹស្តីអរ័ប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលប្រាប់យើងថា៖ មានសម្ព័ន្ធពីជាន់មួយដែលចូលរួមបង្កើតដោយអាតូមកាបូនបី។ យើងក៏បាន

ជាកំណត់ 1/2 ក្បែរអាតូម C1 និង C3ដែរ។ តំណាងនេះតាងឱ្យអ្វីដែលទ្រឹស្តីម៉ូលេគុលទី២ប្រាប់យើងថា៖ ដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងពីអេឡិចត្រុងសេរីស្ថិតនៅលើអាតូម C1 និង C3។ ចុងក្រោយ ភាពគ្រប់គ្រាន់របស់រូប អរ្វីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលនៃវ៉ាន់ដេរីកាល់សេរីអាស៊ីតគឺ៖ ចុងទាំងពីររបស់វ៉ាន់ដេរីកាល់សេរីគឺសមមូលគ្នា។



អរ្វីប៊ីតាល់អាតូម
 ψ


អរ្វីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល
 ψ (ដ្យាក្រាម)

អរ្វីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល
 ψ (គណនា)


រូប១៣.១ បន្សំនៃអរ្វីប៊ីតាល់អាតូម p បីបង្កើតជាអរ្វីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល π បីក្នុងវ៉ាន់ដេរីកាល់សេរីអាស៊ីត។

២.២ ការបរិយាយស្តង់ដារនៃវ៉ាន់ដេរីកាល់សេរីអាស៊ីត

ទម្រង់មួយដែលយើងអាចសរសេរឱ្យវ៉ាន់ដេរីកាល់សេរីអាស៊ីតគឺ A ៖



ប៉ុន្តែ យើងអាចសរសេរទម្រង់សមមូលមួយទៀតគឺ B ៖




ក្នុងការសរសេរទម្រង់របស់ B យើងមិនមានន័យថា យើងយកម៉ូលេគុល A មកត្រលប់នោះទេ។ យើងមិនបានរំកិលណ្វៃយ៉ូទេ។ អ្វីដែលយើងធ្វើគឺរំកិលអេឡិចត្រុងតាមមធ្យោបាយបានយោងក្រោម៖



ទ្រឹស្តីអេសូណង់ប្រាប់យើងថា នៅពេលអាចសរសេរទម្រង់ពីរបស់ប្រភេទគីមីមួយ ដែលខុសគ្នាតែទីតាំងអេឡិចត្រុង ហើយប្រភេទគីមីនោះមិនអាចតាងដោយទម្រង់មួយណាតែឯងបានទេ ប៉ុន្តែអាចតាងដោយអ៊ីប៊្រីតរបស់ទម្រង់ទាំងពីរ។ យើងតាងអ៊ីប៊្រីតតាមមធ្យោបាយពីរ។ យើងអាចតាងទាំងទម្រង់ A និង B និងភ្ជាប់ពួកវាដោយសញ្ញាព្រួញក្បាលសងខាង ដែលសញ្ញាព្រួញពិសេសតាងឱ្យទម្រង់អេសូណង់៖



ឬយើងអាចសរសេរទម្រង់តែមួយគឺ C ដែលជាល្បាយនៃទម្រង់អេសូណង់ទាំងពីរ៖



បន្ទាប់មក យើងឃើញថា ទ្រឹស្តីអេសូណង់អាចឱ្យយើងទទួលបាននូវរូបភាពវ៉ាឌីកាល់សេរីអាស៊ីលដូចគ្នាទៅនឹងរូបភាពដែលយើងទទួលបានពីទ្រឹស្តីអរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល។ ទម្រង់ C បរិយាយអំពីសម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូននៃវ៉ាឌីកាល់សេរីអាស៊ីលជាសម្ព័ន្ធពីរជាន់ដោយផ្នែក។ ទម្រង់អេសូណង់ A និង B ក៏ប្រាប់យើងថា អេឡិចត្រុងសេរីមានតែនៅលើអាតូម C1 និង C3។ យើងបញ្ជាក់វាដោយដាក់ δ^+ ក្បែរ C1 និង C3។ ដោយសារ តែទម្រង់អេសូណង់ A និង B សមមូលគ្នា ដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងពីអេឡិចត្រុងសេរីត្រូវបានដាក់រួមស្មើគ្នារវាង C1 និង C3។

ក្នុងមួយទៀតក្នុងទ្រឹស្តីអេសូណង់មានដូចខាងក្រោម៖

- នៅពេលទម្រង់អេសូណង់សមមូលជាច្រើនអាចត្រូវបានសរសេរតាងឱ្យប្រភេទគីមីមួយ ប្រភេទគីមីនោះមានស្ថេរភាពជាងប្រភេទគីមីដែលមានទម្រង់អេសូណង់តែមួយ។


បើសិន យើងពិចារណាលើ A ឬ B តែឯង យើងអាចសម្រេចខុសថា វាដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាឌីកាល់សេរីថ្នាក់ទី១។ ដូចនេះ យើងអាចប៉ាន់ស្មានស្ថេរភាពរបស់វ៉ាឌីកាល់សេរីអាស៊ីលថាជាវ៉ាឌីកាល់សេរីថ្នាក់ទី១។ ធ្វើដូច្នេះ យើងមិនអាចប៉ាន់ស្មានស្ថេរភាពរបស់វ៉ាឌីកាល់សេរីអាស៊ីលបានទេ។ ប៉ុន្តែ ទ្រឹស្តីអេសូណង់ប្រាប់យើងថា ដោយសារតែ A និង B ជា ទម្រង់អេសូណង់សមមូលគ្នា វ៉ាឌីកាល់អាស៊ីលគួរតែមានស្ថេរភាពជាងវ៉ាឌីកាល់សេរីថ្នាក់ទី១។ ទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានបង្ហាញដោយពិសោធន៍ ៖ វ៉ាឌីកាល់សេរីអាស៊ីលមានស្ថេរភាពខ្លាំងជាងវ៉ាឌីកាល់សេរីថ្នាក់ទី៣។

យើងអាចកត់ចង្អុលថា ទម្រង់មួយដែលមានអេឡិចត្រុងសេរីស្ថិតនៅលើអាតូមកាបូនមណ្ឌលនៃប្រព័ន្ធអាស៊ីល ដូចបានបង្ហាញពេលនេះ វាមិនមែនជាទម្រង់អេសូណង់ពិតប្រាកដ ពីព្រោះទ្រឹស្តីអេសូណង់ កំណត់ថា ទម្រង់អេសូណង់ត្រូវបានតែមានចំនួនអេឡិចត្រុងសេរីដូចគ្នា។ ទម្រង់នេះបង្ហាញអេឡិចត្រុងសេរីពីតែទម្រង់អេសូណង់ផ្សេងទៀតរបស់វ៉ាឌីកាល់សេរីអាស៊ីលមានអេឡិចត្រុងសេរីតែមួយ។



ទម្រង់អេសូណង់មិនត្រឹមត្រូវ

លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.១៖ ចូរពិចារណាលើអាស៊ីលីចប្រូមនៃស៊ីក្លូអ៊ីតសែនមួយដែលគេសម្គាល់ស្លាក C3 ដោយ ^{13}C ។ ដោយមិនគិតពីស្ថេរ៉េអូអ៊ីសូមែរ តើផលិតផលអ្វីដែលយើងទទួលបានពីប្រតិកម្មនេះ?




៣. កាចុងអាស៊ីល

កាបូកាចុងអាចជាកាបូកាចុងអាស៊ីលផងដែរ។


- កាចុងអាស៊ីល (ប្រូប៉េនីល) មានស្ថេរភាពជាងកាបូកាចុងថ្នាក់ទី២ និងមានស្ថេរភាពដូចកាបូកាចុងថ្នាក់ទី៣មួយ។

លំដាប់ស្ថេរភាពកាបូកាចុង៖





ការបរិយាយអរ័បីតាល់ម៉ូលេគុលនៃកាចុងអាស៊ីលគឺលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូប១៣.២។

អរ័បីតាល់ម៉ូលេគុល π សម្ព័ន្ធរបស់កាចុងអាស៊ីលគឺល ដូចអរ័បីតាល់ម៉ូលេគុលរ៉ាឌីកាល់អាស៊ីលដែរ (រូប ១៣.១) មានអេឡិចត្រុងគូស្តីនពីរ។ តែអរ័បីតាល់ម៉ូលេគុល π មិនសម្ព័ន្ធរបស់កាចុងអាស៊ីលនៅទេ។ ទ្រឹស្តីរេសូណង់បង្ហាញកាចុងអាស៊ីលជាអ៊ីប្រីតមួយនៃទម្រង់ D និង E ដែលតាងដូចខាងក្រោម៖



ដោយសារតែ D និង E ជាទម្រង់រេសូណង់សមមូល ទ្រឹស្តីរេសូណង់អាចទស្សន៍ទាយថាកាចុងអាស៊ីល អាចមានស្ថេរភាពខុសពីធម្មតា។ ដោយសារតែបន្ទុកវិជ្ជមានស្ថិតនៅលើ C3 ក្នុង D និងលើC1 ក្នុងE ទ្រឹស្តីរេសូណង់ប្រាប់យើងថាបន្ទុកវិជ្ជមានគួរតែមិនដៅកន្លែងលើអាតូមកាបូនទាំងពីរ។ C2មិនមានបន្ទុកវិជ្ជមានទេ។ ទម្រង់អ៊ីប្រីត F បង្ហាញបន្ទុក និងសម្ព័ន្ធពីទម្រង់រេសូណង់D និង E ទាំងពីរ។





រូប១៣.២ អរ័ប័តាល់ម៉ូលេគុល π របស់កាចុងអាលីល

លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.២៖

- a. ចូរគូរទម្រង់រេសូណង់របស់កាចុងកាចុងដែលកើតពី (E)-2-ប៊ុយតែនីលទ្រីក្លុយអ័រមេតានស៊ុលផូណាត៖



- b. ទម្រង់រេសូណង់មួយរបស់កាចុងកាចុងនេះអាចជាទម្រង់រេសូណង់ចូលរួមសំខាន់ជាងគេបង្កើតជាអ៊ីប៊្រីតរេសូណង់ជាងផ្សេងទៀត។ តើវាជាទម្រង់រេសូណង់មួយណា?
- c. តើផលិតផលអ្វីដែលអ្នករំពឹងថានឹងទទួលបាន បើសិនជាកាចុងកាចុងនេះមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ុយ៉ុង ក្លរ?


៤. រំលឹកទ្រឹស្តីរេសូណង់

យើងបានប្រើទ្រឹស្តីរេសូណង់ក្នុងមេរៀនមុនរួចហើយ ហើយយើងនឹងប្រើវាយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងមេរៀននេះ ពីព្រោះយើងចង់បរិយាយអំពីការលំដាប់ និងអ៊ុយ៉ុងដោយអេឡិចត្រុងមិនដោកន្លែង (ឬបន្ទុក) ក្នុងសម្ព័ន្ធអ្វី។ ទ្រឹស្តីរេសូណង់មានអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសជាមួយប្រព័ន្ធដូចនេះ ហើយយើងនឹងប្រើវាម្តងហើយម្តងទៀត ក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ទៀត។ ក្នុងមេរៀនទី១ផ្នែកទី៨ យើងបានលើកឡើងពីសេចក្តីផ្តើមនៃទ្រឹស្តីរេសូណង់ និងការបង្ហាញជំហ្លួងអំពីក្បួនខ្លះសម្រាប់សរសេរទម្រង់រេសូណង់។ ឥឡូវនេះ វាក៏គួរតែមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការរំលឹក និងពង្រីកបន្ថែម

លើក្បួនទាំងនោះ រួមទាំងក្បួនសម្រាប់ប៉ាន់ស្មានរបាយនៃទម្រង់មួយដែលបង្កើតជាទម្រង់ អ៊ីប៊ីតសរុប ដើម្បីធ្វើការសិក្សាអំពីស្ថេរភាពកាបូកាចុង និងវ៉ាឌីកាល់សេរី និងការយល់អំពីប្រព័ន្ធគ្នាស់។


៤.១ របៀបសរសេរទម្រង់រេសូណង់

- ទម្រង់រេសូណង់មានតែនៅលើក្រដាសទេ។ ទោះបី ពួកវាមិនមានពិតប្រាកដដឹងដោយទម្រង់រេសូណង់ មានអត្ថប្រយោជន៍ពីព្រោះពួកវាអាចឱ្យយើងបរិយាយម៉ូលេគុល វ៉ាឌីកាល់សេរី និង អ៊ីយ៉ុងនៅពេលទម្រង់ឡើយស្ថិតមួយមិនគ្រប់គ្រាន់។ ប៉ុន្តែ យើងសរសេរទម្រង់ឡើយស្ថិតពីរ ឬច្រើន ដែលយើងហៅពួកវាថា ទម្រង់រេសូណង់ ឬអ្នកឱ្យរបាយរេសូណង់។ យើងភ្ជាប់ទម្រង់ទាំងនេះ ដោយប្រើសញ្ញាព្រួញក្បាលសងខាង ($\longleftrightarrow$) ហើយយើងនិយាយថា អ៊ីប៊ីតរបស់ពួកវាទាំងអស់តាងឱ្យម៉ូលេគុល វ៉ាឌីកាល់សេរី ឬអ៊ីយ៉ុងពិតប្រាកដ។
- ក្នុងការសរសេរទម្រង់រេសូណង់ យើងអាចរំកិលតែអេឡិចត្រុងតែប៉ុណ្ណោះ។ ទីតាំងណ្វៃយ៉ូរបស់ អាតូមត្រូវតែនៅរក្សាកន្លែងដែលក្នុងគ្រប់ទម្រង់រេសូណង់ទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ទម្រង់៣ មិន មែនជា ទម្រង់រេសូណង់របស់កាបូនអាស៊ីលទេ ពីព្រោះដើម្បីបង្កើតវា យើងត្រូវរំកិលអាតូមអ៊ីដ្រូសែន មួយមួយ ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិទេ៖



ជាទូទៅ នៅពេលយើងរំកិលអេឡិចត្រុង យើងរំកិលតែអេឡិចត្រុងរបស់សម្ព័ន្ធអ៊ីប៊ីត (π ឧទាហរណ៍ខាងលើ) និងទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីប៉ុណ្ណោះ។

- ទម្រង់រេសូណង់ទាំងអស់ត្រូវតែជាទម្រង់ឡើយស្ថិតត្រឹមត្រូវ។ ឧទាហរណ៍ យើងមិនអាចសរសេរទម្រង់រេសូណង់ដែលអាតូមកាបូនមានសម្ព័ន្ធទេ៖



- ទម្រង់រេសូណង់ទាំងអស់ត្រូវតែមានអេឡិចត្រុងសេរីដូចគ្នា។ ទម្រង់នៅខាងស្តាំនេះមិនមែនជា ទម្រង់រេសូណង់ត្រឹមត្រូវរបស់វ៉ាឌីកាល់សេរីអាស៊ីលទេ ពីព្រោះវាមានអេឡិចត្រុងសេរី៣ តែវ៉ាឌីកាល់សេរីអាស៊ីលមានអេឡិចត្រុងសេរីតែ១៖



៥. អាតូមជាផ្នែករបស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រុងក្នុងមិនដោកនៃទាំងអស់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងប្លង់មួយ ឬស្មើរតែ ប្លង់ រួម។ ឧទាហរណ៍ 2,3-ឌីអ៊ែរ-ប៊ុយទីល-1,3-ប៊ុយតាឌីអែនមានលក្ខណៈដូចឌីអែនមិនធ្លាស់មួយ ពីព្រោះក្រុមអ៊ែរ-ប៊ុយទីលជំរុញទម្រង់ និងរារាំងសម្ព័ន្ធពីរជាន់មិនឱ្យស្ថិតក្នុងប្លង់រួមគ្នា។ ដោយសារ តែពួកវាមិនស្ថិតក្នុងប្លង់រួម អរីប៊ីតាល់របស់C2 និងC3មិនគ្របដណ្តប់គ្នា ហើយភាពមិនដោកនៃ (អសូណង់) ត្រូវបានរារាំង៖




2,3-ឌីអ៊ែរ-ប៊ុយទីល-1,3-ប៊ុយតាឌីអែន

៦. ថាមពលមូលេគុលពិតប្រាកដគឺទាបជាងថាមពលរបស់ទម្រង់អសូណង់នីមួយៗ។ ឧទាហរណ៍ កាចុង អាស៊ីតមានស្ថេរភាពជាងទម្រង់អសូណង់4 និង 5 ខាងក្រោម។ ទម្រង់4និង5 ស្រដៀងគ្នា នឹងកាបូកាចុង ថ្នាក់ទី១ តែកាចុងអាស៊ីតមានស្ថេរភាពជាង (មានថាមពលទាបជាង) កាបូកាចុង ថ្នាក់ទី២។ អ្នកគឺមី តែងតែហៅប្រភេទបន្សំបែបនេះថា *បន្សំអសូណង់*៖



ក្នុងមេរៀនទី១៤ យើងនឹងឃើញថា បង់សែនត្រូវបានបន្សំអសូណង់ខ្ពស់ ពីព្រោះវាជាអ៊ីប៊ីតនៃ ទម្រង់អសូណង់សមមូលពីរដូចខាងក្រោម៖




ទម្រង់អសូណង់របស់បង់សែន

តំណាងអ៊ីប៊ីត

៧. ទម្រង់អសូណង់សមមូលមានរបាយបង្កើតអ៊ីប៊ីតស្មើគ្នា ហើយប្រព័ន្ធដែលមានទម្រង់អសូណង់សម មូលទាំងនេះមានបន្សំអសូណង់ខ្ពស់។ ទម្រង់4 និង5ខាងលើមានរបាយស្មើគ្នាចំពោះកាចុងអាស៊ីត ពីព្រោះពួកវាសមមូលគ្នា។ ពួកវាក៏ធ្វើឱ្យរបាយបន្សំបំផុត និងធ្វើឱ្យកាចុងអាស៊ីត មានស្ថេរភាព។ ដូចគ្នា ដែរចំពោះរបាយដែលកើតឡើងដោយទម្រង់អសូណង់ A និង B។

៨. ទម្រង់អសូណង់កាន់តែមានស្ថេរភាព របាយទៅកាន់អ៊ីប៊ីតកាន់តែធំ។ ទម្រង់អសូណង់ដែលមិនសម មូលមិនមានរបាយស្មើគ្នាទេ។ ឧទាហរណ៍ កាចុងខាងក្រោមជាអ៊ីប៊ីតរបស់ទម្រង់អសូណង់ 6 និង7។ ទម្រង់6 មានរបាយធំជាងទម្រង់7 ពីព្រោះទម្រង់6 ជាកាបូកាចុងថ្នាក់ទី៣មានស្ថេរភាព ជាងទម្រង់7 ដែលជាកាបូកាចុងថ្នាក់ទី១៖




ទម្រង់បង្កើតរបាយធំជាងមួយ មានន័យថា បន្ទុកវិជ្ជមានដោយផ្នែកលើកាបូនb នៃអ៊ីប៊្រីតនឹងធំជាងបន្ទុកវិជ្ជមានដោយផ្នែកលើកាបូនd។ វាក៏មានន័យថា សម្ព័ន្ធរវាងអាតូមកាបូនc និង d នឹងទំនោងជាសម្ព័ន្ធពីជាន់ ច្រើនជាងសម្ព័ន្ធរវាងអាតូមកាបូន b និង c។


៤.២ របៀបប៉ាន់ស្មានស្ថេរភាពរបស់ទម្រង់រេសូណង់

ក្បួនខាងក្រោមនេះនឹងជួយយើងក្នុងកំណត់អំពីស្ថេរភាពរបស់ទម្រង់រេសូណង់។

- a. ទម្រង់ដែលមានសម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់កាន់តែច្រើន កាន់តែមានស្ថេរភាព។ នេះជាការពិត ពីព្រោះយើងដឹងថាការកកើតសម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់មួយបន្ទាបនូវថាមពលរបស់អាតូម។ នេះមានន័យថា ទម្រង់របស់1,3-ប៊ុយតាឌីអែន8 មានស្ថេរភាពជាងគេ ហើយមានរបាយរេសូណង់ធំជាងគេ ពីព្រោះវាមានសម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់មួយច្រើនជាងគេ (វាក៏មានស្ថេរភាពតាមក្បួន c ខាងក្រោម)។










- b. ទម្រង់ដែលមានអាតូមទាំងអស់មានអេឡិចត្រុងក្នុងស្រទាប់ក្លែងផ្គុំ (ដូចទម្រង់ឧស្ម័នកម្រ) មានស្ថេរភាព និងរបាយរេសូណង់ធំទៅអ៊ីប៊្រីត។ ម្តងទៀត នេះជាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកពីអ្វីដែល យើងដឹងអំពីការចងសម្ព័ន្ធ។ ឧទាហរណ៍ នេះមានន័យថា 12មានរបាយស្ថេរភាពទៅកាបូនធំជាង11 ពីព្រោះអាតូមទាំងអស់របស់12 មានស្រទាប់ក្លែងផ្គុំ (ចូរកត់សម្គាល់ផងដែរថា 12 មានសម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់ច្រើនជាង 11 មើលក្បួនa)។








- c. ការញែកបន្ទុកបន្ថយស្ថេរភាព។ ការញែកបន្ទុកផ្ទុយគ្នាត្រូវការថាមពល។ ដូចនេះ ទម្រង់ដែលបន្ទុកផ្ទុយគ្នាត្រូវបានញែកពីគ្នា មានថាមពលធំជាង (ស្ថេរភាពទាប) ទម្រង់ដែលមិនមានការញែកបន្ទុក។ នេះមានន័យថាទម្រង់ទាំងពីររបស់វីនីលក្លរី ទម្រង់13មានរបាយធំ ពីព្រោះវាមិនមានការ ញែកបន្ទុកទេ (នេះមិនមានន័យថា ទម្រង់14មិនចូលរួមបង្កើតអ៊ីប៊្រីត វាគ្រាន់តែមានន័យថារបាយបង្កើតអ៊ីប៊្រីតដោយ14តូចជាង)។





លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.៣៖ ចូរសរសេរទម្រង់អស្ថិរភាពសំខាន់របស់ប្រភេទនីមួយៗខាងក្រោម៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.៤៖ ពីលុតនៃទម្រង់អស្ថិរភាពខាងក្រោម ចូររកទម្រង់អស្ថិរភាពមួយដែលមានរបាយបង្កើតអ៊ីប្រីតច្រើនជាងគេបង្អស់ ចូរពន្យល់ចម្លើយរបស់អ្នក៖



លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.៥៖ ទម្រង់អេណុល (អាល់សែន-អាល់កុលមួយ) និងសេតូខាងក្រោម (សេតូនមួយ) មានរូបមន្ត $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ ខុសគ្នាត្រង់ទីតាំងអេឡិចត្រុង ប៉ុន្តែពួកវាមិនមែនជាទម្រង់អស្ថិរភាពទេ។ ចូរពន្យល់។




ទម្រង់អេណុល



ទម្រង់សេតូ

៥. អាល់កាឌីអែន និងអ៊ីដ្រូកាបូប៉ូលីមីនឆ្អែត


អ៊ីដ្រូកាបូប៉ូលីមីនឆ្អែតត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ ឬបីជាន់ច្រើនជាងមួយ។ អ៊ីដ្រូកាបូប៉ូលីមីនឆ្អែតមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ពីរត្រូវបានគេហៅថា **អាល់កាឌីអែន** (alkadiene) ឯអ៊ីដ្រូកាបូប៉ូលីមីនឆ្អែតមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់បីត្រូវបានគេហៅថា **អាល់កាត្រីអែន** (alkatriene) ។ល។ តាមភាសាសាមញ្ញ សមាសធាតុទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា **ឌីអែន** ឬ **ត្រីអែន**។ អ៊ីដ្រូកាបូប៉ូលីមីនឆ្អែតមានសម្ព័ន្ធបីជាន់ពីរត្រូវបានគេហៅថា **អាល់កាឌីអ៊ីន** (alkadiyne) ហើយអ៊ីដ្រូកាបូប៉ូលីមីនឆ្អែតមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់មួយ និងបីជាន់មួយត្រូវបានគេហៅថា **អាល់សែនីន** (alkenyne)។ ឧទាហរណ៍នៃអ៊ីដ្រូកាបូប៉ូលីមីនឆ្អែត (polyunsaturated hydrocarbons) បង្ហាញពីការហៅឈ្មោះ សមាសធាតុទាំងនេះ។ រំលឹកច្បាប់ IUPAC ថា ទីតាំងរបស់សម្ព័ន្ធពីរជាន់ និងបីជាន់អាចត្រូវបានដាក់ពីមុខ ឈ្មោះរបស់មជ្ឈិមបទ។ យើងឱ្យឧទាហរណ៍ទាំងពីរបៀប។



សម្ព័ន្ធពីរជាន់របស់សមាសធាតុប៉ូលីមីនឆ្អែតត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ជា **ផ្គុំគ្នា** (cumulated) ឆ្លាស់គ្នា (conjugated) និងដាច់ពីគ្នា (isolated)។


- សម្ព័ន្ធពីរជាន់របស់ 1,2-ឌីអែនមួយ (ដូចជា 1,2-ប្រូប៉ាឌីអែន ឬអាឡែន) ត្រូវបានគេនិយាយថាសម្ព័ន្ធផ្គុំគ្នា ពីព្រោះអាតូមកាបូនមួយ (អាតូមមណ្ឌល) មានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ពីរ។

អ៊ីដ្រូកាបូប៉ូលីមីនឆ្អែតមួយដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ផ្គុំគ្នាត្រូវបានគេហៅថា **គូម៉ូលែន** (cumulenes)។ ឈ្មោះអាឡែនក៏ត្រូវបានគេប្រើជាឈ្មោះថ្នាក់មួយរបស់មូលេគុលដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ពីរផ្គុំគ្នា៖



ឧទាហរណ៍មួយនៃឌីអែនឆ្លាស់គឺ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន។

- ក្នុងប៉ូលីអែនឆ្លាស់ សម្ព័ន្ធពីរជាន់ និងសម្ព័ន្ធមួយជាន់នៅឆ្លាស់គ្នាតាមបណ្តោយខ្សែ៖




1,3-ប៊ុយតាឌីអែន

ឌីអែនឆ្លាស់មួយ

(2E,4E,6E)-អុកតា-2,4,6-ទ្រីអែនជាឧទាហរណ៍មួយនៃអាល់កាទ្រីអែនឆ្លាស់មួយ។

- បើសិនជាអាតូមកាបូនផ្នែកមួយឬច្រើនស្ថិតនៅចន្លោះសម្ព័ន្ធពីរជាន់របស់អាល់កាឌីអែន សម្ព័ន្ធពីរជាន់ទាំងនេះត្រូវបានគេនិយាយថា ត្រូវបានញែកដាច់ពីគ្នា។

ឧទាហរណ៍មួយនៃឌីអែនដាច់ពីគ្នាគឺ 1,4-ប៉ង់តាឌីអែន៖



ឌីអែនដាច់មួយ ($n \neq 0$)



1,4-ប៉ង់តាឌីអែន

លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.៦៖

- តើឌីអែនក្នុងផ្នែកទី៥ណាផ្សេងទៀតជាឌីអែនឆ្លាស់?
- តើឌីអែនក្នុងផ្នែកទី៥ណាផ្សេងទៀតជាឌីអែនដាច់?
- តើសមាសធាតុណាជាអ៊ីសូមែរដាច់មួយ?


ក្នុងមេរៀនទី៥ យើងបានឃើញឌីអែនផ្គុំ (អាឡែន) បង្កើតទៅជាម៉ូលេគុលគីរ៉ាល់។ ឌីអែនផ្គុំមានសារៈសំខាន់លើទីផ្សារខ្លះ ហើយសម្ព័ន្ធពីរជាន់ផ្គុំត្រូវបានគេរកឃើញម្តងម្កាលក្នុងម៉ូលេគុលធម្មជាតិ។ ជាទូទៅ ឌីអែនផ្គុំមានស្ថេរភាពទាបជាងឌីអែនដាច់។

សម្ព័ន្ធពីរជាន់របស់ឌីអែនដាច់មានលក្ខណៈដូចឈ្មោះរបស់វា។ ពួកវាងប្រតិកម្មរបស់អាល់សែនទាំងអស់លើកលែងតែពួកវាអាចមានប្រតិកម្មទ្វេរដង។ ឌីអែនឆ្លាស់មានសារៈសំខាន់ជាងគេពីព្រោះយើងរកឃើញថា សម្ព័ន្ធពីរជាន់របស់ពួកវាអន្តរកម្មលើគ្នាទៅវិញទៅមក។ អន្តរកម្មនេះធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈ និងប្រតិកម្មមិនដូចយើងរំពឹងទុក។ ដូចនេះ យើងនឹងពិចារណាលើការសិក្សាគីមីនៃឌីអែនឆ្លាស់លំអិត។

៦. 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន៖ ការមិនដាច់គ្នារបស់អេឡិចត្រុង

៦.១ ប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន

ប្រវែងសម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូនរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនត្រូវបានកំណត់ និងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖



សម្ព័ន្ធពីរជាន់ខ្លីជាងសម្ព័ន្ធមួយជាន់


សម្ព័ន្ធ C1-C2 និង C3-C4 (តាមលំអៀងពិសោធន៍) មានប្រវែងដូចគ្នានឹងសម្ព័ន្ធពីរជាន់របស់អេតែន។ សម្ព័ន្ធកណ្តាលនៃ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន (1.47Å) ប៉ុន្តែខ្លីជាងសម្ព័ន្ធមួយជាន់របស់អេតាន (1.54Å)។

នេះមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលទេ។ អាតូមកាបូនរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនទាំងអស់រងអ៊ីប្រីត sp^2 ហើយធ្វើឱ្យសម្ព័ន្ធកណ្តាលរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនបានមកពីការគ្របដណ្តប់នៃអរមីតាល់ sp^2 ។ ហើយដូចដែលយើងដឹងសម្ព័ន្ធស៊ីចម្ងាយដែលជា sp^3-sp^3 វែងជាង។ ជាការពិត មានការថយចុះនៃប្រវែងសម្ព័ន្ធមួយជាន់កាបូន-កាបូននៅពេលអ៊ីប្រីតកម្មរបស់អាតូមចងសម្ព័ន្ធប្រែប្រួលពី sp^3 ទៅ sp (តារាង១៣.១)។

តារាង១៣.១ ប្រវែងសម្ព័ន្ធមួយជាន់កាបូន-កាបូន និងភាពអ៊ីប្រីតកម្ម		
សមាសធាតុ	ភាពអ៊ីប្រីតកម្ម	ប្រវែងសម្ព័ន្ធ ($\text{\AA}$)
$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$	sp^3-sp^3	1.54
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$	sp^2-sp^3	1.50
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	sp^2-sp^2	1.47
$\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$	$sp-sp^3$	1.46
$\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2$	$sp-sp^2$	1.43
$\text{HC}\equiv\text{C}-\text{C}\equiv\text{CH}$	$sp-sp$	1.37

៦.២ កុងផរម៉ាស្យុងរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន


មានកុងផរម៉ាស្យុងប្លង់របស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនពីរ៖ កុងផរម៉ាស្យុង s-ស៊ីស និងកុងផរម៉ាស្យុង s-ត្រង្ស។



មិនមានទម្រង់ស៊ីស និងត្រង្សពិតប្រាកដទេដោយសារតែកុងផរម៉ាស្យុង s-ស៊ីស និង s-ត្រង្សរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនអាចត្រូវបានបម្លែងទៅវិញទៅមកតាមរយៈរង្វិលជុំវិញសម្ព័ន្ធមួយជាន់ (ដូចនេះគេប្រើបុព្វបទ s)។ កុងផរម៉ាស្យុង s-ត្រង្សមានច្រើនជាងលើសលុបនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។ យើងនឹងឃើញថាកុងផរម៉ាស្យុង s-ស៊ីសរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន និងអាល់សែន 1,3-ឆ្លាស់ផ្សេងទៀតមានភាពចាំបាច់ក្នុងប្រតិកម្ម Diels-Alder (ផ្នែកទី១០)។

៦.៣ អរមីតាល់ម៉ូលេគុលរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន

អាតូមកាបូនមណ្ឌលរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន (រូប១៣.៣) នៅកៀកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យការគ្របដណ្តប់អាចកើតឡើងរវាងអរមីតាល់ p របស់ C2 និង C3។ ការគ្របដណ្តប់នេះមិនធំដូចការគ្របដណ្តប់រវាង C1 និង C2 ទេ (ឬរវាង C3 និង C4) ។ ប៉ុន្តែការគ្របដណ្តប់អរមីតាល់ C2-C3 ឱ្យលក្ខណៈសម្ព័ន្ធពីរជាន់ដោយផ្នែក និង អាចធ្វើឱ្យអេឡិចត្រុង π ចំនួន៤របស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនមិនដៅទីតាំងលើអាតូម៤។



រូប១៣.៣ អរមីតាល់ p របស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន


៩៣

រូប១៣.៤បង្ហាញពីរបៀបដែលដែលអរីប៊ីតាល់ p ៤របស់1,3-ប៊ុយតាឌីអែនផ្គុំគ្នាបង្កើតលុតអរីប៊ីតាល់មួយនៃអរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល π ចំនួន៤។

- អរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល π ចំនួន២របស់1,3-ប៊ុយតាឌីអែនជាអរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលសម្ព័ន្ធ។ ក្នុងភាពគ្រឹះអរីប៊ីតាល់ទាំងនេះមានអេឡិចត្រុង π ចំនួន៤ ដែលនីមួយៗមានអេឡិចត្រុងស្ទើរ១គូ។
- អរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល π ចំនួន២ទៀតជាអរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលបដិសម្ព័ន្ធ។ ក្នុងភាពគ្រឹះអរីប៊ីតាល់ទាំងនេះមិនមានអេឡិចត្រុងទេ។

អេឡិចត្រុងមួយអាចត្រូវបានភ្លេចពីអរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលមានអេឡិចត្រុងថាមពលខ្ពស់បំផុត (HOMO) ទៅអរីប៊ីតាល់ ម៉ូលេគុលគ្មានអេឡិចត្រុងថាមពលទាបបំផុត (LUMO) នៅពេល 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនស្រូបពន្លឺដែលមានប្រវែងរលក 217nm (យើងនឹងសិក្សាសម្របពន្លឺដោយម៉ូលេគុលមិនផ្គុំក្នុងផ្នែកទី៨)។

- ការចងសម្ព័ន្ធមិនដេកនៃដែលយើងទើបតែបានសិក្សាចំពោះ1,3-ប៊ុយតាឌីអែនជាលក្ខណៈរបស់ប៉ូលីអែនឆ្លាស់ទាំងអស់។




រូប១៣.៤ ការកើតអរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល π នៃ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនពីអរីប៊ីតាល់ pបួន។ ទ្រង់ទ្រាយរបស់អរីប៊ីតាល់របស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនដែលបានគណនាដោយគោលការណ៍មេកានិចកង់ទិចត្រូវបានបង្ហាញជាមួយនឹងអរីប៊ីតាល់ជាប្រតិភូ។

៧. ស្ថេរភាពរបស់ឌីអែនឆ្លាស់


- អាល់កាឌីអែនឆ្លាស់មានស្ថេរភាពទៃម៉ូឌីណាមិចអាល់កាឌីអែនដាច់ដែលជាអ៊ីសូមែរនឹងគ្នា។
ឧទាហរណ៍ពីរនៃស្ថេរភាពរបស់ឌីអែនឆ្លាស់អាចត្រូវបានគេដឹងក្នុងការវិភាគលើកម្ដៅនៃប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មក្នុងតារាង១៣.២។

តារាង១៣.២ កម្ដៅនៃប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មរបស់អាល់សែន និងអាល់កាឌីអែន		
សមាសធាតុ	ចំនួនម៉ូល H₂	ΔH⁰ (KJ mol⁻¹)
1-ប៊ុយតែន	1	-127
1-ប៉ងតែន	1	-126
ត្រង់-2-ប៉ងតែន	1	-115
1,3-ប៊ុយតាឌីអែន	2	-239
ត្រង់-1,3-ប៉ងតាឌីអែន	2	-226
1,4-ប៉ងតាឌីអែន	2	-254
1,5-ប៉ងតាឌីអែន	2	-253

1,3-ប៊ុយតាឌីអែនមិនអាចប្រៀបធៀបផ្ទាល់ជាមួយឌីអែនដាច់ដែលមានប្រវែងខ្សែដូចគ្នាទេ។ ប៉ុន្តែការប្រៀបធៀបអាចធ្វើឡើងរវាងកម្ដៅប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មរបស់1,3-ប៊ុយតាឌីអែនដែលបញ្ចេញនៅពេល1-ប៊ុយតែន២ម៉ូលរងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្ម៖



ដោយសារតែ1-ប៊ុយតែនមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ជួសមួយដូច 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន យើងអាចរំពឹងថាប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មនៃ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនបញ្ចេញបរិមាណកម្ដៅដូចគ្នា (254kJ.mol⁻¹) ដូច២ម៉ូលនៃ 1-ប៊ុយតែន។ ប៉ុន្តែយើងរកឃើញថា 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនបញ្ចេញកម្ដៅតែ 239kJ.mol⁻¹ គិតជាងការរំពឹងទុក 15KJ.mol⁻¹។ ដូចនេះយើងសន្និដ្ឋានថា ភាពឆ្លាស់បានចូលរួមលើស្ថេរភាពបន្ថែមលើប្រព័ន្ធឆ្លាស់ (រូប១៣.៥)។



រូប១៣.៥ កម្ដៅនៃប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មនៃ1-ប៊ុយតែន ២ម៉ូល និង 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន១ម៉ូល

ការសិក្សាលើស្ថេរភាពដែលកាត់បន្ថយថ្លៃឱ្យត្រង្ស-1,3-ប័ងតាឌីអែនអាចធ្វើឡើង ដោយប្រៀបធៀបកម្ដៅប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មនៃត្រង្ស-1,3-ប័ងតាឌីអែនទៅនឹងផលបូកនៃកម្ដៅប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មរបស់1-ប័ងតែន និងត្រង្ស-2-ប័ងតែន។ តាមមធ្យោបាយនេះ យើងនឹងប្រៀបធៀបសម្ព័ន្ធពីរជាន់នៃប្រភេទដែលអាចប្រៀប ធៀបគ្នាបាន៖



$$\Delta H^\circ = -126 \text{ kJ mol}^{-1}$$



$$\frac{\Delta H^\circ = -115 \text{ kJ mol}^{-1}}{\text{ផលបូក} = -241 \text{ kJ mol}^{-1}}$$



$$\frac{\Delta H^\circ = -226 \text{ kJ mol}^{-1}}{\text{ភាពខុសគ្នា} = 15 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

យើងបានឃើញពីការគណនាទាំងនេះដែលកាត់បន្ថយថ្លៃឱ្យត្រង្ស1,3-ប័ងតាឌីអែនមានស្ថេរភាពបន្ថែម 15 kJ mol^{-1} ជាតម្លៃមួយដែលសមមូលទៅនឹងតម្លៃដែលយើងទទួលបានពី 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន (15 kJ mol^{-1})។

នៅពេលការគណនាដូចនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះឌីអែនឆ្លាស់ផ្សេងទៀត គេទទួលបានលទ្ធផលស្រដៀងគ្នា ឌីអែនឆ្លាស់ត្រូវបានរកឃើញថាមានស្ថេរភាពជាងឌីអែនដាច់។ ដូចនេះ សំណួរសួរថា៖ តើប្រភព នៃស្ថេរភាពបន្ថែមដែលមានជាមួយឌីអែនឆ្លាស់បានមកពីណា? មានកត្តាពីរដែលចូលរួម។ ស្ថេរភាពបន្ថែម របស់ឌីអែនឆ្លាស់កើតឡើងពីអាក្រក់មណ្ឌលខ្លាំងដែលពួកវាមាន ហើយនិង មកពីភាពមិនដេកនៃបន្ថែមនៃ អេឡិចត្រុង π ដែលកើតឡើងក្នុងឌីអែនឆ្លាស់។

៨. សៀវភៅស្តីពី UV-Vis

ស្ថេរភាពបន្ថែមនៃឌីអែនឆ្លាស់នៅពេលប្រៀបធៀបជាមួយឌីអែនមិនឆ្លាស់ត្រូវបានគេអាចត្រូវបានបង្ហាញ ក្នុងទិន្នន័យពីស្តីពីត្រង្ស UV-Vis (ultraviolet-visible spectroscopy)។ នៅពេលកាំរស្មីអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ក្នុងតំបន់ UV និង Vis ឆ្លងកាត់សមាសធាតុមួយដែលមានសម្ព័ន្ធច្រើនជាន់ ផ្នែកមួយនៃកាំរស្មីនេះតែងតែត្រូវបានស្រូបដោយសមាសធាតុនោះ។ បរិមាណពន្លឺដែលត្រូវបានស្រូបអាស្រ័យលើប្រវែងរលករបស់កាំរស្មី និងទម្រង់របស់សមាសធាតុ។

- សម្រាប់កាំរស្មី UV-Vis បណ្តាលមកពីការផ្ទេរថាមពលពីបាច់កាំរស្មីទៅអេឡិចត្រុងដែលអាចភ្ជាប់ទៅកាន់អរឺប៊ីតាល់ថាមពលខ្ពស់ជាង។

ក្នុងផ្នែកទី៨.ក យើងនឹងត្រលប់ទៅពិភាក្សាជាពិសេសអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យស្តីពីត្រង្ស UV-Vis បង្ហាញស្ថេរភាពបន្ថែមនៃឌីអែនឆ្លាស់។ ជាដំបូង ក្នុងផ្នែកទី៨.ក យើងរំលឹកពីសង្ខេបនៃលក្ខណៈកាំរស្មី អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ហើយបន្ទាប់មកក្នុងផ្នែកទី៨.ខ យើងនឹងមើលពីរបៀបដែលគេអាចទទួលទិន្នន័យពី ស្តីពីត្រង្ស ម៉ែត្រ UV-Vis។

៨.១ សៀវភៅអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច


ដោយយោងលើមេកានិចកង់ទិច កាំរស្មីអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចមានលក្ខណៈទ្វេប្រភេទគ្នា។

- កាំរស្មីអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចអាចត្រូវបានបរិយាយជាវាលកម្ម ដែលកើតឡើងក្នុងដែនអគ្គីសនី និងដែនម៉ាញ៉េទិចដំណាលគ្នា។ វាក៏អាចគេបរិយាយថា វាកើតពីភាគល្អិតហៅថាកង់តា ឬ ផូតុង។

ការពិសោធន៍ជាច្រើនបង្ហាញទិដ្ឋភាពខុសគ្នាពីរនេះនៃការស្ទើរអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ ពួកវាមិនត្រូវបានសង្កេតឃើញក្នុងពិសោធន៍តែមួយទេ។

- ជាធម្មតាគេបរិយាយលក្ខណៈដោយពាក្យ ប្រេងរលក (λ) ឬប្រេកង់ (ν) របស់វា។

លក្ខណៈយមួយត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូប១៣.៦។ ចម្ងាយរវាងចំណុចអតិបរមាពីរជាប់ (crest) (ឬចំណុចអប្បបរមា, troughs) គឺជាប្រេងរលក។ ចំនួនរង្វង់នៃលកដែលឆ្លងកាត់ចំណុចមួយក្នុងមួយវិនាទី នៅពេល លកឆ្លងកាត់លំហ ត្រូវបានគេហៅថាប្រេកង់ ហើយត្រូវបានវាស់ជាអង្គក្នុង១វិនាទី (cps) ឬ អ៊ែក (Hz)។



រូប១៣.៦ លក្ខណៈយមួយ និងប្រេងរលករបស់វា

ការស្ទើរអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចជាលក្ខណៈកាត់សញ្ញាកាសមួយក្នុងល្បឿនដូចគ្នា។ ល្បឿននេះ(c) ត្រូវបានគេហៅថាល្បឿនពន្លឺ គឺ $2.99792458 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ហើយទាក់ទងនឹងប្រេងរលក និងប្រេកង់តាម $c = h\nu$ ប្រេងរលកនៃការស្ទើរអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានគិតជា m, mm, μm ឬ nm។

ថាមពលនៃថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចមួយកង់តាទាក់ទងផ្ទាល់នឹងប្រេកង់របស់វា៖

$$E = h\nu$$

ដែល h = ថេរ Planck = $6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$

ν = ប្រេកង់ (Hz)

ប្រេកង់របស់ការស្ទើរកាន់តែធំថាមពលរបស់វាកាន់តែធំ

ឧទាហរណ៍ ការស្ទើរ-X មានថាមពលខ្ពស់ជាងពន្លឺមើលឃើញ។ ប្រេកង់របស់ការស្ទើរ-X ស្ថិតក្នុងលំដាប់ 10^{19} Hz តែប្រេកង់របស់ពន្លឺមើលឃើញស្ថិតក្នុងលំដាប់ 10^{15} Hz ។

ដោយសារតែ $\nu = c/\lambda$ ថាមពលរបស់ការស្ទើរអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចគឺប្រាសសមាមាត្រទៅនឹងប្រេងរលករបស់វា៖


$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{ដែល } c = \text{ល្បឿនពន្លឺ}$$

ប្រេងរលករបស់ការស្ទើរកាន់តែខ្លី ថាមពលរបស់វាកាន់តែតូច

ការស្ទើរ-X មានប្រេងរលកក្នុងលំដាប់ 0.1nm និងមានថាមពលធំណាស់ ប៉ុន្តែពន្លឺមើលឃើញមានប្រេងរលក 400 និង 750nm ដូចនេះ វាមានថាមពលទាបជាងការស្ទើរ-X។

វាក៏មានប្រយោជន៍ដែលកំណត់សម្គាល់ថា ចំពោះពន្លឺមើលឃើញ ប្រេងរលក (និងប្រេកង់) ទាក់ទងទៅនឹងពណ៌ដែលយើងមើលឃើញ។ ពន្លឺដែលយើងហៅថាពន្លឺពណ៌ក្រហមមានប្រេងរលកប្រហែល 650nm ពន្លឺដែលយើងហៅថាពន្លឺពណ៌ស្វាយមានប្រេងរលកប្រហែល 400nm។ ពណ៌ទាំងអស់ផ្សេងទៀតនៃស្បិច ពន្លឺមើលឃើញ (ឥន្ទន្ទ) មានប្រេងរលកស្ថិតក្នុងចន្លោះទាំងនេះ។


តំបន់ខុសគ្នានៃស្បិចអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូប១៣.៧។ ស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកនៃស្បិចអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចនេះពីកាំរស្មី-X ទៅមីក្រូរលក និងរលកវិទ្យុ ត្រូវបានប្រើក្នុងការទាញរកទម្រង់អាតូម និង ម៉ូលេគុល។ ទោះបីជាបច្ចេកទេសខុសគ្នាដោយយោងទៅតាមផ្នែករបស់ស្បិចអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចក៏ដោយក៏មានភាពពិតប្រាកដ និងភាពរួមគ្នានៃគោលការណ៍មូលដ្ឋាន។



រូប១៣.៧ ស្បិចអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច

៨.២ ស្បិចត្រូផូតូម៉ែត្រ UV-Vis

- ស្បិចត្រូផូតូម៉ែត្រ UV-Vis (រូប១៣.៨) វាស់បរិមាណពន្លឺស្រូបដោយភាគសំណាកមួយ នៅ ប្រវែងរលកនីមួយៗនៃតំបន់UV និងតំបន់មើលឃើញ(Vis) របស់ស្បិចអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច។



រូប១៣.៨ ដ្យាក្រាមរបស់ស្បិចត្រូផូតូម៉ែត្រ UV-Vis

កាំរស្មី UV និង Vis មានថាមពលខ្ពស់ជាង (ប្រវែងរលកខ្លីជាង) កាំរស្មីអាំងប្រាក្រហម (ប្រើក្នុងស្បៀងត្រួសព័រ IR) និងកាំរស្មីហ្វ្រេកង់វិទ្យុ (ប្រើក្នុង NMR) ប៉ុន្តែមិនមានថាមពលធំដូចកាំរស្មី-X ទេ (រូប១៣.៧)។

ក្នុងស្បៀងត្រួសព័រម៉ែត្រស្តង់ដាមួយ (រូប១៣.៨) បាច់ពន្លឺត្រូវបានបំបែកពាក់កណ្តាល (បាច់ពន្លឺភាគសំណាក) ត្រូវបានឆ្លងកាត់គុយវ៉ែតថ្នាំដែលមានសូលុយស្យុងភាគសំណាក និងពាក់កណ្តាលទៀត (បាច់ពន្លឺយោង) ត្រូវបានឱ្យឆ្លងកាត់គុយវ៉ែតដូចគ្នាតែមិនមានភាគសំណាកទេ មានតែធាតុរំលាយរបស់ភាគសំណាក (សារធាតុយោង)។ ធាតុរំលាយដែលត្រូវជ្រើសរើស ត្រូវតែថ្នាំក្នុងតំបន់ស្បៀងពន្លឺដែលបានប្រើដើម្បីវិភាគ។ ឧបករណ៍ត្រូវបានគេរៀបចំដូចនេះគឺដើម្បីអាចប្រៀបធៀបអាំងតង់ស៊ីតេរបស់បាច់ពន្លឺភាគសំណាក និងបាច់ពន្លឺយោង។ បើសិនជាសមាសធាតុស្រូបពន្លឺនៅប្រវែងរលកជាក់លាក់ណាមួយ អាំងតង់ស៊ីតេរបស់បាច់ភាគ សំណាក (I_s) នឹងតិចជាងអាំងតង់ស៊ីតេបាច់ពន្លឺយោង (I_R)។ សម្របនៅប្រវែងរលកណាមួយត្រូវបានកំណត់ដោយសមីការ $A_\lambda = \log(I_R/I_s)$ ។

- ទិន្នន័យពីស្បៀងត្រួសព័រម៉ែត្រ UV-Vis ត្រូវបានតាងឱ្យស្បៀងសម្រប ដែលជាក្រាហ្វមួយនៃប្រវែងរលក (λ) អនុគមន៍នឹងសម្របរបស់ភាគសំណាក (A) នៅប្រវែងរលកនីមួយៗក្នុងតំបន់ស្បៀងដែលទាក់ទង។

ក្នុងស្បៀងត្រួសព័រម៉ែត្រ UV-Vis កាំរស្មីឌីអុត សម្របពន្លឺប្រវែងរលកទាំងអស់ក្នុងតំបន់នៃការវិភាគត្រូវបានគេវាស់ក្លាយដោយកាំរស្មីនៃផូតូឌីអុតមួយ។ ដំបូង គេវាស់សម្របធាតុរំលាយនៃប្រវែងរលកដែលទាក់ទង បន្ទាប់មកគេវាស់សម្របភាគសំណាកក្នុងតំបន់ដូចគ្នា។ ទិន្នន័យពីធាតុរំលាយត្រូវបានដកដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចពីទិន្នន័យភាគសំណាក។ បន្ទាប់មកផលជកនេះត្រូវបានបង្ហាញជាស្បៀងសម្របរបស់ភាគសំណាក។

ស្បៀងសម្រប UV មួយរបស់ 2,5-ឌីមេទីល-2,4-អិចសាឌីអែន ត្រូវបានគេឱ្យក្នុងរូប១៣.៩។ វាបង្ហាញបង់សម្របធំក្នុងតំបន់ចន្លោះ 210 ទៅ 260nm ហើយមានសម្របអតិបរមានៅ 242.5nm។

- ប្រវែងរលកនៃសម្របអតិបរមានៅក្នុងស្បៀងសម្របមួយតែងតែត្រូវបានគេបង្ហាញជាលក្ខណៈគីមីមួយ តាងដោយ λ_{max} ។


បន្ថែមលើការបង្ហាញប្រវែងរលកនៃសម្របអតិបរមា (λ_{max}) អ្នកគីមីតែងតែបង្ហាញបរិមាណមួយទៀតហៅថាលទ្ធភាពសម្របម៉ូលែ (molar absorptivity) តាងដោយ ϵ ។ ពីដើមលទ្ធភាពសម្របម៉ូលែនេះត្រូវបានគេសំដៅលើមេគុណរលត់ម៉ូលែ (molar extinction coefficient)។

- លទ្ធភាពសម្របម៉ូលែ (ϵ ខ្នាតគិតជា $M^{-1}cm^{-1}$) កំណត់អាំងតង់ស៊ីតេនៃសម្របរបស់ភាគសំណាកមួយនៅប្រវែងរលកមួយ។ វាជាថេរសមាមាត្រ ដែលសម្របទាក់ទងនឹងកំហាប់ជាម៉ូលរបស់ភាគសំណាក (M) និងប្រវែង (l , ជា cm) ដែលពន្លឺឆ្លងកាត់ភាគសំណាក។
- សមីការដែលសម្រប (A) ទាក់ទងនឹងកំហាប់ (C) ប្រវែង (l) និងលទ្ធភាពសម្រប (ϵ) ត្រូវបានគេហៅថា ច្បាប់ Beer.

ច្បាប់ Beer $A = \epsilon \times C \times l$ ឬ $\epsilon = \frac{A}{C \times l}$

ចំពោះ 2,5-ឌីមេទីល-2,4-អិចសាឌីអែនដែលរលាយក្នុងមេតានុល លទ្ធភាពសម្របនៅប្រវែងរលកសម្របអតិបរមា (242.5) គឺ $13100 M^{-1} cm^{-1}$ ។ ក្នុងការសិក្សាគីមី វាអាចត្រូវបានគេបង្ហាញជា៖

2,5-ឌីមេទីល-2,4-អិចសាឌីអែន , $\lambda_{max}^{មេតានុល} = 242.5nm$ ($\epsilon=13100$)



រូប១៣.៩ ស្ប៉ិចសម្រូប UV របស់ 2,5-ឌីមេទីល-2,4-អ៊ីចសាឌីអែនក្នុងមេតាណុល
នៅកំហាប់ $5.95 \times 10^{-5} \text{M}$ ក្នុងគុយវ៉ែត 1cm

៨.៣ សម្រូបអតិបរមារបស់ឌីអែនមិនឆ្លាស់ និងឆ្លាស់

ដូចដែលយើងបានកត់សម្គាល់រួចហើយ នៅពេលសមាសធាតុស្រូបពន្លឺក្នុងតំបន់ UV និង Vis អេឡិចត្រុងត្រូវបានភ្ជោចទៅនឹងថាមពលខ្ពស់ជាងមួយ។ ហេតុនេះហើយស្ប៉ិច UV និង Vis ត្រូវបានគេហៅថាស្ប៉ិច អេឡិចត្រុង។ ស្ប៉ិចសម្រូបរបស់ 2,5-ឌីមេទីល-2,4-អ៊ីចសាឌីអែនជាស្ប៉ិចអេឡិចត្រុងមួយ ពីព្រោះបង់ (ឬពិក) សម្រូបមានទំហំធំ។ បង់សម្រូបក្នុងតំបន់ UV និង Vis ស្ទើរតែទាំងអស់មានទំហំធំ ដោយសារនឹងថាមពល អេឡិចត្រុងរួមជាមួយនឹងនឹងថាមពលព័រ៉ូ និងនឹងថាមពលផ្ទៃល។ ដូចនេះ ចម្លងអេឡិចត្រុងអាចកើតឡើងពីភាពព័រ៉ូ និងភាពផ្ទៃលជាច្រើនរបស់នឹងថាមពលអេឡិចត្រុងមួយ ទៅកាន់ភាពព័រ៉ូ និងភាពផ្ទៃលរបស់នឹងថាមពលខ្ពស់ជាង។


- អាល់សែន និងឌីអែនមិនឆ្លាស់តែងតែមានសម្រូបអតិបរមា (λ_{max}) ក្រោម 200nm។

ឧទាហរណ៍ អេតែនឱសម្រូបអតិបរមានៅ 171nm 1,4-ប័ង់តាឌីអែនឱសម្រូបអតិបរមានៅ 178nm។ សម្រូបទាំងនេះកើតឡើងនៅប្រវែងរលកដែលស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ដែលស្ប៉ិចត្រូវផ្សព្វផ្សាយដំណើរការ ពីព្រោះពួកវាកើតឡើងនៅកន្លែងដែលអុកស៊ីសែនក្នុងខ្យល់ត្រូវបានស្រូបផងដែរ។ គេត្រូវប្រើបច្ចេកទេសដកខ្យល់ដើម្បីវាស់ពួកវា។

- សមាសធាតុមានសម្ព័ន្ធច្រើនជាន់ឆ្លាស់មានសម្រូបអតិបរមានៅប្រវែងរលកវែងជាង 200nm។

ឧទាហរណ៍ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនស្រូបនៅ 217nm។ សម្រូបប្រវែងរលកវែងដោយឌីអែនឆ្លាស់ជាផល វិបាកផ្ទាល់ពីភាពឆ្លាស់។

យើងអាចយល់អំពីរបៀបដែលសម្ព័ន្ធច្រើនជាន់ឆ្លាស់មានសម្រូបពន្លឺប្រវែងរលកវែង បើសិនជាយើង យល់ច្បាស់ពីរូប១៣.១០។



រូប១៣.១០ ថាមពលរបស់អរីបីតាល់ម៉ូលេគុល π របស់អេតែន និង 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន

- នៅពេល ម៉ូលេគុលមួយស្រូបពន្លឺប្រវែងរលកវែងបំផុត អេឡិចត្រុងមួយត្រូវបានភ្ជោចពីអរីបីតាល់ម៉ូលេគុលមានអេឡិចត្រុងខ្ពស់បំផុត (HOMO) ទៅអរីបីតាល់ម៉ូលេគុលគ្មានអេឡិចត្រុងទាបបំផុត (LUMO) ។
- ចំពោះអាល់សែន និងអាល់កាឌីអែន HOMO ជាអរីបីតាល់ π សម្ព័ន្ធ ហើយ LUMO ជាអរីបីតាល់ π^* បដិសម្ព័ន្ធ។

ប្រវែងរលកនៃសម្រូបអតិបរមាត្រូវបានកំណត់ដោយផលសងនៃថាមពលរបស់នីវ៉ូថាមពលទាំងពីរ។ គម្លាតថាមពលរវាង HOMO និង LUMO របស់អេតែនខ្ពស់ជាងគម្លាតថាមពលអរីបីតាល់ក្នុង 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន។ ដូចនេះ រំញោចអេឡិចត្រុង $\pi \rightarrow \pi^*$ របស់អេតែនត្រូវការសម្រូបពន្លឺថាមពលខ្ពស់ជាង (ប្រវែងរលកខ្លីជាង) រំញោចអេឡិចត្រុង $\pi_2 \rightarrow \pi_3^*$ ក្នុង 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន។ ផលសងនៃថាមពលរវាង HOMO និង LUMO របស់សមាសធាតុទាំងពីរកំណត់ស្ថិតិសម្រូបរបស់ពួកវា។ អេតែនស្រូបនៅ 171nm តែ 1,4- ប៉ង់តាឌីអែនស្រូបនៅ 217nm។


គម្លាតតូចរវាង HOMO និង LUMO ក្នុង 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនបានមកពីភាពឆ្លាស់នៃសម្ព័ន្ធពីរជាន់។ ការគណនាអរីបីតាល់ម៉ូលេគុលដែលមានគម្លាតនេះធំជាងកើតឡើងក្នុងអាល់កាឌីអែនដាច់។ អាល់កាឌីអែនមានស្ថិតិសម្រូបស្រដៀងទៅស្ថិតិសម្រូបរបស់អាល់សែន។ សម្រូបអតិបរមាស្ថិតនៅប្រវែងរលកខ្លីជាធម្មតាក្រោម 200nm។ ដូចដែលយើងបានលើកឡើង 1,4-ប៉ង់តាឌីអែនមាន $\lambda_{\max} = 178\text{nm}$ ។

អាល់កាទ្រីអែនឆ្លាស់ស្រូបប្រវែងរលកវែងជាងអាល់កាឌីអែនឆ្លាស់ ហើយមូលហេតុនេះអាចត្រូវបានគេបង្ហាញក្នុងការគណនាអរីបីតាល់ម៉ូលេគុល។ គម្លាតថាមពលរវាង HOMO និង LUMO របស់អាល់កាទ្រីអែនតូចជាងគម្លាតថាមពលរបស់អាល់កាឌីអែន។

- ជាទូទៅ ចំនួនសម្ព័ន្ធច្រើនជាន់ឆ្លាស់កាន់តែច្រើនក្នុងម៉ូលេគុលមួយ $\lambda_{\max}$ របស់វាកាន់តែវែង។


ប៉ូលីអែនដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ឆ្លាស់៨ ឬច្រើនជាងនេះស្រូបពន្លឺក្នុងតំបន់មើលឃើញ។ ឧទាហរណ៍ β -ការ៉ូតែនជាសារធាតុផ្ដើមរបស់វីតាមីន A និងជាសមាសធាតុដែលធ្វើឱ្យការ៉ូតមានពណ៌ទឹកក្រូចមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ឆ្លាស់១១ វាមានសម្រូបអតិបរមានៅ 497nm ស្ថិតក្នុងតំបន់មើលឃើញ។ ពន្លឺដែលមានប្រវែងរលក 497nm មាន

ពណ៌បៃតង-ខៀវ។ ពន្លឺនេះត្រូវបានស្រូបដោយ β -កាវ៉ូតែន។ យើងមើលឃើញពណ៌បំពេញរបស់ ពណ៌បៃតង-ខៀវ គឺពណ៌ក្រហម-ទឹកក្រូច។



β -កាវ៉ូតែន

លីកូប៉ែនជាសមាសធាតុដែលធ្វើឱ្យប៉េងប៉ោះមានពណ៌ទឹកក្រូច វាមានក៏មានសម្ព័ន្ធពីជាន់ឆ្លាស់១១ ដែរ លីកូប៉ែនមានសម្រូបអតិបរមានៅ 505nm ដែលវាស្រូបយ៉ាងខ្លាំង (លីកូប៉ែន 0.02g អាចព្យួរចេញពី ប៉េងប៉ោះ ទុំ 1Kg)។




លីកូប៉ែន

តារាង១៣.៣ ឱ្យតម្លៃ $\lambda_{\max}$ របស់សមាសធាតុមិនផ្ដុំតម្លៃយចំនួន។


តារាង១៣.៣ ប្រភេទលកសម្រូបអតិបរមានៅអ៊ីដ្រូកាបូមីនផ្ដុំត			
សមាសធាតុ	ទម្រង់	$\lambda_{\max}$ (nm)	$\epsilon_{\max}$ ($M^{-1} \text{ cm}^{-1}$)
អេតែន	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	171	15,530
ត្រង្ស-3-អ៊ីចសែន		184	10,000
ស៊ីក្លូអ៊ីចសែន		182	7,600
1-អុកតែន		177	12,600
1-អុកទីន		185	2,000
1,3-ប៊ុយតាឌីអែន		217	21,000
ស៊ីស-1,3-ប៉ង់តាឌីអែន		223	22,600
ត្រង្ស-1,3-ប៉ង់តាឌីអែន		223.5	23,000
ប៊ុយ-1-អែន-3-អ៊ីន		228	7,800
1,4-ប៉ង់តាឌីអែន		178	17,000
1,3-ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែន		239	3,400
1,3-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាឌីអែន		256	8,000
ត្រង្ស-1,3,5-អ៊ីចសាឌីអែន		274	50,000

សមាសធាតុដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែនក៏ស្រូបពន្លឺក្នុងតំបន់UV ដែរ។ ឧទាហរណ៍ អាសេតូន មានពិកសម្រូបជំនួយនៅ 280nm ដែលត្រូវទៅនឹងរំញោចអេឡិចត្រុងមួយពីទ្វេតាអេឡិចត្រុង (មិនសម្ព័ន្ធ ឬ អេឡិចត្រុង n) ទៅអរប៊ីតាល់ π^* របស់សម្ព័ន្ធពីរជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែន៖

អាសេតូន



សមាសធាតុដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែន នៅឆ្លាស់ជាមួយសម្ព័ន្ធពីរជាន់កាបូន-កាបូនមាន សម្រូបអតិបរមាត្រូវទៅនឹងរំញោច $n \rightarrow \pi^*$ និង $\pi \rightarrow \pi^*$ ។ សម្រូបអតិបរមា $n \rightarrow \pi^*$ កើតឡើងនៅប្រវែងរលកវែង ជាង ប៉ុន្តែខ្សោយជាងណាស់ (គឺថា មានតម្លៃលទ្ធភាពសម្រូបម៉ូលេគុលតូចជាង) ៖




៨.៤ បម្រើបម្រាស់វិភាគរបស់ស្បិចត្រូស្កូពី UV-Vis

ស្បិចត្រូស្កូពីUV-Vis អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទាញរកទម្រង់របស់ម៉ូលេគុលសរីរាង្គ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមាន វត្ថុមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ឆ្លាស់ឬអត់។ ទោះបីជាភាពឆ្លាស់ក្នុងម៉ូលេគុលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយទិន្នន័យពីIR NMR ឬម៉ាសស្បិចត្រូមេទ្រី ការវិភាគUV-Visអាចផ្តល់ជាព័ត៌មានផ្ទុបផ្ទា។

ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ស្បិចត្រូស្កូពី UV-Vis កាន់តែធំទូលាយ ដើម្បីកំណត់កំហាប់របស់ភាគសំណាក។ ដូចដែលបានលើកឡើងក្នុងផ្នែកទី៨.៣ ទំនាក់ទំនង $A = \epsilon Cl$ បញ្ជាក់ថា បរិមាណសម្រូបដោយភាគសំណាក មួយ នៅប្រវែងរលកជាក់លាក់មួយអាស្រ័យលើកំហាប់របស់វា។ ជាធម្មតាទំនាក់ទំនងនេះលឺនីមួយៗទៅតាមកំហាប់សម ស្របសម្រាប់វិភាគ។ ដើម្បីកំណត់ភាគសំណាកមិនស្គាល់មួយ ក្រាហ្វនៃសម្រូបអនុគមន៍នឹងកំហាប់ត្រូវបានគូរ ឡើងសម្រាប់ឈុតស្តង់ដារនៃកំហាប់ស្គាល់។ ប្រវែងរលកដែលបានប្រើសម្រាប់វិភាគនេះ តែងតែជា $\lambda_{\max}$ របស់ភាគ សំណាក។ កំហាប់របស់ភាគសំណាកត្រូវបានកំណត់ដោយវាស់សម្រូប និងកំណត់ តម្លៃកំហាប់ដែលត្រូវគ្នាពីក្រាហ្វ នៃកំហាប់ស្គាល់ (ខ្សែកោងស្តង់ដារ)។ ការវិភាគជាបរិមាណដោយប្រើស្បិចត្រូ ស្កូពី UV-Vis តែងត្រូវបានប្រើក្នុង ការសិក្សាគីមីជីវៈ ដើម្បីវាស់ល្បឿនប្រតិកម្មអង់ស៊ីម។ កំហាប់របស់ប្រភេទ មួយដែលទាក់ទងប្រតិកម្ម (ទាក់ទង ទៅនឹងសម្រូប UV-Visរបស់វា) ត្រូវបានគេដៅអនុគមន៍ទៅនឹងរយៈពេល ដើម្បីកំណត់ល្បឿនប្រតិកម្ម។ ស្បិចត្រូ ស្កូពីក៏ត្រូវបានប្រើក្នុងគីមីបរិស្ថានផងដែរ ដើម្បីកំណត់កំហាប់អ៊ុយ៉ុងលោហៈផ្សេងៗ (ជួនកាលទាក់ទងនឹងស្បិច សម្រូបរបស់សមាសធាតុកំផ្លិចសរីរាង្គជាមួយលោហៈ) ហើយក៏អាចប្រើជាវិធីសាស្ត្រសម្គាល់ក្នុងបច្ចេកទេស ក្រូម៉ាតូក្រាហ្វីវ (HPLC)។


លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.៧៖ ចូរឱ្យទម្រង់ D, E, និង F



៩. ការប្រយុទ្ធនុយក្លេអ៊ូតិលលើឌីអែនឆ្លាស់៖ ប្លុក-1,4

ខ្ញុំអែនឆ្លាស់មិនមែនមានតែស្ថេរភាពជាងខ្ញុំអែនមិនឆ្លាស់ប៉ុណ្ណោះទេ ពួកវាក៏បង្ហាញលក្ខណៈពិសេសនៅពេលពួកវាមានប្រតិកម្មជាមួយភ្នាក់ងារនយោបាយអ្នករាល់គ្នា។


- ឌីអែនឆ្លាស់រងប្រតិកម្មទាំងបូក-1,2 និងបូក-1,4ដោយឆ្លងកាត់អង្គធាតុកណ្តាលអាលីលមួយឧទាហរណ៍ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រូសែនក្លរួមមូលសមមូលបង្កើតផលិតផលពីរគឺ 3-ក្លរ៉ូ-1-ប៊ុយតែន និង 1-ក្លរ៉ូ-2-ប៊ុយតែន៖




បើសិនមានតែផលិតផលទី១ (3-ក្លរ៉ូ-1-ប៊ុយតែន) ត្រូវបានបង្កើត យើងនឹងគ្មានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលទេ។ យើងអាចសន្និដ្ឋានថា អ៊ីដ្រូសែនក្លរួបានបូកលើសម្ព័ន្ធពីរជាន់មួយរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនតាមមធ្យោបាយធម្មតា។ វាជាផលិតផលទី២ 1-ក្លរ៉ូ-2-ប៊ុយតែនទេ ដែលធ្វើឱ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើល។ សម្ព័ន្ធពីរជាន់របស់វាស្ថិតចន្លោះអាតូម មណ្ឌលទាំងពីរ ហើយធាតុរបស់អ៊ីដ្រូសែនក្លរួបានបូកលើអាតូមC1 និង C4។

ដើម្បីយល់អំពីរបៀបដែលផលិតផលបូក-1,2 និងបូក-1,4 កើតឡើងពីប្រតិកម្ម 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន ជាមួយ HCl យើងពិចារណាលើចលនការខាងក្រោម៖

ដំណាក់កាលទី១




ដំណាក់កាលទី២



ក្នុងដំណាក់កាលទី១ ប្រូតុងមួយបូកលើអាតូមកាបូនចុងខ្សែរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនបង្កើតជាកាចុងស្ថេរភាពមួយ ជាធម្មតា ក្នុងករណីនេះ ជាកាចុងអាស៊ីលស្ថេរភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ប្រតិកម្មបូកលើអាតូមកាបូនខាងក្នុងអាចបង្កើតកាចុងថ្នាក់ទី១អន់ស្ថេរភាព ដែលមិនអាចបន្ស៊ប់ដោយផលស្វ័យប្រវត្តិ៖



ក្នុងដំណាក់កាលទី២ អ៊ីយ៉ុងក្លរូបង្កើតសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមកាបូនមួយរបស់កាចុងអាស៊ីលដែលមានបន្ទុកវិជ្ជមានដោយផ្នែក។ ប្រតិកម្មលើអាតូមកាបូនមួយបង្កើតជាផលិតផលបូក-1,2 ឯប្រតិកម្មលើអាតូមកាបូនមួយទៀតបង្កើតផលិតផលបូក-1,4។

ចូរកត់សម្គាល់ថា ការតាង-1,2 និង -1,4 ទាក់ទងនឹងការបង់លេខ IUPAC លើអាតូមកាបូនក្នុងឧទាហរណ៍នេះ។


- អ្នកគីមីប្រើ -1,2- និង -1,4 ដើម្បីសំដៅលើរបៀបបូកលើប្រព័ន្ធខីអែនឆ្លាស់ ដោយមិនគិតពីកន្លែងរបស់សម្ព័ន្ធពីរជាន់ស្ថិតនៅក្នុងម៉ូលេគុលទេ។

ដូចនេះ ប្រតិកម្មបូករបស់ 2,4-អិចសាឌីអែននៅតែជាប្រតិកម្មទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មបូកតាមរបៀប-1,2 និង -1,4។


លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.៨៖ ចូរឱ្យផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



1,3-ប៊ុយតាឌីអែនបង្ហាញប្រតិកម្មបូក-1,4ជាមួយភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ីកក្រៅពីអ៊ីដ្រូសែនក្លរួ។ ឧទាហរណ៍ ពីរខាងក្រោម គឺប្រតិកម្មបូកអ៊ីដ្រូសែនប្រូម (មិនមានវត្តមានពែរអុកស៊ីតទេ) និងប្រតិកម្មបូកប្រូម៖




ប្រតិកម្មប្រភេទនេះអាចកើតឡើងជាមួយឌីអែនឆ្លាស់ផ្សេងទៀត។ ទ្រីអែនឆ្លាស់តែងតែមានប្រតិកម្មបូក-1,6។ ឧទាហរណ៍មួយគឺប្រតិកម្មបូក-1,6 នៃប្រូមលើ 1,3,5-ស៊ីក្លូអុកតាទ្រីអែន៖



❖ **ការត្រួតពិនិត្យស៊ីនេទិច និងថេរម៉ូឌីណាមិចនៃប្រតិកម្មគីមីមួយ**

ប្រតិកម្មបូករបស់អ៊ីដ្រូសែនប្រូមលើ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនបង្ហាញទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយទៀតនៃប្រតិកម្មភាពគីមី មធ្យោបាយដែលសីតុណ្ហភាពជះឥទ្ធិពលលើរបាយផលិតផលក្នុងប្រតិកម្មដែលអាចកើតកើតឡើងតាមផ្លូវច្រើន។ ជាទូទៅ៖

- ផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មមួយដែលសម្របសម្រួលនៅសីតុណ្ហភាពទាប ត្រូវបានកើតតាមផ្លូវដែលមានរបាំងថាមពលសកម្មទាបជាងគេបំផុត។ ក្នុងករណីនេះ គេហៅថាប្រតិកម្មនេះថាជាប្រតិកម្មដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយស៊ីនេទិច (ឬល្បឿន) (kinetic control) ហើយផលិតផលឧត្តមភាពជា **ផលិតផលស៊ីនេទិច** (kinetic products) ។
- ផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មដែលសម្របសម្រួលនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ក្នុងប្រតិកម្មប្រាសមួយជាផលិតផលដែលមានស្ថេរភាពបំផុត។ ក្នុងករណីនេះ គេហៅប្រតិកម្មនេះថាជាប្រតិកម្មដែល ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយថេរម៉ូឌីណាមិច (ឬលំនឹង) (Thermodynamic control) ហើយផលិតផលឧត្តមភាពជា **ផលិតផលថេរម៉ូឌីណាមិច** (Thermodynamic products) ។



រូប១៣.១១ ដ្យាក្រាមថាមពលសេរីអនុគមន៍នឹងដំណើរការប្រតិកម្មរបស់ប្រតិកម្មបូក-1,2 និង បូក-1,4 របស់ HBr លើ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន។ កាបូកាចុងអាស៊ីលជាចំណុចរួមរបស់ផ្លូវទាំងពីរ។ របាំងថាមពលសម្រាប់ការប្រយុទ្ធនៃអ៊ីយ៉ុងប្រូមលើ កាចុងអាស៊ីលបង្កើតផលិតផលបូក-1,2 ទាបជាងរបាំងថាមពលដែលបង្កើតផលិតផលបូក-1,4។

ផលិតផលបូក-1,2 ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយស៊ីនេទិច។ ផលិតផលបូក-1,4 មានស្ថេរភាពជាង ហើយវាជា **ផលិតផលត្រួតពិនិត្យដោយ ថេរម៉ូឌីណាមិច**។

យើងឃើញក្នុងរូប១៣.១១ ថា ថាមពលសេរីសកម្មដែលបង្កើតផលិតផលបូក-1,2 ទាបជាងថាមពលសេរីសកម្មបង្កើតផលិតផលបូក-1,4 ទោះបីជាផលិតផលបូក-1,4មានស្ថេរភាពជាងក៏ដោយ។

- នៅសីតុណ្ហភាពទាប ភាគរយនៃការទង្គិចដើម្បីឱ្យមានថាមពលធំជាងរបាំងថាមពលបង្កើតផលិតផលបូក-1,4 តិចជាងភាគរយនៃការទង្គិចបង្កើតផលិតផលបូក-1,2។

- នៅសីតុណ្ហភាពទាប ការកើតផលិតផលបូក-1,2 និងបូក-1,4 គឺមិនអាចគ្រលប់វិញបាន ពីព្រោះមិនមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យផលិតផលទាំងពីរអាចឆ្លងរបាំងថាមពលបង្កើតជាកាចុងអាស៊ីលវិញបាន។ ដូចនេះ ផលិតផលបូក-1,2មានឧត្តមភាពនៅសីតុណ្ហភាពទាប ពីព្រោះវាត្រូវបានកកើតឡើងជាង ហើយវាមិនអាចគ្រលប់ទៅវិញបាន។ វាជាផលិតផលស៊ីនេទិចរបស់ប្រតិកម្មនេះ។
- **នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់** ការទង្គិចរវាងអ៊ីយ៉ុងអង្គធាតុកណ្តាលបង្កើតថាមពលគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យកកើតផលិតផលទាំងពីរយ៉ាងហ័ស។ ប៉ុន្តែ វាក៏មានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យផលិតផលទាំងពីរបម្លែងគ្រលប់មកកាចុងអាស៊ីលវិញ។
- ដោយសារតែ ផលិតផលបូក-1,2 មានរបាំងថាមពលសេរីសម្រាប់ការបម្លែងទៅកាចុងអាស៊ីលវិញតូចជាងរបាំងថាមពលសេរីនៃផលិតផលបូក-1,4 មានផលិតផលបូក-1,2ច្រើនជាងដែលបានបម្លែងទៅជាកាចុងអាស៊ីលច្រើនជាងផលិតផលបូក-1,4។ ប៉ុន្តែដោយសារផលិតផល ទាំងពីរត្រូវបានបង្កើតពីកាចុងអាស៊ីលនៅសីតុណ្ហភាព លំនឹងនៃប្រតិកម្មនេះនឹងរំកិលទៅកាន់ ផលិតផលបូក-1,4 ជាផលិតផលឧត្តមភាព ពីព្រោះវាមានស្ថេរភាពជាង។ ផលិតផលបូក-1,4 ជា**ផលិតផលទែម៉ូឌីណាមិច** ឬ **ផលិតផលលំនឹង**របស់ប្រតិកម្មនេះ។

មុនពេលយើងចេញពីប្រធានបទនេះ យើងត្រូវកត់សម្គាល់ចំណុចចុងក្រោយមួយ។ ឧទាហរណ៍នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា ការទស្សន៍ទាយល្បឿនប្រតិកម្មអាចធ្វើបានអាស្រ័យលើស្ថេរភាពរបស់ផលិតផលតែមួយគឺមិនត្រឹមត្រូវទេ។ ប៉ុន្តែ វាមិនកើតឡើងគ្រប់ករណីទាំងអស់ទេ។ ចំពោះប្រតិកម្មជាច្រើនដែលមានឆ្លងកាត់អង្គធាតុកណ្តាលរួម បង្កើតជាផលិតផលពីរ ឬច្រើន ផលិតផលដែលមានស្ថេរភាពជាងគេត្រូវបានបង្កើតហ័សជាងគេ។


លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.៩៖

- ចូរពន្យល់តាមទម្រង់ដែលបញ្ជាក់ថា ប្រតិកម្មបូក-1,2នៃ1,3-ប៊ុយតាឌីអែនជាមួយអ៊ីដ្រូសែនប្រូម កើតឡើងហ័សជាងប្រតិកម្មបូក-1,4។
- ចូរពន្យល់ហេតុអ្វីបានជាផលិតផលបូក-1,4 មានស្ថេរភាពជាង។

១០. ប្រតិកម្ម Diels-Alder ៖ ប្រតិកម្មបូក៦-1,4 នៃឌីអែន

ក្នុងឆ្នាំ១៩២៨ អ្នកគីមីអាណ្លីម៉ង់ Otto Diels និងKurt Alderបានបង្កើតប្រតិកម្មបូក៦-1,4 នៃឌីអែន។ ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានបង្ហាញជាប្រតិកម្មមួយដែលមានប្រយោជន៍ច្រើន និងជាប្រតិកម្មសំយោគដែលDiels និងAlder ទទួលបានរង្វាន់ណូបែលផ្នែកគីមីក្នុងឆ្នាំ១៩៥០។

ឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្ម Diels-Alder ជាប្រតិកម្មដែលកើតឡើងនៅពេល 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន និងម៉ាលេអ៊ីចអានីទ្រីតត្រូវបានកម្ដៅរួមគ្នានៅ 100°C។ ផលិតផលទទួលបានក្នុងទិន្នផលខ្ពស់បំផុត។




- ក្នុងន័យទូទៅ ប្រតិកម្ម Diel-Alder ជាប្រតិកម្មមួយរវាងឌីអែនឆ្លាស់មួយ (ប្រព័ន្ធ 4 អេឡិចត្រុង π) និងសមាសធាតុមួយមានសម្ព័ន្ធពីជាន់មួយ (ប្រព័ន្ធ 2 អេឡិចត្រុង π) ហៅថា ឌីអែណូភីល (Dienophile) (ចូលចិត្តឌីអែន)។ ផលិតផលរបស់ប្រតិកម្ម Diel-Alder ត្រូវបានគេហៅថា អាដាក់ (adduct)។



ក្នុងប្រតិកម្ម Diel-Alder សម្ព័ន្ធពីជាន់មួយត្រូវបានកកើតពីការដាច់នៃសម្ព័ន្ធពីជាន់មួយរបស់ឌីអែន និងឌីអែណូភីល។ អាដាក់រង់៦អាតូមមួយ សម្ព័ន្ធពីជាន់មួយ។ ដោយសារតែសម្ព័ន្ធពីជាន់តែងតែខ្លាំងជាងសម្ព័ន្ធពីជាន់ π ការកកើតអាដាក់មួយតែងតែត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយថាមពល ប៉ុន្តែប្រតិកម្ម Diels-Alder ស្ទើរតែអស់ជាប្រតិកម្មអាចគ្រប់គ្រងបាន។

ប្រតិកម្ម Diels-Alder ជាឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្មបិទរង (pericyclic reaction)។ ប្រតិកម្មបិទរងជាប្រតិកម្មត្រូវបានកើតឡើងក្នុងមួយដំណាក់កាល ឆ្លងកាត់អន្តរភាពរង់មួយដែលមានលក្ខណៈអប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល ស៊ីមេទ្រីត្រួតពិនិត្យប្រតិកម្ម។


ឧទាហរណ៍ងាយបំផុតនៃប្រតិកម្ម Diels-Alder ជាប្រតិកម្មដែលកើតឡើងរវាង 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន និងអេតែន។ ប៉ុន្តែប្រតិកម្មកើតឡើងយឺតជាងប្រតិកម្មរវាងប៊ុយតាឌីអែនជាមួយម៉ាលេអ៊ុចអានីត្រីត ហើយត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមលក្ខខណ្ឌសំពាធនៈ



ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺធ្វើអង្គធាតុកណ្តាលមួយក្នុងការសំយោគថ្នាំប្រឆាំងមហារីក Taxol (paclitaxel) ដោយ K. C. Nicolaou (វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Scripps និងសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា San Diego) ៖



ជាទូទៅ ឌីអែណូក្លីលមានប្រតិកម្មជាមួយឌីអែនឆ្លាស់ដោយប្រតិកម្មបូក-1,4 បង្កើតវង់៦អាតូមមួយ។ ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថា **ប្រតិកម្មបូកវង់ [4+2]** ដែលត្រូវបានហៅឈ្មោះដោយយោងទៅលើចំនួនអាតូមពីប្រតិកម្មនីមួយៗដែលចូលរួមបង្កើតវង់ ហើយប្រតិកម្មនេះបញ្ចេញកម្ដៅ។ ទីតាំងណាមួយនៃផ្នែកទាំងពីរបស់ឌីអែនឬឌីអែណូក្លីលអាចត្រូវបានជំនួស។ ក្រុមទាញអេឡិចត្រុងខ្លះដែលជាផ្នែករបស់ឌីអែណូក្លីល ត្រូវបានតាងដោយ Z និង Z' ដូចបង្ហាញខាងក្រោម៖



ដែល Z និង Z' អាចជា CHO, COR, CO₂H, CO₂R, CN, Ar, CO-O-CO, ឬ អាឡូសែន និងក្រុមផ្សេងទៀត ប្រតិកម្មបិទវង់ដែលមានអាល់សែនពីរប្រតិកម្មជាមួយគ្នាតាមរបៀបនេះ ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាង ក្រោម៖




ប្រតិកម្មនេះហៅថា ប្រតិកម្មបូកវង់[2+2] ហើយវាត្រូវការថាមពលពន្លឺ។

១០.១ កត្តាជំរុញប្រតិកម្មDiels-Alder

Alderបានលើកឡើងថា ប្រតិកម្មDiels-Alder ត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយវត្ថុមាននៃក្រុមទាញអេឡិចត្រុងក្នុងឌីអែណូក្លីល និងដោយក្រុមទាញអេឡិចត្រុងក្នុងឌីអែន។ ម៉ាលេអ៊ីតអាស៊ីតឌីអែណូក្លីល ខ្លាំងមួយមានក្រុមកាបូនីលទាញអេឡិចត្រុងពីរលើអាតូមកាបូនជាមួយអាតូមកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់។


ឥទ្ធិពលនៃក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុងក្នុងឌីអែនក៏អាចបង្ហាញផងដែរ ឧទាហរណ៍2,3-ឌីមេទីល-1,3-ប៊ុយតាឌីអែនមានប្រតិកម្ម Diels-Alder លឿនជាង 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន ប្រហែល៥ដង។ ក្រុមមេទីលឱ្យដងស៊ីតេអេឡិចត្រុងតាមផលអាំងឌុចទីវ ដូចក្រុមអាល់គីលមាននៅពេលបន្សំកាបូកាចុង (ទោះបីគ្មានកាបូកាចុងក៏ដោយ)។ នៅពេល 2,3-ឌីមេទីល-1,3-ប៊ុយតាឌីអែនប្រតិកម្មជាមួយប្រូប៉ែណាល់(អាត្រូលីន)នៅសីតុណ្ហភាព តែ 30°C គេទទួលបានអាជាក់ក្នុងទិន្នផលខ្ពស់បំផុត (Quantitative yield) ៖



ការស្រាវជ្រាវ (ដោយ C. K. Bradsher នៅសាកលវិទ្យាល័យ Duke) បានបង្ហាញថា ទីតាំងក្រុមទាញអេឡិចត្រុង និងក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុងក្នុងឌីអែណូក្លីល និងឌីអែនអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយគ្មានការបាត់បង់ទិន្នផលនៃអាជាក់។ ឌីអែនដែលមានក្រុមទាញអេឡិចត្រុងត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រតិកម្មជាមួយឌីអែណូក្លីលដែលមានក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុងយ៉ាងងាយស្រួល។

ក្រៅពីការប្រើប្រាស់ឌីអែន និងឌីអែណូក្លីលដែលមានលក្ខណៈឱ្យអេឡិចត្រុង និងទាញអេឡិចត្រុង កត្តាផ្សេងទៀតដែលជម្រុញល្បឿនប្រតិកម្ម Diels-Alder រួមមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសំពាធកម្រិត។ វិធីសាស្ត្រដែលគេ


និយមប្រើមួយទៀតគឺប្រើកាតាលីករអាស៊ីតឡឺវីស។ ប្រតិកម្មខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍មួយ ដែលប្រតិកម្ម Diels-Alder កកើតនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ក្រោមវត្តមានកាតាលីករអាស៊ីត (ក្នុងផ្នែក១០.គ យើងនឹងឃើញពីរបៀបដែលអាស៊ីតឡឺវីសអាចត្រូវបានប្រើជាមួយលីហ្គង់គីរ៉ាល់ ដើម្បីបង្កើតភាពអស៊ីមេទ្រីក្នុងផលិតផលប្រតិកម្ម)។



១០.២ ស្តេរ៉េអូគីមីនៃប្រតិកម្ម Diels-Alder

ឥឡូវនេះ ចូរយើងពិចារណាលើទិដ្ឋភាពស្តេរ៉េអូគីមីនៃប្រតិកម្ម Diels-Alder។ កត្តាខាងក្រោមជាមូលហេតុដែលធ្វើឱ្យប្រតិកម្ម Diels-Alder មានសារប្រយោជន៍ណាស់ក្នុងការសំយោគ។

១. ប្រតិកម្ម Diels-Alder ជាប្រតិកម្មស្តេរ៉េអូជាក់លាក់៖ ប្រតិកម្មជាប្រតិកម្មបូក-ស៊ុនមួយ ហើយក្នុងកិច្ចសង្ខេបរបស់ឌីអែណូកីលត្រូវបានរក្សាក្នុងផលិតផល។ ឧទាហរណ៍ពីរដែលបង្ហាញទិដ្ឋភាពនៃប្រតិកម្មនេះ ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖




ក្នុងឧទាហរណ៍ទី១ ឌីអែណូកីលមួយជាមួយក្រុមអេស្ទែរស៊ីសប្រតិកម្មជាមួយ1,3-ប៊ុយ តាឌីអែនបង្កើត ជាអាជាក់មួយដែលមានក្រុមអេស្ទែរស៊ីស។ ក្នុងឧទាហរណ៍ទី២គ្រាន់តែបញ្ជ្រាសគ្នាជាការពិត។ ត្រង់-ឌីអែណូកីលបង្កើតត្រង់-អាជាក់ មួយ។


២. ជាចាំបាច់ ឌីអែនប្រតិកម្មក្នុងកុងផរម៉ាស្យុង s-ស៊ីស ជាជាងកុងផរម៉ាស្យុង s-ត្រង់៖




បើសិនជាប្រតិកម្មក្នុងកុងផរម៉ាស្យុងs-ត្រង់អាចកើតឡើង វាអាចបង្កើតវ៉ែង៦អាតូមដែលមាន សម្ព័ន្ធ ពីរជាន់រមួលសម្ព័ន្ធខ្ពស់។ ករណីប្រតិកម្ម Diels-Alder នេះមិនដែលសង្កេតឃើញទេ។



ឌីអែនវ៉ែងដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ក្នុងកុងផរម៉ាស្យុងs-ស៊ីស តែងតែមានប្រតិកម្ម Diels-Alder ខ្លាំង។ ឧទាហរណ៍ ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនប្រតិកម្មជាមួយម៉ាលេអ៊ីចអានីត្រីតនៅ សីតុណ្ហភាព បន្ទប់បង្កើតអាជាក់ខាងក្រោមក្នុងទិន្នផលខ្ពស់បំផុត។



ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនមានប្រតិកម្មភាពខ្លាំង ដែលនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ វាអាចរងប្រតិកម្ម Diels-Alder យឺតៗដោយខ្លួនវា៖



ប៉ុន្តែប្រតិកម្មអាចត្រលប់មកវិញ។ នៅពេលឌីស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនត្រូវបានគេបិទវ៉ាបំបែកជា ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែន២ម៉ូល។ ប្រតិកម្មរបស់ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនបង្ហាញលក្ខណៈស្តេអែក្លីមីរបស់ ប្រតិកម្មDiels-Alder។


៣. ប្រតិកម្ម Diels-Alder កើតឡើងជាដំបូងតាមបែបអង់ដូជាជាងបែបអ៊ីចសូ នៅពេលប្រតិកម្ម ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយស៊ីនេទិច។ ឌីអែណូក្លីលមួយតែងតែមានក្រុមទាញអេឡិចត្រុងមួយ ដូចជា ក្រុមកាបូនីល ឬក្រុមអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានផ្សេងទៀតដែលមានអេឡិចត្រុង π ដូចក្នុង ឧទាហរណ៍ ខាងក្រោម និងក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងអស់ដែលយើងបានឃើញកន្លងមក។

- ក្នុងប្រតិកម្ម Diels-Alder អង់ដូ និងអ៊ីចសូសំដៅលើជំណាចនៃឌីអែណូក្លីល និង ក្រុម ទាញអេឡិចត្រុងរបស់វា នៅពេលវាមានប្រតិកម្មជាមួយឌីអែន។
- នៅពេលឌីអែណូក្លីលមានប្រតិកម្មដូចនេះ អរ៊ីតាល់អេឡិចត្រុង π របស់ក្រុមទាញ អេឡិចត្រុងតម្រៀបពីក្រុម (ឬពីលើ) អរ៊ីតាល់អេឡិចត្រុង π របស់ឌីអែន វិធីតម្រៀប បែប នេះត្រូវបានគេហៅថាអង់ដូ។
- នៅពេលក្រុមទាញអេឡិចត្រុងរបស់ឌីអែណូក្លីលត្រូវបានតម្រៀបចេញឆ្ងាយពីអេឡិចត្រុង ត្រុង π របស់ឌីអែនក្នុងអន្តរភាព វិធីតម្រៀបបែបនេះត្រូវបានគេហៅថាអ៊ីចសូ។


- នៅពេលប្រតិកម្ម Diels-Alder មួយកើតឡើង ផលិតផលទាំងពីរអន្តរភាពអង់ដូ និងអ៊ីចសូ អាចកើតឡើង ប៉ុន្តែផលិតផលអង់ដូតែងតែមានឧត្តមភាព ពីព្រោះអន្តរភាព អង់ដូតែងតែ មានថាមពលទាបជាង។

ទោះបីជាយោងមិនបានពិភាក្សាលម្អិតនៅកន្លែងនេះ ប្រតិកម្មដែលសម្របសម្រួលតាមអង់ដូកើតឡើង ដោយការគ្របដណ្តប់អរីតាល់ដែលធ្វើឱ្យថាមពលអន្តរភាពទាបក្នុងដំណើរទិសអង់ដូ។ ចំពោះមូលហេតុនេះ ផលិតផលអង់ដូត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងរហ័ស (វាជាផលិតផលស៊ីនេទិច)។

ចូរពិចារណាលើឧទាហរណ៍ក្នុងរូប១៣.១២ ដែលទាក់ទងនឹង (2E,4E)-អ៊ីច-2,4-ឌីអែន និងមេទីល ប្រូប៉ាណូអាត។ ចូរកត់សម្គាល់ថា វីធីអង់ដូ ឬអ៊ីចសូជះឥទ្ធិពលលើស្តេរ៉េអូគីមីផលិតផលនៃក្រុមទាញអេឡិចត្រុងពី ឌីអ៊ែណូកីល។



វីធីអង់ដូ៖ ឌីអ៊ែណូកីលតម្រៀបដោយក្រុមទាញអេឡិចត្រុងរបស់វានៅពីក្រោមប្រព័ន្ធ π ឌីអែន ដូចដែលបានបង្ហាញ ឬពីលើវា (មិនបានបង្ហាញ)។ វីធីអង់ដូពីរនេះធ្វើឱ្យកើតអេណង់តូមែរ។




វីធីអ៊ីចសូ៖ ឌីអ៊ែណូកីលតម្រៀបដោយក្រុមទាញអេឡិចត្រុងរបស់វានៅខាងក្រោម និងចេញពីប្រព័ន្ធ π ឌីអែន ដូចបង្ហាញ ឬពីលើ និងចេញពីប្រព័ន្ធ π ឌីអែន (មិនបានបង្ហាញ)។ វីធីអ៊ីចសូទាំងពីរធ្វើឱ្យកើតអេណង់តូមែរ។

រូប១៣.១២ ប្រតិកម្ម Diels-Alder នៃ (2E,4E)-អ៊ីចសា-2,4-ឌីអែន និងមេទីលប្រូប៉ែនណូអាត តាមវិធី (a) អង់ដូ និង (b) អ៊ីចសូ

ទោះបីក្នុងឧទាហរណ៍អង់ដូ និងអ៊ីចសូទាំងពីរដែលយើងបានបង្ហាញក្នុងរូប១៣.១២ ឌីអ៊ែណូកីល ប្រយុទ្ធលើឌីអែនពីខាងក្រោម ឌីអ៊ែណូកីលក៏អាចប្រយុទ្ធលើឌីអែនពីខាងលើបានដែរ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យកើតអេណង់តូមែរក្នុងករណីនេះ។ ជាទូទៅ ប្រតិកម្ម Diels-Alder ធ្វើឱ្យកើតអេណង់តូមែរ លុះត្រាតែ ប្រតិកម្មមួយក្នុងចំណោមទាំងពីរជាសមាសធាតុគីរ៉ាល់ ឬមានឥទ្ធិពលពីភាគលីការគីរ៉ាល់។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.១១៖ ចូរគូរអន្តរភាពរបស់ប្រតិកម្ម Diels-Alder អង់ដូ និងអ៊ីចសូនៃម៉ាលេអ៊ីចអានីទ្រីត ជាមួយស៊ីគ្លូប៉ង់តាឌីអែន។ អន្តរភាពដែលនាំឱ្យកើតអេណង់តូមែរតែមួយត្រូវបង្ហាញក្នុងករណីនេះ។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.១២៖ បើសិនជាយើងចង់សរសេរសមីការគីមីតាងប្រតិកម្ម (2E,4E)-អ៊ីចសា-2,4-ឌីអែន និង មេទីលប្រូប៉ែណូអាត យើងអាចសរសេរវាដូចបង្ហាញខាងក្រោម។



ឧត្តមភាពដោយប្រតិកម្ម ឧត្តមភាពដោយប្រតិកម្ម
 បូកអង់ដូ (បូកអេណង់តូមែរ) បូកអ៊ីចសូ (បូកអេណង់តូមែរ)

- ចូរពន្យល់ថាហេតុអ្វីយើងអាចទស្សន៍ទាយថាផលិតផលអង់ដូ និងអ៊ីចសូនឹងអាចកើតជាគូ អេណង់តូមែរមួយ។
- តើទំនាក់ទំនងស្តេរ៉េអូគីមីរវាងអេណង់តូមែរអង់ដូមួយជាមួយអេណង់តូមែរអ៊ីចសូមួយជាអ្វី?


ពាក្យថាអង់ដូ និងអ៊ីចសូក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីតាងដំណៅទិសក្រុមជួសលើកាបូនចតុមុខក្នុងស្ថាននៃ ប្រព័ន្ធរង់ប៊ីស៊ីគ្លីចផងដែរ។

- ក្នុងប្រព័ន្ធរង់ប៊ីស៊ីគ្លីចមួយ ក្រុមជួសមួយជាអ៊ីចសូ បើសិនសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ទៅស្ថានត្រូវបានដៅទិសចេញពីស្ថានរំងង់ជាងគេនៃស្ថាននៅសល់ទាំងពីរក្នុងប្រព័ន្ធនោះ ហើយក្រុមជួសមួយជាអង់ដូ បើសិនសម្ព័ន្ធទៅក្រុមជួសនោះត្រូវបានដៅទិសឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានរំងង់ជាងគេនៃស្ថាននៅសល់ទាំងពីរ។

រូបខាងក្រោមបង្ហាញក្រុម R ក្នុងទីតាំងអ៊ីចសូមួយ និងក្នុងទីតាំងអង់ដូមួយ។




ចូរពិចារណាលើប្រតិកម្ម Diels-Alder របស់ស៊ីគ្លូប៉ង់តាឌីអែនជាមួយប្រូប៉ែណូអាតខាងក្រោម។ ក្រុម អេស្ទែរក្នុងផលិតផលឧត្តមភាពជាអង់ដូ ពីព្រោះក្រុមជួសអេស្ទែរត្រូវបានដៅទិសទៅក្បែរស្ថានកាបូនពីរ (រំងង់ ជាង) ជាស្ថានកាបូនមួយ (ខ្លីជាង)។ ក្នុងផលិតផលតិចតួច ក្រុមជួសអេស្ទែរជាអ៊ីចសូ ពីព្រោះវាត្រូវបានដៅ ទិសចេញពីស្ថានរំងង់ជាងគេ។



ផលិតផលអង់ដូ (ឧត្តមភាព) ផលិតផលអ៊ីចសូ (តិចតួច)
 (បូកអេណង់តូមែរ) (បូកអេណង់តូមែរ)

៤. ក្នុងកិច្ចស្វែងរករបស់ឌីអែនត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប្រតិកម្មDiels-Alder។ ដូចគ្នាទៅនឹងក្នុងកិច្ចស្វែងរបស់ឌីអែណូក្លីលដែលត្រូវបានរក្សាក្នុងអាជាកនៃប្រតិកម្ម Diels-Alder មួយ (មើល ចំណុច1ខាងលើ) ក្នុងកិច្ចស្វែងរបស់ឌីអែនក៏ត្រូវបានរក្សាទុកដែរ។ អ្វីដែលយើងមានន័យគឺថា ស្តេរ៉េអូគីមីអាល់សែន E,Z ទាំងរបស់ឌីអែន និងឌីអែណូក្លីលត្រូវបានផ្ទេរទៅជាមណ្ឌល គឺរាល់ចតុមុខក្នុងអាជាកDiels-Alder។ ចូរពិចារណាលើប្រតិកម្មខាងក្រោមនៃម៉ាលេអ៊ីចអានីត្រីតជាមួយ (2E, 4E)-អ៊ីចសា-2,4-ឌីអែន និងជាមួយជ្យ៉ាស្តេរ៉េអូមែរអាល់សែននេះ និង (2E,4Z)-អ៊ីចសា-2,4-ឌីអែនដោយបង្ហាញផលិតផលអង់ដូ (ឧត្តមភាព) ក្នុងករណីនេះ។




បើសិនក្រុមជួសឌីអែនទាំងពីរស្ថិតនៅខាងក្រៅភាគីឌីអែន នៅពេលឌីអែនស្ថិតក្នុងក្នុងផែរម៉ាស្យុង-s-ស៊ីស ក្រុមជួសនឹងមានក្នុងផែរម៉ាស្យុងស៊ីស។

ការពិចារណាលើអន្តរភាពរបស់ប្រតិកម្មនីមួយៗ ដូចបានបង្ហាញខាងលើជួយបង្ហាញពីរបៀបដែលស្តេរ៉េអូគីមីត្រូវបានផ្ទេរពីឌីអែនទៅអាជាកក្នុងករណីនីមួយៗ។


លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.១២៖ បើសិន (2Z,4Z)-អ៊ីចសា-2,4-ឌីអែនអាចរងប្រតិកម្មDiels-Alder មួយជាមួយមេទីលប្រូប៉ែណូអាត តើទទួលបានផលិតផលជាអ្វី? តាមធាតុពិតប្រតិកម្ម Diels-Alder នេះមិនអាចអនុវត្តបានទេពីព្រោះក្នុងផែរម៉ាស្យុង-s-ស៊ីសរបស់ឌីអែនត្រូវការសម្រាប់ប្រតិកម្មមានថាមពលខ្ពស់ដោយសាររបាំងស្តេរីចរវាងក្រុមមេទីល។

១០.៣ របៀបទស្សន៍ទាយផលិតផលរបស់ប្រតិកម្ម Diels-Alder មួយ

បញ្ហា៖ ចូរទស្សន៍ទាយផលិតផលប្រតិកម្ម Diels-Alder រវាងសមាសធាតុខាងក្រោម៖




យុទ្ធសាស្ត្រ និងដំណោះស្រាយ៖ គួរឌីអែនក្នុងក្នុងផែរម៉ាស្យុង-s-ស៊ីស ដែលចុងទាំងពីររបស់សម្ព័ន្ធពីរជាន់នៅក្បែរសម្ព័ន្ធពីរជាន់របស់ឌីអែណូក្លីល។ បន្ទាប់មកបង្ហាញចលនាទ្វេតាអេឡិចត្រុងដែលនឹងបង្កើនម៉ូលេគុលទាំងពីរជាម៉ូលេគុលស៊ីគ្លីចមួយ។




១០.៤ របៀបប្រើប្រតិកម្ម Diels-Alder មួយក្នុងការវិភាគសំយោគត្រលប់

បញ្ហា៖ ចូរធ្វើការសំយោគស្តេរ៉េអូដាក់លាក់នៃស្តេរ៉េអូអ៊ីសូមេរីសទាំងអស់របស់ 1,2,3,4-តេត្រាមេទីលស៊ីក្លូអិចសាន (ដែលមានក្រុមមេទីលទាំងអស់ស្ថិតនៅខាងដូចគ្នានៃវង់) ។


ការវិភាគសំយោគត្រលប់ និងដំណោះស្រាយ៖ ការប្រឌិតការសំយោគនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យឃើញពីរបៀបដែលប្រតិកម្ម Diels-Alder មួយអាចប្រើដើម្បីរួមចំណែកក្នុងស្តេរ៉េអូគីមីដាក់លាក់ក្នុងការសំយោគមួយ។ វាក៏អាចជួយអ្នករំលឹកប្រតិកម្មផ្សេងទៀតដែលអ្នកទើបតែបានសិក្សា។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបសំយោគត្រលប់របស់យើង៖




ខាងក្រោមនេះជាការសំយោគរបស់យើង។ យើងប្រើប្រតិកម្ម Diels-Alder បង្កើតវង់៦អាតូមដែលមានស្តេរ៉េអូគីមីស៊ីសទាំងអស់ពីផលិតផលអង់ដូ។ បន្ទាប់មក យើងបំប្លែងក្រុម $\text{-CO}_2\text{H}$ ទៅជាក្រុម $\text{-CH}_2\text{OH}$ បន្ទាប់មកទៅជាក្រុម $\text{-CH}_2\text{Br}$ និងចុងក្រោយទៅជាក្រុម -CH_3 ។



លំហាត់អនុវត្តន៍ ១៣.១៤៖ តើផលិតផលណាដែលអ្នករំពឹងថានឹងទទួលបានពីប្រតិកម្មខាងក្រោម?







លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.១៥៖ តើឌីអែន និងឌីអែណូក៏លណាដែលអ្នកត្រូវប្រើដើម្បីសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម?



លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.១៥៖ ប្រតិកម្ម Diels-Alder ក៏អាចកើតឡើងជាមួយឌីអែណូក៏លសម្ព័ន្ធបីជាន់ (អាសេទីលេនិច)។ តើឌីអែន និងឌីអែណូក៏លណាដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីបង្កើតសមាសធាតុខាងក្រោម?



លំហាត់អនុវត្តន៍១៣.១៦៖ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន និងឌីអែណូក៏លបង្ហាញខាងក្រោម ត្រូវបានប្រើដោយ A.Eschenmoser ក្នុងការសំយោគវីតាមីន B₁₂ ជាមួយ R. B. Woodward។ ចូរគូរទម្រង់របស់អេណង់តូមែរអាជាក់ Diels-Alder ដែលអាចនឹងកើតក្នុងប្រតិកម្មនេះ និងគូរអន្តរភាពពីរដែលនាំឱ្យកើតផលិតផលទាំងនេះ។





លំហាត់មេរៀនទី១៣


ប្រព័ន្ធន្តាស

១. ចូរឱ្យដាក់ទីបដែលត្រូវការដើម្បីសំយោគ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន ដោយចាប់ផ្តើមពី៖

(a). 1,4- ឌីប្រូម៉ូប៊ុយតាន



២. តើផលិតផលណាដែលអ្នករំពឹងថាទទួលបានពីប្រតិកម្មខាងក្រោម?



៣. តើផលិតផលណាដែលអ្នករំពឹងថាទទួលបានពីប្រតិកម្មនៃ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន១ម៉ូល ជាមួយ អ្វី ដាក់ទីបខាងក្រោម? (បើសិនជាគ្មានប្រតិកម្ម ចូរបញ្ជាក់)។

a. ១ម៉ូលនៃ Cl_2

b. ២ម៉ូលនៃ Cl_2

c. ២ម៉ូលនៃ Br_2



d. 2ម៉ូលនៃ H_2 , Ni



e. ១ម៉ូលនៃ Cl_2 ក្នុងទឹក

f. KMnO_4 ក្តៅ (លើស)

g. H_2O , cat. H_2SO_4

៤. ចូរឱ្យដាក់ទីបដែលចាំបាច់សម្រាប់បង្កើន 2,3-ឌីមេទីល-1,3-ប៊ុយតាឌីអែនទៅជាសមាសធាតុខាងក្រោម៖







៥. ចូរឱ្យអ្នកកំណត់ទីបដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបង្កើនខាងក្រោម។ ក្នុងករណីខ្លះមានច្រើនដំណាក់កាល

(a) 1-ប៊ុយតែន $\rightarrow$ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន

(b) 1-ប៊ីនតែន $\rightarrow$ 1,3-ប៊ីនតាឌីអែន



៦. ឌីអែនឆ្លស់មានប្រតិកម្មជាមួយរ៉ាឌីកាល់សេរីដោយប្រតិកម្មបូក-1,2និងបូក-1,4។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មដោយប្រើប្រតិកម្មបូកជំរុញដោយពែរអុកស៊ីតនៃHBr ១ម៉ូលទៅលើ1,3-ប៊ុយតាឌីអែន។


៧. UV-Vis, IR, NMR និងម៉ាសស្ប៊ីតត្រូវបានប្រើជាបច្ចេកទេសស្ប៊ីតដែលយើងប្រើដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទម្រង់អំពីសមាសធាតុ។ ចំពោះគូសមាសធាតុខាងក្រោម ចូរបរិយាយពីទិដ្ឋភាពយ៉ាងហោចណាស់មួយពីវិធីសាស្ត្រស្ប៊ីតពីរ ដែលអាចព្រែកសមាសធាតុមួយក្នុងគូសមាសធាតុខាងក្រោម៖

a. 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន និង 1-ប៊ុយទីន

b. 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន និងប៊ុយតាន

c. ប៊ុយតាន និង


d. 1,3-ប៊ុយតាឌីអែន និង




៨. នៅពេល 2-មេទីល-1,3-ប៊ុយតាឌីអែន (អ៊ីសូប្រែន) រងប្រតិកម្មបូក-1,4 អ៊ីដ្រូសែនក្លរ ផលិតផលឧត្តម ភាពដែលត្រូវបានបង្កើតគឺ 1-ក្លរ៉ូ-3-មេទីល-2-ប៊ុយតែន។ 1-ក្លរ៉ូ-2-មេទីល-2-ប៊ុយតែនតិចតួច ត្រូវបាន បង្កើត ឬមិនបានកកើត។ ចូរពន្យល់អំពីមូលហេតុនេះ?

៩. នៅពេល 1-ប៉ង់តែនប្រតិកម្មជាមួយ N- ប្រូម៉ូស៊ីស៊ីនីមីត (NBS) ផលិតផលពីរដែលមានរូបមន្ត C_5H_9Br ត្រូវបានបង្កើត។ តើផលិតផលទាំងនេះជាអ្វី ហើយតើពួកគេត្រូវបានបង្កើតរបៀបណា?


១០. ចូរសរសេរចលនការដែលពន្យល់អំពីការកើតផលិតផលទាំងនេះ ដោយរួមមានអង្គធាតុកណ្តាល ទាំង អស់ បន្ទុកអាកូម និងសញ្ញាព្រួញដែលបង្ហាញលំហូរអេឡិចត្រុង។




១១. ចូរសរសេរចលនការបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម។ ចូរគូររូបក្រាមកូអរដោនេថាមពលប្រតិកម្មមួយ ដែល បង្ហាញផ្លូវទែម៉ូឌីណាមិច និងផ្លូវស៊ីនេទិចសម្រាប់ប្រតិកម្មនេះ។




១២. ចូរឱ្យផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




១៣. ចូរសរសេរចលនការពន្យល់អំពីការកើតផលិតផលខាងក្រោម៖



១៤. ចូរសរសេរចលនការពន្យល់ការកើតផលិតផលខាងក្រោម៖




១៥. គេដាក់ 1-ក្លរ៉ូ-3-មេទីល-2-ប៊ុយតែន ឬ 3-ក្លរ៉ូ-3-មេទីល-1-ប៊ុយតែនឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយ Ag_2O ក្នុង ទឹកបង្កើតល្បាយអាល់កុលដូចខាងក្រោម (និង AgCl)។




- ចូរសរសេរចលនការបង្កើតផលិតផលទាំងនេះ។
- តើអ្វីដែលអាចពន្យល់អំពីសមមាត្ររបស់អាល់សែនដែលកើតទាំងពីរ។

ប្រតិកម្ម Diels-Alder


១៦. ចូរបំពេញអរ្យប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលសម្រាប់ភាពគ្រឹះរបស់ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនខាងក្រោម។ ចូរផាត់ពណ៌ខ្មៅលើឡូបដែលកំណត់សញ្ញាផាសក្នុងអរ្យប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលនីមួយៗ ដោយយើងទៅលើការកើនឡើងថាមពលរបស់អរ្យប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល។ ចូរដាក់ពាក្យ HOMO និង LUMO ឱ្យអរ្យប៊ីតាល់ ហើយដាក់ចំនួនអេឡិចត្រុងក្នុងនីវ៉ូនីមួយៗដោយប្រើសញ្ញាព្រួញក្បាលមួយចំហៀងតាងឱ្យអេឡិចត្រុង នីមួយៗ។




១៧. ហេតុអ្វីបានជាម៉ូលេគុលឌីអែនឆ្លាស់ខាងក្រោមមិនរងប្រតិកម្ម Diels-Alder?



១៨. ចូរបៀបឌីអែនខាងក្រោមតាមលំដាប់កើនឡើងនៃប្រតិកម្មភាពក្នុងប្រតិកម្ម Diels-Alder។ ចូរពន្យល់ដោយសង្ខេបអំពីលំដាប់របស់អ្នក។




១៩. ចូរឱ្យទម្រង់ផលិតផលដែលនឹងកើតនៅពេល 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនមានប្រតិកម្មជាមួយសមាស ធាតុខាងក្រោម៖





២០. ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនរងប្រតិកម្ម Diels-Alder ជាមួយអេតែននៅ 160-180°C។ ចូរគូរទម្រង់ផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មនេះ។

២១. សមាសធាតុអាសេទីលេនិចអចប្រើជាឌីអែណូក្លីលក្នុងប្រតិកម្ម Diels-Alder។ ចូរគូរទម្រង់អាជាក់ដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មរបស់ 1,3-ប៊ុយតាឌីអែនជាមួយ៖




២២. ចូរឱ្យផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖






២៣. តើឌីអែន និងឌីអែណូកីលណាដែលអាចប្រើដើម្បីសំយោគសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោម៖




២៤. ចូរឱ្យអ្នកកំណត់ទីបំផុតដែលចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការបង្កើនខាងក្រោម។
ដំណាក់កាល។

ប្រតិកម្មខ្លះអាចមានច្រើនជាងមួយ



Orn Orn Orn Orn Orn Orn Orn

ផែនទីបញ្ញត្តិ




មេរៀនទី១៤

សមាសធាតុអរូម៉ាទិច

១. មេកានិចហ្វីញបង់សែន

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍របស់សមាសធាតុអរូម៉ាទិចរួមទាំងបង់សែនផងដែរ។ ក្នុងរូបមន្តទាំងនេះ យើងផ្ដោតការសិក្សារបស់យើងលើលក្ខណៈពិសេសរបស់វង់បង់សែន ដោយប្រើរង្វង់មូលមួយក្នុងឆករណ៍មួយដើម្បីតាងអេឡិចត្រុង π ៦ និងវង់៦អាតូមរបស់សមាសធាតុទាំងនេះ ដែលពីមុនមកយើងធ្លាប់តែបង្ហាញរូបមន្តទម្រង់របស់វង់សែនដូចតែទម្រង់ខាងឆ្វេងនេះតែប៉ុណ្ណោះ។



ការសិក្សាថ្នាក់របស់សមាសធាតុដែលអ្នកគឺមីហៅថាសមាសធាតុអរូម៉ាទិច បានចាប់ផ្ដើមដោយមេកានិចហ្វីញក្នុងឆ្នាំ១៨២៥ នៃអ៊ីដ្រូកាបូឌីមួយដោយអ្នកគឺមីអង់គ្លេស Michael Faraday ក្នុងឆ្នាំ១៨២៥។ Faradayបានហៅអ៊ីដ្រូកាបូឌីនេះថាប៊ីកាប៊ុយរ៉េតនៃអ៊ីដ្រូសែន ហើយឥឡូវយើងហៅវាថាបង់សែន។ Faradayបានព្យាករណ៍បង់សែនពីឧស្ម័នដែលបានបានពីព័រូលីសខ្លាញ់ត្រីបាឡែន។

ក្នុងឆ្នាំ១៨៣៤ អ្នកគឺមីអាល្លឺម៉ង់ Eilhardt Mitscherlich (សាកលវិទ្យាល័យប៊ែកឡាំង) បានសំយោគបង់សែនពីកម្ដៅអាស៊ីតបង់សូអ៊ីចជាមួយកាល់ស្យូមអុកស៊ីត។ ដោយប្រើរង្វង់ដង់ស៊ីតេចំហាយ Mitscherlich បានបង្ហាញបន្ថែមថា បង់សែនមានរូបមន្តម៉ូលេគុល C_6H_6 ៖



រូបមន្តម៉ូលេគុលនេះធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់។ បង់សែនមាន *អាតូមអ៊ីដ្រូសែនស្មើនឹងអាតូមកាបូន*។ បង់សែនដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុល C_6H_6 គួរតែជាសមាសធាតុមិនផ្អែកខ្ពស់មួយ ពីព្រោះវាមានចំនួនកង់អ៊ីដ្រូសែនស្មើនឹង៤។ ជាយថាហេតុ អ្នកគឺមីបានចាប់ផ្ដើមសម្គាល់ថា បង់សែនជាសមាជិកមួយនៃថ្នាក់ថ្មីនៃសមាសធាតុសរីរាង្គដែលមានលក្ខណៈគីមីមិនធម្មតា និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ដូចដែលយើងនឹងឃើញក្នុងផ្នែកទី៣ បង់សែនមិនបានបង្ហាញលក្ខណៈជាសមាសធាតុមិនផ្អែកខ្ពស់មួយទេ។


ក្នុងចុងសតវត្សទី១៩ ទ្រឹស្តីKekulé-Couper-Buterov នៃវ៉ាន់ត្រូវបានអនុវត្តជាប្រព័ន្ធលើសមាសធាតុ សរីរាង្គទាំងអស់។ លទ្ធផលមួយពីការប្រឹងប្រែងនេះគឺបានបែងចែកសមាសធាតុសរីរាង្គជាពីរផ្នែកធំៗ គឺ **សមាសធាតុអាឡីផាទិច** (aliphatic compounds) និង **សមាសធាតុអារូម៉ាទិច** (aromatic compounds)។ បន្ទាប់មក ដើម្បីចាត់ថ្នាក់ជាសមាសធាតុអាឡីផាទិច សមាសធាតុនោះត្រូវតែមានលក្ខណៈគីមីដូចខ្លាញ់ (fatlike) (ឥឡូវ វាមានន័យថា សមាសធាតុដែលមានប្រតិកម្មដូចអាល់កាណូល អាល់សែនមួយ អាល់ស៊ីនមួយ ឬស្រឡាយរបស់ពួកវា)។ បន្ទាប់មកសមាសធាតុមួយត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាសមាសធាតុអារូម៉ាទិចមានន័យថា សមាសធាតុនោះមានអាក្រក់ផលធៀបកាបូន-អ៊ីដ្រូសែនទាប ហើយជាសមាសធាតុប្រហើរ (fragrant)។ សមាសធាតុអារូម៉ាទិចស្ទើរមួយចំនួនធំទទួលបានប្រេង ឬជ័រក្នុងជាតិ។

Kekuléជាអ្នកដំបូងគេដើម្បីកំណត់សម្គាល់ថា សមាសធាតុអារូម៉ាទិចទាំងនេះទាំងអស់មានឯកតាកាបូន៦ ហើយពួកវានៅតែរក្សាឯកតានេះនៅពេលរវាងរងប្រតិកម្មប្លែងគីមី និងការបំបែក។ បង់សែនត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាជាសមាសធាតុមេនៃស៊េរីទាំងនេះ។ ប៉ុន្តែរហូតដល់ឆ្នាំ១៩២០ ទើបគេអាចយល់ពីទម្រង់របស់វាបានច្បាស់លាស់តាមទ្រឹស្តីមេកានិចកង់ទិច។


២. ការហៅឈ្មោះស្រឡាយបង់សែន

គេប្រើប្រព័ន្ធពីក្នុងការហៅឈ្មោះបង់សែន៖


- ក្នុងសមាសធាតុងាយមួយចំនួន *បង់សែន*ជាឈ្មោះមេហើយក្រុមជួសត្រូវបានហៅជាបុព្វបទ។ យើងមានឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោម៖




ក្លុយអ៊ូបង់សែន



ក្លរ៉ូបង់សែន




ប្រូម៉ូបង់សែន




នីត្រូបង់សែន

- ចំពោះសមាសធាតុងាយនិងសំខាន់ ក្រុមជួសនិងវង់បង់សែនត្រូវបានហៅបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាឈ្មោះរបស់ខ្សែមេ។


គេតែងហៅមេទីលបង់សែនថា *តូលុយអែន* គេតែងហៅអ៊ីដ្រុកស៊ីបង់សែនថា *ផេណុល* និងអាមីណូបង់សែនតែងតែត្រូវបានគេហៅថា *អាត់លីន*។ សមាសធាតុទាំងនេះ និងឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖




តូលុយអែន




ផេណុល




អាត់លីន




អាស៊ីតបង់សែនស៊ុលផួនិច



អាស៊ីតបង់ស៊ូអិច




អាសេតូផេណូន




អានីសុល

- នៅពេលមានវត្តមានក្រុមជួសពីរ គេត្រូវកំណត់ទីតាំងរបស់វាដោយបុព្វបទ អរតូ មេតា និង ប៉ារ៉ា (តាងដោយ o, m, និង p) ឬដោយការប្រើប្រាស់លេខ។


ចំពោះឌីប្រូម៉ូបង់សែន យើងមាន៖



1,2-ឌីប្រូម៉ូបង់សែន
(o-ឌីប្រូម៉ូបង់សែន)




1,3-ឌីប្រូម៉ូបង់សែន
(m-ឌីប្រូម៉ូបង់សែន)




1,4-ឌីប្រូម៉ូបង់សែន
(p-ឌីប្រូម៉ូបង់សែន)


ហើយចំពោះអាស៊ីតនីត្រូបង់ស៊ូអិច៖



អាស៊ីត 2-នីត្រូបង់ស៊ូអិច
(អាស៊ីត o-នីត្រូបង់ស៊ូអិច)




អាស៊ីត 3-នីត្រូបង់ស៊ូអិច
(អាស៊ីត m-នីត្រូបង់ស៊ូអិច)




អាស៊ីត 4-នីត្រូបង់ស៊ូអិច
(អាស៊ីត p-នីត្រូបង់ស៊ូអិច)


គេតែងតែហៅឌីមេទីលបង់សែនថា ស៊ីឡេន៖



1,2-ឌីមេទីលបង់សែន
(o-ស៊ីឡេន)




1,3-ឌីមេទីលបង់សែន
(m-ស៊ីឡេន)




1,4-ឌីមេទីលបង់សែន
(p-ស៊ីឡេន)

- បើសិនមានវត្តមានច្រើនជាងបីក្រុមលើវង់បង់សែន ទីតាំងរបស់ពួកវាត្រូវសម្គាល់ដោយលេខ។ ឧទាហរណ៍ ចូរពិចារណាលើសមាសធាតុទាំងពីរខាងក្រោម៖




1,2,3-ទ្រីក្លរូបង់សែន




1,2,3-ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែន

(មិនមែន 1,3,4-ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែន)

- វង់បង់សែនត្រូវបានបង់លេខរបៀបណាឱ្យលេខរបស់ក្រុមជួសតូចបំផុតបើអាចទៅរួច។
- នៅពេលមានវត្តមានក្រុមជួសច្រើនជាងពីរ ហើយក្រុមជួសខុសគ្នា ពួកវាត្រូវបានហៅតាមលំដាប់អក្សរឡាតាំង។
- នៅពេលក្រុមជួសមួយដែលអាចផ្ទុំជាមួយវង់បង់សែនបង្កើតជាឈ្មោះថ្មីមួយ ក្រុមជួសនោះត្រូវតែបង់លេខ 1 ហើយគេត្រូវប្រើឈ្មោះខ្សែមេថ្មីនោះ។




អាស៊ីត 3,5-ឌីនីត្រូបង់សូអ៊ិច




អាស៊ីត 2,4-ឌីក្លុយអ៊ីបង់សែនស៊ុលផ្សូនិច

- នៅពេលក្រុម C_6H_5- ត្រូវបានហៅឈ្មោះជាក្រុមជួស វាត្រូវបានគេហៅថា ក្រុមផេនីល។ គេតាងក្រុមផេនីលដោយអក្សរកាត់ដូចជា C_6H_5- , $Ph-$, ឬ $\varphi-$ ។


ក្រុមអ៊ីដ្រូកាបូដែលមានខ្សែឆ្នែកមួយ និងវង់បង់សែនមួយត្រូវបានគេហៅឈ្មោះជាស្រឡាយនៃឯកតាទម្រង់ធំជាង។ ប៉ុន្តែ បើសិនខ្សែមិនឆ្នែក សមាសធាតុនោះអាចត្រូវបានហៅជាស្រឡាយនៃខ្សែនោះដោយមិនគិតពីទំហំវង់ទេ។ ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន៖



ប៊ុយទីលបង់សែន




(E) -2- ផេនីល-2-ប៊ុយតែន




2-ផេនីលអិបតាន

- បង់ស៊ីលគឺជាឈ្មោះមួយទៀតរបស់ក្រុមផេនីលមេទីល។ ជួនកាលគេតាងវាដោយ Bn ។




ក្រុមបង់ស៊ីល



បង់ស៊ីលក្លរី ឬ $BnCl$


លំហាត់អនុវត្តន៍១៤.១៖ ចូរឱ្យឈ្មោះសមាសធាតុខាងក្រោម៖



៣. ប្រតិកម្មរបស់បង់សែន


ក្នុងពាក់កណ្តាលសតវត្សទី១៩ បង់សែនធ្វើឱ្យអ្នកគីមីមានចង្អុលមួយ។ ពួកគេដឹងអំពីរូបមន្តរបស់វា ថាបង់សែនមានភាពមិនឆ្អែតខ្ពស់ ហើយពួកគេរំពឹងថាវាមានប្រតិកម្មទៅតាមភាពមិនឆ្អែតនេះ។ ពួកគេរំពឹងថា ពួកវាមានប្រតិកម្មដូចអាល់សែនមួយ ដោយបង្កើតជាទឹកប្រូមតាមរយៈប្រតិកម្មបូក។ ពួកគេរំពឹងថា វាអាចផ្លាស់ប្តូរពណ៌របស់សូល្យូស្យុងប៉ូតាស្យូមពែរម៉ង់កាណាត ដោយដេអុកស៊ីតកម្ម ហើយពួកគេរំពឹងថា វាអាច បូកអ៊ីដ្រូសែនយ៉ាងរហ័សក្រោមវត្តមានកាតាលីករលោហៈ និងអាចបូកទឹកក្រោមវត្តមានអាស៊ីតខ្លាំង។

បង់សែនមិនមានប្រតិកម្មទាំងអស់នេះទេ។ នៅពេលបង់សែនត្រូវបានដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយប្រូម ក្នុងទីងងឹត ឬដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូល្យូស្យុងប៉ូតាស្យូមពែរម៉ង់កាណាត ឬប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតរាវ មិនមានប្រតិកម្មកើតឡើងដូចការរំពឹងទុកទេ។ បង់សែនអាចបូកអ៊ីដ្រូសែនក្រោមវត្តមាននីកែលម៉ត់ ប៉ុន្តែមានតែនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសំពាធខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះ។




បង់សែនមានប្រតិកម្មជាមួយប្រូមតែក្រោមវត្តមាននៃកាតាលីករអាស៊ីតឡឺរីស ដូចជាភីរ៉ូប្រូម។ ប៉ុន្តែ អ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងគេ វាប្រតិកម្មមិនតាមប្រតិកម្មបូកទេ ប៉ុន្តែវាធ្វើតាមប្រតិកម្មជំនួស ហៅថា ប្រតិកម្មជំនួសបង់សែន។

ប្រតិកម្មជំនួស៖



ប្រតិកម្មបូក៖



នៅពេលបង់សែនប្រតិកម្មជាមួយប្រូម មានតែម៉ូណូប្រូមីបង់សែនដែលត្រូវបានបង្កើត។ មានតែសមាសធាតុមួយដែលមានរូបមន្ត $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ ត្រូវបានរកឃើញក្នុងផលិតផល។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ នៅពេលបង់សែនរងប្រតិកម្មក្លរកម្ម មានតែម៉ូលីគ្រូបង់សែនមួយដែលកើត។


គេអាចពន្យល់ការសង្កេតនេះពីរយ៉ាង។ ទី១ មានអាតូមអ៊ីដ្រូសែនតែ១ក្នុងចំណោម៦របស់បង់សែនដែលមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រូសែនទាំងនេះ។ ទី២អាតូមអ៊ីដ្រូសែនទាំង៦សមមូលគ្នា ហើយការជំនួសអាតូមអ៊ីដ្រូសែនណាមួយដោយក្រុមជួសមួយ ធ្វើឱ្យកើតផលិតផលដូចគ្នា។ ដូចដែលយើងនឹងឃើញ ការពន្យល់ទី២ត្រឹមត្រូវ។

លំហាត់អនុវត្ត១៤.២៖ សមាសធាតុបួនខាងក្រោមមានរូបមន្តម៉ូលេគុល C_6H_6 ។ តើសមាសធាតុមួយណាដែលបង្កើតផលិតផលម៉ូណូជំនួសតែមួយ ឧទាហរណ៍ អ៊ីដ្រូសែនមួយត្រូវបានជំនួសដោយប្រូម?



៤. ទម្រង់ Kekulé របស់បង់សែន

ក្នុងឆ្នាំ១៨៦៥ August Kekulé ដែលជាអ្នកបង្កើតទ្រឹស្តីទម្រង់ដំបូងគេ បានលើកឡើងអំពីទម្រង់ជាក់ លាក់របស់បង់សែនមុនគេ ដែលជាទម្រង់មួយដែលយើងនៅតែប្រើរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។ Kekulé បានលើក ឡើងថា អាតូមកាបូនរបស់បង់សែនស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់មួយ ដែលពួកវាត្រូវបានចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាដោយសម្ព័ន្ធ ធ្លាស់នៃសម្ព័ន្ធពីជាន់ និងមួយជាន់ ហើយមានអាតូមអ៊ីដ្រូសែនម្នាក់មួយ។ ទម្រង់នេះត្រូវនឹងទ្រឹស្តីទម្រង់ដែល អាតូមកាបូនបង្កើតសម្ព័ន្ធបួន ហើយអាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់បង់សែនទាំងអស់សមមូលគ្នា៖



រូបមន្ត Kekulé របស់បង់សែន

ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយកើតឡើងចំពោះទម្រង់ Kekulé ។ ទម្រង់ Kekulé អាចប៉ាន់ស្មានថា អាចមាន 1,2- ឌីប្រូមីបង់សែនពីរខុសគ្នា ប៉ុន្តែមិនមានទេ។ ក្នុងសមាសធាតុទាំងពីរ (ខាងក្រោម) អាតូមកាបូនចងជាមួយប្រូម អាចត្រូវបានព្រែកពីគ្នាដោយសម្ព័ន្ធមួយជាន់ និងក្នុងទម្រង់មួយទៀត ពួកវាអាចត្រូវបានព្រែកសម្ព័ន្ធពីជាន់។




- មានតែ 1,2-ឌីប្រូម៉ូបង់សែនតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានសង្កេតឃើញ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ការសរសេររូបមន្តKekulé នៃទម្រង់បង់សែនជាដំណាក់កាលសំខាន់រហូតមក និងសម្រាប់មូលហេតុជាច្រើន គេនៅតែប្រើរូបភាពមកដល់ឥឡូវ។ ប៉ុន្តែ ឥឡូវនេះយើងយល់អត្ថន័យខុសគ្នារបស់វា។

ទំនោរដែលបង់សែនមានប្រតិកម្មជំនួស មិនមែនប្រតិកម្មបណ្តាច់ បានផ្តល់ឱ្យជាបញ្ញត្តិមួយទៀតនៃ **ភាពអារ៉ូម៉ាទិច** (Aromaticity)។ ចំពោះសមាសធាតុមួយដែលត្រូវបានបានគេហៅថាអារ៉ូម៉ាទិចមានន័យថាវាមានប្រតិកម្មជំនួស មិនមែនប្រតិកម្មបូក ទោះបីជាពួកវាមានកម្រិតមិនឆ្គោតខ្ពស់ក៏ដោយ។

មុនឆ្នាំ១៩០០ អ្នកគីមីសន្មត់ថា រង់នៃសម្ព័ន្ធពីជាន់ និងមួយជាន់ឆ្លាស់ជាលក្ខណៈទម្រង់មួយដែលធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈអារ៉ូម៉ាទិច។ ដោយសារតែបង់សែន និងស្រឡាយបង់សែន (សមាសធាតុមានរង្វង់៦អាតូម) ជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចគេបានស្គាល់ អ្នកគីមីបានរកឃើញក្នុងធម្មជាតិផ្សេងទៀត។ សមាសធាតុស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនទំនោរជាសមាសធាតុដូចនេះ៖




ស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែន

ក្នុងឆ្នាំ១៩១១ Richard Willstatter បានសំយោគស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនយ៉ាងជោគជ័យ។ ប៉ុន្តែ Willstatter បានរកឃើញថា វាមិនមែនជាសមាសធាតុដូចបង់សែនទេ។ ស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនមានប្រតិកម្មជាមួយប្រូមដោយប្រតិកម្មបូក វាបូកអ៊ីដ្រូសែនយ៉ាងងាយ វាងអុកស៊ីតកម្មដោយសូលុយស្យុងពែរម៉ង់កាណាតដូចនេះ វាច្បាស់លាស់ណាស់ដែលវាមិនមានភាពអារ៉ូម៉ាទិចទេ។ នៅពេលការរងឃើញទាំងនេះធ្វើឱ្យ Willstatter ខកចិត្តក៏ដោយ ពួកវាក៏មានសារសំខាន់ចំពោះអ្វីដែលគេមិនអាចបង្ហាញបាន។ ដូចនេះ អ្នកគីមីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅទៀតលើប្រភពនៃភាពអារ៉ូម៉ាទិចរបស់បង់សែន។

៥. ស្ថេរភាពទែម៉ូឌីណាមិចរបស់បង់សែន

យើងបានឃើញរួចហើយថា បង់សែនបង្ហាញលក្ខណៈមិនធម្មតាដោយរងប្រតិកម្មជំនួស តែអាស្រ័យលើទម្រង់Kekulé យើងរំពឹងថាវាងប្រតិកម្មបូក។ បង់សែនមានលក្ខណៈមិនធម្មតាមួយទៀតគឺ៖ វាមាន **ស្ថេរភាពទែម៉ូឌីណាមិច**ជាងទម្រង់ Kekulé។ ដើម្បីដឹងពីមូលហេតុនេះ ពិចារណាលើលទ្ធផលទែម៉ូឌីណាមិចខាងក្រោម។

ស៊ីក្លូអិចសែន ជាវង់៦អាតូមមានសម្ព័ន្ធពីជាន់មួយ អាចរងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មយ៉ាងងាយស្រួលទៅ ជាស៊ីក្លូអិចសាន។ នៅពេលគេវាស់ ΔH° របស់ប្រតិកម្ម គេរកឃើញវាមាន តម្លៃ -120 kJ mol^{-1} ដែលស្រដៀងគ្នា នឹងអាល់សែនជួស។



ស៊ីក្លូអិចសែន


ស៊ីក្លូអិចសាន

យើងនឹងរំពឹងថា ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មនៃ1,3-ស៊ីក្លូអិចសាឌីអែននឹងបញ្ចេញកម្ដៅច្រើនជាងទ្វេដងដូចនេះវាមាន $\Delta H^\circ = -240 \text{ kJ mol}^{-1}$ ។ នៅពេលគេធ្វើពិសោធន៍នេះ លទ្ធផលគឺ -232 kJ mol^{-1} ។ តម្លៃនេះ


កៀក ទៅនឹងតម្លៃដែលយើងគណនា ហើយភាពខុសគ្នាអាចត្រូវបានពន្យល់ដោយពិចារណាលើសមាសធាតុដែលមានសម្ព័ន្ធពីជាន់ឆ្លាស់ តែងតែជាសមាសធាតុដែលមានស្ថេរភាពជាងសម្ព័ន្ធពីជាន់ដាច់ (រូប១៣.៨) ៖



បើសិនជាយើងពង្រីកការគិតរបៀបនេះ ហើយបើសិនបង់សែនត្រូវបានគេគិតឱ្យងាយជា 1,3,5-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាទ្រីអែន យើងនឹងរំពឹងថា បង់សែនបញ្ចេញកម្ដៅប្រហែល 360 KJ mol^{-1} ($3 \times (-120)$) នៅពេលវាដេញប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្ម។ នៅពេលគេធ្វើពិសោធន៍ពិតប្រាកដ លទ្ធផលគឺខុសគ្នាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ ប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅ ប៉ុន្តែបញ្ចេញកម្ដៅតែ 208 KJ mol^{-1} ៖



នៅពេលគេតាងលទ្ធផលទាំងនេះដោយរូប១៤.១ គេឃើញច្បាស់ថាបង់សែនមានស្ថេរភាពច្រើនជាង យើងគណនា។ ជាការពិត វាមានស្ថេរភាពជាង 1,3,5-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាទ្រីអែន 152 KJ mol^{-1} ។ ភាពខុសគ្នាវាង បរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញពិតប្រាកដ និងការគណនាលើមូលដ្ឋានទម្រង់Kekulé ឥឡូវនេះត្រូវបានគេហៅថា **ថាមពលអស្ចារ្យ** (resonance energy) របស់សមាសធាតុ។



រូប១៤.១ ស្ថេរភាពធៀបនៃស៊ីក្លូអ៊ីចសែន 1,3-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាឌីអែន 1,3,5-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាទ្រីអែន (សម្មតិកម្ម) និងបង់សែន

៦. ទ្រឹស្តីទំនើបនៃទម្រង់បង់សែន

គេមិនបានយល់ច្បាស់អំពីលក្ខណៈមិនធម្មតា និងស្ថេរភាពរបស់បង់សែនរហូតមកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ឡើងនៃមេកានិចកង់ទិចក្នុងទសវត្ស១៩២០។ ដូចដែលយើងបានឃើញហើយ ទ្រឹស្តីមេកានិចកង់ទិចបង្កើតមធ្យោបាយបាយពីរក្នុងការសង្កេតសម្ព័ន្ធក្នុងម៉ូលេគុល៖ ទ្រឹស្តីរេសូណង់ និងទ្រឹស្តីអរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល។ ឥឡូវយើងប្រើវាទាំងពីរដើម្បីអនុវត្តលើបង់សែន។

៦.១ ការពន្យល់រេសូណង់នៃទម្រង់បង់សែន


ទ្រឹស្តីរេសូណង់មួយចែងថា នៅពេលយើងអាចសរសេរទម្រង់ឡឺវីសពីរ ឬច្រើនតាងឱ្យម៉ូលេគុលមួយដែល *ខុសគ្នាតែទីតាំងអេឡិចត្រុងរបស់ពួកវា* គ្មានទម្រង់ណាមួយដែលកំណត់លក្ខណៈរូប និងលក្ខណៈគីមីរបស់សមាសធាតុនោះ។ បើសិនជាយើងសម្គាល់ដូចនេះ យើងអាចយល់អំពីលក្ខណៈពិតរបស់ទម្រង់ Kekulé ពីរ (I និង II) របស់បង់សែន។

- ទម្រង់ Kekulé I និង II ខាងក្រោមខុសគ្នាតែទីតាំងអេឡិចត្រុងរបស់វា ពួកវាមិនតាងឱ្យ ម៉ូលេគុលពីរខុសគ្នាក្នុងលំនឹង ដូចដែល Kekulé បានលើកឡើងទេ។

តែទម្រង់ I និង II ជាទម្រង់ដែលកៀកបំផុតទៅនឹងទម្រង់បង់សែនដែលយើងទទួលបានក្នុងលីមីតកម្មនៃរូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់វា ច្បាប់នៃវ៉ាន់ឡង់ និងអាក្រូមីយ៉ូសែន៦របស់វាគឺសមមូលគឺមិននឹងគ្នា។ បញ្ហាដែលមានលើទម្រង់ Kekulé គឺថា ពួកវាជាទម្រង់ឡឺវីស ហើយទម្រង់ឡឺវីសទាំងនេះពណ៌នាអំពីអេឡិចត្រុងក្នុងរបាយដេកន្លែង (ជាមួយនឹងបង់សែន យើងនឹងឃើញថា អេឡិចត្រុងរបស់វាមិនដេកន្លែង)។ ជាសំណាងល្អ ទ្រឹស្តីរេសូណង់ ជួយឱ្យយើងដោះស្រាយនូវបញ្ហានេះតាមមធ្យោបាយមួយ៖

- តាមទ្រឹស្តីរេសូណង់ យើងចាត់ទុកទម្រង់ Kekulé I និង II ខាងក្រោមជា *ទម្រង់របាយរេសូណង់* ទៅទម្រង់ពិតប្រាកដរបស់បង់សែន ហើយយើងធ្វើទំនាក់ទំនងទម្រង់ទាំងពីរដោយសញ្ញាព្រួញក្បាលសងខាង (មិនមែនសញ្ញាព្រួញពីរទៅវិញទៅមក ដែលយើងប្រើក្នុងលំនឹងទេ)។

ទម្រង់របាយរេសូណង់មិនមែនស្ថិតក្នុងលំនឹងទេ។ ពួកវាមិនមែនជាទម្រង់តាងឱ្យម៉ូលេគុលពិតប្រាកដទេ។ ពួកវាជាទម្រង់ដែលកៀកបំផុត បើសិនជាយើងប្រើច្បាប់វ៉ាន់ឡង់ធម្មតា ប៉ុន្តែពួកវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការ ជួយឱ្យយើងបង្ហាញម៉ូលេគុលពិតប្រាកដជាអ៊ីប៊ីតមួយ៖




ចូរមើលទម្រង់នេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ សម្ព័ន្ធពីរជាន់ទាំងអស់ក្នុងទម្រង់ I ជាសម្ព័ន្ធពីរជាន់ក្នុងទម្រង់ II ។

- អ៊ីប៊ីត (មធ្យម) នៃទម្រង់ Kekulé I និង II អាចមិនមានទាំងសម្ព័ន្ធមួយជាន់សុទ្ធ និងសម្ព័ន្ធពីរជាន់សុទ្ធរវាងកាបូន។ សម្ព័ន្ធទាំងនេះអាចជាសម្ព័ន្ធនៅចន្លោះសម្ព័ន្ធមួយជាន់ និងសម្ព័ន្ធពីរជាន់។

ការពិសោធន៍បង្ហាញការចងសម្ព័ន្ធនេះ។ រង្វាស់ស្ទ្រីចត្រូស្កូពីបង្ហាញថា ម៉ូលេគុលបង់សែនជាប្លង់ ហើយសម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូនរបស់វាទាំងអស់មានប្រវែងស្មើគ្នា។ ហើយសម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូនក្នុងបង់សែនមាន

ប្រវែង $1.39\text{\AA}$ (រូប១៤.២) ដែលជាតម្លៃមួយស្ថិតក្នុងចន្លោះប្រវែងសម្ព័ន្ធមួយជាន់កាបូន-កាបូនរវាងអាតូមអ៊ីប្រីត sp^2 ($1.47\text{\AA}$) (មើលតារាង១៣.១) និងប្រវែងសម្ព័ន្ធពីជាន់កាបូន-កាបូន ($1.34\text{\AA}$)។



រូប១៤.២ ប្រវែងសម្ព័ន្ធ និងមុំសម្ព័ន្ធក្នុងបង់សែន (បង្ហាញតែសម្ព័ន្ធ១)

- ទម្រង់អ៊ីប្រីតរបស់បង់សែនតាងដោយគូររង្វង់មួយក្នុងឆកោណ ដូចបានបង្ហាញក្នុងរូបមន្តIII ខាងក្រោម។




ប៉ុន្តែពេលខ្លះ នៅពេលដែលយើងគិតពីគូអេឡិចត្រុង π យើងត្រូវប្រើទម្រង់ Kekulé I ឬ II។ យើងធ្វើដោយដូចនេះ ពីព្រោះការរាប់គូអេឡិចត្រុង និងអេឡិចត្រុង π សរុបអាចធ្វើបានតែក្នុងទម្រង់ Kekulé ទេ ដែលចំនួនគូអេឡិចត្រុង π ដែលតាងដោយរង្វង់មិនអាចរាប់បានទេ។ ដូចដែលយើងនឹងឃើញក្នុងមេរៀននេះ មានប្រព័ន្ធដែលមានទំហំខុសគ្នា និងចំនួនអេឡិចត្រុង π មិនដាក់កន្លែងខុសគ្នា ដែលអាចតាងដោយរង្វង់មួយ។ ប៉ុន្តែក្នុងបង់សែន រង្វង់តាងឱ្យអេឡិចត្រុង π ៦ ដែលមិនដាក់កន្លែងលើកាបូន៦របស់វាដែរ។

- ម៉ូលេគុលពិតប្រាកដមួយរបស់បង់សែន (តាងដោយទម្រង់អ៊ីប្រីតស្នូណង់ III) មានស្ថេរភាពជាងទម្រង់ស្នូណង់ទាំងពីរ ពីព្រោះគេអាចគូទម្រង់ស្នូណង់សមមូលច្រើនជាងមួយសម្រាប់បង់សែន (I និង II ខាងលើ)។

ភាពខុសគ្នារវាងថាមពលនៃ 1,3,5-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាទ្រីអែន (បើសិនជាវាមាន ត្រូវការថាមពលខ្ពស់ជាង) និងបង់សែនត្រូវបានគេហៅថា *ថាមពលស្នូណង់* ហើយនេះអាចបញ្ជាក់អំពីស្ថេរភាពរបស់បង់សែនដោយការមិនដាក់កន្លែងនៃអេឡិចត្រុង។


លំហាត់អនុវត្ត១៤.៣៖ បើសិនបង់សែនជា 1,3,5-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាទ្រីអែន សម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូនគួរតែមានប្រវែងវែង និងខ្លីធ្លាស់គ្នា ដូចបានបង្ហាញក្នុងទម្រង់ខាងក្រោម។ ប៉ុន្តែ ការចាត់ទុកពួកវាជាទម្រង់ស្នូណង់នឹងគ្នា នឹង បំពានគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃទ្រឹស្តីស្នូណង់។ ចូរពន្យល់។



៦.២ ការពន្យល់ដោយអរីម៉ូនីតាងម៉ូលេគុលនៃទម្រង់បង់សែន

ការពិតដែលមុំសម្ព័ន្ធរបស់អាតូមកាបូនក្នុងបង់សែនគឺ 120° ទាំងអស់ ស្នើថា អាតូមកាបូនទាំងអស់ជាអាតូមអ៊ីប្រីត sp^2 ។ បើសិនជាយើងទទួលស្គាល់ការស្នើឡើងនេះ ហើយសង់រង្វង់៦អាតូមក្នុងប្លង់មួយពីអាតូមកាបូន sp^2 គេទទួលបានតំណាងដូចបង្ហាញក្នុងរូប១៤.៣a និង b ខាងក្រោម។ ក្នុងគំរូទាំងនេះកាបូននីមួយៗ

ជាប្រភេទ sp^2 មានអរីប៊ីតាល់ p មួយ ដែលអាចគ្របដណ្តប់ជាមួយអរីប៊ីតាល់ p របស់កាបូនក្បែរខាងវា។ បើសិនជាយើងសន្មតថា ការគ្របដណ្តប់នៃអរីប៊ីតាល់ p ទាំងអស់ជុំវិញវង់អាចកើតឡើង យើងទទួលបានគំរូមូលេគុលដូចបានបង្ហាញក្នុងរូប១៣.៣c។




រូប១៤.៣ a. អាតូមកាបូន sp^2 ៦ ផ្គុំគ្នាក្នុងវង់មួយ (អាតូមកាបូននីមួយៗមានអាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយ) កាបូននីមួយៗមានអរីប៊ីតាល់ p មួយដែលមានឡប់នៃខាងក្រោម និងខាងលើប្លង់របស់វា។

b. តំណាងអរីប៊ីតាល់ p ក្នុងការគ្របដណ្តប់ក្នុង (a)។

c. ការគ្របដណ្តប់នៃអរីប៊ីតាល់ p ជុំវិញវង់បង្កើតអរីប៊ីតាល់មូលេគុលមួយអាចនៅខាងលើ ឬនៅខាងក្រោមរបស់វា។

- តាមគោលការណ៍មេកានិកកង់ទិច ចំនួនអរីប៊ីតាល់មូលេគុលក្នុងមូលេគុលមួយដូចគ្នាទៅនឹងចំនួនអរីប៊ីតាល់អាតូមដែលបង្កើតពួកវា ហើយអរីប៊ីតាល់នីមួយៗអាចមានអេឡិចត្រុងអតិបរមាពីរ បើសិនជាស្ថានីយរបស់ពួកវាប្រាសគ្នា។

បើសិនជាយើងគិតថា មានតែអរីប៊ីតាល់អាតូម p ដែលបានចូលរួមដោយអាតូមកាបូនរបស់បង់សែន គួរតែមានអរីប៊ីតាល់មូលេគុល៦កើតឡើង។ អរីប៊ីតាល់ទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូប១៤.៤។




រូប១៤.៤ របៀបដែលអរីប៊ីតាល់អាតូម p ៦ (ពីកាបូននីមួយៗរបស់បង់សែន)

ផ្គុំចូលគ្នាបង្កើតអរីប៊ីតាល់មូលេគុល π ៦។ អរីប៊ីតាល់មូលេគុល៣មានថាមពលទាបជាងអរីប៊ីតាល់ p ពួកវាទាំងនេះជាអរីប៊ីតាល់ មូលេគុលម៉ូណូ។ អរីប៊ីតាល់មូលេគុលមានថាមពលខ្ពស់ជាងអរីប៊ីតាល់ p អរីប៊ីតាល់ទាំងនេះជាអរីប៊ីតាល់មូលេគុលបដិសម្ព័ន្ធ។ អរីប៊ីតាល់ ψ_2 និង ψ_3 មានថាមពលដូចគ្នា និងដូចគ្នាចំពោះអរីប៊ីតាល់ ψ_4 និង ψ_5 ហើយត្រូវបានគេហៅថាអរីប៊ីតាល់ដេដឺណ័រេត។

របាយអេឡិចត្រុងនៃភាពគ្រឹះរបស់បង់សែន ត្រូវបានទទួលពីការបំពេញអេឡិចត្រុង π ចំនួន៦ទៅក្នុង អរីតាល់ម៉ូលេគុល π ដូចបានបង្ហាញក្នុងរូប១៤.៤ ដោយចាប់ផ្តើមពីអរីតាល់មានថាមពលទាបជាងគេ។ អរីតាល់ម៉ូលេគុល π មានថាមពលទាបជាងគេក្នុងបង់សែនមានការគ្របដណ្តប់គ្នារវាងអរីតាល់p ដែលមាន សញ្ញាផាសដូចគ្នាទាំងអស់ ពីលើ និងពីក្រោមមុខវង់។ ក្នុងអរីតាល់នេះ គ្មានប្លង់ណូដ (ភាពខុសគ្នានៃ សញ្ញាផាស) កែងទៅនឹងវង់របស់អាតូមទាំងនេះទេ។ អរីតាល់ដែលមានថាមពលខ្ពស់ជាងនីមួយៗមានប្លង់ ណូដមួយ។ (ជាទូទៅ ឈុតនីមួយៗនៃអរីតាល់ម៉ូលេគុល π ថាមពលខ្ពស់មានប្លង់ណូដថែមមួយទៀត)។ អរីតាល់ទាំងនេះនីមួយៗត្រូវបានបំពេញដោយទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយផងដែរ។ អរីតាល់នេះមានថាមពល ស្មើគ្នា (ឌីជីណីរេត) ពីព្រោះពួកវាទាំងពីរមានប្លង់ណូដមួយ។ រួមគ្នា អរីតាល់ទាំងបីនេះ ជាអរីតាល់ម៉ូលេគុល π សម្ព័ន្ធរបស់បង់សែន។ ឈុតអរីតាល់ម៉ូលេគុល π ថាមពលខ្ពស់បន្ទាប់ទៀតមានប្លង់ណូដពីរ ហើយ អរីតាល់ម៉ូលេគុល π ថាមពលខ្ពស់ជាងគេមានប្លង់ណូដបី។ អរីតាល់ទាំងបីនេះជាអរីតាល់ π បដិសម្ព័ន្ធ របស់ បង់សែន ហើយពួកវាមិនមានអេឡិចត្រុងក្នុងភាពគ្រឹះទេ។ បង់សែនត្រូវបានគេនិយាយថាមានស្រទាប់ សម្ព័ន្ធ នៃអេឡិចត្រុង π កៀកណ្តែយមួយ ដោយសារអរីតាល់សម្ព័ន្ធរបស់វាទាំងអស់មានអេឡិចត្រុងពេញ ហើយ គ្មានអេឡិចត្រុងក្នុងអរីតាល់បដិសម្ព័ន្ធទេ។ ស្រទាប់សម្ព័ន្ធកៀកណ្តែយនេះ ជាអ្នកចូលរួមចំណែកធ្វើ ឱ្យបង់សែនមានស្ថេរភាព។

យើងបានពិចារណាលើអរីតាល់ម៉ូលេគុលបង់សែនរួចហើយ ឥឡូវនេះវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការ បង្ហាញគំរូបូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចនៃផ្ទៃ van der Waals របស់បង់សែន ដែលត្រូវបានគណនាពីគោល ការណ៍មេកានិចកង់ទិចដែរ (រូប១៤.៥)។ យើងអាចឃើញថា តំណាងនេះអាចជួយឱ្យយើងយល់ថាអេឡិចត្រុង π របស់បង់សែនមិនដៅទីតាំងទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានរាយជុំវិញមុខខាងលើ ឬមុខខាងក្រោម (មិនបានបង្ហាញ) នៃវង់ កាបូនក្នុងបង់សែន។



រូប១៤.៥ គំរូបូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់បង់សែន

វាមានសារសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់រកគំហើញថ្មីដែលក្រាមបង់សែនទាក់ទងនឹងអន្តរកម្មកែងគ្នា រវាងវង់បង់សែន តាមមធ្យោបាយមួយដែលបង្កើតបន្ទុកវិជ្ជមានលើម៉ូលេគុលមួយអន្តរកម្មជាមួយមុខអវិជ្ជមាន នៃម៉ូលេគុលបង់សែនដែលតម្រៀបពីលើ និងពីក្រោមវា។

៧. ច្បាប់ Huckel ៖ ច្បាប់ $4n+2$ អេឡិចត្រុង π

ក្នុងឆ្នាំ១៩៣១ អ្នកគីមីអាណ្លីម៉ង់ Erich Huckel បានធ្វើការសិរិះគណនាគណិតវិទ្យាមួយ អាស្រ័យ លើ ប្រភេទនៃទ្រឹស្តីដែលយើងទើបតែបានសិក្សារួច។ ច្បាប់ Huckel ទាក់ទងជាមួយសមាសធាតុដែលមាន វង់ប្លង់ មួយ ហើយដែលអាតូមនីមួយៗរបស់វង់នេះមានអរីតាល់p មួយ ដូចក្នុងបង់សែន។ ការគណនារបស់

គាត់ បង្ហាញថា វ៉ង់ម៉ូណូស៊ីត្រីចប្លង់មួយដែលមានអេឡិចត្រុង π ចំនួន $4n+2$ ដែល $n=0, 1, 2, 3, \dots$ (ឧទាហរណ៍វ៉ង់ មាន អេឡិចត្រុង π ចំនួន 2, 6, 10, 14, ...) មានស្រទាប់អេឡិចត្រុងមិនដាក់កន្លែងដូចបង់ សែន និងថាមពល រេសូណង់ខ្ពស់។


- ម្យ៉ាងវិញទៀត ច្បាប់ Huckel ចែងថា វ៉ង់ម៉ូណូស៊ីត្រីចប្លង់ដែលអេឡិចត្រុងមិនដាក់កន្លែងចំនួន 2, 6, 10, 14, ... មានលក្ខណៈអារ៉ូម៉ាទិច។

៧.១ របៀបគូរដ្យាក្រាមថាមពលរបស់អរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល π ក្នុងប្រព័ន្ធវ៉ង់ម៉ូណូស៊ីត្រីច អាស្រ័យលើច្បាប់ Huckel

មានមធ្យោបាយងាយមួយដើម្បីគូរដ្យាក្រាមថាមពលអរីប៊ីតាល់ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់វ៉ង់ម៉ូណូស៊ីត្រីចអាស្រ័យ លើការគណនារបស់Huckel។ ដើម្បីគូរដ្យាក្រាម យើងអនុលោមន៍ដំណើរការខាងក្រោម៖

១. យើងចាប់ផ្តើមគូរពហុកោណមួយដែលត្រូវនឹងចំនួនអាតូមកាបូនក្នុងវ៉ង់ ហើយដាក់ជ្រុងមួយ របស់ ពហុកោណនោះទៅក្រោម។
២. បន្ទាប់មក យើងគូររង្វង់ចារិកក្រៅពហុកោណនោះ ដែលរង្វង់ប៉ះជ្រុងទាំងអស់របស់ពហុកោណ។
៣. នៅលើចំណុចដែលរង្វង់ប៉ះពហុកោណ យើងគូរបន្ទាត់ដេកខ្លីៗទៅម្ខាងរង្វង់។ កំពស់របស់បន្ទាត់ នីមួយៗតាងឱ្យថាមពលរបស់អរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល π នីមួយៗ។
៤. បន្ទាប់មក យើងគូរបន្ទាត់ដាច់ៗចែករង្វង់ជាពីរលើនិងក្រោម។ ថាមពលរបស់អរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល π សម្ព័ន្ធស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់នេះ។ ថាមពលអរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល π បដិសម្ព័ន្ធស្ថិតនៅខាងលើ បន្ទាត់ នេះ ហើយថាមពលអរីប៊ីតាល់មិនសម្ព័ន្ធស្ថិតនៅលើនីវ៉ូបន្ទាត់ដាច់នេះ។
៥. បន្ទាប់មក អាស្រ័យលើចំនួនអេឡិចត្រុង π ក្នុងវ៉ង់ យើងដាក់សញ្ញាព្រួញអេឡិចត្រុងលើបន្ទាត់ ដែល ត្រូវទៅនឹងអរីប៊ីតាល់នីមួយៗ ដោយចាប់ផ្តើមពីអរីប៊ីតាល់ដែលមាននីវ៉ូថាមពលទាបជាងគេ មុន និងបន្តបន្ទាប់។ ធ្វើដូចនេះ យើងបំពេញអរីប៊ីតាល់ដ៏ដ៏ណ៍រតនីមួយៗដោយអេឡិចត្រុងមួយ សិន បន្ទាប់មកបន្ថែមអេឡិចត្រុងមួយទៀតដែលមានស្តីនប្រាស បើសិនជាមាន។


ឧទាហរណ៍ ការអនុវត្តវិធីនេះលើបង់សែន (រូប១៤.៦) គេទទួលបាននីវ៉ូថាមពលដូចគ្នាទៅនឹងរូបនីវ៉ូ ថាមពលដែលយើងឃើញក្នុងរូប១៤.៤ ហើយដែលជានីវ៉ូថាមពលអាស្រ័យលើការគណនាមេកានិចកង់ទិច។



រូប១៤.៦ វិធីពហុកោណនិងរង្វង់ដើម្បីទទួលបាននីវ៉ូថាមពលធៀបរបស់អរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល π របស់បង់សែន

ឥឡូវនេះ យើងអាចយល់ថាហេតុអ្វីបានជាស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនមិនមែនជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច។ ស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនមានអេឡិចត្រុង π សរុបចំនួន៨។ ៨មិនមែនជាលេខរបស់Huckel ទេ វាជាលេខ $4n$ មិន មែន $4n+2$ ទេ។ ដោយប្រើវិធីពហុកោណនិងរង្វង់ (រូប១៤.៧) យើងរកឃើញថា ស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែន

បើសិនវាជាប្លង់ វាមិនមានស្រទាប់អេឡិចត្រុង π ដូចបង់សែនទេ វាអាចមានអេឡិចត្រុងមិនចងសម្ព័ន្ធមួយក្នុងអរីប៊ីតាល់មិនសម្ព័ន្ធពីរនីមួយៗ។ ម៉ូលេគុលដែលមានអេឡិចត្រុងសេរី (វ៉ាឌីកាល់សេរី) ជាធម្មតាមិនមានស្ថេរភាពទេ ពួកវាមានប្រតិកម្មភាពខ្លាំង និងគ្មានស្ថេរភាព។ ដូចនេះ ប្លង់មួយពីស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនគួរតែមិនដូចប្លង់ របស់បង់សែនទាំងអស់ទេ ហើយវាមិនមែនជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចទេ។



រូប១៤.៧ អរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុល π ដែលស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនអាចមានបើសិនវាជាប្លង់


ដោយសារស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនមិនមានស្ថេរភាពនៅពេលវាក្លាយជាប្លង់ វាមានទម្រង់ដូចបង្ហាញខាងក្រោម (ក្នុងផ្នែកទី៧៥យើងនឹងឃើញថា ស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែននឹងបាត់បង់ស្ថេរភាពដោយក្លាយជាប្លង់)។ គេដឹងថា សម្ព័ន្ធរបស់ស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនជាសម្ព័ន្ធគ្នាស់វែង និងខ្លី គឺ $1.48\text{\AA}$ និង $1.34\text{\AA}$ ដែលបង្ហាញដោយការស្នើ-X។



៧.២ អានុយឡែន


ពាក្យថាអានុយឡែន (annulenes) ត្រូវបានគេប្រើតាងឈ្មោះនៃថ្នាក់របស់សមាសធាតុម៉ូណូស៊ីគ្លិចដែលអាចត្រូវបានតាងដោយទម្រង់ដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ និងមួយជាន់គ្នា។ ទំហំរបស់អានុយឡែនត្រូវបានកំណត់ដោយលេខក្នុងដង្កៀប។ ដូចនេះ បង់សែនជា អានុយឡែន[6] និងស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនជា អានុយឡែន[8] ។

- ច្បាប់ Huckel ប៉ាន់ស្មានថាអានុយឡែនជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច បើសិនម៉ូលេគុលរបស់ពួកវា មានអេឡិចត្រុង π $4n + 2$ និងមានខ្សែគ្រោងកាបូនក្នុងប្លង់មួយ៖



មុនឆ្នាំ១៩៦០ អានុយឡែនដែលមានដើម្បីធ្វើតេស្តការប៉ាន់ស្មានរបស់ Huckel មានតែបង់សែន និងស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែន។ ក្នុងកំឡុងទសវត្សឆ្នាំ១៩៦០ លទ្ធផលយ៉ាងធំធេងបានមកពីការស្រាវជ្រាវរបស់ F. Sondheimer គឺអានុយឡែនវែងជាច្រើនត្រូវបានសំយោគ និងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការប៉ាន់ស្មានរបស់ Huckel។

ចូរពិចារណាលើ អានុយឡែន[14], [16], [18], [20], [22], និង [24] ជាឧទាហរណ៍។ តាមច្បាប់ Huckel អានុយឡែន [14], [18], និង [22] ($4n+2$, $n=3,4,5$ រៀងគ្នា) ត្រូវបានរកឃើញជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច។ អានុយឡែន[16] និងអានុយឡែន[24]មិនមែនជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចទេ ពួកវាជាសមាសធាតុ **អង់ទីអារ៉ូម៉ាទិច** (antiaromatic) (មើលផ្នែក៧ង)។ ពួកវាជាសមាសធាតុ $4n$ មិនមែនសមាសធាតុ $4n+2$ ៖



អានុយឡែន [14]
(អារ៉ូម៉ាទិច)




អានុយឡែន [16]
(អង់ទីអារ៉ូម៉ាទិច)



អានុយឡែន [18]
(អារ៉ូម៉ាទិច)


អានុយឡែន[10] និង [12] ក៏ត្រូវបានសំយោគដែរ តែពួកវាមិនមែនជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចទេ។ យើងមិនរំពឹងថាអានុយឡែន[12] ជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច ដោយសារតែវាមានអេឡិចត្រុង π ១២ និងមិនគោរពច្បាប់ Huckel។ គេបានរំពឹងថាអានុយឡែន[10] ខាងក្រោមជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចទៅតាមការរាប់ចំនួនអេឡិចត្រុង ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបង្កើនទេ។



I



II



III

អានុយឡែន[10] មិនមែនជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច ពីព្រោះពួកវាមិនមែនជាបង្កើន

អានុយឡែន[10] I មានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ត្រង់ពីរ។ មុំសម្ព័ន្ធរបស់វាប្រហែល 120° ដូចនេះវាមិនមានលំដាក់មុំសម្ព័ន្ធទេ។ ប៉ុន្តែអាក្រក់កាបូននៃវាត្រូវបានរារាំងមិនឱ្យមានបង្កើន ពីព្រោះអាក្រក់អ៊ីដ្រូសែនពីរលើវាដែលកណ្តាលបានគ្នាទៅវិញទៅមក។ ដោយសារតែវាមិនមែនជាបង្កើន អរបីតាល់ p របស់អាក្រក់កាបូនមិនស្របគ្នាទេ ដូចនេះពួកវាមិនអាចគ្របដណ្តប់គ្នាជុំវិញវ៉ង់បង្កើតជាអរបីតាល់ម៉ូលេគុល π នៃប្រព័ន្ធអារ៉ូម៉ាទិចមួយទេ។

អានុយឡែន[10] ដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ស៊ីសទាំងអស់(II) បើសិនជាវាជាបង្កើន វាមានលំដាក់មុំសម្ព័ន្ធដោយសារតែមុំសម្ព័ន្ធក្នុងរបស់វាប្រហែល 144° ។ ដូចនេះ ស្ថេរភាពរបស់អ៊ីសូមែរនេះដែលទទួលបានដោយ ក្លាយជាបង្កើនដើម្បីក្លាយជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច អាចនឹងត្រូវការថាមពលខ្ពស់ដោយឥទ្ធិពលអស្ថេរភាពដោយលំដាក់មុំសម្ព័ន្ធ។ បញ្ហាដូចគ្នានៃលំដាក់មុំសម្ព័ន្ធទំនើតឡើងជាមួយការបង្កើតបង្កើនរារាំងម៉ូលេគុលរបស់អ៊ីសូមែរអានុយឡែន[10] ដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ត្រង់(III) មិនឱ្យក្លាយជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចបាន។

បន្ទាប់ពីគោលបំណងបរាជ័យក្នុងច្រើនឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៥ អានុយឡែន[4] (ឬ ស៊ីក្លូប៊ុយតាឌីអែន) ត្រូវបានសំយោគដោយ R. Pettit និងសហការី នៅសាកលវិទ្យាល័យតិចសាស។ ស៊ីក្លូប៊ុយតាឌីអែនជាម៉ូលេគុល

$4n$ មិនមែន $4n+2$ ទេ ហើយដូចដែលយើងបានរំពឹងទុក វាជាសមាសធាតុមិនមានស្ថេរភាព ហើយវាជាសមាសធាតុអង់ទីអារ៉ូម៉ាទិច (មើលផ្នែកទី៧៥) ៖



ស៊ីក្លូប៊ូយតាឌីអែន
ឬ អានុយឡែន[4] (អង់ទីអារ៉ូម៉ាទិច)

៧.៣ ស្ប៉ិចត្រូស្កូពី NMR ៖ ភស្តុតាងនៃការមិនដេរ៉ូកនៃអេឡិចត្រុងក្នុងសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច


ស្ប៉ិច ^1H NMR របស់បង់សែនមានស៊ីញ៉ាល់មិនបំបែកទោល នៅ 7.27។ គេសង្កេតឃើញតែស៊ីញ៉ាល់មិនបំបែកទោល ជាកស្តុតាងបញ្ជាក់ថា អាតូមអ៊ីដ្រូសែនទាំងអស់របស់បង់សែនសមមូលគ្នា។ ហើយដោយសារស៊ីញ៉ាល់កើតឡើងនៅប្រេកង់ខ្ពស់គឺជាកស្តុតាងបន្ថែមក្នុងការសន្និដ្ឋានថា អេឡិចត្រុង π របស់បង់សែនមិនដេរ៉ូតាំងទេ។

យើងបានសិក្សាក្នុងមេរៀនទី៩ ផ្នែកទី៦ រួចហើយថា រង្វិលអេឡិចត្រុង π នៃសម្ព័ន្ធ C-H បណ្តាលឱ្យប្រូតុងរបស់អាល់កានត្រូវបានប៉ាន់ប៉ាន់ម៉ាញ៉េទិចរបស់ស្ប៉ិចត្រូម៉ែត្រ NMR ហើយជាវិបាក ប្រូតុងទាំងនេះស្រូបប្រេកង់ទាប។ យើងនឹងពន្យល់អំពីសម្របប្រេកង់ខ្ពស់នៃប្រូតុងបង់សែនមិនប៉ាន់ ដែលបណ្តាលមកពីរង្វិលអេឡិចត្រុង π របស់បង់សែន ហើយការពន្យល់នេះត្រូវការអេឡិចត្រុង π មិនដេរ៉ូតាំង។

នៅពេលម៉ូលេគុលបង់សែនត្រូវបានដាក់ក្នុងដែនម៉ាញ៉េទិចខ្លាំងរបស់ស្ប៉ិចត្រូម៉ែត្រ NMR អេឡិចត្រុងវិលជុំវិញទិសដៅដូចបង្ហាញក្នុងរូប១៤.៨ ហើយដោយធ្វើរបៀបនេះ ពួកវាបានបង្កើតចរន្តរង្វង់មួយ (បើសិនជាអ្នកបានសិក្សារូបវិទ្យា អ្នកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាអេឡិចត្រុងនេះវិលដូចនេះ) ។


- រង្វិលនៃអេឡិចត្រុង π ក្នុងបង់សែនបង្កើតដែនម៉ាញ៉េទិចអន្ទោងមួយដែលនៅទីតាំងរបស់ប្រូតុងបានបង្កើនកម្លាំងដែនម៉ាញ៉េទិចរបស់ម៉ាស៊ីន។ ការបង្កើនដែនម៉ាញ៉េទិចនេះធ្វើឱ្យ ប្រូតុងមិនត្រូវបានប៉ាន់ខ្លាំងទេ ហើយវាមានសម្របប្រេកង់ខ្ពស់ (៨~7)។

ការមិនប៉ាន់ មានន័យថា ប្រូតុងទទួលបាននូវផលបូកនៃដែនម៉ាញ៉េទិចទាំងពីរ ដូចនេះកម្លាំងម៉ាញ៉េទិចសរុបគឺធំជាងដែនម៉ាញ៉េទិចអាចទទួលបានក្នុងអវត្តមានដែនម៉ាញ៉េទិចអន្ទោង។ ភាពមិនប៉ាន់ខ្លាំងនេះដែលធ្វើឱ្យចរន្តរង្វង់មួយកើតពីអេឡិចត្រុង π មិនដេរ៉ូតាំង ពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលប្រូតុងអារ៉ូម៉ាទិចស្រូបប្រេកង់ខ្ពស់។



ភាពមិនប៉ាន់ប្រុងអារ៉ូម៉ាទិចខាងក្រៅដែលកើតឡើងពីចរន្តរង ជាផ្នែកនៃភស្តុតាងរូបសំខាន់បំផុត ដែលយើងមានសម្រាប់ភាពមិនដៅកន្លែងអេឡិចត្រុងπក្នុងអារ៉ូម៉ាទិច។ ជាការពិត សម្របប្រូតុងប្រូកង់ខ្ពស់តែងតែត្រូវបានប្រើជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ភាពអារ៉ូម៉ាទិច ក្នុងសមាសធាតុរងឆ្លាស់សំយោគថ្មីៗ។

ប៉ុន្តែ មិនមែនគ្រប់ប្រូតុងអារ៉ូម៉ាទិចទាំងអស់មានសម្របប្រូកង់ខ្ពស់ទេ។ ប្រូតុងខាងក្នុងនៃសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចរង់ចាំដែលមានអ៊ីដ្រូសែននៅកណ្តាលរង (ក្នុងប្រហោងអេឡិចត្រុងπ) តែងតែស្រូបប្រូកង់ទាបមិនធម្មតា ដោយសារតែពួកវាត្រូវបានប៉ាន់ដោយដែនម៉ាញ៉េទិចអន្ទោងផ្ទុយក្នុងមណ្ឌលរង (មើលរូប ១៤.៨)។ ឧទាហរណ៍មួយគឺ អានុយឡែន[18] (រូប១៤.៩)។ ប្រូតុងខាងក្នុងរបស់អានុយឡែន[18] ស្រូបដែនលើ (upfield) នៅ $\delta \sim 3.0$ ខាងលើស៊ីញ៉ាល់របស់តេត្រាមេទីលស៊ីឡាន (TMS) តែ ប្រូតុងខាងក្រៅស្រូបដែនក្រោម (down-field) នៅ $\delta \sim 9.3$ ។ ដោយគិតថា អានុយឡែន[18] មានអេឡិចត្រុងπ $4n + 2$ ភស្តុតាងនេះគាំទ្រភាពមិនដៅ កន្លែងនៃអេឡិចត្រុងπ ជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ភាពអារ៉ូម៉ាទិច និងជាកម្លាំងប៉ាន់ស្មានរបស់ច្បាប់ Huckel។



រូប១៤.៩ អានុយឡែន[18]។ ប្រូតុងក្នុង (ក្រហម) មានរបាំងខ្ពស់ ហើយស្រូបនៅ $\delta \sim 3.0$ ។ ប្រូតុងក្រៅ (ខៀវ) មានរបាំងតិច ស្រូបនៅ $\delta \sim 9.3$ ។

៧.៤ អ៊ីយ៉ុងអារ៉ូម៉ាទិច

បន្ថែមលើម៉ូលេគុលណ៍តធម្មតាដែលយើងបានសិក្សារួចហើយកន្លងមក មានប្រភេទម៉ូណូស៊ីគ្លីចមួយចំនួនដែលមានបន្ទុកវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមានមួយ។ អ៊ីយ៉ុងទាំងនេះខ្លះបង្ហាញស្ថេរភាពមិននឹកស្មានដល់ ដែលស្មើថាពួកវាជាអ៊ីយ៉ុងអារ៉ូម៉ាទិច។ ច្បាប់ Huckel មានសារប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សាលក្ខណៈរបស់អ៊ីយ៉ុងទាំងនេះផងដែរ។ យើងនឹងពិចារណាលើឧទាហរណ៍ពីរ៖ អាញ៉ុងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីលនិងកាចុងស៊ីក្លូអិបតាទ្រីអែនីល។


ទោះបីជាស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីលមិនមែនជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច វាមានភាពអាស៊ីតមិនធម្មតាមួយនៃក្រុម អ៊ីដ្រូកាបូ (pK_a របស់ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីលគឺ 16 តែ pK_a របស់ស៊ីក្លូអិបតាទ្រីអែនីលគឺ 36)។ ដោយសារតែភាពអាស៊ីតរបស់វា ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីលអាចត្រូវបានបម្លែងជាអាញ៉ុងរបស់វាដោយមានប្រតិកម្មជាមួយបាសខ្លាំងបង្ករណាមួយ។ បន្ថែមនេះទៀត អាញ៉ុងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីលមានស្ថេរភាពមិនធម្មតា ហើយស្ទើរជានិច្ច NMR បង្ហាញថា អាតូមអ៊ីដ្រូសែនទាំង៥ក្នុងអាញ៉ុងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីលសមមូល និងស្រូបដែនក្រោម។



ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែន

អាញ៉ុងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីល

ទម្រង់អរីតាល់របស់ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែន (រូប៤.១០) បង្ហាញពីមូលហេតុដែលស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនខ្លួនវាមិនមែនជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច។ វាមិនត្រឹមតែមានចំនួនអេឡិចត្រុង π មិនគ្រប់ វាថែមទាំងគ្មានភាពមិនដៅកន្លែងអេឡិចត្រុង π លើវង់ទាំងមូល ពីព្រោះតែភាពអ៊ីប្រីត sp^3 របស់ក្រុម-CH₂- ដែលមិនមានអរីតាល់p។



ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែន

អាញ៉ុងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីល


រូប១៤.១០ ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនមិនមែនជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច ពីព្រោះវាមានអេឡិចត្រុង π តែ៤ ហើយភាពអ៊ីប្រីតកម្ម sp^3 រារាំងភាពមិនដៅកន្លែងលើវង់ពេញលេញ។ ការដកប្រូតុងមួយបង្កើតអាញ៉ុងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីល ដែលមានភាពអារ៉ូម៉ាទិចពីព្រោះវាមានអេឡិចត្រុង π ៦ ហើយអាតូមកាបូនទាំងអស់មានអរីតាល់pមួយ

ម្យ៉ាងវិញទៀត បើសិនអាតូមកាបូន-CH₂-ក្លាយជាអ៊ីប្រីត sp^2 បន្ទាប់ពីវាបោះបង់ប្រូតុង (រូប១៤.១០) អេឡិចត្រុងពីរដែលនៅសល់អាចស្ថិតក្នុងអរីតាល់ p ថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើត។ បន្ថែមនេះទៀត អរីតាល់pថ្មីនេះអាចគ្របដណ្តប់ជាមួយអរីតាល់p ទាំងពីរសងខាង ហើយធ្វើឱ្យកើតវង់មួយមានអេឡិចត្រុង π ៦មិនដៅកន្លែង។ ដោយសារតែអេឡិចត្រុងទាំងនេះមិនដៅកន្លែង អាតូមអ៊ីដ្រូសែនទាំងអស់សមមូលគ្នា ហើយវាត្រូវគ្នា ជាមួយស្ទីច NMR។ គំរូបូតុងស្បែកអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់អាញ៉ុងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីល (រូប១៤.១១) ក៏បាន បង្ហាញអំពីរបាយស៊ីមេទ្រីនៃបន្ទុកអវិជ្ជមានក្នុងវង់ដែរ និងបង្ហាញពីភាពស៊ីមេទ្រីសរុបរបស់ទម្រង់វង់។

អាញ៉ុងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីលមានចំនួនអេឡិចត្រុង π ៦ គឺជាចំនួន Huckel មួយ ($4n+2$, $n=1$)។


- ដូចនេះ អាញ៉ុងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីលជាអាញ៉ុងអារ៉ូម៉ាទិច ហើយភាពអាស៊ីតរបស់ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនធ្វើឱ្យអាញ៉ុងរបស់វាមានស្ថេរភាព។

ស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែន (រូប១៤.១២) (សមាសធាតុមួយដែលមានឈ្មោះថាត្រូពីលីដែន) មានអេឡិចត្រុង π ៦ ប៉ុន្តែអេឡិចត្រុង π ៦របស់ស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែនមិនអាចមិនដៅកន្លែងពេញលេញលើវង់ទេ ពីព្រោះតែវត្តមាននៃ ក្រុម -CH₂- ដែលគ្មានអរីតាល់ p (រូប១៤.១២)។




រូប១៤.១២ ស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែនមិនមែនជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច ទោះបីវាមានអេឡិចត្រុង π ៦ ក៏ដោយ ព្រោះវាមានកាបូន sp^3 ដែលរារាំងភាពមិនដោកនៃឆ្នាំងជុំវិញវា។ ការដកអ៊ីដ្រូមួយ (H^-) ចេញបង្កើតកាចុងស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែនីល ដែលមានលក្ខណៈអារ៉ូម៉ាទិច ពីព្រោះកាបូនរបស់វាទាំងអស់មានអរប៊ីតាល់ p មួយ និងនៅតែមានអេឡិចត្រុង π ៦

នៅពេលអ៊ីបតាទ្រីអែនត្រូវបានដាក់ជាមួយអ្នកដទៃដែលអាចដកយកអ៊ីដ្រូមួយ វាបានបម្លែងជាកាចុងស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែនីល (ត្រូពីលីញ៉ូម)។ ការបាត់បង់អ៊ីដ្រូពីស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែនកើតឡើងយ៉ាងងាយស្រួល ហើយគេរកឃើញថាកាចុងស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែនីលមានស្ថេរភាពមិនធម្មតា។ ស្ស៊ីច NMR របស់កាចុងស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែនីលបញ្ជាក់ថា អាតូមអ៊ីដ្រូសែនទាំង៧របស់វាសមមូលគ្នា។ បើសិនជាយើងមើលរូប ១៤.១២ យើងនឹងឃើញអំពីរបៀបដែលយើងសង្កេតឃើញដូចនេះ។




នៅពេលអ៊ីដ្រូអ៊ីដ្រូត្រូវបានដកចេញពីក្រុម $-CH_2-$ របស់ស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែន អរប៊ីតាល់ p ទំនេរមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយអាតូមកាបូនក្លាយជាអ៊ីប៊ីត sp^2 ។ កាចុងដែលកើតមានអរប៊ីតាល់ p គ្រប់ដណ្តប់គ្នាចំនួន៧ មានអេឡិចត្រុង π ៦ មិនដោកនៃឆ្នាំង។ ដូចនេះ កាចុងស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែនជាប់អារ៉ូម៉ាទិចមួយ ហើយអាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់វាទាំងអស់សមមូលគ្នា នេះដូចអ្វីដែលយើងរកឃើញក្នុងពិសោធន៍។

គំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់កាចុងស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែនីល (រូប១៤.១៣) ក៏បានបង្ហាញអំពីភាពស៊ីមេទ្រីរបស់អ៊ីដ្រូនេះដែរ។ ប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចពីអេឡិចត្រុង π ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធអារ៉ូម៉ាទិចត្រូវបានកំណត់ដោយពណ៌លឿង-ទឹកក្រូច ដែលត្រូវបានរាយជុំវិញមុខខាងលើ (និងខាងក្រោម តែមិនបានបង្ហាញ) នៃគ្រោងកាបូន។ អ៊ីដ្រូទាំងមូលគឺវិជ្ជមាន តំបន់ដែលមានប៉ូតង់ស្យែលវិជ្ជមានធំជាងគេត្រូវបានតាង ដោយពណ៌ខៀវជុំវិញបរិមាត្ររបស់អ៊ីដ្រូនេះ។



រូប១៤.១៣ គំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់កាចុងស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែនីល


លំហាត់អនុវត្តន៍១៤.៤៖ ចូរប្រើវិធីពហុកោណ-រង្វង់សម្រាប់កាចុងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីល និងពន្យល់ថាតើវាជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច ឬអត់។



កាចុងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីល


លំហាត់អនុវត្តន៍១៤.៥៖ ចូរប្រើវិធីពហុកោណ-រង្វង់សម្រាប់អាញ៉ុង និងកាចុងស៊ីក្លូអិបតាទ្រីអែនីល និងពន្យល់ ថាតើពួកវាជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច ឬអត់។

(a)



អាញ៉ុងស៊ីក្លូអិបតាទ្រីអែនីល

(b)



កាចុងស៊ីក្លូអិបតាទ្រីអែនីល

លំហាត់អនុវត្តន៍១៤.៦៖ 1,3,5-ស៊ីក្លូអិបតាទ្រីអែនមានភាពអាស៊ីតតិចជាង 1,3,5-អិបតាទ្រីអែន។ ចូរពន្យល់ពីរបៀបដែលការសង្កេតពិសោធន៍អាចជួយដើម្បីបញ្ជាក់ចម្លើយរបស់អ្នកក្នុងផ្នែក (b) ក្នុងលំហាត់ខាងលើ។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៤.៧៖ នៅពេល 1,3,5-ស៊ីក្លូអិបតាទ្រីអែនមានប្រតិកម្មជាមួយប្រូម១ម៉ូលនៅ 0°C វាឯងប្រតិកម្មបូក-1,6។

- ចូរគូរទម្រង់របស់ផលិតផលនេះ។
- ដោយកម្ដៅ ផលិតផលប្រតិកម្មបូក-1,6នេះបោះបង់ HBr បង្កើតសមាសធាតុមួយដែលមានរូបមន្ត ម៉ូលេគុល C_7H_7Br ហៅថា *ត្រូពីលីញ៉ូមប្រូម*។ ត្រូពីលីញ៉ូមប្រូមមិនរលាយក្នុងធាតុរំលាយមិនប៉ូលែ ប៉ុន្តែរំលាយក្នុងទឹក វាមានចំណុចរលាយខ្ពស់ ($mp = 203^{\circ}C$) ហើយនៅពេលគេដាក់ជាមួយប្រាក់នីត្រាត សូលុយស្យុងត្រូពីលីញ៉ូមប្រូមបង្កើតកកវា $AgBr$ ។ តើលទ្ធផលពិសោធន៍ទាំងនេះ បញ្ជាក់ពីអ្វីនៃការចងសម្ព័ន្ធក្នុងត្រូពីលីញ៉ូមប្រូម?

៧.៥ សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច អង់ឌីអារ៉ូម៉ាទិច និងមិនអារ៉ូម៉ាទិច

- សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចមានអេឡិចត្រុង π មិនដៅកន្លែងលើវង់ទាំងមូល ហើយវាត្រូវបានបន្ស៊ប់ ដោយភាពមិនដៅកន្លែងរបស់អេឡិចត្រុង π ។

ដូចដែលយើងបានឃើញរួចហើយ មធ្យោបាយល្អមួយដើម្បីកំណត់ថាអេឡិចត្រុង π របស់ប្រព័ន្ធវង់មួយមិនដៅកន្លែងឬអង់ គឺប្រើបច្ចេកទេសស្បិច NMR។ វាផ្តល់ជាកស្មតាងរូបថាតើអេឡិចត្រុង π មិនដៅកន្លែង ឬ អត់។

ប៉ុន្តែតើមានន័យយ៉ាងម៉េច បើយើងនិយាយថាសមាសធាតុមួយត្រូវបានបន្ស៊ប់ដោយភាពមិនដៅកន្លែងនៃអេឡិចត្រុង π ? យើងមានគំនិតអំពីអ្វីអត្ថន័យនេះ ពីការប្រៀបធៀបកម្ដៅនៃប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មរបស់បង់សែន និងកម្ដៅដែលបានពីការគណនាពី 1,3,5-ស៊ីក្លូអិបតាទ្រីអែន។ យើងឃើញថា បង់សែនមានអេឡិចត្រុង π មិនដៅកន្លែង មានស្ថេរភាពខ្លាំងជាង 1,3,5-ស៊ីក្លូអិបតាទ្រីអែន (គំរូមួយដែលអេឡិចត្រុង π ដៅកន្លែង)។ យើងហៅភាពខុសគ្នានៃថាមពលរវាងពួកវាថា ថាមពលអេសូណង់ (ថាមពលភាពមិនដៅកន្លែង) ឬថាមពលបន្ស៊ប់កម្ម។

ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបស្រដៀងគ្នាចំពោះសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចផ្សេងទៀត យើងត្រូវជ្រើសរើសគំរូ ត្រឹមត្រូវ។ ប៉ុន្តែតើគំរូទាំងនេះជាគំរូយ៉ាងម៉េច ?

មធ្យោបាយមួយដើម្បីវាយតម្លៃថា សមាសធាតុស៊ីគ្លីចមួយត្រូវបានបន្ស៊ប់ដោយភាពមិនដៅកន្លែងនៃ អេឡិចត្រុង π ទូទាំងរង្វាស់អត់ គឺយើងត្រូវប្រៀបវាជាមួយសមាសធាតុខ្សែបើកដែលមានចំនួនអេឡិចត្រុង π ដូចគ្នា។ វិធីសាស្ត្រនេះមានប្រយោជន៍ណាស់ ពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែផ្តល់ឱ្យយើងនូវគំរូរបស់ពួកអានុយឡែន ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងគំរូរបស់កាបូន និងអាញ្គីងអារ៉ូម៉ាទិចផងដែរ (គេត្រូវធ្វើការកែតម្រូវ នៅពេលប្រព័ន្ធរង ត្រូវបានរមួល)។

ដើម្បីប្រើវិធីសាស្ត្រនេះ យើងអនុលោមនូវជំហានខាងក្រោម៖

១. យើងគួរគំរូរបស់យើងជាខ្សែលីនេអ៊ែរនៃអាតូមអ៊ីប្រីត sp^2 ដែលមានចំនួនអេឡិចត្រុង π ដូច សមាស ធាតុរងរបស់យើង។
២. បន្ទាប់មក យើងដកអាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយចេញពីចុងខ្សែទាំងពីរ ហើយផ្គុំចុងទាំងពីរជាដងមួយ។
 - បើសិនជាពឹងផ្អែកលើការគណនា ឬពិសោធន៍ រងមានថាមពលអេឡិចត្រុង π ទាបជាង នោះសមាសធាតុរងជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច។
 - បើសិនជាដង និងខ្សែបើកមានថាមពលអេឡិចត្រុង π ដូចគ្នា នោះរងជាសមាសធាតុមិន អារ៉ូម៉ាទិច។
 - បើសិនជាដងមានថាមពលអេឡិចត្រុង π ធំជាងខ្សែបើក នោះសមាសធាតុរងរបស់យើងជា សមាសធាតុអង់ទីអារ៉ូម៉ាទិច។

ការគណនា និងការពិសោធន៍ពិតប្រាកដដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការកំណត់ថាមពលអេឡិចត្រុង π មិន ត្រូវ បានបង្ហាញទេ ប៉ុន្តែយើងអាចសិក្សាឧទាហរណ៍បួនដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានប្រើ៖

❖ **ស៊ីក្លូប៊ុយតាឌីអែន** ៖ ចំពោះស៊ីក្លូប៊ុយតាឌីអែន យើងពិចារណាលើបម្រែបម្រួលថាមពលអេឡិចត្រុង π នៃការបម្លែងជាសម្មតិកម្មខាងក្រោម៖



1,3-ប៊ុយតាឌីអែន

ស៊ីក្លូប៊ុយតាឌីអែន

៤ អេឡិចត្រុង π

៤អេឡិចត្រុង π (អង់ទីអារ៉ូម៉ាទិច)

ការគណនាកំណត់ ហើយការពិសោធន៍បង្ហាញដើម្បីបញ្ជាក់ថា ថាមពលអេឡិចត្រុង π របស់ស៊ីក្លូប៊ុយ តាឌីអែនខ្ពស់ជាងដៃគូខ្សែបើករបស់វា។ ដូចនេះ ស៊ីក្លូប៊ុយតាឌីអែនជាសមាសធាតុអង់ទីអារ៉ូម៉ាទិច។

❖ **បង់សែន**៖ ពេលនេះការប្រៀបធៀបរបស់យើងអាស្រ័យលើការបម្លែងខាងក្រោម៖



1,3,5-អ៊ីចសាទ្រីអែន


បង់សែន

៦ អេឡិចត្រុង π

៦អេឡិចត្រុង π (អារ៉ូម៉ាទិច)


ការគណនា និងការពិសោធន៍បញ្ជាក់ថា បង់សែនមានថាមពលអេឡិចត្រុង π ទាបជាង 1,3,5-អ៊ីចសាទ្រីអែន។ បង់សែនត្រូវបានគេចាត់ជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច អាស្រ័យលើការប្រៀបធៀបនេះផងដែរ។

❖ **អាញ៉ុងស៊ីក្លូបង់តាឌីអែនីល៖** ពេលនេះយើងប្រើអាញ៉ុងលីនេអ៊ែរមួយសម្រាប់ការបង្កែងរបស់យើង៖



ទាំងការគណនា និងការពិសោធន៍បញ្ជាក់ថាអាញ៉ុងស៊ីក្លូបង់តាឌីអែនីលមានថាមពលអេឡិចត្រុង π ទាបជាងដៃគូខ្សែបើករបស់វា។ ដូចនេះ អាញ៉ុងស៊ីក្លូបង់តាឌីអែនីលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច។

❖ **ស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែន៖** ចំពោះស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែន យើងពិចារណាលើការបង្កែងខាងក្រោម៖



ពេលនេះការគណនា និងការពិសោធន៍បញ្ជាក់ថា ស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនប្លង់មួយអាចមានថាមពលអេឡិចត្រុង π ខ្ពស់ជាងអុកតាតេត្រាអែនខ្សែបើក។ ដូចនេះ ទម្រង់ប្លង់មួយរបស់ស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែន (បើសិនជាមាន) នឹងអាចជាអង់ទីអារ៉ូម៉ាទិច។ ដូចដែលយើងឃើញថ្មីៗ ស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនមិនមែនជាប្លង់ និងមានលក្ខណៈប៉ូលីអែនស៊ីតិចធម្មតា។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៤.៨៖ កាចុងស៊ីក្លូបង់តាឌីអែនីលជាសមាសធាតុអង់ទីអារ៉ូម៉ាទិច។ ចូរពន្យល់មូលហេតុនេះ តាមថាមពលអេឡិចត្រុង π របស់វាសមាសធាតុវែងមួយ និងសមាសធាតុខ្សែបើកមួយ។


លំហាត់អនុវត្តន៍១៤.៩៖ ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៧ R. Breslow (នៃសាកលវិទ្យាល័យកូឡុំប៊ី) និងសហការីបានបង្ហាញថា ការបូក $SbCl_5$ ទៅក្នុងសូលុយស្យុងនៃ 3-ក្លូរ៉ូស៊ីក្លូប្រូប៉ែនក្នុង CH_2Cl_2 បង្កើតជាករណីអង្គធាតុរឹងពណ៌សមួយ ដែលមានភាគផ្សំ $C_8H_8^+SbCl_6^-$ ។ ស្បៀងត្រួសត្រូវពី NMR របស់សូលុយស្យុងមួយនៃអំបិលនេះបង្ហាញថា អាតូម អ៊ីដ្រូសែនទាំងអស់សមមូលគ្នា។

- តើអ៊ីយ៉ុងអារ៉ូម៉ាទិចថ្មីណាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវទង្វើ?
- តើមានស៊ីញ៉ាល់ ^{13}C NMR ប៉ុន្មានដែលអ្នករំពឹងថាអ៊ីយ៉ុងនេះមាន?


៨. សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចផ្សេងៗទៀត

៨.១ សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចបង់ស្ទើត


បន្ថែមលើសមាសធាតុដែលយើងបានឃើញកន្លងមក មានឧទាហរណ៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតនៃសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច។ តំណាងនៃក្រុមធំមួយនៃសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចបង់ស្ទើត (benzenoid aromatic compounds) ត្រូវបានគេហៅថា អ៊ីដ្រូកាបូអារ៉ូម៉ាទិចប៉ូលីស៊ីតិច (polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH) ត្រូវ បានបង្ហាញក្នុងរូប១៤.១៤។





ណាប់ផ្តាឡែន




អង់ត្រាសែន




ផេណង់ត្រែន




ពីរ៉ែន



បង់សូ [a] ពីរ៉ែន




ឌីបង់សូ [a,1]ពីរ៉ែន




- អ៊ីដ្រូកាបូអាឡែនទីប៉ូលីស៊ីត្តិចបង់សែណូអ៊ីតមានម៉ូលេគុលដែលមានរង្វង់បង់សែនពីរ ឬច្រើន រលាយចូលគ្នា។

អាស្រ័យលើទ្រឹស្តីរេសូណង់ ម៉ូលេគុលគុលមួយនៃណាប់ផ្តាឡែនអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាអ៊ីប្រីតមួយនៃទម្រង់ Kekulé បី។ ទម្រង់Kekuléមួយ ដែលមានសារសំខាន់ជាងគេ ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូប១៤.១៥។ មានអាតូមកាបូនបួនពីរក្នុងណាប់ផ្តាឡែន (C_{4a} និង C_{8a}) ដែលជាចំណុចរួមរបស់រង្វង់ទាំងពីរ។ អាតូមកាបូនពីរនេះ ត្រូវនិយាយថាជាចំណុចរួមមួយនៃការរលាយរង្វង់។ ពួកវាភ្ជាប់សម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់វាទៅកាន់អាតូមកាបូនផ្សេង ទៀត ហើយវាមិនចងជាមួយអាតូមអ៊ីដ្រូសែនទេ។




ឬ




រូប១៤.១៥ ទម្រង់ Kekuléមួយរបស់ណាប់ផ្តាឡែន

លំហាត់ឧទាហរណ៍៖ តើមានស៊ីញ៉ាល់ ^{13}C NMR ប៉ុន្មានដែលអ្នករំពឹងថាបង្កើតបានពីអាសេណាប់ផ្តាឡែន ?



អាសេណាប់ផ្តាឡែន


យុទ្ធសាស្ត្រ និងចម្លើយ៖ អាសេណាប់ផ្កាឡែនមានប្លង់ស៊ីមេទ្រីមួយដែលធ្វើឱ្យអាតូមកាបូន៥នៅខាងឆ្វេង (a – e នៅខាងស្តាំ) សមមូលគ្នាជាមួយអាតូមកាបូននៅខាងស្តាំ។ អាតូមកាបូន f និង g ជាអាតូមកាបូនខុសគ្នា។ ដូចនេះ អាសេណាប់ផ្កាឡែនអាចឱ្យស៊ីញ៉ាល់ ^{13}C MNR ចំនួន៧។



លំហាត់អនុវត្តន៍១៤.១០៖ តើមានស៊ីញ៉ាល់ ^{13}C NMR ប៉ុន្មានដែលអ្នករំពឹងថាបានមកពី៖

- ណាប់ផ្កាឡែន
- អង់ត្រាសែន
- ផេណង់ត្រាសែន
- ពីរ៉ែន

ការគណនាអរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលរបស់ណាប់ផ្កាឡែនចាប់ផ្តើមតាមគំរូដែលបង្ហាញក្នុងរូប១៤.១៦។ អរីប៊ីតាល់ p គ្របដណ្តប់ជុំវិញបរិមាត្រវែងទាំងពីរ និងតាមចំណុចរលាយចូលគ្នារបស់វែង។




រូប១៤.១៦ អរីប៊ីតាល់p របស់ណាប់ផ្កាឡែន

នៅពេលការគណនាអរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលមួយត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះណាប់ផ្កាឡែន ដោយប្រើគំរូដូចបានបង្ហាញក្នុងរូប១៤.១៦ លទ្ធផលនៃការគណនានេះទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងពិសោធន៍នៃណាប់ផ្កាឡែននៃណាប់ផ្កាឡែនផងដែរ។ ការគណនាបញ្ជាក់ថា ភាពមិនដៅកន្លែងរបស់អេឡិចត្រុង π ចំនួន១០ លើវែងទាំងពីរបង្កើតទម្រង់មួយដែលមានថាមពលទាបជាងថាមពលគណនាពីទម្រង់Kekuléមួយ។ ដូចនេះណាប់ផ្កាឡែនមានថាមពលអស្ចារ្យមួយ។ បន្ថែមនេះទៀត អាស្រ័យលើអ្វីដែលយើងដឹងពីបង់សែន ទំនោររបស់ណាប់ផ្កាឡែនក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មជំនួសខ្លាំងជាងប្រតិកម្មបូក ហើយវាបង្ហាញលក្ខណៈផ្សេងទៀតដែលមានជាមួយសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច។


អង់ត្រាសែន និងផេណង់ត្រែន (រូប១៤.១៤) ជាអ៊ីសូមែរនឹងគ្នា។ ក្នុងអង់ត្រាសែន វែងបីត្រូវបានរលាយចូលគ្នាតាមផ្លូវលីនេអ៊ែរមួយ ហើយក្នុងផេណង់ត្រែន ពួកវារលាយចូលគ្នាបង្កើតជាម៉ូលេគុលរាងមុំមួយ។ ម៉ូលេគុលទាំងពីរក៏បានបង្ហាញថាមពលអស្ចារ្យធំ និងមានលក្ខណៈគីមីជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច។

ពីរ៉ែន(រូប១៤.១៧)ក៏ជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចដែរ។ ពីរ៉ែនត្រូវបានគេស្គាល់ជាយូរណាស់មកហើយ។ ប៉ុន្តែស្រលាយរបស់ពីរ៉ែនក្លាយជាប្រធានបទស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញនូវការអនុវត្តមួយទៀតរបស់ច្បាប់Huckel។




រូប១៤.១៧ ទម្រង់ Kekulé មួយរបស់ពីរ៉ែន

ដើម្បីយល់អំពីការស្រាវជ្រាវនេះ យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើទម្រង់Kekuléរបស់ពីរ៉ែន (រូប ១៤.១៧)។ ចំនួនសរុបនៃអេឡិចត្រុង π ក្នុងពីរ៉ែនគឺ១៦ (សម្ព័ន្ធពីរជាន់=៨)។ លេខ ១៦ជាលេខ Huckel មួយ ប៉ុន្តែ ច្បាប់ Huckel មានបំណងអនុវត្តតែលើសមាសធាតុម៉ូណូស៊ីក្លិចប៉ុណ្ណោះ ហើយពីរ៉ែនជាសមាសធាតុតេត្រាវ៉ែន ច្បាស់ ណាស់។ ប៉ុន្តែ បើយើងមិនគិតពីសម្ព័ន្ធពីរជាន់ខាងក្នុងរបស់ពីរ៉ែន ហើយមើលតែលើបរិមាត្រ យើងឃើញថា បរិមាត្រ នេះគឺជាវង់ប្លង់មួយដែលមានអេឡិចត្រុង π ១៤។ ជាការពិតណាស់ បរិមាត្រវង់នេះស្រដៀងគ្នាទៅ នឹងអានុយឡែន[14]ណាស់។ លេខ១៤ជាលេខ Huckel មួយ ($4n+2, n=3$) ហើយគេអាចប៉ាន់ស្មានថាបរិមាត្ររបស់ពីរ៉ែនអាចមានលក្ខណៈអារ៉ូម៉ាទិច បើសិនជាមិនមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ក្នុងនេះទេ។



អានុយឡែន[14]





ត្រង់-15,16-ឌីមេទីលឌីអ៊ីដ្រូពីរ៉ែន

ការប៉ាន់ស្មាននេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅពេល V. Boekelheide (សាកលវិទ្យាល័យ Oregon) បានសំយោគត្រង់-15,16-ឌីមេទីលឌីអ៊ីដ្រូពីរ៉ែន ហើយបានបង្ហាញថា វាជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច។ **លំហាត់អនុវត្ត១៤.១១៖** បន្ថែមលើសិប្បាល់ដែនក្រោម ស្ទិច $^1\text{H-NMR}$ របស់ត្រង់-15,16-ឌីមេទីលឌីអ៊ីដ្រូពីរ៉ែនមានសិប្បាល់ដែនលើមួយ ត្រង់ $\delta = 4.2$ ។ ចូរពន្យល់អំពីវត្តមាននៃសិប្បាល់ដែនលើនេះ។

៨.២ សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចមិនបង់សែនណូអ៊ីត

ណាប៉្តាឡែន ផេណង់ត្រែន និងអង់ត្រាសែនជាឧទាហរណ៍នៃសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចបង់សែនណូអ៊ីត តែអាញ់ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីល កាចុងស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែនីល ត្រង់-15,16-ឌីមេទីលឌីអ៊ីដ្រូពីរ៉ែន និងអានុយឡែនអារ៉ូម៉ាទិច (លើកលែងអានុយឡែន[6]) ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចមិនបង់សែនណូអ៊ីត (nonbenzenoid aromatic compounds)។

ឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃអ៊ីដ្រូកាបូអារ៉ូម៉ាទិចមិនបង់សែនណូអ៊ីតគឺសមាសធាតុអាស៊ុយឡែន (azulene) អាស៊ុយឡែនមានថាមពលរេសូណង់ 205 kJ mol^{-1} ។ មានការព្រួយបារម្ភក្នុងអាស៊ុយឡែនដែលត្រូវ បានកំណត់ថាដោយគំរូប្លង់ស្បែកអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់អាស៊ុយឡែនក្នុងរូប១៤.១៨។ កត្តាដែលទាក់ទង នឹងភាពអារ៉ូម៉ាទិច គឺអាស្រ័យលើបរិមាត្រវង់អាស៊ុយឡែន (មើលលំហាត់អនុវត្ត១៤.១២)។





អាស៊ីយឡែន

រូប១៤.១៨ គំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចគណនារបស់អាស៊ីយឡែន

លំហាត់អនុវត្ត៩៤.១២៖ អាស៊ីយឡែនមានឌីប៉ូលម៉ូម៉ង់មួយ។ ចូរគូរទម្រង់វ៉ិចទ័ររបស់អាស៊ីយឡែនដែលពន្យល់អំពីឌីប៉ូលម៉ូម៉ង់នេះ ហើយដែលជួយពន្យល់ពីភាពអាក្រក់របស់វា។

៨.៣ កុយឡីវ៉ែន

ក្នុងឆ្នាំ១៩៩០ W. Kratschmer (វិទ្យាស្ថាន Mak Planck, Heidelberg), D. Huffman (សាកលវិទ្យាល័យ Arizona) និងសហការីរបស់ពួកគាត់បានបរិយាយការសំយោគដំបូងនៃ C_{60} ដែលជាម៉ូលេគុលមួយមានរាងដូច បាល់ទាត់ ហើយគេហៅវាថា បាក់មិនស្ទ័រកុយឡីវ៉ែន (buckminsterfullerene)។ ដោយទទួលបានពីការដុត កម្ដៅក្រាភីតក្នុងបរិយាកាសនិចល C_{60} គឺជាសមាជិកថ្មីមួយនៃក្រុមថ្មីនៃសមាសធាតុអាក្រក់ហៅថា កុយឡីវ៉ែន (fullerene)។ កុយឡីវ៉ែនជាម៉ូលេគុលដូចទ្រង់មានធរណីមាត្រដូចពហុកោណជ្រុង៦០ ឬដោម ដែលត្រូវបានគេហៅឈ្មោះ បន្ទាប់ពី ស្ថាបត្យករ Buckminster Fuller ល្បីល្បាញលើការបង្កើតទម្រង់ដោម របស់គាត់។ ទម្រង់របស់ C_{60} និងវត្តមានរបស់វាត្រូវបានព្យាបាល៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដោយ H.W.Kroto (សាកលវិទ្យាល័យ Sussex) R. E. Smalley និង R. F. Curl (សាកលវិទ្យាល័យ Rice) និងសហការីរបស់ ពួកគាត់។ Kroto, Curl, និង Smalley (ទទួលបានរង្វាន់ណូបែលក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦) បានរកឃើញទាំង C_{60} និង C_{70} (រូប១៤.១៩) ជាភាគផ្សំស្ថេរភាពខ្ពស់របស់ល្បាយនៃបណ្តុំកាបូនដែលបង្កើតក្រាភីតបង្អួតដោយឡែកស៊ែរ។ តាំងពីឆ្នាំ១៩៩០ អ្នកគីមីបានសំយោគសមាសធាតុកុយឡីវ៉ែនទាបជាង និងខ្ពស់ជាងជាច្រើន ហើយ បានចាប់ ផ្តើមស្រាវជ្រាវលក្ខណៈគីមីរបស់ពួកវា។




រូប១៤.១៩ ទម្រង់របស់ C_{60} និង C_{70}

ដូចគ្នាទៅនឹងដូមមួយដែរ កុយឡឺវ៉ែនមួយកើតឡើងពីបណ្តាញមួយនៃបញ្ចកោណ និងឆកោណ។ មាន រាងស្ទើរតែជាស្វ៊ែរមួយ កុយឡឺវ៉ែនត្រូវតែមានមុខ៥អាតូមចំនួន១២ ប៉ុន្តែចំនួនមុខ៦អាតូមអាចខុសគ្នា ឆ្ងាយ។ ទម្រង់C₆₀ មានមុខឆកោណចំនួន២០ ៧ទម្រង់C₇₀ មានមុខឆកោណ២៥។ អាតូមកាបូននីមួយៗ របស់កុយឡឺវ៉ែនជាអ៊ីប៊្រីតsp² និងបង្កើតសម្ព័ន្ធទៅអាតូមកាបូនបីផ្សេងទៀត។ អេឡិចត្រុងដែលនៅសល់ លើកាបូន នីមួយៗត្រូវរាយប៉ាយ (មិនដៅកន្លែង) ក្នុងប្រព័ន្ធមួយនៃអរីប៊ីតាល់ម៉ូលេគុលទាំងមូលដែលធ្វើឱ្យ វាមាន លក្ខណៈអារ៉ូម៉ាទិច។

គីមីវិទ្យានៃកុយឡឺវ៉ែនត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានភាពអស្ចារ្យជាការសំយោគរបស់វា។ កុយឡឺវ៉ែនមាន កម្រិតចំណូលអេឡិចត្រុងខ្ពស់ និងងាយទទួលយកអេឡិចត្រុងពីលោហៈអាល់កាឡាំងដើម្បីបង្កើតជាស លោហៈថ្មីមួយ គេហៅថាអំបិលបាក់កូ (buckide salt)។ អំបិលប្រភេទនេះ ដូចជា K₃C₆₀ គឺជាក្រាមលោហៈ មានស្ថេរភាពមួយ ដែលមានទម្រង់គូបមណ្ឌលផ្ទៃមុខ (face-centerd-cubic structure) នៃបាល់បាក់យី (bucky balls) ដែលអ៊ីយ៉ុងប៉ូតាស្យូមមួយស្ថិតចន្លោះគូបនីមួយៗ វាក្លាយសារធាតុចម្លងអគ្គីសនីយ៉ាងអស្ចារ្យ នៅពេល គេបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពមកក្រោម18K។ គេបានសំយោគកុយឡឺវ៉ែនដែលមានអាតូមលោហៈខាងក្នុង ទ្រុឌ អាតូមកាបូនរបស់វាដែរ។

គីមីវិទ្យានៃបំពង់ណាណូ (Nanotubes)

បំពង់ណាណូជាថ្នាក់នៃសារធាតុកាបូនថ្មីមួយដែលទាក់ទងនឹង បាក់មិនស្ទើរកុយឡឺវ៉ែន។ បំពង់ ណាណូមួយជាទម្រង់មួយដែលមើលទៅ ដូចជាវាត្រូវបានបង្កើត ដោយការមូរបន្ទះកាបូនក្រាភីត (បណ្តាញសំប៉ែត មួយនៃវង់បង់សែន ស្រដៀងគ្នានឹងខ្សែលួស) ទៅជារាងមួយដូចបំពង់ដែល ចុកចុងសងខាងដោយ បាល់បាក់យីមួយចំហៀង។ បំពង់ណាណូ រឹងខ្លាំង ប្រហែល១០០ដងខ្លាំងជាងដែកថែប។ ក្រៅពីភាពរឹងមាំ របស់វា បំពង់ណាណូខ្លះត្រូវបានគេប្រើឱ្យមានអំពើជាឧបករណ៍ ចម្លងអគ្គីសនី ឬសម្ព័ន្ធដាក់ទ័រ អាស្រ័យលើទម្រង់ជាក់លាក់របស់ពួក (Probe tips) សម្រាប់ការវិភាគ DNA ឬប្រូតេអ៊ីនដោយមីក្រូទស្សន៍កម្លាំងអាតូម (atomic force microscopy [AFM])។ ពួកវាក៏មានបម្រើបម្រាស់ជាច្រើនទៀតផងដែរ ដូចជាប្រើជាបំពង់តេស្តទំហំម៉ូលេគុល ឬជាគ្រាប់សម្រាប់ផ្ទុក ឱសថ។



បណ្តាញវង់បង់សែនមួយដែលគូសម្គាល់ ដោយពណ៌ ខ្មៅ លើរូបភាពមីក្រូទស្សន៍ STM (scanning tunnelling microscope) ជាជញ្ជាំងរបស់បំពង់ ណាណូមួយ

៩. សមាសធាតុស៊ីគ្លីចអេតេរ៉ូស៊ីគ្លីច


ស្ទើរតែគ្រប់ម៉ូលេគុលស៊ីគ្លីចទាំងអស់ដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមក កកើតពីវង់ដែលមានតែអាតូម កាបូនតែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងសមាសធាតុស៊ីគ្លីចមួយចំនួន ធាតុមួយក្រៅពីកាបូនអាចមានវត្តមានក្នុងវង់ នោះ។

- សមាសធាតុស៊ីគ្លីចដែលមានធាតុមួយផ្សេងពីកាបូនត្រូវបានគេហៅថាសមាសធាតុអេតេរ៉ូស៊ីគ្លីច (heterocyclic compounds)។

ម៉ូលេគុលអេត្រូស៊ីត្រីចត្រូវបានគេជួបប្រទះក្នុងធម្មជាតិ។ ដោយសារមូលហេតុនេះ និងដោយសារតែ ម៉ូលេគុលខ្លះជាសមាសធាតុអ្វីម៉ាទិច យើងនឹងបរិយាយឧទាហរណ៍ខ្លះអំពីសមាសធាតុអ្វីម៉ាទិចអេត្រូស៊ីត្រីច (heterocyclic aromatic compounds) ។


សមាសធាតុអេត្រូស៊ីត្រីចមានអាសូត អុកស៊ីសែន ឬស្ថាន់ជីវជាសមាសធាតុដែលសំខាន់ជាងគេ។ ឧទាហរណ៍៤សំខាន់ត្រូវបានគេឱ្យក្នុងទម្រង់Kekuléរបស់ពួកវា។ សមាសធាតុទាំងបួននេះជាសមាសធាតុ អ្វីម៉ាទិច៖

- ពីរឌីនមានទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រុងទៅនឹងបង់សែន
- ពីរ៉ុល ផ្សាន់ និងត្យូផែនទាក់ទងទៅនឹងអាញ់ដ្រូស៊ីត្រីចបង់តាឌីអែនីល



អាតូមអាសូតក្នុងម៉ូលេគុលពីរឌីន និងពីរ៉ុលជាអាតូមអ៊ីប្រីត sp^2 ។ ក្នុងពីរឌីន (រូប១៤.២០) អាសូត sp^2 ឱ្យអេឡិចត្រុងសម្ព័ន្ធមួយទៅប្រព័ន្ធ π ។ រួមគ្នាជាមួយអេឡិចត្រុងមួយៗពីអាតូមកាបូន៥ អេឡិចត្រុងនេះ ឱ្យពីរឌីននូវទម្រង់សិចតេត (sextet) មួយដូចបង់សែន។ អេឡិចត្រុងត្រង់មិនសម្ព័ន្ធពីរបស់អាសូតនៃពីរឌីន ស្ថិតក្នុងអរីប៊ីតាល់ sp^2 មួយដែលស្ថិតក្នុងប្លង់ដូចគ្នានឹងអាតូមរបស់វង់។ អរីប៊ីតាល់ sp^2 នេះមិនបានគ្របដណ្តប់ ជាមួយអរីប៊ីតាល់ p របស់វង់ទេ (ដូចនេះ គេនិយាយថា វាជាអត្រូកូណាល់នៃអរីប៊ីតាល់ p ទាំងនេះ)។ ទ្វេតា អេឡិចត្រុងសេរីលើអាសូតមិនមែនជាផ្នែករបស់ប្រព័ន្ធ π ទេ ហើយអេឡិចត្រុងហើយទាំងនេះធ្វើឱ្យពីរឌីនមាន លក្ខណៈជាបាសខ្សោយមួយ។

ក្នុងពីរ៉ុល (រូប១៤.២១) អេឡិចត្រុងត្រូវបានតម្រៀបខុសគ្នាពីពីរឌីន។ ដោយសារតែមានអេឡិចត្រុង π តែ៤ ដែលបានមកពីអាតូមកាបូនរបស់វង់ពីរ៉ុល អាសូតអ៊ីប្រីត sp^2 ត្រូវតែរួមចំណែកនូវ២អេឡិចត្រុងដើម្បី ទទួលបានភាពសិចតេអ្វីម៉ាទិចមួយ។ ដោយសារតែអេឡិចត្រុងទាំងនេះជាផ្នែកមួយរបស់សិចតេអ្វីម៉ាទិច ពួកវាមិនអាចផ្តល់ទៅឱ្យប្រូតុងមួយទេ។ ដូចនេះ ក្នុងសូលុយស្យុងទឹក ពីរ៉ុលមិនមែនជាបាសទេ។




រូប១៤.២០ ពីរឌីនជាសមាសធាតុអ្វីម៉ាទិច និងជាបាស។ អាសូត របស់វាមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយ ក្នុងអរីប៊ីតាល់ sp^2 មួយដែលមិន មែនជាផ្នែករបស់ប្រព័ន្ធអ្វីម៉ាទិច

រូប១៤.២១ ពីរ៉ុលជាសមាសធាតុអ្វីម៉ាទិច តែមិនមែនជាបាស។ វា មិនមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីទេ។ ទ្វេតាអេឡិចត្រុងលើអាសូតជា ផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអ្វីម៉ាទិច

ផ្សាន់ និងត្យូផែនមានទម្រង់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពីរ៉ុលណាស់។ អាតូមអុកស៊ីសែនក្នុងផ្សាន់ និងអាតូម

ស្ថាន់ជ័រក្នុងត្យូផែនមានភាពអ៊ីប្រីត sp^2 ។ ក្នុងសមាសធាតុទាំងពីរ អរីតាល់ p របស់អេតេរអាតូមឱ្យ២អេឡិចត្រុងទៅប្រព័ន្ធ π ។ អាតូមអុកស៊ីសែនរបស់ផ្សាន និងអាតូមស្ថាន់ជ័របស់ត្យូផែនមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងត្រង់សេរីមួយក្នុងអរីតាល់ sp^2 (រូប១៤.២២) ដែលអត្តកូណាល់ជាមួយប្រព័ន្ធ π ។



ផ្សាន

ត្យូផែន

រូប១៤.២២ ផ្សាន និងត្យូផែនជាសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច។ ក្នុងករណីនីមួយៗ


អេតេរអាតូមឱ្យទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយទៅប្រព័ន្ធអារ៉ូម៉ាទិច ប៉ុន្តែអាតូមនីមួយៗ

ក៏មានទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីក្នុងអរីតាល់ sp^2 ដែលមិនមែនជាផ្នែករបស់ប្រព័ន្ធ π ទេ


១០. សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចក្នុងគីមីជីវៈ

សមាសធាតុដែលមានរង្វង់អារ៉ូម៉ាទិចមានគួរឱ្យសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងប្រតិកម្មដែលកើតឡើងក្នុងប្រព័ន្ធភារវេស។ យើងមិនអាចសិក្សាបរិយាយពួកវាក្នុងមេរៀននេះទាំងអស់ទេ។ យើងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ខ្លះប៉ុណ្ណោះ។

អាស៊ីតអាមីនេ (amino acids) ពីរដែលចាំបាច់សម្រាប់សំយោគប្រូតេអ៊ីនមានរង្វង់បង់សែន៖




ផេនីលអាឡានីន




ទីរ៉ូស៊ីន

អាស៊ីតអាមីនេអារ៉ូម៉ាទិចទី៣គឺទ្រីបតូផានមានរង្វង់បង់សែនមួយរលាយជាប់រង្វង់ពីរុលមួយ (ប្រព័ន្ធអារ៉ូម៉ាទិចនេះត្រូវបានគេហៅថាប្រព័ន្ធអ៊ីនដុល (indole system))។





ទ្រីបតូផាន



អ៊ីនដុល

ដោយសារតែការវិវត្ត មនុស្សមិនមានលទ្ធភាពដ៏សាស្ត្រក្នុងការសំយោគវង់បង់សែនទេ។ ដូចនេះ ស្រលាយផេនីលអាឡានីន និង ទ្រីបតូផានមានសារសំខាន់ក្នុងចំណីអាហាររបស់មនុស្ស។ ដោយសារ តែ ទីរ៉ូស៊ីនអាចត្រូវបានសំយោគពីផេនីលអាឡានីន ក្នុងប្រតិកម្មមួយ ដោយប្រើកាតាលីកអង់ស៊ីមមួយជា *ផេនីលអាឡានីនអ៊ីដ្រូកស៊ីឡាស*។ វាមិនមានសារសំខាន់ក្នុងចំណីអាហារទេ លុះត្រាតែ មានវត្តមានផេនីល អាឡានីន។

សមាសធាតុអេត្រូស៊ីត្តិចក៏មានវត្តមានក្នុងប្រព័ន្ធដីគីមីដែរ។ ស្រលាយរបស់ពូរីន និងពីរីមីឌីនជាផ្នែក សំខាន់របស់ DNA និង RNA:




ផលិតផលទឹកដោះគោ សណ្តែក ត្រី សាច់ និង ស៊ុត ជាប្រភពរបស់អាស៊ីតអាមីនេសំខាន់ៗ

លំហាត់អនុវត្តន៍១៤.១៣៖

- a. ជួនកាលគេហៅក្រុម -SH ជា *ក្រុមមែកាប់តូ* ។ 6-មែកាប់តូពូរីនត្រូវបានប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកឈាមធ្ងន់ធ្ងរ (acute leukemia) ។ ចូរគូរទម្រង់របស់វា។
- b. អាឡូពូរីណុលជាសមាសធាតុដែលគេប្រើដើម្បីព្យាបាលរោគប្រគ្រីវ (gout) គឺ 6-អ៊ីដ្រូកស៊ីពូរីន។ ចូរគូរទម្រង់របស់វា។

ទោះបីសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចជាច្រើនមានសារសំខាន់ចំពោះការវិវត្ត តែសមាសធាតុខ្លះអាចមានគ្រោះថ្នាក់។ សារធាតុខ្លះពុលខ្លាំងណាស់ ហើយសមាសធាតុបង់សែណូអ៊ីតខ្លះ រួមមានបង់សែនផងដែរ ជាសមាសធាតុបង្កមហារីក (carcinogen)។ ឧទាហរណ៍ពីរគឺ បង់សូ[a] ពីរីន និង 7-មេទីលបង់[a]អង់ត្រាសែន៖



អ៊ីដ្រូកាបូបង់សូ[a]ពីរីនត្រូវបានរកឃើញក្នុងផ្សេងៗបារី និងក្នុងផ្សែងចេញពីឃាសយន្ត។ វាក៏ត្រូវបានបង្កើតក្នុងចំហេះមិនសព្វនៃប្រេងឥន្ធនៈ។ វាត្រូវបានរកឃើញលើសាច់អាំងខ្លោច (charcoal-broiled steaks) និងពីថ្នល់កៅស៊ូនៅរដូវក្តៅខ្លាំង។

១១. ស្បៀងត្រួសពីរបស់សមាសធាតុអរ៉ូម៉ាទិច

១១.១ ស្បៀង¹H NMR

- អ៊ីដ្រូសែនវង់របស់ស្រឡាយបង់សែនស្រូបដែនក្រោមក្នុងតំបន់ចន្លោះ $\delta = 6.0 - 9.5$ ។


ក្នុងផ្នែកទី១៤.៧គ យើងរកឃើញថា សម្របកើតឡើងលើដែនក្រោម ពីព្រោះចរន្តវង់ដែលបានបង្កើត ក្នុងវង់បង់សែនបង្កើតដែនម៉ាញ៉េទិច ហៅថា ដែនម៉ាញ៉េទិចអន្លោង ដែលបន្ថែមកម្លាំងម៉ាញ៉េទិចបន្ថែមលើដែនម៉ាញ៉េទិចរបស់ម៉ាស៊ីននៅទីតាំងប្រូតុងរបស់វង់។ ការបន្ថែមកម្លាំងម៉ាញ៉េទិចនេះបណ្តាលឱ្យប្រូតុងរបស់ បង់សែនមិនមានរបាំងសោះ។

យើងបានសិក្សាក្នុងផ្នែកទី៧គ រួចហើយ ដែលអ៊ីដ្រូសែនក្នុងរបស់សមាសធាតុអរ៉ូម៉ាទិចវង់ធំ ដូចជា អានុយឡែន[18] ដោយសារប្រូតុងរបស់វាមានរបាំងខ្ពស់ដោយដែនម៉ាញ៉េទិចអន្លោង។ ដូចនេះ វាស្រូបប្រេកង់ទាបណាស់ តែងតែមានតម្លៃ δ អវិជ្ជមាន។

១១.២ ស្បៀង¹³C NMR

- អាតូមកាបូនរបស់វង់បង់សែនតែងតែស្រូបក្នុងតំបន់ $\delta = 100 - 170$ នៃស្បៀង ¹³C NMR។

រូប១៤.២៥ ឱ្យស្បៀង ¹³C NMR ផ្ទុបប្រូតុង នៃ 4-N,N-ឌីអេទីលអាមីណូបង់សាល់ដេអ៊ីត ហើយជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងការសិក្សាអំពី¹³C នៃសមាសធាតុដែលមានទាំងអាតូមកាបូនអរ៉ូម៉ាទិច និងអាតូមផាទិច។




រូប១៤.២៥ ស្បៀង ¹³C NMR ផ្ទុបប្រូតុងរបស់ 4-N,N-ឌីអេទីលអាមីណូបង់សាល់ដេអ៊ីត

ស្បៀង DEPT (មិនបានបង្ហាញ) បង្ហាញថា ស៊ីញ៉ាល់នៅ $\delta = 45$ កើតឡើងពីក្រុម CH_2 មួយ ហើយស៊ីញ៉ាល់នៅ $\delta = 13$ បានមកពីក្រុម CH_3 មួយ។ ស្បៀងនេះអាចជួយឱ្យយើងកំណត់ស៊ីញ៉ាល់ទាំងពីរនេះលើ កាបូនពីរបស់ក្រុមអេទីលសមមូលគ្នា។

ស៊ីញ៉ាល់នៅ $\delta = 126$ និង $\delta = 153$ កើតឡើងក្នុងស្បៀង DEPT នៅពេលអាតូមកាបូនមិនចង់អាតូមអ៊ីដ្រូសែន ហើយត្រូវបានតាងដោយកាបូន b និង e (រូប១៥.២៥)។ កម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខ្ពស់របស់អាសូត (បើប្រៀបធៀបជាមួយកាបូន) បណ្តាលឱ្យស៊ីញ៉ាល់ពី e កាន់តែដែនក្រោម (នៅ $\delta = 153$)។ ស៊ីញ៉ាល់នៅ $\delta = 190$ កើតឡើងនៅពេលក្រុម CH មួយក្នុងស្បៀង DEPT ហើយកើតឡើងពីកាបូនរបស់ក្រុមអាល់ដេអ៊ីត។


រំកិលគឺមីរបស់វាស្ថិតនៅដែនក្រោមនៃពិកទាំងអស់ ដោយសារតែកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខ្ពស់របស់វា ហើយដោយសារតែទម្រង់រេសូណង់ទី២ចូលរួមបង្កើតអ៊ីប៊ីតខាងក្រោម។ កត្តាទាំងពីរនេះបណ្តាលឱ្យដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងលើកាបូននេះកាន់តែទាប ដូចនេះកាបូននេះកាន់តែមានភាពមិនប៉ងខ្ពស់។




ទម្រង់រេសូណង់របស់ក្រុមអាល់ដេអ៊ីត

មូលហេតុនេះធ្វើឱ្យមានស៊ីញ៉ាល់នៅ $\delta=112$ និង $\delta=133$ ហើយអាតូមកាបូនពីរឈូតរបស់វាបង់សែនតាងដោយ c និង d បង្កើតស៊ីញ៉ាល់ទាំងពីរនេះ។ ស៊ីញ៉ាល់ទាំងពីរនេះត្រូវបានកំណត់ជាក្រុម CH ក្នុងស្ស៊ីច DEPT។ ប៉ុន្តែតើស៊ីញ៉ាល់ណាជាប់របស់ឈូតអាតូមកាបូនណា? ពេលនេះ យើងរកឃើញការអនុវត្តមួយផ្សេងទៀតរបស់ទ្រឹស្តីរេសូណង់។

បើសិនជាយើងសរសេរទម្រង់រេសូណង់ A-D ដែលទាក់ទងនឹងទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីរបស់ក្រុមអាមីណូ យើងឃើញថាបាយបង្កើតដោយ B និង D បង្កើនដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងនៅលើឈូតនៃអាតូមកាបូន ដែលតាងដោយ d:



ម្យ៉ាងវិញទៀត ការគូរទម្រង់ E-H ដែលទាក់ទងនឹងក្រុមអាល់ដេអ៊ីត បង្ហាញថាបាយដែលបង្កើតដោយ F និង H បន្ថយដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងនៅលើឈូតអាតូមកាបូនដែលតាងដោយ c:




(មានទម្រង់រេសូណង់ផ្សេងទៀតដែលអាច ប៉ុន្តែមិនទាក់ទងទេ)

ការបង្កើនដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងលើអាតូមកាបូនមួយអាចបង្កើនភាពប៉ងរបស់វា ហើយអាចរំកិលស៊ីញ៉ាល់ទៅកាន់ដែនលើ។ ដូចនេះ យើងកំណត់ស៊ីញ៉ាល់នៅ $\delta=112$ ឱ្យឈូតអាតូមកាបូនតាងដោយ d។

ផ្ទុយមកវិញ ការបន្ថយដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងលើអាតូមកាបូនមួយអាចរំកិលស៊ីញ៉ាល់របស់វាទៅកាន់ដែនក្រោម ដូច នេះយើងកំណត់ស៊ីញ៉ាល់នៃ $\delta=133$ ជារបស់ឈុតកាបូនតាងដោយ c។


ស្បៀតត្រួសពីកាបូន-13 អាចត្រូវបានប្រើជាពិសេសក្នុងការសម្គាល់សមាសធាតុមួយដែលមានកម្រិតស៊ីមេទ្រីខ្ពស់។

ឧទាហរណ៍៖ ស្បៀត ^{13}C NMR បង្គាប់ប្រូតុងក្នុងរូប១៤.២៦ ជារបស់ ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែន ($\text{C}_6\text{H}_3\text{Br}_3$)។ តើវាជា ទ្រីប្រូម៉ូប៊ុយតានមួយណា?




រូប១៤.២៦ ស្បៀត ^{13}C NMR បង្គាប់ប្រូតុងរបស់ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែន


អាចមានទ្រីប្រូម៉ូបង់សែនបី៖



1,2,3-ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែន



1,2,4-ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែន



1,3,5-ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែន


ស្បៀតរបស់យើងមានស៊ីញ៉ាល់តែពីរទេ នេះបញ្ជាក់ថាមានប្រភេទអាតូមកាបូនតែពីរខុសគ្នាក្នុងសមាស ធាតុនេះទេ។ មានតែ 1,3,5-ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែនទេដែលមានកម្រិតស៊ីមេទ្រីមួយ ដូចនេះ វាត្រូវឱ្យស៊ីញ៉ាល់តែ២ ប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះវាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ។ 1,2,3-ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែនអាចឱ្យស៊ីញ៉ាល់ ^{13}C NMR ចំនួន៤ និង 1,2,4-ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែនអាចឱ្យស៊ីញ៉ាល់៦។

លំហាត់អនុវត្ត១៤.១៤៖ ចូរពន្យល់ពីរបៀបដែល ^{13}C NMR អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាករណ៍ខុសគ្នារវាងអរតូ- , មេតា- និង ប៉ារ៉ា-ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែន។

១១.៣ ស្បៀតIRរបស់បង់សែនជួស

ស្រលាយបង់សែនឱ្យពិក C-H ទាញ ជិត 3030cm^{-1} (តារាង២.៧)។ ចលនាទាញរបស់រង់បង់សែនអាចឱ្យបង់សម្រប៤ ក្នុងតំបន់ $1450 - 1600\text{cm}^{-1}$ ដែលពិកពីរនៅ 1500 និង 1600cm^{-1} ខ្លាំងជាងគេ។

ពិកសម្របក្នុងតំបន់ $680-860\text{cm}^{-1}$ ពីការបត់ចេញក្រៅប្លង់នៃសម្ព័ន្ធ C-H អាច (តែមិនមែនជានិច្ចកាល) ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់គំរូជំនួសនៃសមាសធាតុបង់សែន (តារាង១៤.១)។ បង់សែនម៉ូណូជំនួសឱ្យពិក ខ្លាំងពីរ ចន្លោះ 690 និង 710cm^{-1} និងរវាង 730 និង 770cm^{-1} ។



បង់សែនអរតូឌីជំនួសបង្ហាញពិកសម្របខ្លាំងចន្លោះ 735 និង 770cm^{-1} ដែលកើតឡើងពីចលនាសម្ព័ន្ធរបស់ C-H ។ បង់សែនមេតាឌីជំនួសបង្ហាញពិកពីរ៖ ពិកខ្លាំងមួយនៅចន្លោះ 680 និង 725cm^{-1} និងពិកខ្លាំងមួយនៅចន្លោះ 750 និង 810cm^{-1} ។ បង់សែនប៉ារ៉ាឌីជំនួសឱ្យសម្របធំតែមួយចន្លោះ $800-860\text{cm}^{-1}$ ។

លំហាត់អនុវត្ត១៤.១៥៖ ចំពោះសមាសធាតុបង់សែនអ៊ុតខាងក្រោម ទាំងអស់មានរូបមន្ត $\text{C}_7\text{H}_7\text{Br}$ ឱ្យពិក IR ក្នុងតំបន់ $680-860\text{cm}^{-1}$ ៖

- A. 740cm^{-1} (ខ្លាំង)
 - B. 800cm^{-1} (ខ្លាំងណាស់)
 - C. 680cm^{-1} (ខ្លាំង) និង 760cm^{-1} (ខ្លាំងណាស់)
 - D. 693cm^{-1} (ខ្លាំងណាស់) និង 765cm^{-1} (ខ្លាំងណាស់)
- ចូរឱ្យទម្រង់ A, B, C, និង D។

១១.៤ ស្បៀង UV-Vis របស់សមាសធាតុអរ៉ូម៉ាទិច

អេឡិចត្រុង π ឆ្លាស់រស់វែងបង់សែនមួយឱ្យសម្រប UV ដែលបញ្ជាក់ពីវត្តមាននៃវង់បង់សែនមួយក្នុងសមាសធាតុមិនស្គាល់មួយ។ បង់សម្របអាំងតង់ស៊ីតេមធ្យមកើតឡើងក្បែរ 205nm ហើយបង់សម្របផ្សេងទៀតជាងបង់អាំងតង់ស៊ីតេទាប កើតឡើងក្នុងតំបន់ $250-275\text{nm}$ ។ ភាពឆ្លាស់ខាងក្រៅវង់បង់សែនធ្វើឱ្យមានសម្របប្រវែងរលកខុសពីនេះ។

១១.៥ ស្បៀងម៉ាសរបស់សមាសធាតុអ័រ៉ូម៉ាទិច

អ៊ីយ៉ុងសំខាន់ក្នុងស្បៀងម៉ាសរបស់បង់សែនជួសអាល់គីលគឺតែងតែមាន $m/z=91$ ($C_6H_5CH_2^+$) ដែលកកើតពីបណ្តាចំរាងកាបូនទី១ និងទី២នៃខ្សែអាល់គីលដែលភ្ជាប់លើវង់។ អ៊ីយ៉ុងនេះជាប្រភពនៃកាបូនបង់ស៊ី លិច ដែលជាអ័រ៉ូម៉ាត់ទីបំពេញកាបូនត្រូពីលីញ៉ូម ($C_7H_7^+$)។ អ៊ីយ៉ុងផ្សេងទៀតដែលតែងតែសង្កេតឃើញក្នុង ស្បៀងម៉ាសរបស់សមាសធាតុម៉ូណូអាល់គីលបង់សែនគឺ $m/z = 77$ ដែលត្រូវនឹង $C_6H_5^+$ ។

%%%%%%%%%







លំហាត់មេរៀនទី១៤


ការហៅឈ្មោះ:

១. ចូរគូរទម្រង់សមាសធាតុខាងក្រោម៖
 - a. អាស៊ីត 3-នីត្រូបង់សូអ៊ីច
 - b. p-ប្រូម៉ូតូលុយអែន
 - c. o-ឌីប្រូម៉ូបង់សែន
 - d. m-ឌីនីត្រូបង់សែន
 - e. 3,5-ឌីត្រីផេណុល
 - f. អាស៊ីត p- នីត្រូបង់សូអ៊ីច
 - g. 3-ក្លរ៉ូ-1-អេតុកស៊ីបង់សែន
 - h. អាស៊ីត p-ក្លរ៉ូបង់សែនស៊ុលផួនីច
 - i. មេទីល p-តូលុយអែនស៊ុលផួណាត
 - j. បង់ស៊ីលប្រូម
 - k. p-នីត្រូអាណីលីន
 - l. o-ស៊ីឡែន
 - m. ទែរ-ប៊ុយទីលបង់សែន
 - n. p-មេទីលផេណុល
 - o. p-ប្រូម៉ូអាសេតូផេណុន
 - p. 3-ផេនីលស៊ីក្លូអ៊ីចសាណុល
 - q. 2-មេទីល-3-ផេនីល-1-ប៊ុយតាណុល
 - r. o-ក្លរ៉ូអាណីសុល

ភាពអារ៉ូម៉ាទិច

២. តើម៉ូលេគុលខាងក្រោមណាខ្លះ ដែលអ្នករំពឹងថាមានលក្ខណៈអារ៉ូម៉ាទិច?






៣. ចូរប្រើវិធីពហុកោណ-រង្វង់ គូររូបក្រាមអរ្វីបីតាល់របស់សមាសធាតុខាងក្រោម៖




៤. ចូរគូរទម្រង់ផលិតផលដែលកើតនៅពេលសមាសធាតុខាងក្រោមមានប្រតិកម្មជាមួយ HCl ១ម៉ូល៖




៥. តើអ៊ីដ្រូសែនមួយណាក្នុងសមាសធាតុខាងក្រោមមានលក្ខណៈអាស៊ីតខ្លាំងជាងគេ? ចូរពន្យល់។



៦. រងខាងក្រោមត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធពីរជាន់មួយដែលរងអ៊ីសូមែរកម្មស៊ីស-ត្រង់ជាន់សម្ព័ន្ធពីរជាន់ក្នុងអាល់សែនមួយ។ ចូរពន្យល់។




៧. ក្នុងឆ្នាំ១៩៦០ T. Kartz (សាកលវិទ្យាល័យគូឡុំប៊ី) បានបង្ហាញថាស៊ីក្លូអុកតាតេត្រាអែនបូកពីរ អេឡិចត្រុងនៅពេលប្រតិកម្មជាមួយលោហៈប៉ូតាស្យូម និងបង្កើតឌីអាញ៉ុងប្លង់មានស្ថេរភាពមួយ៖



ដោយប្រើរូបក្រាមអរូបីតាមម៉ូលេគុលក្នុងរូប១៤.៧ ពន្យល់ពីលទ្ធផលនេះ។


៨. ស៊ីក្លូអ៊ីបតាទ្រីអែលូន (I) មានស្ថេរភាពណាស់។ ប៉ុន្តែស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែលូនមិនមានស្ថេរភាពទេ វា មានប្រតិកម្ម Diels-Alder យ៉ាងងាយស្រួលជាមួយខ្លួនវា។



- ចូរពន្យល់អំពីស្ថេរភាពខុសគ្នានៃសមាសធាតុទាំងពីរនេះ។
- ចូរគូរទម្រង់អាជាក់Diels-Alder របស់ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែលូន។

ស្បៀងត្រួសពី និងការទាញរកទម្រង់

៩. ចំពោះគូសមាសធាតុខាងក្រោម ចូរប៉ាន់ស្មានទិដ្ឋភាពស្បៀង ^1H NMR ដែលអ្នកអាចញែកភាព ខុស គ្នានៃគូសមាសធាតុនេះ៖



១០. សមាសធាតុ L ដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុល C_9H_{10} មានប្រតិកម្មជាមួយប្រូម និងឱស្ស៊ីចសម្រប IR ដែលមានពិកដ្ឋចតទៅនេះ៖ $3035\text{cm}^{-1}(\text{m})$, $3020\text{cm}^{-1}(\text{m})$, $2925\text{cm}^{-1}(\text{m})$, 2853cm^{-1}


^1H NMR របស់ L មាន៖

ឌុបឡេត $\delta=3.1$ (2H) ពហុឡេត $\delta=5.1$ ពហុឡេត $\delta=7.1$ (5H)




ពហុឡេត $\delta=4.8$ ពហុឡេត $\delta=5.8$

ស្បីច UV បង្ហាញសម្របអតិបរមានៅ 255nm។ ចូរឱ្យទម្រង់របស់សមាសធាតុ L និងឱ្យរបាយការណ៍នៃពិភព IR នីមួយៗ។


១១. សមាសធាតុ M មានរូបមន្តម៉ូលេគុល C_9H_{12} ។ ស្បីច ^1H NMR និងស្បីច IR របស់វាត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម។ ចូរគូរទម្រង់របស់ M។




១២. ចូរកំណត់ទម្រង់របស់ A, B, និង C ដែលមានស្បៀង ^1H NMR ដូចខាងក្រោម៖



១៣. សមាសធាតុ N មានរូបមន្តម៉ូលេគុល $C_9H_{10}O$ ។ ស្អាត 1H NMR និងស្អាត IR របស់វាត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម។ ចូរគូរទម្រង់របស់ N។




១៤. កាហ្វេអ៊ីនមានទម្រង់ដូចខាងក្រោម៖



- តើមានស៊ីញ៉ាល់ប៉ុន្មានដែលអ្នករំពឹងថានឹងមានក្នុងស្អាត 1H NMR របស់កាហ្វេអ៊ីន?
- តើពិកណាខ្លះដែលអ្នករំពឹងថានឹងមានក្នុងស្អាត IR របស់កាហ្វេអ៊ីន?

\$\$\$\$\$\$\$\$

ផែនទីបញ្ញត្តិ




មេរៀនទី១៥

ប្រតិកម្មសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច


១. ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូភីលអារ៉ូម៉ាទិច

ប្រតិកម្មសំខាន់ៗខ្លះរបស់សមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិច គឺជាប្រតិកម្មដែលអេឡិចត្រូភីលមួយជំនួសអាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់វា។




ដែល E - A ជាប្រតិករអេឡិចត្រូភីលមួយ

ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានគេហៅថា **ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូភីលអារ៉ូម៉ាទិច** (electrophilic aromatic substitutions, EAS) អាចឱ្យគេបញ្ចូលក្រុមជាច្រើនទៅលើវង់អារ៉ូម៉ាទិច ដូចជាបង់សែន ហើយពួកវាផ្តល់ជាមធ្យោបាយសំយោគសមាសធាតុសំខាន់ៗជាច្រើន។ រូប១៥.១បង្ហាញប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូភីលអារ៉ូម៉ាទិច ៥ប្រភេទខុសគ្នា ដែលយើងនឹងសិក្សាក្នុងមេរៀននេះ រួមទាំងប្រតិកម្មបង្កើតសម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូន និងប្រតិកម្មអាឡូសែនកម្ម។



ឧទាហរណ៍សំខាន់មួយនៃប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូភីលក្នុងធម្មជាតិ គឺប្រតិកម្មសំយោគជីវៈនៃអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតទីរ៉ូកស៊ីន ដែលអ៊ីយ៉ូតត្រូវបានបញ្ចូលលើវង់បង់សែនដែលបានមកពីទីរ៉ូស៊ីន។




ទីរ៉ូស៊ីន (Tyrosine)
(អាស៊ីតអាមីនេក្នុងអាហារមួយ)

ធីរ៉ូស៊ីន (Thyroxine)
(អរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតមួយ)

ក្នុងផ្នែកបន្ទាប់ទៀត យើងនឹងសិក្សាចលនការទូទៅសម្រាប់មធ្យោបាយដែលអេឡិចត្រូនមានប្រតិកម្មជាមួយវ៉ង់សែនមួយ។ បន្ទាប់មក ក្នុងផ្នែកទី៣- ទី៧ យើងនឹងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់លាក់នៃ អេឡិចត្រូន និងរបៀបដែលវាស្វ័យៗត្រូវបានកើតក្នុងល្បាយប្រតិកម្ម។

២. ចលនការទូទៅរបស់ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូនអារ៉ូម៉ាទិច

អេឡិចត្រូនរបស់វ៉ង់សែនប្រតិកម្មជាមួយអេឡិចត្រូនខ្លាំង។ ក្នុងទិដ្ឋភាពនេះ វ៉ង់សែនមានចំណុចរួមជាមួយអាល់សែន។ នៅពេលអាល់សែនមានប្រតិកម្មជាមួយអេឡិចត្រូនមួយ ដូចជាក្នុងប្រតិកម្មបូកHBrអេឡិចត្រូនពីសម្ព័ន្ធអាល់សែនមានប្រតិកម្មជាមួយអេឡិចត្រូន បង្កើតអង្គធាតុកណ្តាលកាបូកាចុងមួយ។




អាល់សែន

អេឡិចត្រូន

កាបូកាចុង

បន្ទាប់មកកាបូកាចុងដែលកើតពីអាល់សែនមានប្រតិកម្មជាមួយនុយក្លេអូភីលអ៊ីយ៉ុងប្រូម បង្កើតផលិតផលប្រតិកម្មបូក។



កាបូកាចុង

ផលិតផលប្រតិកម្មបូក

ប៉ុន្តែភាពស្រដៀងគ្នានៃប្រតិកម្មភាពរបស់វ៉ង់សែនទៅនឹងចុងអាល់សែនមួយ គឺដំណាក់កាលកាបូកាចុង បន្ទាប់មកមានការប្រយុទ្ធពីនុយក្លេអូភីល។ ដូចដែលយើងបានឃើញក្នុងមេរៀនទី១៤ស្រទាប់នៃអេឡិចត្រូន៦ របស់វ៉ង់សែនធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាពពិសេសមួយ។


- ទោះបីជាវ៉ង់សែនអាចទទួលការប្រយុទ្ធពីអេឡិចត្រូន វាងប្រតិកម្មជំនួសជាជាងប្រតិកម្មបូក។

ប្រតិកម្មជំនួសធ្វើឱ្យភាពស័កស័ព្វនៃអេឡិចត្រូនរបស់វ៉ង់សែន ត្រូវតែរងផែនការបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធដោយអេឡិចត្រូន។ យើងអាចឃើញពីរបៀបវាកើតឡើង បើសិនជាយើងសិក្សាពីចលនការរបស់ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូនអារ៉ូម៉ាទិច។

ភស្តុតាងនៃការពិសោធន៍បញ្ជាក់ថាអេឡិចត្រូនប្រយុទ្ធលើប្រព័ន្ធរបស់វ៉ង់សែនបង្កើតកាបូកាចុងស៊ីក្លូអ៊ីបសាឌីអែនីលមិនអារ៉ូម៉ាទិច ដែលគេហៅថាអ៊ីយ៉ុងអារេនីយ៉ូម (arenium ion)។ ក្នុងការបង្ហាញដំណាក់


កាលនេះ វាមានភាពងាយស្រួលដែលយើងប្រើទម្រង់Kekulé ពីព្រោះទម្រង់ទាំងនេះនឹងធ្វើឱ្យភាពងាយស្រួលដើម្បីរក្សាគន្លងរបស់អេឡិចត្រុង π ៖

ជំណាក់កាលទី១៖



- ក្នុងជំណាក់កាលទី១ អេឡិចត្រូនីកចាប់យកពីអេឡិចត្រុងរបស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រុង π បង្កើតសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមកាបូនមួយរបស់វ៉ង់បង់សែន។

ការកើតសម្ព័ន្ធនេះធ្វើឱ្យខូចដល់ប្រព័ន្ធស៊ីតិចអេឡិចត្រុង π ដោយសារតែការកើតអ៊ីយ៉ុងអាអេញ៉ូមកាបូនដែលបង្កើតសម្ព័ន្ធជាមួយអេឡិចត្រូនីកក្លាយជាកាបូន sp^3 ដូចនេះវាមិនមានអរ័ប័តាល់p ទំនេរទៀតទេ ឥឡូវនេះមានតែអាតូមកាបូន៥ របស់វ៉ង់ដែលមានភាពអ៊ីប្រីត sp^2 និងនៅមានអរ័ប័តាល់p ទំនេរ។ អេឡិចត្រុង π ចំនួន៤ត្រូវបានមិនដាក់ក្នុងជុំវិញអរ័ប័តាល់p ទាំង៥នេះ។ គំរូបូតង់ស្បែកអេឡិចត្រូស្តាទិចគណនារបស់អ៊ីយ៉ុងអាអេញ៉ូមដែលបង្កើតដោយការបូកអេឡិចត្រូនីកប្រូមលើបង់សែន បញ្ជាក់ថាបន្ទុកវិជ្ជមានត្រូវបានរាយប៉ាយក្នុងវ៉ង់របស់អ៊ីយ៉ុងអាអេញ៉ូម (រូប១៥.២) ដែលដែលទើបនឹងបានបង្ហាញក្នុងទម្រង់រសូណង់ខាងលើ។




រូប១៥.២ ទម្រង់គណនារបស់អង្គធាតុកណ្តាលអ៊ីយ៉ុងអាអេញ៉ូម ដែលបង្កើតដោយប្រតិកម្មបូកអេឡិចត្រូនីកនៃប្រូមលើបង់សែន។ គំរូបូតង់ស្បែកអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់កាចុងនៃអេឡិចត្រុងសម្ព័ន្ធ (តាងដោយផ្ទៃជិត)

បង្ហាញថាបន្ទុកវិជ្ជមាន (ខៀវ) ស្ថិតនៅលើទីតាំងកាបូនអរតូ និងប៉ារ៉ា ធៀបនឹងកាបូនដែលចងសម្ព័ន្ធជាមួយអេឡិចត្រូនីក។ របាយបន្ទុកនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងគំរូរសូណង់របស់អ៊ីយ៉ុងអាអេញ៉ូម។ ផ្ទៃ van der Waals ត្រូវបានតាងដោយក្រលាសំណាញ់។

- ក្នុងជំណាក់កាលទី២ ប្រូតុងមួយត្រូវបានដកចេញពីអាតូមកាបូនរបស់អ៊ីយ៉ុងអាអេញ៉ូមដែលចង សម្ព័ន្ធជាមួយអេឡិចត្រូនីក ហើយធ្វើឱ្យវាមានភាពអារ៉ូម៉ាទិចឡើងវិញ។

ជំណាក់ទី២៖




អេឡិចត្រុងពីរដែលប្រូតុងនេះប្រើដើម្បីចងសម្ព័ន្ធជាមួយវង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធ π ។ អាតូម កាបូនដែលចងសម្ព័ន្ធជាមួយអេឡិចត្រូក្លីលក្លាយជាកាបូនអ៊ីប្រីត sp^2 វិញ ហើយស្រលាយបង់សែនដែលមាន អេឡិចត្រុង π មិនដៅកន្លែង៦កកើតឡើង។ ប្រូតុងនេះត្រូវបានដកដោយវត្តមានបាសណាមួយ ឧទាហរណ៍ ដោយអាញ្ចុងដែលបានពីអេឡិចត្រូក្លីល។


លំហាត់អនុវត្ត៩៥.១៖ ចូរបង្ហាញពីរបៀបបោះបង់ប្រូតុងមួយពីទម្រង់សេណុងប៊ីបេសអ៊ីយ៉ុងអាអេញ្ចូម និងបង្ហាញពីរបៀបដែលតំណាងនីមួយៗធ្វើឱ្យកកើតវង់បង់សែនដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ឆ្លាស់ប៊ី (គឺថាអេឡិចត្រុង π មិនដៅកន្លែង៦)។

ទម្រង់Kekuléសមស្របសម្រាប់សរសេរចលនការប្រតិកម្ម ដូចជាប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូក្លីល អាវ៉ូម៉ាទិច ពីព្រោះពួកវាអាចប្រើទ្រឹស្តីសេណុង ដែលយើងនឹងឃើញ ដែលជាជំនួយឱ្យយើងយល់។ ប៉ុន្តែដើម្បីឱ្យខ្លី យើងចង់បង្ហាញចលនការប្រតិកម្មដោយប្រើរូបមន្តអ៊ីប្រីតរបស់បង់សែន យើងអាចធ្វើតាមមធ្យោបាយខាងក្រោម។ យើងគួរអ៊ីយ៉ុងអាអេញ្ចូមជាកាបូនស៊ីក្លូអ៊ីចសាឌីអែនីលមិនដៅកន្លែងមួយ៖

ដំណាក់កាលទី១៖




ដំណាក់កាលទី២៖



មានភស្តុតាងពិសោធន៍បញ្ជាក់ថា អ៊ីយ៉ុងអាអេញ្ចូមជាអង្គធាតុកណ្តាលពិតមួយក្នុងប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូក្លីល។ វាមិនមែនជាអន្តរភាពទេ។ នេះមានន័យថា ក្នុងដ្យាក្រាមថាមពលសេរី (រូប១៥.៣) អ៊ីយ៉ុងអាអេញ្ចូមស្ថិតជ្រលងថាមពលចន្លោះអន្តរភាពពីរ។


ថាមពលសេរីសកម្មសម្រាប់ដំណាក់កាលទី១, $\Delta G_1^\ddagger$ ត្រូវបានបង្ហាញថាមានថាមពលធំជាងថាមពលសេរីសកម្មសម្រាប់ដំណាក់កាលទី២, $\Delta G_2^\ddagger$ ដូចដែលបានតាងក្នុងរូប១៥.៣។ នេះបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលយើងរំពឹងទុក។ ប្រតិកម្មពីបង់សែន និងអេឡិចត្រូក្លីលទៅអ៊ីយ៉ុងអាអេញ្ចូមជាប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅខ្លាំង ពីព្រោះស្ថេរភាព អាវ៉ូម៉ាទិចរបស់វង់បង់សែនត្រូវបានបាត់បង់។ ផ្ទុយមកវិញ ប្រតិកម្មពីអ៊ីយ៉ុងអាអេញ្ចូមទៅបង់សែនជួសជា ប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅខ្ពស់ ពីព្រោះវាស្ដារឡើងវិញនូវភាពអាវ៉ូម៉ាទិចទៅឱ្យប្រព័ន្ធ។




រូប១៥.៣ ដ្យាក្រាមថាមពលរបស់ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូហ្វីលអារ៉ូម៉ាទិច

ក្នុងដំណាក់កាលពីរខាងក្រោម ដំណាក់កាលទី១ (ការកើតអ៊ីយ៉ុងអាណូម) តែងតែជាដំណាក់កាល កំណត់ល្បឿនក្នុងប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូហ្វីលអារ៉ូម៉ាទិច ពីព្រោះវាមានថាមពលសេរីសកម្មខ្ពស់ជាងគេ៖

ដំណាក់កាលទី១៖





ដំណាក់កាលទី២៖



ដំណាក់កាលទី២ ការដកប្រូតុងមួយ កើតឡើងលឿនជាងដំណាក់កាលទី១ ហើយមិនមានឥទ្ធិពលដល់ល្បឿនប្រតិកម្មសរុបទេ។

៣. ប្រតិកម្មអេឡូសែនកម្មបង់សែន


បង់សែនប្រតិកម្មជាមួយប្រូម និងក្លរក្រោមវត្តមានអាស៊ីតឡឺវីសបង្កើតផលិតផលជំនួសអាឡូសែនកម្ម ក្នុងទិន្នផលខ្ពស់។



អាស៊ីតឡឺវីសដែលគេនិយមប្រើគឺអាណុយមីញ៉ូមក្លរួ (AlCl₃) និងដែកក្លរួ (FeCl₃) សម្រាប់ប្រតិកម្មក្លរកម្ម និងដែកប្រូម (FeBr₃) សម្រាប់ប្រតិកម្មប្រូមកម្ម។ គោលបំណងនៃការប្រើអាស៊ីតឡឺវីសគឺដើម្បីធ្វើឱ្យអាឡូសែនកាន់តែមានលក្ខណៈអេឡិចត្រូកីលខ្លាំង។ ចលនការនៃប្រតិកម្មប្រូមកម្មត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។


➢ ចលនការប្រតិកម្មប្រូមកម្មអេឡិចត្រូកីលអាវុំម៉ាទិច

ដំណាក់កាលទី១៖



ប្រូមផ្គុំជាមួយ FeBr₃ បង្កើតជាកំផ្លិចមួយ


ដំណាក់កាលទី២៖



អ៊ីយ៉ុងអាវុំម៉ា

រង់បង់សែនឱ្យទ្វេតាអេឡិចត្រុងទៅប្រូមបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអាវុំម៉ា ហើយធ្វើឱ្យណ៍តដល់បន្ទុកវិជ្ជមានលើប្រូមមួយទៀត

ដំណាក់កាលទី៣៖




ប្រូតុងមួយត្រូវបានដកចេញពីអ៊ីយ៉ុងអាវុំម៉ាបង្កើតប្រូម៉ូបង់សែន និងបង្កើតកាតាលីករមកវិញ

ចលនការរបស់ប្រតិកម្មក្លរកម្មបង់សែនក្រោមវត្តមានដែក (III) ក្លរួ ស្រដៀងគ្នានឹងចលនការប្រូមកម្មនេះដែរ។

ក្លុយអរមានប្រតិកម្មហ៊ុលសណាស់ជាមួយបង់សែនដែលក្លុយអរកម្មអារ៉ូម៉ាទិចត្រូវការលក្ខខណ្ឌពិសេស និងប្រភេទឧបករណ៍ពិសេស។ ប៉ុន្តែមានភាពលំបាកក្នុងការលើមីតប្រតិកម្មត្រឹមម៉ូណូក្លុយអរកម្ម។ ប៉ុន្តែក្លុយអរូបង់សែនអាចត្រូវបានបង្កើតដោយវិធីសាស្ត្រមិនផ្ទាល់ ដែលយើងនឹងឃើញក្នុងមេរៀនទី២០។


ម្យ៉ាងវិញទៀត អ៊ីយ៉ូតមានប្រតិកម្មខ្សោយណាស់ ដែលត្រូវការប្រើបច្ចេកទេសពិសេស ដើម្បីឱ្យមានប្រតិកម្មអ៊ីយ៉ូតកម្មដោយផ្ទាល់ ប្រតិកម្មត្រូវតែធ្វើក្នុងវត្ថុមានភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មមួយ ដូចជាអាស៊ីតនីទ្រិច៖



ប្រតិកម្មអ៊ីយ៉ូតកម្មគឺមីជីវៈ ដូចជាក្នុងការសំយោគជីវៈនៃជីរ៉ូស៊ីន កើតឡើងដោយប្រើកាតាលីការ អង់ស៊ីម។

៤. ប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មបង់សែន


បង់សែនរងប្រតិកម្មនីត្រាតកម្ម ក្នុងល្បាយអាស៊ីតនីទ្រិច និងអាស៊ីតស៊ុលផួរិចខាប់។




អាស៊ីតស៊ុលផួរិចខាប់បង្កើនល្បឿនប្រតិកម្ម ដោយបង្កើនកំហាប់អេឡិចត្រូគីលជាអ៊ីយ៉ុងនីត្រូញ៉ូម (NO_2^+) ដូចបានបង្ហាញក្នុងដំណាក់កាលទី១នៃចលនការខាងក្រោម។

➢ ចលនការប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មបង់សែន

ដំណាក់កាលទី១៖




ក្នុងដំណាក់កាលនេះ អាស៊ីតនីទ្រិចទទួលប្រូតុងមួយពីអាស៊ីតខ្លាំងជាង គឺអាស៊ីតស៊ុលផួរិច ដំណាក់កាលទី២៖




អាស៊ីតនីទ្រិចដែលរងប្រូតុងកម្មរួចហើយអាចបំបែកបង្កើតអ៊ីយ៉ុងនីត្រូញ៉ូមមួយ

ដំណាក់កាលទី៣៖



អ៊ីយ៉ុងនីត្រូញ៉ូមជាអេឡិចត្រូគីលក្នុងប្រតិកម្មនីត្រាតកម្ម វាប្រតិកម្មជាមួយបង់សែន បង្កើតអ៊ីយ៉ុងអារញ៉ូមស្ថេរភាពដោយផលរេសូណង់មួយ

ដំណាក់កាលទី៤៖




បន្ទាប់មកអ៊ីយ៉ុងអាណូមបោះបង់ប្រូតុងមួយទៅឱ្យបាសទ្វីវិស ក្លាយជានីត្រូបង់សែន

លំហាត់អនុវត្ត៩៥.២៖ គេឱ្យ pK_a (H_2SO_4) = -9 និង pK_a (HNO_3) = -1.4 ។ ចូរពន្យល់ហេតុអ្វីបានជាប្រតិកម្មកើតឡើងក្នុងល្បាយមួយនៃអាស៊ីតនីទ្រិច និងអាស៊ីតស៊ុលផួរិចខាប់ លឿនជាងក្នុងអាស៊ីតនីទ្រិចខាប់តែឯង។

៥. ប្រតិកម្មស៊ុលផួរកម្មបង់សែន


បង់សែនមានប្រតិកម្មជាមួយចំហាយអាស៊ីតស៊ុលផួរិចនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ បង្កើតអាស៊ីតបង់សែនស៊ុលផួរិច។ ចំហាយអាស៊ីតស៊ុលផួរិចគឺជាអាស៊ីតស៊ុលផួរិចដែលមានបន្ថែមស្ពាន់ជំរឿអុកស៊ីត (SO_3)។ ប្រតិកម្មស៊ុលផួរកម្ម (sulfonation) ក៏អាចកើតឡើងក្នុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិចខាប់តែឯងបានដែរ ប៉ុន្តែយឺតជាង។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងពីរ អេឡិចត្រូកីលជាស្ពាន់ជំរឿអុកស៊ីត។



ក្នុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិចខាប់ ស្ពាន់ជំរឿអុកស៊ីតត្រូវបានបង្កើតក្នុងលំនឹងមួយ ដែល H_2SO_4 មានអំពើជាអាស៊ីតផង និងជាបាសផង (មើលដំណាក់កាលទី១ក្នុងចលនការខាងក្រោម)។


➢ ចលនការប្រតិកម្មស៊ុលផួរកម្មបង់សែន

ដំណាក់កាលទី១៖




SO_3 រងប្រូតុងកម្មបង្កើត SO_3H^+

ដំណាក់កាលទី២៖




SO_3H^+ ប្រតិកម្មជាអេឡិចត្រូកីលមួយជាមួយបង់សែនបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអាណូមមួយ

ដំណាក់កាលទី៣៖



**ការបោះបង់ប្រូតុងមួយពីអ៊ីយ៉ុងអាប្រេមស្តារភាពអារ៉ូម៉ាទិចទៅឱ្យវង់វិញ និងបង្កើត
កាតាលីការអាស៊ីតមកវិញ**

គ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ក្នុងប្រតិកម្មស៊ុលផួនកម្មជាប្រតិកម្មលំនឹង ដែលមានន័យថាប្រតិកម្មសរុប
អាចត្រលប់វិញបាន។ ទីតាំងលំនឹងអាចជះឥទ្ធិពលដោយលក្ខខណ្ឌដែលយើងប្រើ។



- បើសិនជាយើងចង់ធ្វើស៊ុលផួនកម្មលើវង់ (បញ្ចូលក្រុមអាស៊ីតស៊ុលផួនិច) យើងប្រើអាស៊ីតស៊ុលផួនិចខាប់ ឬយកល្អត្រូវប្រើចំហាយអាស៊ីតស៊ុលផួនិច។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ទីតាំងលំនឹងរំកិលទៅខាងស្តាំ ហើយយើងទទួលបានអាស៊ីតបង់សែនស៊ុលផួនិចក្នុងទិន្នផលខ្ពស់។
- បើសិនជាយើងចង់ធ្វើដេស៊ុលផួនកម្ម (ដកក្រុមអាស៊ីតស៊ុលផួនិច) ចេញពីវង់ យើងត្រូវប្រើអាស៊ីតស៊ុលផួនិចរាវនិងឱ្យចរន្តចំហាយទឹកក្តៅឆ្លងកាត់ល្បាយប្រតិកម្ម។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌនេះ ដែលមានកំហាប់ទឹកខ្ពស់ លំនឹងរំកិលទៅខាងឆ្វេង ហើយប្រតិកម្មដេស៊ុលផួនកម្មនឹងកើតឡើង។


យើងនឹងឃើញពេលក្រោយថា ប្រតិកម្មស៊ុលផួនកម្ម និងដេស៊ុលផួនកម្មតែងតែត្រូវបានប្រើក្នុងការងារ សំយោគ។

- ជួនកាល យើងចង់បញ្ចូលក្រុមស៊ុលផួនណាតជាក្រុមការពារមួយ ដើម្បីរារាំងទីតាំងរបស់វាពីប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូហ្វីលអារ៉ូម៉ាទិច ឬ ជាក្រុមដំណេកទិស (a directing group) ដើម្បីធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលលើទីតាំងនៃការជំនួសផ្សេងទៀតជៀបទៅនឹងវា។ នៅពេលគេលែងត្រូវការវាយើងត្រូវអាចក្រុមស៊ុលផួនណាតនេះចេញបាន។

៦. ប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម Friedel-Crafts

Charles Friedel អ្នកគីមីបារាំង និងសហការីរបស់គាត់ James M. Crafts បានរកឃើញវិធីសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ទង្វើអាល់គីលបង់សែន (ArR) និងអាស៊ីលបង់សែន (ArCOR) ក្នុងឆ្នាំ១៨៧៧។ ឥឡូវនេះប្រតិកម្មទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា **អាល់គីលកម្ម Friedel-Crafts** (Friedel-Crafts alkylation) និង **ប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម** (acylation reaction) ។ យើងនឹងសិក្សាប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មFriedel-Crafts នៅចំណុចនេះ និងសិក្សាអំពី ប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Crafts ក្នុងផ្នែកទី៧។

- ខាងក្រោមនេះជាសមីការទូទៅមួយរបស់ប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម Friedel-Crafts៖




- ចលនការប្រតិកម្មនេះចាប់ផ្តើមពីការកើតកាបូកាចុងមួយ។

- បន្ទាប់មកកាបូកាចុងមានអំពើជាអេឡិចត្រូកីលប្រយុទ្ធលើវង់បង់សែនបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអាមញ៉ូមមួយ។
- បន្ទាប់មក អ៊ីយ៉ុងអាមញ៉ូមបោះបង់ប្រូតុងមួយ។

➢ ចលនការប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម *Friedel-Crafts*


ដំណាក់កាលទី១៖



នេះជាប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាសឡឺវីស


ការបំបែកកំន្លិចបង្កើតជាកាបូកាចុងមួយ និង AlCl_4^-

ដំណាក់កាលទី២៖




កាបូកាចុងមានអំពើជាអេឡិចត្រូកីល
ប្រតិកម្មជាមួយបង់សែន បង្កើតអ៊ីយ៉ុង
អាមញ៉ូមមួយ។

ប្រូតុងមួយត្រូវបានដកចេញពីអ៊ីយ៉ុងអាមញ៉ូមបង្កើត អ៊ីសូប្រូពីល បង់
សែនមួយ។ ដំណាក់កាល នេះបង្កើត AlCl_3 ឡើងវិញ និងបំបាយ HCl



- នៅពេល R-X ជាអាឡូសែនដាក់ទី១ កាបូកាចុងងាយមួយប្រហែលជាមិនអាចកកើតទេ។ ប៉ុន្តែ អាលុយមីញ៉ូមក្លរួបង្កើតជាកំន្លិចមួយជាមួយអាល់គីលអាឡូសែន ហើយកំន្លិចនេះមានអំពើជាអេឡិចត្រូកីល។


កំន្លិចនេះមានសម្ព័ន្ធកាបូន-អាឡូសែនជិតដាច់ ហើយជាកំន្លិចមួយដែលអាតូមកាបូនមានបន្ទុកវិជ្ជមានមួយ៖



ទោះបីជាកំន្លិចនេះមិនមែនជាកាចុងធម្មតា វាមានអំពើដូចគ្នា ហើយវាផ្ទេរក្រុមអាល់គីលវិជ្ជមានមួយទៅវង់អាណ្យូម៉ាទិចមួយ។

- កំន្លិចទាំងនេះមានប្រតិកម្មដូចគ្នាទៅនឹងកាបូកាចុងធម្មតា ហើយវាអាចរងនូវប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងដែរ។
- ប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម *Friedel-Crafts* មិនមានកម្រិតក្នុងការប្រើអាល់គីលអាឡូសែន និង អាលុយមីញ៉ូមក្លរួទេ។ គូរ៉េអាក់ទីបផ្សេងទៀតដែលបង្កើតកាបូកាចុង (ឬប្រភេទដូចកាបូកាចុង) អាចត្រូវបានប្រើក្នុងប្រតិកម្ម *Friedel-Crafts* ផងដែរ។

លទ្ធភាពទាំងនេះរួមមានការប្រើប្រាស់ល្បាយនៃអាល់សែន និងអាស៊ីតមួយ៖





 ស៊ីក្លូអ៊ីតសាណុល ស៊ីក្លូអ៊ីតស៊ីលបង់សែន (56%)

៧. ប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Crafts



ក្រុមអាសេទីល




ក្រុមបង់សូអ៊ីល


អាសេទីលក្លរ៍
 អាសេតូផេណូន (97%)

(មេទីលផេនីលសេតុន)

គេក៏អាចហៅអាស៊ីលក្លរួថា **អាស៊ីតក្លរួ** (acid chlorides) ហើយវាត្រូវបានទង្វើយ៉ាងងាយស្រួលដាក់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយតូនីលក្លរួ (SOCl_2) ឬ ផូស្វរ៉ូប័ង់តាត្រួ (PCl_5) ៖




ប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Crafts ក៏អាចធ្វើឡើងដោយប្រើអាស៊ីតតកាបូកស៊ីលិចដែរ។
ឧទាហរណ៍៖




ក្នុងប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Crafts ស្ទើរតែទាំងអស់ អេឡិចត្រូនីលជាអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីលីញ៉ូម (acy-lium ion) ដែលកើតពីអាស៊ីលអាឡុយមីនមួយតាមមធ្យោបាយខាងក្រោម៖

ដំណាក់កាលទី១៖




ដំណាក់កាលទី២៖




ដំណាក់កាលនៅសល់ក្នុងប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Crafts នៃបង់សែនមានដូចខាងក្រោម៖

ដំណាក់កាលទី៣៖




អ៊ីយ៉ុងអាស៊ីលីញ៉ូមមានអំពើជាអេឡិចត្រូកីលមួយ
ប្រតិកម្មជាមួយបង់សែនបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអាណូញ៉ូមមួយ

ដំណាក់កាលទី៤៖




ប្រូតុងមួយត្រូវបានដកចេញពីអ៊ីយ៉ុងអាហ្វេម បង្កើតជាអាវិលសេតូន

ដំណាក់កាលទី៥៖



សេតូនមានអំពើជាបាសឡើយប្រតិកម្មជាមួយអាឡុយមីញ៉ូមក្លរួ (អាស៊ីតឡើយ) បង្កើតជាកំផ្លិចមួយ

ដំណាក់កាលទី៦៖



ប្រតិកម្មនៃទឹកលើកំផ្លិចដោះសេតូន និងអ៊ីដ្រូលីសអាស៊ីតឡើយ


ការអនុវត្តន៍សំយោគជាច្រើននៃប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Crafts មានក្នុងផ្នែកទី៩។

៨. លីមីតនៃប្រតិកម្ម Friedel-Crafts


លីមីតជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យប្រតិកម្ម Friedel-Crafts គ្មានប្រយោជន៍គឺ៖

១. នៅពេលកាបូកាចុងដែលកើតពីអាល់គីលអាឡូសែន អាល់សែន ឬអាល់កុលមួយអាចធ្វើបណ្តូរទីតាំងទៅជាកាបូកាចុងមួយ ឬច្រើនដែលមានស្ថេរភាពជាង វាតែងតែកើតឡើងដូចនេះ ហើយផលិតផលឧត្តមភាពដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មនេះ តែងតែទទួលបានពីកាបូកាចុងដែលមានស្ថេរភាពជាងគេ។

ឧទាហរណ៍ នៅពេលបង់សែនរងប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មជាមួយប៊ុយទីប្រូម កាបូកាចុងប៊ុយទីលបណ្តូរទីតាំង ដោយរំកិលអ៊ីដ្រូ។ កាបូកាចុងថ្នាក់ទី១ ដែលកើតបានក្លាយជាកាបូកាចុងថ្នាក់ទី២ដែលមានស្ថេរភាព ជាង។ បន្ទាប់មក បង់សែនប្រតិកម្មជាមួយកាបូកាចុងទាំងពីរនេះបង្កើតជាប៊ុយទីលបង់សែន និង ស៊ីក-ប៊ុយទីលបង់សែន។




២. ប្រតិកម្ម Friedel-Crafts តែងតែឱ្យទិន្នផលទាប នៅពេលមានក្រុមទាញអេឡិចត្រុងលើវង់ អារ៉ូម៉ាទិច ឬនៅពេលវង់ចងជាមួយក្រុម -NH₂, -NHR, ឬ -NH₂។ លីមីតនេះអាចកើតឡើង ទាំងប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម និងអាស៊ីលកម្ម។



ប្រភេទគីមីទាំងនេះតែងតែឱ្យទិន្នផលទាបក្នុងប្រតិកម្ម Friedel-Crafts


យើងនឹងសិក្សាក្នុងផ្នែកទី១០ថា ក្រុមលើបង់សែនអាចមានឥទ្ធិពលធំធេងលើប្រតិកម្មភាពរបស់វង់ចំពោះប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូន ក្រុមទាញអេឡិចត្រុង (Electron-withdrawing groups) ធ្វើឱ្យវង់អន់ប្រតិកម្មភាពដោយធ្វើឱ្យវាខ្វះអេឡិចត្រុង។ ក្រុមជួសណាមួយដែលទាញអេឡិចត្រុងខ្លាំងជាងអាឡូសែនមួយ ដែលជាក្រុមដៅទិសមេតា (meta-directing group) (មើល ផ្នែកទី១១) ធ្វើឱ្យវង់អារ៉ូម៉ាទិចខ្វះអេឡិចត្រុងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីធ្វើប្រតិកម្ម Friedel-Craft។ ក្រុម អាមីណូ -NH₂, -NHR និង -NR₂ ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាក្រុមទាញអេឡិចត្រុងយ៉ាងខ្លាំងដោយអាស៊ីតឡឺវីសដែលបានប្រើក្នុងប្រតិកម្មFriedel-Crafts។

ឧទាហរណ៍៖




មិនរងប្រតិកម្ម Friedel-Crafts 19

៣. អាល់កុល និងវីនីលអាឡូសែនមិនអាចប្រើជាដៃគូអាឡូសែន ពីព្រោះពួកវាមិនអាចបង្កើតកាបូកាចុងទេ៖




៤. ប៉ូលីអាល់គីលកម្មតែងតែកើតឡើង។ ក្រុមអាល់គីលជាក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុងត្រង់តាមផលអាំងឌុចទីវ ហើយនៅពេលគេបញ្ចូលវាទៅលើវ៉ងបង់សែន វាបន្ថែមសកម្មភាពប្រតិកម្មជំនួសទៅឱ្យវ៉ង (មើលផ្នែកទី១០)៖



ប៉ូលីអាល់គីលកម្មមិនមែនជាបញ្ហាក្នុងប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Crafts ទេ។ ក្រុមអាស៊ីល (RCO-) ជាក្រុមទាញអេឡិចត្រុងខ្លួនវា និងនៅពេលវាបង្កើតកំផ្លិចមួយជាមួយ AlCl_3 ក្នុងដំណាក់កាលចុង ក្រោយ (ផ្នែកទី៧) វាត្រូវបានបង្កើត ទោះបីជាវាទាញអេឡិចត្រុងខ្លាំងក៏ដោយ។ ការទាញអេឡិចត្រុង ត្រង់នេះរារាំងប្រតិកម្មជំនួសបន្ថែម និងធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ប្រតិកម្មម៉ូណូអាស៊ីលកម្ម។

លំហាត់អនុវត្តទី១៥.៤៖ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




៩. ការអនុវត្តន៍សំយោគនៃប្រតិកម្ម Friedel-Crafts ៖

ប្រតិកម្មអេដូកម្ម Clemmensen និង Wolff-Kishner


- ប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងរបស់ខ្សែកាបូនមិនកើតឡើងក្នុងប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Crafts ទេ។ ដោយសារតែអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីលីញ៉ូមត្រូវបានបន្ស៊ប់ដោយផលអេសូណង់ វាមានស្ថេរភាពជាងកាបូកាចុងផ្សេងទៀត។ ដូចនេះ វាគ្មានកម្លាំងបង្ខំឱ្យមានប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងទេ។ ដោយសារតែប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងមិនកើតឡើង ប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Crafts ដែលបន្តដោយប្រតិកម្មអេដូកម្មក្រុមកាបូនីលទៅជាក្រុម

CH₂តែងតែផ្តល់ឱ្យយើងនូវមធ្យោបាយបង្កើតអាល់គីលបង់សែនមិនមានខ្លែង ជាងប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម Friedel- Crafts ។

- ក្រុមកាបូនីលនៃអាសែតូនមួយអាចរងអេដុកម្មទៅជាក្រុម CH₂ មួយ។




ជាឧទាហរណ៍ ចូរយើងពិចារណាលើការសំយោគប្រូពីលបង់សែន។ បើសិនជាយើងចង់សំយោគវាតាមប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម Friedel-Crafts ប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងអាចកើតឡើង ហើយផលិតផលឧត្តមភាពជា អ៊ីសូប្រូពីលបង់សែន៖



អ៊ីសូប្រូពីលបង់សែន ប្រូពីលបង់សែន
(ផលិតផលឧត្តមភាព) (ផលិតផលតិចតួច)

ផ្ទុយមកវិញ ប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្មFriedel-Crafts នៃបង់សែនជាមួយប្រូប៉ាណូអ៊ីលក្លរួបង្កើតសេតូនមួយ ដែលមានខ្សែកាបូនមិនអាចរងបណ្តូរទីតាំងក្នុងទិន្នផលខ្ពស់៖




ប្រូប៉ាណូអ៊ីលក្លរួ អេទីលផេនីលសេតូន
(90%)

បន្ទាប់មក សេតូននេះអាចរងអេដុកម្មទៅជាប្រូពីលបង់សែនដោយវិធីសាស្ត្រជាច្រើន។


៩.១ ប្រតិកម្មអេដុកម្ម Clemmensen

វិធីសាស្ត្រទូទៅមួយសម្រាប់ធ្វើអេដុកម្មសេតូនមួយទៅជាក្រុមមេទីឡែនមួយ ហៅថាប្រតិកម្មអេដុកម្ម Clemmensen ដែលក្នុងសេតូនត្រូវបានធ្វើរីក្តច (reflux) ជាមួយអាស៊ីតក្លរីឌ្រីចមានស័ង្កសីអាម៉ាល់ហ្គាម (បំរាម៖ ដូចដែលយើងនឹងឃើញ ស័ង្កសី និងអាស៊ីតក្លរីឌ្រីចនឹងធ្វើអេដុកម្មក្រុមនីត្រូទៅជាក្រុមអាមីណូ)។




អេទីលផេនីលសេតូន ប្រូពីលបង់សែន (80%)
ប្រតិកម្មអេដុកម្ម Clemmensen

ជាទូទៅ៖





៩.២ ប្រតិកម្មរេដុកម្ម Wolff-Kishner

វិធីសាស្ត្រមួយទៀតក្នុងការធ្វើអ្នកដកមូលសេតូនមួយទៅជាក្រុមមេទីឡែនមួយជាប្រតិកម្មអ្នកដកមូល Wolff-Kishner ដែលទាក់ទងនឹងការកម្ដៅសេតូនជាមួយអ៊ីដ្រាស៊ីន និងបាស។ ប្រតិកម្មអ្នកដកមូល Wolff-Kishner ជា ប្រតិកម្មបំពេញប្រតិកម្មអ្នកដកមូល Clemmensen ត្រង់ថា វាត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាស តែប្រតិកម្មអ្នកដកមូល Clemmensenត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត។ ប្រតិកម្មអ្នកដកមូល Wolff-Kishner ឆ្លងកាត់អង្គធាតុអ៊ីដ្រាសូនមួយ ដែលមិនអាចប្រែកម្រិតក្នុងពេលប្រតិកម្ម។ ឧទាហរណ៍ អេទីលផេនីលសេតូនអាចរេដុកមូលទៅជា ប្រូពីលបង់សែនដោយប្រតិកម្មអ្នកដកមូល Wolff-Kishner ខាងក្រោម៖



ប្រតិកម្មអ្នកដកមូល Wolff-Kishner

នៅពេលអានីត្រីត្រូវបានប្រើជាដៃគូមួយ ប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Crafts ផ្តល់ជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការប្តូរវ៉ង់ឌ្រីមួយទៅលើសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចមួយ។ ប្រតិកម្មដូចនេះមួយត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។ ចូរកត់សម្គាល់ថា សេតូនរេដុកមូលក្នុងដំណាក់កាលអ្នកដកមូល Clemmensen។ អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមិនមានរេដុកមូលនេះទេ។ គេទទួលបានលទ្ធផលដូចគ្នា បើគេប្រើអ្នកដកមូល Wolff-Kishner។





អាស៊ីត 4-ផេនីលប៊ុយតាណូអ៊ិច

4-ផេនីលប៊ុយតាណូអ៊ីលក្លរ


α-តេត្រាឡូន

លំហាត់អនុវត្ត៩៥.៥៖ ដោយផ្ដើមពីបង់សែន និងអាស៊ីលក្លរសមស្រប ឬអាស៊ីតអានីត្រីច ចូរសរសេរសមីការ សំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម៖

(a) ប៊ុយទីលបង់សែន



ឌីផេនីលមេតាន



9,10 -ឌីអ៊ីដ្រូអង់ត្រាសែន


១០. ឥទ្ធិពលនៃក្រុមជួសលើប្រតិកម្មភាពរង់ និងដំណើរទិសក្រុមចំណូល

ក្រុមជួសមួយដែលមានវត្តមានលើវង់បង់សែនរួចហើយអាចប៉ះពាល់ទាំងប្រតិកម្មភាពរបស់វង់ចំពោះប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូគីល និងដំណើរទិសដែលក្រុមចំណូល (incoming group) ត្រូវចូលលើវង់។

- ក្រុមជួសអាចធ្វើឱ្យវង់កាន់តែមានប្រតិកម្មភាពជាងបង់សែន (គឺថា វាអាចធ្វើឱ្យសមាសធាតុនេះមានប្រតិកម្មកាន់តែលឿនជាងប្រតិកម្មរបស់បង់សែន)។ ក្រុមទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា ក្រុមសកម្ម (activating groups)។
- ក្រុមជួសអាចធ្វើឱ្យវង់កាន់តែអស់ប្រតិកម្មភាពជាងបង់សែន (គឺថា វាអាចធ្វើឱ្យសមាសធាតុនេះ ប្រតិកម្មយឺតជាងប្រតិកម្មរបស់បង់សែន)។ ក្រុមទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថាក្រុមអសកម្ម (deactivating groups)។


១០.១ តើក្រុមជួសមានឥទ្ធិពលដល់ប្រតិកម្មភាពយ៉ាងម៉េច?

មើលរូប១៥.៣ និង១៥.២ ឡើងវិញ ដែលដំណាក់កាលយឺតក្នុងប្រតិកម្មអេឡិចត្រូគីលអាវ៉ូម៉ាទិច និងជាដំណាក់កាលកំណត់ល្បឿនជាដំណាក់កាលទី១។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ភ្នាក់ងារស្វែងរកអេឡិចត្រុងមានប្រតិកម្មដោយទទួលយកទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយពីវង់បង់សែន។




បង់សែនជួសមួយ អេឡិចត្រូគីល អ៊ីយ៉ុងអាអេញម

បើសិនជាក្រុមជួសមួយដែលមានលើវង់រួចហើយធ្វើឱ្យវង់កាន់តែសំបូរអេឡិចត្រុង ដោយឱ្យអេឡិចត្រុងទៅវា នោះវង់នឹងមានលក្ខណៈនុយក្លេអ៊ីកកាន់តែខ្លាំង កាន់តែមានប្រតិកម្មភាពចំពោះអេឡិចត្រូគីល ហើយប្រតិកម្មនឹងកើតឡើងកាន់តែលឿន។



បើ Z ឱ្យអេឡិចត្រុង វង់កាន់តែសំបូរអេឡិចត្រុង ហើយ មានប្រតិកម្មជាមួយអេឡិចត្រូគីលកាន់តែលឿន

ម្យ៉ាងវិញ បើសិនជាក្រុមជួសនៅលើវង់ទាញអេឡិចត្រុង វែងនឹងកាន់តែខ្វះអេឡិចត្រុង ហើយអេឡិចត្រូនក៏លម្អយនឹងប្រតិកម្មជាមួយវង់នេះកាន់តែយឺត។




បើ Y ទាញអេឡិចត្រុង វែងកាន់តែខ្វះអេឡិចត្រុង ហើយវាប្រតិកម្មជាមួយអេឡិចត្រូនក៏លកាន់តែយឺត


១០.២ ក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា និងក្រុមដៅទិសមេតា

ក្រុមជួសនៅលើវង់អាចមានឥទ្ធិពលដល់ដំណើរទិសនៃក្រុមចូល នៅពេលវាជំនួសអាតូមអ៊ីដ្រូសែនលើវង់នោះ។ ក្រុមជួសទាំងនេះមានពីរថ្នាក់៖

- ក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា (Orto-Para directors) ដៅទិសក្រុមចូលទៅកាន់ទីតាំងអរតូ និងប៉ារ៉ា ធៀប នឹងខ្លួនវា។




- ក្រុមដៅទិសមេតា (Meta directors) ដៅទិសក្រុមចូលលើទីតាំងមេតាធៀបនឹងខ្លួនវា។




១០.៣ ក្រុមជួសឱ្យអេឡិចត្រុង និងទាញអេឡិចត្រុង

ក្រុមជួសមួយជាក្រុមជួសអសកម្ម និងសកម្ម ឬក្រុមជួសមួយជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា ឬក្រុមដៅទិស មេតា អាស្រ័យលើថាតើក្រុមជួសនោះឱ្យអេឡិចត្រុងទៅវង់ ឬទាញអេឡិចត្រុងពីវង់។

- ក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុងទាំងអស់ជាក្រុមសកម្ម និងជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា។
- លើកលែងតែក្រុមជួសជាអាឡូសែន ក្រុមទាញអេឡិចត្រុងទាំងអស់ជាក្រុមអសកម្ម ហើយពួកវាទាំងអស់ជាក្រុមដៅទិសមេតា។
- ក្រុមជួសអាឡូសែនជាក្រុមអសកម្មខ្សោយ និងជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា។



បើសិនជា G ឱ្យអេឡិចត្រុង វែងត្រូវបាន ធ្វើឱ្យសកម្ម វាប្រតិកម្មលឿនជាងមុន ហើយប្រតិកម្មកើតឡើងលើទីតាំងអរតូ ឬប៉ារ៉ា



បើសិនជា G ទាញអេឡិចត្រុង វែងត្រូវបាន បង្អាក់សកម្ម វាប្រតិកម្មយឺតជាងមុន ហើយ ប្រតិកម្មកើតលើទីតាំងមេតា (លើកលែង G ជា អាឡូសែន)

១០.៤ ក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា

- ក្រុមជួសអាល់គីលជាត្រូវឱ្យអេឡិចត្រុង ហើយពួកវាជាក្រុមសកម្ម។ ពួកវាក៏ជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ាដែរ។


ឧទាហរណ៍ តូលុយអែនប្រតិកម្មលឿនជាងបង់សែនក្នុងប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូក្រីល៖



តូលុយអែនមានប្រតិកម្មជំនួស
អេឡិចត្រូក្រីលខ្លាំងជាងបង់សែន

យើងសង្កេតឃើញ ប្រតិកម្មភាពខ្លាំងរបស់តូលុយអែនក្នុងមធ្យោបាយជាច្រើន។ ឧទាហរណ៍ យើងរកឃើញថា ជាមួយតូលុយអែន គេអាចប្រើលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូក្រីល ដូចជាសីតុណ្ហភាពទាប និងកំហាប់ទាបរបស់អេឡិចត្រូក្រីល ងាយជាងបង់សែន។ យើងក៏រកឃើញដែរថា ក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា តូលុយអែនមានប្រតិកម្មលឿនជាងបង់សែន។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងប្រតិកម្មនីត្រាតកម្ម តូលុយអែនប្រតិកម្មលឿនជាងបង់សែន២៥ដង។

បន្ថែមនេះទៀត យើងក៏រកឃើញដែរថា នៅពេលតូលុយអែនរងប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូក្រីលការជំនួសស្ទើរតែទាំងអស់កើតឡើងលើទីតាំងអរតូ និងប៉ារ៉ាបស់វា។ នៅពេលយើងធ្វើប្រតិកម្មនីត្រាតកម្ម តូលុយអែនដោយអាស៊ីតនីទ្រិច និងអាស៊ីតស៊ុលផួរិច យើងទទួលបានម៉ូណូនីត្រូតូលុយអែនតាមសមាមាត្រដូចខាងក្រោម៖



o-នីត្រូតូលុយអែន(59%)

p-នីត្រូតូលុយអែន(37%)

m-នីត្រូតូលុយអែន(4%)


ម៉ូណូនីត្រូតូលុយអែនដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មនេះគឺ 96% (59%+37%) មានក្រុមនីត្រូលើទីតាំងអរតូ និងប៉ារ៉ា។ មានតែ 4% ទេដែលក្រុមនីត្រូស្ថិតលើទីតាំងមេតា។

លំហាត់អនុវត្ត៩៥.៦៖ ចូរពន្យល់ពីរបៀបដែលភាគរយខាងលើបង្ហាញថាក្រុមមេទីលដៅទិសទីតាំងអរតូ-ប៉ារ៉ា ដោយចាត់ទុកថាភាគរយទាំងនេះនឹងទទួលបានពីក្រុមមេទីលដែលគ្មានឥទ្ធិពលលើដំណៅទិសលើអេឡិចត្រូក្រីលចូលទេ។

ការជំនួសឧត្តមភាពរបស់តូលុយអែនលើទីតាំងអរតូ និងប៉ារ៉ាមិនត្រូវបានកម្រិតតែចំពោះប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មទេ។ គេសង្កេតឃើញលក្ខណៈដូចគ្នានេះក្នុងប្រតិកម្មអាឡូសែនកម្ម ស៊ុលផួនកម្ម និងប្រតិកម្មផ្សេងទៀត។

- ក្រុមដែលមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីលើអាតូមចងសម្ព័ន្ធជាមួយរង់អារ៉ូម៉ាទិច ដូចជាក្រុមអាមីណូ អ៊ីដ្រូកស៊ីល អាល់កុកស៊ីល និងអាមីត ឬអេស្ទែរ ដែលមានអុកស៊ីសែន ឬអាសូតចងសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយរង់ ជាក្រុមសកម្មខ្លាំង និងជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ាខ្លាំង។


ផេណុល និងអាសីលីនមានប្រតិកម្មជាមួយប្រូមក្នុងទឹក (មិនត្រូវការកាតាលីករ) នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ បង្កើតសមាសធាតុដែលទីតាំងទាំងអរតូ និងប៉ារ៉ាត្រូវបានជំនួសទាំងពីរ។




- ជាទូទៅ ក្រុមជំនួសដែលមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីលើអាតូមជាប់ជាមួយរង់បង់សែន (ដូចជាអ៊ីដ្រូកស៊ីល, អាមីណូ) ជាក្រុមសកម្មខ្លាំងជាងក្រុមដែលគ្មានទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរី (ដូចជាក្រុមអាល់គីល)។
- របាយដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងទៅកាន់រង់បង់សែនតាមរសូណង់ជាទូទៅខ្លាំងជាងរបាយអេឡិចត្រុងតាមផលអាំងឌុចទីវ។

ដូចមូលហេតុខាងលើ ទោះបីអាមីត និងអេស្ទែរមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីមួយលើអាតូមជាប់នឹងរង់ ឥទ្ធិពលសកម្មរបស់វាត្រូវបានលុបបាត់ ពីព្រោះក្រុមកាបូនីលផ្តល់ទម្រង់រសូណង់មួយដែលដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងរាយចេញពីរង់បង់សែន។ មូលហេតុនេះធ្វើឱ្យអាមីត និងអេស្ទែរសកម្មតិចជាងក្រុមដែលមានលទ្ធភាពរសូណង់ទាក់ទងនឹងការឱ្យអេឡិចត្រុងទៅរង់បង់សែន។

ឧទាហរណ៍នៃការបន្ស៊ីបអ៊ីយ៉ុងអាអេញ្យូមដោយផលរសូណង់ និងផលអាំងឌុចទីវ






ការឱ្យអេឡិចត្រុងទៅវង់ដោយអសូណង់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ
នៅពេលមានផ្លូវអសូណង់មួយផ្សេងទៀតដែលចេញពីវង់

១០.៥ ក្រុមអសកម្ម៖ ក្រុមដៅទិសមេតា

- ក្រុមនីត្រូវជាក្រុមអសកម្មខ្លាំងបំផុតមួយ ដោយសារតែកម្រិតអេឡិចត្រុងវិជ្ជមានផ្ទុកនៃអាតូមអុកស៊ីសែន និងអាសូត។ វាជាក្រុមទាញអេឡិចត្រុងយ៉ាងខ្លាំងមួយ។

នីត្រូបង់សែនរងប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មក្នុងល្បឿន 10^{-4} ដងនៃបង់សែន។ ក្រុមនីត្រូវជាក្រុមដៅទិសមេតា។ នៅពេលនីត្រូបង់សែនរងនីត្រាតកម្មជាមួយអាស៊ីតនីទ្រិច និងអាស៊ីតស៊ុលផួរិច ជំនួសលើទីតាំងមេតាកើតឡើង 93%៖



- ក្រុមកាបូកស៊ីល (-CO₂H) ក្រុមអាស៊ីតស៊ុលផួរិច (-SO₃H) និងក្រុមទ្រីក្លុយអ័រមេទីល (-CF₃) ក៏ជាក្រុមអសកម្មដែរ ហើយពួកវាក៏ជាក្រុមដៅទិសមេតាដែរ។

១០.៦ ក្រុមជួសអាឡូសែន៖ ក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ាអសកម្ម

- ក្រុមក្លរ ប្រូម និងអ៊ីយ៉ូដូជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា។ ប៉ុន្តែ ទោះបីពួកវាមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរី ពួកវាអសកម្មចំពោះប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអារ៉ូម៉ាទិច ពីព្រោះតែឥទ្ធិពលនៃកម្រិតអេឡិចត្រុងវិជ្ជមានរបស់អាឡូសែន។







ឧទាហរណ៍ ក្លរូបង់សែន និងប្រូមូបង់សែនរងប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មក្នុងល្បឿនយឺតជាងបង់សែន ៣០ ដង ភាគរយនៃផលិតផលម៉ូណូជំនួសដែលទទួលបាននៅពេលក្លរូបង់សែនរងប្រតិកម្មក្លរកម្ម ប្រូមកម្ម នីត្រាតកម្ម និងស៊ុលផួរកម្មត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង ១៥.១។

តារាង១៥.១ ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូនីកនៃក្រុមបង់សែន				
ប្រតិកម្ម	ផលិតផល អរតូ(%)	ផលិតផល ប៉ារ៉ា(%)	សរុបអរតូ និងប៉ារ៉ា(%)	ផលិតផល មេតា(%)
ក្លរកម្ម	39	55	94	6
ប្រូមកម្ម	11	87	98	2
នីត្រាតកម្ម	30	70	100	
ស៊ុលផួនកម្ម		100	100	

គេទទួលបានលទ្ធផលស្រដៀងគ្នាពីប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូនីកនៃក្រុមបង់សែន។

១០.៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមជួស

ការសង្ខេបពីឥទ្ធិពលនៃក្រុមជួសមួយចំនួនលើប្រតិកម្មភាព និងដំណើរទិសត្រូវបានសង្ខេបក្នុងតារាង ១៥.២។

តារាង១៥.២ ឥទ្ធិពលនៃក្រុមជួសលើប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូនីកនៃក្រុមបង់សែន	
ក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា	ក្រុមដៅទិសមេតា
សកម្មខ្លាំង $-\ddot{\text{N}}\text{H}_2, -\ddot{\text{N}}\text{HR}, -\ddot{\text{N}}\text{R}_2$ $-\ddot{\text{O}}\text{H}, -\ddot{\text{O}}:-$ សកម្មមធ្យម   សកម្មខ្សោយ $-\text{R}$ (alkyl) $-\text{C}_6\text{H}_5$ (phenyl) អសកម្មខ្សោយ $-\ddot{\text{F}}:, -\ddot{\text{Cl}}:, -\ddot{\text{Br}}:, -\ddot{\text{I}}:$	អសកម្មមធ្យម $-\text{C}\equiv\text{N}$ $-\text{SO}_3\text{H}$     អសកម្មខ្លាំង $-\text{NO}_2$ $-\text{NR}_3^+$ $-\text{CF}_3, \text{CCl}_3$

លំហាត់អនុវត្ត១៥.៧៖ ចូរឱ្យផលិតផលឧត្តមភាពដែលកើតនៅពេល៖

- តូលុយអែនរងប្រតិកម្មស៊ុលផួនកម្ម
- អាស៊ីតបង់សូអ៊ីចរងប្រតិកម្មនីត្រាតកម្ម
- នីត្រូបង់សែនរងប្រតិកម្មប្រូមកម្ម
- អ៊ីសូប្រូពីលបង់សែនប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីលក្លរួ និង AlCl_3
បើសិនផលិតផលឧត្តមភាពអាចជាល្បាយនៃអ៊ីសូមែអរតូ និងប៉ារ៉ា អ្នកត្រូវបញ្ជាក់។

១១. របៀបដែលក្រុមជួសមានឥទ្ធិពលលើប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូនិកអ៊ីប៊ែរណូម៉ាទិចការសិក្សាលម្អិត

១១.១ ប្រតិកម្មភាព៖ ឥទ្ធិពលនៃក្រុមឱ្យអេឡិចត្រូន និងទាញអេឡិចត្រូន



យើងអាចសិក្សាអំពីល្បឿនប្រតិកម្មដោយបញ្ជាក់អន្តរភាពរបស់ដំណាក់កាលកំណត់ល្បឿន។

- កត្តាណាមួយដែលកាត់បន្ថយថាមពលអន្តរភាពធៀបទៅនឹងអង្គធាតុប្រតិករ ធ្វើឱ្យថយចុះនូវ ថាមពលសេរីសកម្ម និងបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្ម។
- កត្តាណាមួយដែលបង្កើនថាមពលអន្តរភាពធៀបនឹងអង្គធាតុប្រតិករធ្វើឱ្យកើនឡើងនូវ ថាមពលសេរីសកម្ម និងបន្ថយល្បឿនប្រតិកម្ម។

ដំណាក់កាលកំណត់ល្បឿនក្នុងប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូននៃបង់សែនជួស ជាដំណាក់កាលដែលបានមកពីការកើតនៃអ៊ីយ៉ុងអាណូម។ យើងអាចសរសេររូបមន្តបង់សែនជួសមួយតាមវិធីទូទៅមួយ បើសិនយើងប្រើអក្សរ G តាងឱ្យក្រុមជួសវែងមួយ រួមទាំងអ៊ីដ្រូសែនផងដែរ។

នៅពេលយើងធ្វើរបៀបនេះសម្រាប់ប្រតិកម្មជាច្រើន យើងឃើញថា ល្បឿនប្រតិកម្មអាស្រ័យលើ G ឱ្យ ឬ ទាញអេឡិចត្រូន។

- បើសិនជា G ជាក្រុមឱ្យអេឡិចត្រូន (ធៀបនឹងអ៊ីដ្រូសែន) ប្រតិកម្មកើតឡើងរហ័សជាងប្រតិកម្ម របស់បង់សែន។
- បើសិនជា G ជាក្រុមទាញអេឡិចត្រូន ប្រតិកម្មនឹងយឺតជាងប្រតិកម្មរបស់បង់សែន។



វាទំនោងថាក្រុមជួស (G) ត្រូវតែប៉ះពាល់លើស្ថេរភាពរបស់អន្តរភាពធៀបនឹងស្ថេរភាពរបស់អង្គធាតុប្រតិករ។


- ក្រុមឱ្យអេឡិចត្រូនធ្វើឱ្យអន្តរភាពកាន់តែមានស្ថេរភាព តែក្រុមទាញអេឡិចត្រូនធ្វើឱ្យអន្តរភាពកាន់តែអន់ស្ថេរភាព។

តំនោលសមហេតុផល ពីព្រោះអន្តរភាពដូចគ្នាទៅនឹងអ៊ីយ៉ុងអាណូម ហើយអ៊ីយ៉ុងអាណូមជា កាបូចុងមិនដៅកន្លែងមួយ។

ឥទ្ធិពលនេះបង្ហាញការអនុវត្តមួយទៀតនៃទ្រឹស្តី Hammond-Leffler ។ អ៊ីយ៉ុងអាណូម៉ាអង្គធាតុកណ្តាលមានថាមពលខ្ពស់ ហើយដំណាក់កាលបង្កើតវា ជាដំណាក់កាលស្រូបកម្ដៅខ្ពស់។ ដូចនេះ ដោយយោងលើទ្រឹស្តីHammond-Leffler វាគួរតែមានភាពដូចគ្នាខ្លាំងរវាងអ៊ីយ៉ុងអាណូម៉ា និងអន្តរភាពដែលបង្កើតវា។


ដោយសារតែអ៊ីយ៉ុងអាណូម៉ាមានបន្ទុកអគ្គីសនីវិជ្ជមាន យើងអាចរំពឹងថាក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុងអាចបន្ស៊ប់អ៊ីយ៉ុងអាណូម៉ា និងអន្តរភាពដែលបង្កើតវា ចំពោះអន្តរភាពដែលបង្កើតជាកាបូកាចុងមិនដៅកន្លែង។ យើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃក្រុមទាញអេឡិចត្រុង។ ក្រុមទាញអេឡិចត្រុងមួយអាចធ្វើឱ្យអ៊ីយ៉ុងអាណូម៉ាអន់ស្ដេភាព ហើយតាមមធ្យោបាយត្រូវគ្នា វាអាចធ្វើឱ្យអន្តរភាពដែលបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអាណូម៉ាអន់ស្ដេភាពដែរ។

រូប១៥.៤ បង្ហាញអំពីរបៀបដែលលទ្ធភាពក្រុមជួសឱ្យអេឡិចត្រុង និងទាញអេឡិចត្រុងប៉ះពាល់ដល់ថាមពលសេរីសកម្មរបស់ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអារ៉ូម៉ាទិច។



រូប១៥.៤ ការប្រៀបធៀបថាមពលសេរីនៃការកើតអ៊ីយ៉ុងអាណូម៉ាក្នុងវង់មួយដែលមានមានក្រុមជួសទាញអេឡិចត្រុងគ្មានក្រុមជួស និងក្រុមជួសឱ្យអេឡិចត្រុង។ របាំងថាមពលសកម្មខ្ពស់ជាងគេ ប្រតិកម្មយឺតជាងគេ។ ប្រតិកម្ម(២) ដែលគ្មានក្រុមជួស ត្រូវបានប្រើជាប្រតិកម្មយោងសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ ក្នុងប្រតិកម្ម(៣) ក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុង G បន្ស៊ប់អន្តរភាព របាំងថាមពលវាទាបជាងគេ ដូចនេះប្រតិកម្មលឿនជាងគេ។

គំរូបូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចគណនារបស់អ៊ីយ៉ុងអាណូម៉ា ដែលប្រៀបធៀបឥទ្ធិពលបន្ស៊ប់បន្ទុករបស់ក្រុមមេទីលឱ្យអេឡិចត្រុង ជាមួយឥទ្ធិពលមិនបន្ស៊ប់បន្ទុករបស់ក្រុមទ្រីក្លុយអរ៉ូមេទីលទាញអេឡិចត្រុង ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូប១៥.៥។ អ៊ីយ៉ុងអាណូម៉ាខាងឆ្វេង (រូប១៥.៥a) គឺជាអ៊ីយ៉ុងបានមកពីការបូកអេឡិចត្រូកីលនៃប្រូមលើមេទីលបង់សែន (តូលុយអែន) លើទីតាំងប៉ារ៉ា។ អ៊ីយ៉ុងអាណូម៉ាខាងស្តាំ (រូប១៥.៥b) គឺជាអ៊ីយ៉ុងដែលបានមកពីការបូកប្រូមលើទ្រីក្លុយអរ៉ូមេទីលបង់សែនលើទីតាំងមេតា។ ចូរកត់សម្គាល់ថា អាតូមរបស់វង់ក្នុងរូប១៥.៥a មានពណ៌ខៀវតិចជាង ដែលបង្ហាញថា ពួកវាមានបន្ទុកវិជ្ជមានតិច ហើយវង់ត្រូវបានបន្ស៊ប់។



រូប១៥.៥ គំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចគណនារបស់អ៊ីយ៉ុងអាអេញមីពីកាបូកអេឡិចត្រូនៃប្រូមលើ
(a)មេទីលបង់សែន (តូលុយអែន) និង (b) ទ្រីក្លុយអ៊ីដ្រូមេទីលបង់សែន

១១.២ ផលរេសូណង់ និងផលរេសូណង់: ទ្រឹស្តីជំនោរទិស


យើងអាចពិចារណាអំពីលក្ខណៈឱ្យអេឡិចត្រុង និងទាញអេឡិចត្រុងរបស់ក្រុមជាច្រើនដោយផ្នែក លើមូលដ្ឋានពីរ៖ ផលរេសូណង់ និង ផលរេសូណង់។ យើងក៏នឹងឃើញដែរថា កត្តាទាំងពីរនេះកំណត់ ដំណើរ ទិសក្នុងប្រតិកម្មជំនួសអាវ៉ូម៉ាទិច។

> ផលរេសូណង់

ផលរេសូណង់នៃក្រុមជួស G កើតឡើងពីអន្តរកម្មអេឡិចត្រូស្តាទិចនៃសម្ព័ន្ធប៉ូលែកម្យរបស់ G ជាមួយ បន្ទុកវិជ្ជមានក្នុងរង្វង់ នៅពេលវាងការប្រយុទ្ធដោយអេឡិចត្រូនិកមួយ។ ឧទាហរណ៍ ប៊េសិនជា G ជា អាតូម (ឬក្រុម) មានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខ្ពស់ជាងកាបូន នោះរង្វង់នឹងមានចុងវិជ្ជមាននៃឌីប៉ូល៖



ការប្រយុទ្ធដោយអេឡិចត្រូននឹងកាន់តែយឺត ពីព្រោះការប្រយុទ្ធនេះនឹងនាំឱ្យកើតបន្ទុកវិជ្ជមាន ពេញបន្ថែមមួយទៀតលើរង្វង់។ អាឡូសែនទាំងអស់មានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខ្ពស់ជាងកាបូន និងបញ្ចេញ ផលរេសូណង់ឱ្យទាញអេឡិចត្រុងមួយ។ ក្រុមផ្សេងទៀតមានផលរេសូណង់ឱ្យទាញអេឡិចត្រុង ពីព្រោះអាតូម ចងផ្ទាល់ជាមួយរង្វង់ដែលមានបន្ទុកវិជ្ជមានដោយផ្នែក ឬពេញលេញមួយ។ ឧទាហរណ៍៖



ក្រុមទាញអេឡិចត្រុងជាមួយបន្ទុកដោយផ្នែក
ឬពេញលេញនៅលើអាតូមចងជាមួយរង្វង់

> ផលរេសូណង់

ផលរេសូណង់របស់ក្រុមជួស G មួយសំដៅលើលទ្ធភាពដែលវត្ថុមានរបស់ G អាចបង្កើន ឬបន្ថយការ បន្ស៊ប់រេសូណង់របស់អង្គធាតុកណ្តាលអ៊ីយ៉ុងអាអេញមី។ ឧទាហរណ៍ ក្រុមជួស G អាចបណ្តាលឱ្យរេសូណង់ មួយក្នុងចំណោមរេសូណង់ទាំងបីដែលបង្កើតអ៊ីប្រីតរបស់អ៊ីយ៉ុងអាអេញមី កាន់តែមានស្ថេរភាព ឬកាន់តែអន់

ស្ថេរភាពជាងក្នុងករណី G ជាអ៊ីដ្រូសែន។ បន្ថែមនេះទៀត នៅពេល G ជាអាតូមដែលមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងមិនចង់សម្ព័ន្ធមួយឬច្រើន វាអាចធ្វើឱ្យអ៊ីយ៉ុងអាអេញមកាន់តែមានស្ថេរភាព ដោយផ្តល់ឱ្យវានូវទម្រង់ស្ថេរណ៍ទី៤ ដែលមានបន្ទុកវិជ្ជមានស្ថិតលើ G ៖



ផលស្ថេរណ៍ឱ្យអេឡិចត្រុងថយចុះទៅតាមលំដាប់ខាងក្រោម៖




- ក្រុមអាមីណូជាក្រុមសកម្មខ្លាំង ក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីល និងអាល់កុកស៊ីលជាក្រុមសកម្មតិច ហើយក្រុមជួសអាឡូសែនជាការក្រុមអសកម្មខ្សោយ។

នៅពេល $X=F$ លំដាប់នេះទាក់ទងនឹងកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមាននៃអាតូមដែលមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងមិនចង់សម្ព័ន្ធ។ អាតូមមានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានកាន់តែធំ វាកាន់តែមានលទ្ធភាពទទួលយកបន្ទុកវិជ្ជមាន (ក្លាយអមមានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខ្ពស់ជាងគេ អាសូតតិចជាងគេ)។ នៅពេល $X=Cl, Br,$ ឬ I លទ្ធភាពឱ្យ អេឡិចត្រុងខ្សោយនៃអាឡូសែនដោយផលស្ថេរណ៍អាចយល់តាមមូលដ្ឋានខុសគ្នាមួយ។ អាតូមទាំងនេះ ($Cl, Br,$ និង I) មានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានធំជាងកាបូន ដូចនេះ អរីប៊ីតាល់ដែលមានទ្វេតាមិនចង់សម្ព័ន្ធនៅ ឆ្ងាយពីណ្ឌយ៉ូ ហើយមិនគ្របដណ្តប់បានល្អជាមួយអរីប៊ីតាល់ $2p$ របស់កាបូនទេ។ នេះជាបាតុភូតទូទៅមួយ៖ ផលស្ថេរណ៍មិនត្រូវបានសាយកាយល្អចន្លោះអាតូមនៃខួបខុសគ្នាក្នុងតារាងខួបទេ។

១១.៣ ក្រុមដៅទិសមេតា


- ក្រុមដៅទិសមេតាទាំងអស់មានបន្ទុកវិជ្ជមានដោយផ្នែក ឬពេញលើអាតូមដែលចង់សម្ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយវា។

ជាឧទាហរណ៍មួយ ចូរយើងពិចារណាលើក្រុមទ្រីក្លុយអ័រមេទីល។ ដោយសារតែមានអាតូមក្លុយអរកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខ្ពស់ចំនួនបី ក្រុមទ្រីក្លុយអ័រមេទីលជាក្រុមទាញអេឡិចត្រុងខ្លាំង។ វាជាក្រុមអសកម្មខ្លាំងមួយ ហើយជាក្រុមដៅទិសមេតាខ្លាំងមួយក្នុងប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូគីលអារ៉ូម៉ាទិច។ យើងអាចពិចារណាលើលក្ខណៈទាំងពីរនេះរបស់ក្រុមទ្រីក្លុយអ័រមេទីលតាមមធ្យោបាយខាងក្រោម។




យើងអាចយល់អំពីរបៀបដែលក្រុមទ្រីក្លុយអ័រមេទីលជះឥទ្ធិពលលើដំណើរទិស ក្នុងប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូគីលអារ៉ូម៉ាទិច បើសិនជាយើងគិតអំពីទម្រង់ស្ថេរណ៍របស់អ៊ីយ៉ុងអាអេញមដែលអាចត្រូវបានកកើត នៅពេលមានការប្រយុទ្ធអេឡិចត្រូគីលលើទីតាំងអរតូ មេតា និងប៉ារ៉ារបស់ទ្រីក្លុយអ័រមេទីលបង់សែន។


ការប្រយុទ្ធអរតូ



ការប្រយុទ្ធមេតា




ការប្រយុទ្ធព៉ាក



- អ៊ីយ៉ុងអាត្មូមដែលកើតពីការប្រយុទ្ធអរតូ និងប៉ារ៉ានីមួយៗមានទម្រង់រេសូណង់មួយដែលមិនមានស្ថេរភាពខ្ពស់ធៀបទៅនឹងទម្រង់ទាំងអស់ ពីព្រោះបន្ទុកវិជ្ជមានមានទីតាំងលើកាបូនរងដែលចង់ក្រុមទាញអេឡិចត្រុង។
- អ៊ីយ៉ុងអាត្មូមដែលបានពីការប្រយុទ្ធមេតាមិនមានទម្រង់រេសូណង់ដែលគ្មានស្ថេរភាពទេ។
- ដោយហេតុផលធម្មតានេះ យើងអាចរំពឹងថាអន្តរភាពដែលបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអាត្មូមជំនួសមេតា មានស្ថេរភាពទាបជាងគេ ដូចនេះការប្រយុទ្ធមេតាអាចមិនសម្របសម្រួល។

ហេតុផលនេះពិតប្រាកដដែលអាចសង្កេតឃើញតាមពិសោធន៍។ ក្រុមទ្រីក្លុយអរ៉ូជា ក្រុមដៅទិសមេតាខ្លាំងមួយ៖




ចូរចងចាំថា ការជំនួសមេតាត្រូវបានសម្របសម្រួលតែក្នុងន័យថា វាសម្របសម្រួលតិចជាងគេក្នុងចំណោមការជំនួសដែលមិនសម្របសម្រួលទាំងបី។ ថាមពលសេរីសកម្មសម្រាប់ការជំនួសលើទីតាំងមេតានៃទ្រីក្លុយអរ៉ូមេទីលបង់សែនគឺទាបជាងថាមពលសេរីសកម្មសម្រាប់ការប្រយុទ្ធលើទីតាំងអរតូ ឬប៉ារ៉ា ប៉ុន្តែវានៅ

តែងតែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រយុទ្ធលើបង់សែន។ ការជំនួសកើតឡើងលើទីតាំងមេតានៃទ្រីក្លុយអ៊ុយមេទីលបង់សែនលឿនជាងការជំនួសដែលកើតឡើងលើទីតាំងអរតូ និងប៉ារ៉ា ប៉ុន្តែវាកើតឡើងយឺតជាងការជំនួសលើបង់សែនណាស់។

- ក្រុមនីត្រូ ក្រុមកាបូកស៊ីល និងក្រុមដោទិសមេតាផ្សេងទៀត (មើលតារាង១៥.២) ជាក្រុមទាញអេឡិចត្រុងខ្លាំង ហើយមានអំពើក្នុងមធ្យោបាយស្រដៀងគ្នាមួយ។

១១.៤ ក្រុមដោទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា

លើកលែងតែក្រុមជួសអាល់គីល និងផេនីល ក្រុមដោទិសអរតូ-ប៉ារ៉ាទាំងអស់ក្នុងតារាង១៥.២ជាប្រភេទទូទៅដូចខាងក្រោម៖



លក្ខណៈទម្រង់ ដែលមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងលើអាតូមជាប់ជាមួយវង់ កំណត់ដំណើរទិស និងជះឥទ្ធិពលដល់ប្រតិកម្មភាពក្នុងប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីល។

ឥទ្ធិពលផ្ទាល់នៃក្រុមដែលមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយ គឺបណ្តាលមកពីផលរេសូណង់ឱ្យអេឡិចត្រុងមួយ។ ប៉ុន្តែ ផលរេសូណង់មានឥទ្ធិពលជាចំបងក្នុងអ៊ីយ៉ុងអាអេញ៉ូម និងអន្តរភាពដែលបង្កើតវា។

លើកលែងតែអាឡូសែន ឥទ្ធិពលចំបងរបស់ក្រុមនេះលើប្រតិកម្មភាពរបស់វង់បង់សែនក៏បណ្តាលមកពីផលរេសូណង់ឱ្យអេឡិចត្រុងមួយដែរ។ ហើយ ផលនេះមានឥទ្ធិពលជាចំបងក្នុងអន្តរភាពដែលបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអាអេញ៉ូម។


ដើម្បីយល់អំពីផលរេសូណង់ទាំងនេះ ចូរយើងចាប់ផ្តើមដោយរំលឹកអំពីឥទ្ធិពលនៃក្រុមអាមីណូលើប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអាវ៉ូម៉ាទិច។ ក្រុមអាមីណូមិនត្រឹមតែជាក្រុមសកម្មខ្លាំងទេ វាថែមទាំងជាក្រុមដោទិសអរតូ-ប៉ារ៉ាខ្លាំងផងដែរ។ យើងបានឃើញរួចហើយថា អានីលីនមានប្រតិកម្មជាមួយប្រូមក្នុងសូលុយស្យុងទឹកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ និងអវត្តមានកាតាលីករមួយបង្កើតជាផលិតផលមួយដែលមានការជំនួសទាំងទីតាំងអរតូ និងប៉ារ៉ា។

ផលអាំងឌុចទីវរបស់ក្រុមអាមីណូធ្វើឱ្យទាញអេឡិចត្រុងតិចតួច។ ដូចដែលយើងដឹង អាសូតមានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានធំជាងកាបូន។ ប៉ុន្តែ ផលសងនៃកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានរវាងអាសូត និងកាបូនក្នុងអានីលីនមិនធំទេ ពីព្រោះកាបូនរបស់វង់បង់សែនមានភាពអ៊ីប្រីត sp^2 ហើយវាជាកាបូនដែលមានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានធំជាងកាបូនអ៊ីប្រីត sp^3 ។


- ផលរេសូណង់របស់ក្រុមអាមីណូមានសារៈសំខាន់ជាងផលអាំងឌុចទីវរបស់វាក្នុងប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអាវ៉ូម៉ាទិច ហើយផលរេសូណង់ធ្វើឱ្យក្រុមអាមីណូឱ្យអេឡិចត្រុង។

យើងអាចយល់អំពីផលនេះ បើសិនជាយើងពិចារណាលើទម្រង់រេសូណង់របស់អ៊ីយ៉ុងអាអេញ៉ូម ដែលកើតពីការប្រយុទ្ធអរតូ មេតា និងប៉ារ៉ាលើអានីលីន៖

ការប្រយុទ្ធអរត្ន៖




ការប្រយុទ្ធមេតា៖



ទម្រង់វេស្យូណង់
ស្ថេរភាពជាងគេ

ការប្រយុទ្ធព៉ាវ៉ា




ទម្រង់វេស្យូណង់
ស្ថេរភាពជាងគេ

គេអាចសរសេរទម្រង់វេស្យូណង់ចំនួន៤របស់អ៊ីយ៉ុងអាមញ៉ូមដែលបានមកពីការប្រយុទ្ធអរត្ន និងប៉ាវ៉ា តែគេអាចសរសេរទម្រង់វេស្យូណង់របស់អ៊ីយ៉ុងអាមញ៉ូមបានតែបីពីការប្រយុទ្ធមេតា។ ការសង្កេតនេះបញ្ជាក់ ថា អ៊ីយ៉ុងអាមញ៉ូមជំនួសអរត្ន និងប៉ាវ៉ា អាចមានស្ថេរភាពជាង។ ប៉ុន្តែសារសំខាន់បំផុត គឺទម្រង់ស្ថេរភាពដែល ចូលរួមបង្កើតអ៊ីប្រីតរបស់អ៊ីយ៉ុងអាមញ៉ូមជំនួសអរត្ន និងប៉ាវ៉ា។ ក្នុងទម្រង់ទាំងនេះ ទ្វេតាអេឡិចត្រុងមិនសម្ព័ន្ធពី អាសូតបង្កើតសម្ព័ន្ធក្នុងមួយថែមទៀតជាមួយកាបូនរបស់វា។ សម្ព័ន្ធបន្ថែម និងការពិតដែលអាតូមទាំង អស់ក្នុងទម្រង់ទាំងនេះមានអេឡិចត្រុងអដ្ឋតាពេញលេញ ធ្វើឱ្យទម្រង់ទាំងនេះមានស្ថេរភាពជាងទម្រង់ផ្សេង ទៀត។ ដោយសារតែទម្រង់ទាំងនេះមានស្ថេរភាពមិនធម្មតា ពួកវាធ្វើឱ្យមានរបាយជំនឿថាអ៊ីប្រីតរបស់វា។ នេះមានន័យថា អ៊ីយ៉ុងអាមញ៉ូមជំនួសអរត្ន និងប៉ាវ៉ាមានស្ថេរភាពជាងអ៊ីយ៉ុងអាមញ៉ូមដែលបានពីការ ប្រយុទ្ធមេតា។ អន្តរភាពដែលបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអាមញ៉ូមជំនួសអរត្ន និងប៉ាវ៉ាកើតឡើងនៅថាមពលសេរីទាបណាស់។ ដូចនេះ អេឡិចត្រូកីលមានប្រតិកម្មលើទីតាំងអរត្ន និងប៉ាវ៉ាលឿនណាស់។


លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.៨៖ ដោយប្រើទ្រឹស្តីវេស្យូណង់ ចូរពន្យល់ពីមូលហេតុដែលក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលរបស់ផេណុល ជាក្រុមសកម្ម និងជាក្រុមដៅទិសអរត្ន-ប៉ាវ៉ា។ ចូរបង្ហាញការពន្យល់ដោយបង្ហាញអ៊ីយ៉ុងអាមញ៉ូមដែលបង្កើត នៅពេលផេណុលមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីយ៉ុង Br^+ មួយនៅទីតាំងអរត្ន មេតា និងប៉ាវ៉ា។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.៩៖ ផេណុលមានប្រតិកម្មជាមួយអាសេទិចអានីទ្រីតក្រោមវត្តមាននៃសូដ្យូមអាសេតាត បង្កើតអេស្តេរផេនីលអាសេតាត៖



ក្រុម $\text{CH}_3\text{COO}-$ នៃផេនីលអាសេតាត ដូចក្រុម $-\text{OH}$ នៃផេណុល (លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.៨) ជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា។

- តើលក្ខណៈទម្រង់នៃក្រុម $\text{CH}_3\text{COO}-$ ពន្យល់ពីបាតុភូតនេះយ៉ាងម៉េច?
- ផេនីលអាសេតាត ទោះបីរងប្រតិកម្មនៅទីតាំងអរតូ និងប៉ារ៉ា មានប្រតិកម្មភាពចំពោះប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអារ៉ូម៉ាទិចខ្សោយជាងផេណុល។ ចូរប្រើទ្រឹស្តីស្វែងរកពន្យល់ហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះ?
- អានីលីនតែងតែមានប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអារ៉ូម៉ាទិចដែលគេមិនចង់បានមួយខ្លាំង។ មធ្យោបាយមួយដើម្បីជៀសវាងប្រតិកម្មមិនចង់បាននេះ គឺត្រូវបំប្លែងអានីលីនជាអាសេតានីលីត (ខាង ក្រោម) ដោយដាក់អានីលីនឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអាសេទីលក្លរ ឬអាសេទិចអានីឌ្រីត៖




តើឥទ្ធិពលផ្ទាល់អ្វីដែលអ្នករំពឹងថាក្រុមអាសេតាមីដូ ($\text{CH}_3\text{CONH}-$) មាន?

- ចូរពន្យល់ហេតុអ្វីបានជាវាសកម្មខ្សោយជាងក្រុមអាមីណូ - NH_2 ។


ជាដំបូង ឥទ្ធិពលផ្ទាល់ និងប្រតិកម្មភាពនៃក្រុមជួសអាឡូសែនទំនោងជាមានភាពផ្ទុយគ្នា។ ក្រុមអាឡូសែនជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា (ក្នុងតារាង១៥.២) ដែលជាក្រុមអសកម្ម។ ក្រុមអសកម្មទាំងអស់ជាក្រុមដៅ ទិសមេតា។ ប៉ុន្តែ យើងបានសិក្សាលក្ខណៈក្រុមជួសអាឡូសែន បើសិនយើងសន្មតថា ផលអាំងឌុចទីវទាញអេឡិចត្រុងរបស់ពួកវាប៉ះពាល់ដល់ប្រតិកម្មភាព និងផលស្វែងរកឱ្យអេឡិចត្រុងទាក់ទងនឹងដំណើរទិស។

ចូរយើងប្រើការសន្មតទាំងនេះជាពិសេសក្លរ៉ូបង់សែន។ អាតូមក្លរមានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមាន។ ដូចនេះ យើងអាចរំពឹងថាអាតូមក្លរទាញអេឡិចត្រុងពីវ៉ង់បង់សែន និងស្រឡាយរបស់វា៖




ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅពេលការប្រយុទ្ធអេឡិចត្រូកីលកើតឡើង អាតូមក្លររបស់វាបង្កើតអាយ៉ុងអារេញ៉ូមដែលបានពីការប្រយុទ្ធអរតូ និងប៉ារ៉ា ធៀបនឹងអាយ៉ុងអារេញ៉ូមដែលទទួលបានពីការប្រយុទ្ធលើទីតាំងមេតា។ អាតូមក្លរធ្វើដូចនឹងរបៀបដែលក្រុមអាមីណូ និងក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលធ្វើដែរ **ដោយឱ្យទាញអេឡិចត្រុងសេរីមួយ។** អេឡិចត្រុងទាំងនេះធ្វើឱ្យកើតទម្រង់ស្ថេរភាពដែលចូលរួមបង្កើតអ៊ីប្រីតរបស់អាយ៉ុងអារេញ៉ូមជួសអរតូ និង ប៉ារ៉ា។


ការប្រយុទ្ធអរតូ



ការប្រយុទ្ធមេតា



ការប្រយុទ្ធព៉ាវ៉ា




ទម្រង់រសូណង់
ស្ថេរភាពជាងគេ

អ្វីដែលយើងបាននិយាយចំពោះក្លរូបង់សែនក៏ពិតដូចគ្នាចំពោះប្រូម៉ូបង់សែនដែរ។

យើងអាចសង្ខេបផលរសូណង់ និងផលអាំងឌុចទីវរបស់ក្រុមជួសអាឡូសែន ដូចខាងក្រោម៖

- តាមរយៈផលអាំងឌុចទីវទាញអេឡិចត្រុងរបស់ពួកវា ក្រុមអាឡូសែនធ្វើឱ្យវង់ខ្វះអេឡិចត្រុងជាងបង់សែន។ វាធ្វើឱ្យថាមពលសេរីសកម្មរបស់ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអារ៉ូម៉ាទិចមួយ ខ្ពស់ជាងថាមពលសេរីសកម្មរបស់បង់សែន ដូចនេះ ក្រុមអាឡូសែនជាក្រុមអសកម្ម។
- ប៉ុន្តែតាមរយៈផលរសូណង់ឱ្យអេឡិចត្រុងរបស់ពួកវា ក្រុមអាឡូសែនធ្វើឱ្យថាមពលសេរីសកម្មដែលធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មជំនួសអរតូ និងប៉ាវ៉ាទាបជាងថាមពលសេរីសកម្មដែលធ្វើឱ្យមានការជំនួសមេតា។ វាធ្វើឱ្យក្រុមជួសអាឡូសែនជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ាវ៉ា។


អ្នកអាចកត់សម្គាល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងហេតុផលសម្រាប់ឥទ្ធិពលមិនធម្មតារបស់អាឡូសែននិងហេតុផលសម្រាប់ក្រុមអាមីណូ និងក្រុមអ៊ីដ្រូកស៊ីល។ ហេតុផលនោះគឺ អុកស៊ីសែនមានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមាន ខ្ពស់ជាងក្លរ ឬប្រូម (និងជាពិសេស អ៊ីយ៉ូត)។ ដោយសារតែក្រុមអ៊ីដ្រូកស៊ីលជាក្រុមសកម្មមួយ ប៉ុន្តែអាឡូសែន ជាក្រុមអសកម្ម។ ការពន្យល់នេះអាចធ្វើឡើង បើសិនជាយើងពិចារណាលើរបាយបន្សំបំផុតឱ្យអន្តរភាពដែល បង្កើតអ៊ីយ៉ុងអាអេញ៉ូមដោយទម្រង់រសូណង់ទាក់ទងនឹងក្រុមមួយ (ខាងក្រោម) ដែលចង់ភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយវង់ បង់សែន ក្នុងករណី G មានទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយ។



បើសិនជា G ជាក្រុម -OH ឬ -NH₂ ទម្រង់រសូណង់កើតឡើង ពីព្រោះការគ្របដណ្តប់នៃអរប៊ីតាល់ 2p មួយជាមួយអរប៊ីតាល់របស់អុកស៊ីសែន ឬអាសូត។ ការគ្របដណ្តប់ត្រូវបានសម្របសម្រួល ពីព្រោះអាតូមទាំង


នេះមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ប៉ុន្តែ ចំពោះក្លរ ការឱ្យទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយទៅវង់បង់សែនត្រូវការគ្របដណ្តប់នៃអរីប៊ីតាល់ 2p របស់កាបូនជាមួយអរីប៊ីតាល់ 3p របស់ក្លរ។ ការគ្របដណ្តប់បែបនេះមានប្រសិទ្ធភាពតិច អាតូមក្លរមានទំហំធំជាង ហើយអរីប៊ីតាល់ 3p របស់វាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីណ្វៃយ៉ូជាង។ ជាមួយប្រូមនិងអ៊ីយ៉ូត ការគ្របដណ្តប់នេះប្រសិទ្ធភាពតិចបំផុត។ ការបញ្ជាក់លើការពន្យល់នេះត្រូវបានសង្កេតឃើញថា ក្លុយអ៊ីដ្រូសែន ($G = -F$) ជាអាឡូបង់សែនខ្លាំងជាងគេ ទោះបីក្លុយអ៊ីដមានកម្រិតអេឡិចត្រូអ៊ីវ៉ុស៊ីតេខ្ពស់ ហើយវាជាក្រុម ដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ាខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមអាឡូសែន។ ចំពោះក្លុយអ៊ីដ ការឱ្យទ្វេតាអេឡិចត្រុងកើតឡើងពីការគ្របដណ្តប់នៃអរីប៊ីតាល់ 2p របស់ក្លុយអ៊ីដជាមួយអរីប៊ីតាល់ 2p របស់កាបូន (ដូចក្នុងក្រុម $-NH_2$ និង $-OH$)។ ការគ្របដណ្តប់នេះមានប្រសិទ្ធភាព ពីព្រោះអរីប៊ីតាល់របស់ $=C$ និង $-F$ មានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។

លំហាត់អនុវត្តន៍ ១៥.១០៖ ក្លរូអេតែនបូកអ៊ីដ្រូសែនក្លរូយ៉ែតជាងអេតែន ហើយផលិតផលជា 1,1-ឌីក្លរូអេតាន។ តើអ្នកអាចពន្យល់ដោយប្រើផលស្នូណង់ និងផលអាំងឌុចទីវ៉ង់ម៉េច?



១១.៥ ដំណើរទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា និងប្រតិកម្មភាពរបស់អាល់គីលបង់សែន

ក្រុមអាល់គីលជាក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុងខ្លាំងជាងអ៊ីដ្រូសែន។ ដោយសារហេតុនេះ ពួកវាអាចធ្វើឱ្យសកម្មដល់វង់បង់សែនមួយចំពោះប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអ៊ីត ដោយបន្ស៊ប់អន្តរភាពដែលបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអារញ្ចៀម៖




អន្តរភាពត្រូវបានបន្ស៊ប់ អ៊ីយ៉ុងអារញ្ចៀមត្រូវបានបន្ស៊ប់

ចំពោះអាល់គីលបង់សែន ថាមពលសេរីសកម្មរបស់ដំណាក់កាលដែលបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអារញ្ចៀម (ទើបតែបានបង្ហាញ) ទាបជាងថាមពលរបស់បង់សែន ហើយអាល់គីលបង់សែនមានប្រតិកម្មលឿនជាង។

ក្រុមអាល់គីលជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា។ យើងក៏អាចពិចារណាលើលក្ខណៈនេះរបស់ក្រុមអាល់គីលដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលទ្ធភាពរបស់ពួកវាក្នុងការឱ្យអេឡិចត្រុង ដែលជាឥទ្ធិពលដែលមានសារសំខាន់នៅពេលក្រុមអាល់គីលត្រូវបានភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយកាបូនមានបន្ទុកវិជ្ជមានមួយ។


ឧទាហរណ៍ បើសិនយើងសរសេរទម្រង់ស្ថេរភាពរបស់អ៊ីយ៉ុងអារញ្ចៀមដែលកើតនៅពេលតូលុយអែនប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអារ៉ូម៉ាទិច យើងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

ការប្រយុទ្ធអរតូ




ទម្រង់ស្ថេរភាពស្ថេរភាពជាងគេ

ការប្រយុទ្ធអេតា




ការប្រយុទ្ធព៉ាវ៉ា




ទម្រង់អស្ថេរភាពជាងគេ

ក្នុងការប្រយុទ្ធអេតា និងប៉ាវ៉ា យើងឃើញថា យើងអាចសរសេរទម្រង់អស្ថេរភាពដែលក្រុមមេទីលត្រូវបានភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយកាបូនបន្ទុកវិជ្ជមានរបស់វា។ ទម្រង់ទាំងនេះមានស្ថេរភាពជាងទម្រង់អស្ថេរភាពណាមួយ ពីព្រោះក្នុងទម្រង់របស់ពួកវាឥទ្ធិពលបន្ស៊ប់នៃក្រុមមេទីល (ដោយឱ្យអេឡិចត្រុងតាមអាំងឌុចទីវ) មានប្រសិទ្ធភាពជាងគេ។ ដូចនេះ ទម្រង់ទាំងនេះធ្វើឱ្យមានរបាយធំ (បន្ស៊ប់) ទៅអ៊ីប្រីតរបស់អ៊ីយ៉ុងអាអេញមជ្ឈសអេតា និង ប៉ាវ៉ា។ គ្មានទម្រង់ស្ថេរភាពដូចនេះឱ្យរបាយទៅអ៊ីប្រីតរបស់អ៊ីយ៉ុងអាអេញមជ្ឈសមេតាទេ ហើយជាលទ្ធផល វាមានស្ថេរភាពទាបជាងអ៊ីយ៉ុងអាអេញមជ្ឈសអេតា ឬប៉ាវ៉ា។ ដោយសារតែអ៊ីយ៉ុងអាអេញមជ្ឈសអេតា និងប៉ាវ៉ា មានស្ថេរភាពជាង អន្តរភាពដែលបង្កើតពួកវាកើតឡើងនៅថាមពលទាប ហើយការជំនួសអេតា និងប៉ាវ៉ាកើត ឡើងលឿនជាង។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.១១៖ ចូរសរសេរទម្រង់អស្ថេរភាពរបស់អ៊ីយ៉ុងអាអេញមដែលកើត នៅពេលអេទីលបង់សែនមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីយ៉ុង Br^+ (កកើតពី $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3$) បង្កើតផលិតផលអេតា និងប៉ាវ៉ាខាងក្រោម។



លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.១២៖ ចូរសរសេរចលនការមួយសម្រាប់ប្រតិកម្មខាងក្រោម និងពន្យល់អំពីមូលហេតុវាកើតឡើងលឿនជាងប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មបង់សែន។




១១.៦ ការសង្ខេបឥទ្ធិពលក្រុមជួសលើដំណើរទិស និងប្រតិកម្មភាព

ឥឡូវនេះដោយយល់ទ្រឹស្តីនៃឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមជួសលើដំណើរទិស និងប្រតិកម្មភាព យើងត្រូវដាក់ទៅមើលតារាង១៥.២ សម្រាប់ការសង្ខេបក្រុមជាកំលាក់ និងឥទ្ធិពលរបស់ពួកវា។

១២. ប្រតិកម្មខ្សែខាងរបស់អាត់គីលបង់សែន


អ៊ីដ្រូកាបូដែលមានទាំងក្រុមអាត់ជាទិច និងក្រុមអាត់ម៉ាទិចក៏ត្រូវបានគេហៅថា អាត់ដែរ។ តូលុយអែន អេទីលបង់សែន និងអ៊ីសូប្រូពីលបង់សែនជាអាត់គីលបង់សែន៖



ផេនីលអេតែន ដែលជាធម្មតាគេហៅថាស្ទីរ៉ែន ជាឧទាហរណ៍មួយនៃអាត់សែនីលបង់សែន។ ផ្នែកអាត់ជាទិចនៃសមាសធាតុទាំងនេះជាធម្មតាត្រូវបានគេហៅថាខ្សែខាង (side chain)។


១២.១ កាចុង និងរ៉ាឌីកាល់សេរីបង់ស៊ីល

អរូបកម្មអ៊ីដ្រូសែនពីក្រុមមេទីលរបស់មេទីលបង់សែន (តូលុយអែន) បង្កើតរ៉ាឌីកាល់សេរីមួយហៅថា រ៉ាឌីកាល់សេរីបង់ស៊ីល ៖




ឈ្មោះនៃរ៉ាឌីកាល់សេរីបង់ស៊ីលត្រូវបានប្រើជាឈ្មោះដាក់លាក់របស់រ៉ាឌីកាល់សេរី បង្កើតក្នុងប្រតិកម្មនេះ។ ឈ្មោះទូទៅ រ៉ាឌីកាល់សេរីបង់ស៊ីល ប្រើលើរ៉ាឌីកាល់សេរីទាំងអស់ដែលមានអេឡិចត្រុងសេរីមួយលើកាចុងខ្សែខាងដែលចង់ផ្ទាល់ជាមួយវង់បង់សែន។ អាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់អាតូមកាចុងដែលចង់ផ្ទាល់ជាមួយវង់បង់សែនត្រូវបានគេហៅថា អាតូមអ៊ីដ្រូសែនបង់ស៊ីល។ ក្រុមដែលចង់សម្ព័ន្ធនៅលើទីតាំងបង់ស៊ីលិចត្រូវបានគេហៅថាក្រុមជួសបង់ស៊ីល។

ការចាកចេញនៃក្រុមចាកចេញ (LG) ពីទីតាំងបង់ស៊ីលបង្កើតកាចុងបង់ស៊ីលមួយ ៖




រ៉ាឌីកាល់បង់ស៊ីល និងកាចុងបង់ស៊ីលជាប្រព័ន្ធមិនផ្អែតឆ្លាស់ ហើយ ពួកវាទាំងពីរមានស្ថេរភាពមិនធម្មតា។ ពួកវាមានស្ថេរភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីអាត់លីល និងកាចុងអាត់លីលដែរ (មេរៀនទី ១៣)។ ស្ថេរភាពរបស់រ៉ាឌីកាល់សេរី និងកាចុងបង់ស៊ីលនេះអាចត្រូវបានពន្យល់ដោយទ្រឹស្តីស្កេណុង។ ក្នុង

ករណីនីមួយៗ គេអាចសរសេរទម្រង់អសូណង់ដែលដាក់អេឡិចត្រុងសេរី (ក្នុងករណីរ៉ាឌីកាល់សេរី) ឬបន្ទុកវិជ្ជមាន (ក្នុងករណីកាចុង) ទាំងលើទីតាំងអរតូ និងប៉ារ៉ាណៃកាបូនវែង (មើលទម្រង់ខាងក្រោម)។ ដូចនេះ អសូណង់ធ្វើឱ្យ អេឡិចត្រុងសេរី ឬបន្ទុកមិនដៅកន្លែង ហើយការមិនដៅកន្លែងធ្វើឱ្យកាចុង ឬរ៉ាឌីកាល់សេរី ទាំងនេះមាន ស្ថេរភាពខ្ពស់ណាស់។




រ៉ាឌីកាល់សេរីបង់ស៊ីលបន្ស៊ីបដោយអសូណង់



កាចុងបង់ស៊ីលបន្ស៊ីបដោយអសូណង់

ទម្រង់គណនារបស់រ៉ាឌីកាល់សេរីបង់ស៊ីល និងកាចុងបង់ស៊ីលត្រូវបានតាងក្នុងរូប១៥.៦។ ទម្រង់ទាំងនេះបង្ហាញពីវត្តមានលើកាបូនអរតូ និងប៉ារ៉ាណៃដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងសេរីក្នុងរ៉ាឌីកាល់ និងបន្ទុកវិជ្ជមានក្នុង កាចុង ដែលមានទម្រង់អសូណង់ខាងលើ។




រូប១៥.៦ ឡូបពណ៌ប្រផេះក្នុងទម្រង់គណនារបស់រ៉ាឌីកាល់បង់ស៊ីល (ខាងឆ្វេង) បង្ហាញទីតាំងដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងសេរី។ គំរូនេះបញ្ជាក់ថារ៉ាឌីកាល់សេរីមានទីតាំងថ្មីលើកាបូនបង់ស៊ីល អរតូ និងប៉ារ៉ា។ គំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចនៃអេឡិចត្រុង សម្ព័ន្ធក្នុងកាចុងបង់ស៊ីល (ខាងស្តាំ) បញ្ជាក់ថាបន្ទុកវិជ្ជមាន (ខៀវ) មានទីតាំងថ្មីលើកាបូនបង់ស៊ីល អរតូ និងប៉ារ៉ា ដែលបញ្ជាក់ ដោយគំរូអសូណង់របស់កាចុងបង់ស៊ីល។ ផ្ទៃ van der Waals នៃទម្រង់ទាំងពីរត្រូវបានតាងដោយសំណាញ់។


១២.២ អន្ស៊ែសនកម្មបង់ស៊ីលនៃខ្សែខាង

យើងបានឃើញក្នុងមេរៀននេះរួចហើយដែលយើងអាចជំនួសអាតូមអ៊ីដ្រូសែនដោយប្រូម និងក្លរលើវែងរបស់តូលុយអែន និងសមាសធាតុអាល់គីលអារ៉ូម៉ាទិចផ្សេងទៀត ដោយប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអារ៉ូ


ម៉ាទិច។ យើងក៏អាចជំនួសអាតូមអ៊ីដ្រូសែនលើកាបូនបង់ស៊ីលនៃខ្សែខាងអាល់គីលដោយប្រូម និងក្លរដោយប្រតិកម្មរ៉ាឌីកាល់សេរីក្រោមវត្តមានកម្ដៅ ពន្លឺ ឬធាតុផ្ដើមរ៉ាឌីកាល់សេរី ដូចជាពែរអុកស៊ីតមួយ ដូចដែលយើងបានឃើញពីជំហានក្នុងមេរៀនទី១០។ ប្រតិកម្មនេះអាចទៅរួចដោយស្ថេរភាពពិសេសនៃអង្គធាតុកណ្តាលរ៉ាឌីកាល់សេរីបង់ស៊ីល។ ឧទាហរណ៍ ក្លរកម្មបង់ស៊ីលនៃតូលុយអែនកើតឡើងក្នុងផាសឧស្ម័ននៅ 400-600°C ឬ ក្នុងវត្តមាននៃពន្លឺ UV ដូចដែលបង្ហាញពេលនេះ។ ពហុជំនួសកើតឡើងដោយក្លរលើស។



NBS (N-ប្រូម៉ូស៊ីស៊ីនីមីត មេរៀនទី១០) តែងតែត្រូវបានប្រើក្នុងប្រតិកម្មបង់ស៊ីលប្រូមកម្ម ពីព្រោះវាផ្តល់ បរិមាណស្តីស្យូមទ្រីនៃប្រូមក្នុងកំហាប់ទាប។



ប្រតិកម្មបង់ស៊ីលអាឡូសែនកម្មផ្តល់ជាមធ្យោបាយមានប្រយោជន៍មួយ សម្រាប់បញ្ចូលក្រុមចាក់ចេញមួយនៅពេលគេត្រូវការក្រុមចាក់ចេញសម្រាប់ប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីល ឬប្រតិកម្មបណ្តាច់។ ឧទាហរណ៍ បើសិនយើងចង់សំយោគបង់ស៊ីលអេទីលអេទែរពីតូលុយអែន គេអាចទង្វើបង់ស៊ីលប្រូមពីតូលុយអែនដូចប្រតិកម្មខាងលើ ហើយបន្ទាប់មកគេដាក់បង់ស៊ីលប្រូមឱ្យធ្វើប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូមអេតុកស៊ីតដូចខាងក្រោម៖




១៣. អាល់សែនីលបង់សែន

១៣.១ ស្ថេរភាពរបស់អាល់សែនីលបង់សែនឆ្លាស់

- អាល់សែនីលបង់សែន (alkenylbenzenes) ដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ខ្សែខាងឆ្លាស់ជាមួយរង់បង់ សែនមានស្ថេរភាពជាងអាល់សែនីលបង់សែនដែលមិនឆ្លាស់។




កស្មតាងមួយដែលអាចបញ្ជាក់ដូចនេះ៖ បានមកពីប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មអាល់កុលកាតាលីករអាស៊ីត ដែលគេដឹងថាទទួលបាននូវអាល់សែនស្ថេរភាពជាង(មើលមេរៀនទី៧)។ ឧទាហរណ៍ ដេអ៊ីដ្រាតកម្មអាល់កុល មួយដូចជា អាល់កុលដែលបង្កើតប្រព័ន្ធឆ្លាស់គឺ៖




ដោយសារតែភាពឆ្លាស់តែងតែធ្វើឱ្យថាមពលនៃប្រព័ន្ធមិនឆ្លុះមួយថយចុះ ដោយអាចឱ្យមានភាពមិនដេកនៃអេឡិចត្រុងπ លក្ខណៈនេះដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានរំពឹង។

១៣.២ ប្រតិកម្មបូកសម្ព័ន្ធពីជាន់នៃអាល់សែនបង់សែន

ក្រោមវត្តមានពែរអុកស៊ីតHBrបូកលើសម្ព័ន្ធពីជាន់នៃ1-ផេនីលប្រូប៉ែនបង្កើត-ប្រូម៉ូ-1-ផេនីលប្រូប៉ាន ជាផលិតផលឧត្តមភាព៖



ក្នុងអវត្តមានពែរអុកស៊ីត HBrបូកតាមមធ្យោបាយខុសគ្នា៖



ប្រតិកម្មនៃអ៊ីដ្រូសែនប្រូម៉ូលើ1-ផេនីលប្រូប៉ែន ដំណើរការឆ្លងកាត់រ៉ាឌីកាល់ស៊ីលក្នុងវត្តមានពែរអុកស៊ីត និង ឆ្លងកាត់កាចុងបង់ស៊ីលមួយក្នុងអវត្តមានពែរអុកស៊ីត។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.១៣៖ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្ម ដែល HBr បូកលើ 1-ផេនីលប្រូប៉ែន


- a. ក្នុងវត្តមានពែរអុកស៊ីត
- b. ក្នុងអវត្តមានពែរអុកស៊ីត

លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.១៤៖

- a. តើផលិតផលឧត្តមភាពដែលអ្នករំពឹងថាទទួលបាននៅពេល 1-ផេនីលមានប្រតិកម្មជាមួយHCl?
- b. តើផលិតផលណាដែលអ្នករំពឹងថាទទួលបាននៅពេលវារងប្រតិកម្មអុកស៊ីមែរក្លរ៉ាស្យុង-ដេមែរ ក្លរ៉ាស្យុង?

១៣.៣ អុកស៊ីតកម្មនៃខ្សែខាង


ភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មខ្លាំងធ្វើអុកស៊ីតកម្មតូលុយអែនទៅជាអាស៊ីតបង់សូអ៊ីច។ អុកស៊ីតកម្មនេះអាចធ្វើឡើងដោយអំពៅនៃប៉ូតាស្យូមពែរម៉ង់កាណាតក្នុងសូលុយស្យុងបាសក្តៅ។ វិធីសាស្ត្រនេះបង្កើតអាស៊ីតបង់សូអ៊ីចក្នុងទិន្នផលអតិបរមា៖



អាស៊ីតបង់សូអ៊ីច (~100%)

លក្ខណៈសំខាន់នៃអុកស៊ីតកម្មខ្សែខាងគឺថា អុកស៊ីតកម្មកើតឡើងដំបូលលើកាបូនបង់ស៊ីល។

- អាល់គីលបង់សែនដែលមានក្រុមអាល់គីលវែងជាងមេទីលត្រូវបានបំបែកទៅជាអាស៊ីតបង់សូអ៊ីច៖




អាល់គីលបង់សែន

អាស៊ីតបង់សូអ៊ីច


អុកស៊ីតកម្មខ្សែខាងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រតិកម្មបង់ស៊ីលអាឡូសែនកម្ម ពីព្រោះក្នុងដំណាក់កាលទី១ ភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មដកយកអ៊ីដ្រូសែនបង់ស៊ីលមួយ។ នៅពេលអុកស៊ីតកម្មបានចាប់ផ្តើមលើកាបូនបង់ស៊ីល ហើយ វាបន្តលើកន្លែងនោះ។ ជាចុងក្រោយ ភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មធ្វើអុកស៊ីតកម្មកាបូនបង់ស៊ីលទៅជាក្រុមកាបូនស៊ីលមួយ ហើយក្នុងដំណើរការនេះ វាបណ្តាច់អាតូមកាបូនដែលនៅសល់លើខ្សែខាង(ទែ-ប៊ុយទីលបង់សែនអាចធន់នឹងប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មខ្សែខាងនេះបាន។ ហេតុអ្វី?)។

- អុកស៊ីតកម្មខ្សែខាងមិនកើតឡើងតែលើក្រុមអាល់គីលទេ។ ក្រុមអាល់អាល់សែនីល អាល់ស៊ីនីល និង អាស៊ីលក៏រងអុកស៊ីតកម្មដោយសូលុយស្យុងបាសនៃប៉ូតាស្យូមពែរម៉ង់កាណាតក្តៅដែរ។



១៣.៤ អុកស៊ីតកម្មរង្វង់បង់សែន

កាបូនវង់បង់សែនដែលក្រុមអាល់គីលចងសម្ព័ន្ធជាមួយ អាចត្រូវបានបម្លែងទៅជាក្រុមកាបូនស៊ីលមួយដោយប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីស បន្ទាប់មកដាក់ឱ្យធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រូសែនពែរម៉ង់កាណាត។




១៤. ការអនុវត្តសំយោគ

នៅពេលគេធ្វើរួមគ្នានៃប្រតិកម្មជំនួសវង់អាវ៉ូម៉ាទិច និងប្រតិកម្មខ្សែខាងរបស់អាល់គីល និងអាល់សែ នីលបង់សែន អាចផ្តល់ឱ្យយើងនូវឈុតប្រតិកម្មខ្លាំងមួយសម្រាប់សំយោគសរីរាង្គ។ ដោយប្រើប្រតិកម្មទាំងនេះយ៉ាងជំនាញ យើងនឹងអាចសំយោគស្រលាយបង់សែនជាច្រើន។

- ផ្នែកមួយនៃជំនាញក្នុងការគ្រោងសំយោគ គឺជាសម្រេចរកលំដាប់លំដោយនៃប្រតិកម្ម។


ឧទាហរណ៍ យើងមានបំណងសំយោគ o-ប្រូម៉ូនីត្រូបង់សែន។ យើងអាចឃើញយ៉ាងហោចណាស់ថា យើងអាចបញ្ចូលក្រុមប្រូមទៅក្នុងវង់មុន ពីព្រោះវាជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា៖




o-ប្រូម៉ូនីត្រូបង់សែន p-ប្រូម៉ូនីត្រូបង់សែន

គេអាចព្រែកផលិតផលអរតូ និងប៉ារ៉ាដោយវិធីសាស្ត្រជាច្រើន ពីព្រោះពួកវាមានលក្ខណៈរូបខុសគ្នា។ ប៉ុន្តែ បើយើងបញ្ចូលក្រុមនីត្រូមុន យើងនឹងទទួលបាន m-ប្រូម៉ូនីត្រូបង់សែនជាផលិតផលឧត្តមភាព។


ឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតក្នុងការជ្រើសរើសលំដាប់ត្រឹមត្រូវនៃប្រតិកម្មមានសារសំខាន់គឺការសំយោគអាស៊ីតអរតូ-, មេតា-, និងប៉ារ៉ា-នីត្រូបង់សូអ៊ិច។ ដោយសារតែក្រុមមេទីលរបស់តូលុយអែនជាក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុង យើងអាចសំយោគអាស៊ីតអរតូ- និង ប៉ារ៉ា-នីត្រូបង់សូអ៊ិចពីតូលុយអែនដោយធ្វើនីត្រាតកម្មលើវា ព្រែកពួកវាចេញពីគ្នា បន្ទាប់មកធ្វើអុកស៊ីតកម្មក្រុមមេទីលជាក្រុមកាបូកស៊ីត៖



យើងអាចសំយោគ អាស៊ីតm-នីត្រូបង់សូអ៊ិចដោយចម្រាសលំដាប់នៃប្រតិកម្មនេះ។ យើងធ្វើអុកស៊ីតកម្មក្រុមមេទីលទៅជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមុន បន្ទាប់មកយើងប្រើក្រុមកាបូកស៊ីលិចជាជំនួសទៅអេឡិចត្រុងដើម្បីដៅទិសប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មលើទីតាំងមេតា។



លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.១៥៖ ឧបមាថាអ្នកចង់សំយោគ m-ក្លរូអេទីលបង់សែនពីបង់សែន៖



អ្នកអាចចាប់ផ្តើមពីក្លរូកម្មបង់សែន ហើយបន្ទាប់មកធ្វើប្រតិកម្ម Friedel-Crafts ដោយប្រើក្លរូអេតាន និង AlCl_3 ឬអ្នកអាចចាប់ផ្តើមពីប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម Friedel-Crafts បន្ទាប់មកធ្វើប្រតិកម្មក្លរូកម្ម។ ប៉ុន្តែ វិធីសាស្ត្រទាំងពីរមិនអាចទទួលបានផលិតផលដែលយើងចង់បានទេ។


- ហេតុអ្វីវិធីសាស្ត្រទាំងពីរមិនអាចបង្កើតផលិតផលដែលយើងចង់បាន?
- មានវិធីសាស្ត្របីដំណាក់កាលមួយ ដែលនឹងអាចបង្កើតផលិតផលនេះបាន។ ចូរឱ្យវិធីសាស្ត្រនេះ។

១៤.១ ការប្រើក្រុមការពារ និងក្រុមរារាំង

- ក្រុមសកម្មខ្លាំងបំផុតដូចជាក្រុមអាមីណូ និងក្រុមអ៊ីដ្រូកស៊ីលធ្វើឱ្យបង់សែនកាន់តែសកម្ម ដែលប្រតិកម្មមិនចង់បានអាចកើតឡើង។

អ្នកអាចទប់ទល់ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអ៊ីត ដូចជាអាស៊ីតនីទ្រិចក៏ជាភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មខ្លាំងដែរ។ ទាំងភ្នាក់ងារអេឡិចត្រូនីក និងភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មស្វែងរកអេឡិចត្រុង។ ដូចនេះក្រុម អាមីណូ និងក្រុមអ៊ីដ្រូកស៊ីលមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យសកម្មដល់រង់ចំពោះប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូនីកទេ ប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើ ឱ្យសកម្មដល់រង់ចំពោះប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ នីត្រាតកម្មអានីលីនធ្វើឱ្យមានការបំបែករង់ បង់សែន ពីព្រោះវារង់អុកស៊ីតកម្មដោយអាស៊ីតនីទ្រិច។ ដូចនេះនីត្រាតកម្មផ្ទាល់នៃអានីលីនមិនមែនជាវិធី សាស្ត្រមួយសម្រាប់ទង្វើអរតូ និងប៉ារ៉ា-នីត្រូអានីលីនទេ។


ការដាក់អានីលីនឱ្យធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអាសេទីលក្លរួ CH_3COCl ឬអានីទ្រីតអាសេទិច $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ បង្កើនក្រុមអាមីណូរបស់អានីលីនទៅជាអាមីតមួយ (ជាពិសេសក្រុមអាសេតាមីដូ $-\text{NHCOCH}_3$) ដោយបង្កើតជាអាសេតានីលីត។ ក្រុមអាមីតជាក្រុមសកម្មបង្គួរ ហើយវាមិនធ្វើឱ្យរង់អុកស៊ីតកម្មខ្លាំងក្នុងពេលនីត្រាតកម្មទេ។ ដូចនេះ ក្រុមអាមីណូរបស់អានីលីនរារាំងអាសេតានីលីត គេអាចធ្វើនីត្រាតកម្មផ្ទាល់៖



នីត្រាតកម្មអាសេតានីលីតបង្កើត p-នីត្រូអាសេតានីលីតក្នុងទិន្នផលខ្ពស់ និងបរិមាណតិចតួចនៃអ៊ីសូមែរអរតូ។ អ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈជ្ជានអាស៊ីតនៃ p-នីត្រូអាសេតានីលីតដកក្រុមអាសេទីលចេញ និងបង្កើត p-នីត្រូអាស៊ីលីនក្នុងផលិតផលខ្ពស់ដែរ។

ប៉ុន្តែសន្មតថា យើងត្រូវការ o-នីត្រូអាស៊ីលីន។ ការសំយោគដែលយើងទើបតែបានបង្ហាញខាងលើមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អទេ ពីព្រោះយើងទទួលបាន o-នីត្រូអាសេតានីលីតក្នុងបរិមាណបន្តិចបន្តួចពីប្រតិកម្មនីត្រាតកម្ម។

ប៉ុន្តែ យើងអាចសំយោគ o-នីត្រូអាស៊ីលីនតាមប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




នៅពេលនេះ យើងឃើញក្រុមអាស៊ីតស៊ុលផ្សិតអាចត្រូវបានប្រើជាក្រុម រារាំង (blocking group)។ យើងអាចដកក្រុមអាស៊ីតស៊ុលផ្សិតចេញដោយធ្វើប្រតិកម្មដេស៊ុលផ្សិតក្នុងប្រតិកម្មចុងក្រោយគេ។ ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ អ័ក់ទីបដែលបានប្រើសម្រាប់ប្រតិកម្មដេស៊ុលផ្សិតកម្ម (H_2SO_4) ក៏បានដកក្រុមអាសេទីលយ៉ាងងាយដែលយើងប្រើសម្រាប់ការពារវ៉ង់បង់សែនពីអុកស៊ីតកម្មដោយអាស៊ីតនីទ្រីច។

១៤.២ ដំណើរទិសក្នុងបង់សែនឌីជីន្ទស

- នៅពេល ក្រុមខុសគ្នាពីរមានវត្តមានលើវង់បង់សែនមួយក្រុមសកម្មខ្លាំងជាង (តារាង១៥.២) តែងតែកំណត់ផលិតផលរបស់ប្រតិកម្ម។

ជាឧទាហរណ៍មួយ ចូរយើងពិចារណាលើដំណើរទិសប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូហ្វីលនៃ p-មេទីលអាសេតានីលីត។ ក្រុមអាមីតជាប្រភេទសកម្មខ្លាំងជាងក្រុមមេទីល។ ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមបង្ហាញថាក្រុមអាមីតកំណត់លទ្ធផលរបស់ប្រតិកម្ម។ ការជំនួសកើតឡើងជាចំបងលើទីតាំងអរតូជ្រុងនឹងក្រុមអាមីត៖




ផលិតផលឧត្តមភាព

ផលិតផលតិចតួច

- ក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ាមានឧត្តមភាពជាក្រុមដៅទិសមេតា ក្នុងការកំណត់ទីតាំងនៃការជំនួសពីព្រោះក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ាជាក្រុមសកម្មជាងក្រុមដៅទិសមេតា។


ផលស្ដេចក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រតិកម្មជំនួសអាហ្វីនីយ៉ាទីបដែរ។

- ការជំនួសមិនកើតឡើងលើទីតាំងមេតាវាងក្រុមជួសពីរទេ បើសិនជាទីតាំងមួយទៀតនៅទំនេរ។ គេអាចឃើញឧទាហរណ៍មួយនៃឥទ្ធិពលនេះក្នុងប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មនៃ m-ប្រូមូក្លូបង់សែន៖




មានតែផលិតផលមួយណាត្រូវតែ 1%ប៉ុណ្ណោះដែលមានក្រុមនីត្រូនៅចន្លោះប្រូម និងក្លរ។

លំហាត់អនុវត្ត១៥.១៦៖ ចូរប៉ាន់ស្មានផលិតផលឧត្តមភាព (មួយ ឬច្រើន) ដែលអាចទទួលបាន នៅពេល សមាសធាតុខាងក្រោមរងប្រតិកម្មនីត្រាតកម្ម៖



១៥. អាស៊ីលអាឡូសែន និងបង់ស៊ីលអាឡូសែនក្នុងប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីល

អាស៊ីលអាឡូសែន និងបង់ស៊ីលអាឡូសែនអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមមធ្យោបាយ ដែលយើងចាត់ថ្នាក់អាឡូសែនសរីរាង្គផ្សេងទៀត៖




សមាធាតុទាំងអស់នេះរងប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូក្លីល។ ដូចគ្នាទៅនឹងអាល់គីលអាឡូសែនថ្នាក់ទី៣ ផ្សេងទៀតដែរ របាំងស្តេរិចដែលមានជាមួយក្រុមប្រេងប្រេងប្រាំងបីលើកាបូនចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាឡូសែនរាង អាលីលអាឡូសែន និងបង់ស៊ីលអាឡូសែនថ្នាក់ទី៣ពីប្រតិកម្មតាមចលនការ S_N2។ ពួកវាប្រតិកម្មជាមួយ នុយក្លេអូក្លីលតែតាមចលនការ S_N1ប៉ុណ្ណោះ។

អាលីលអាឡូសែន និងបង់ស៊ីលអាឡូសែនថ្នាក់ទី១ និងទី២អាចប្រតិកម្មតាមទាំងចលនការ S_N2 ឬ ដោយតាមចលនការ S_N1ក្នុងធាតុរំលាយមិនអាស៊ីតធម្មតា។ យើងរំពឹងថា អាឡូសែនទាំងនេះប្រតិកម្មតាម ចលនការ S_N2 ពីព្រោះពួកវាមានទម្រង់ស្រដៀងគ្នានឹងអាល់គីលអាឡូសែនធម្មតា (មានតែក្រុមមួយ ឬពីរ ភ្ជាប់ទៅនឹងកាបូនមានអាឡូសែនមិនរាងការប្រយុទ្ធ S_N2 ទេ)។ ប៉ុន្តែអាលីលអាឡូសែន និងបង់ស៊ីល អាឡូសែនថ្នាក់ទី១ និងទី២ ក៏អាចប្រតិកម្មតាមចលនការ S_N1 បានដែរ ពីព្រោះពួកវាអាចបង្កើតកាបូកាចុង អាលីល និងកាបូកាចុងបង់ស៊ីលស្ថេរភាព ហើយក្នុងប្រតិកម្មនេះ វាខុសពីអាល់គីលអាឡូសែនថ្នាក់ទី១ និងទី២។


- សរុបមក យើងអាចសង្ខេបពីឥទ្ធិពលទម្រង់លើប្រតិកម្មភាពរបស់អាល់គីល អាលីល និងបង់ស៊ីលអាឡូសែនក្នុងតារាង១៥.៣។

តារាង១៥.៣ សង្ខេបអាល់គីល, អាលីល, និងបង់ស៊ីលអាឡូសែនក្នុងប្រតិកម្ម S_N	
អាឡូសែនទាំងនេះមានប្រតិកម្ម S_N2 CH₃-X R-CH₂-X R-CH(R')-X អាឡូសែនទាំងនេះមានប្រតិកម្ម S_N1 ឬ S_N2 Ar-CH₂-X Ar-CH(R)-X	អាឡូសែនទាំងនេះមានប្រតិកម្ម S_N1

លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.១៧៖ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



នៅកំហាប់ខ្ពស់របស់អេតុកស៊ីត ល្បឿនប្រតិកម្មអាស្រ័យលើទំហំកំហាប់អេតុកស៊ីត និងអាលីលអាឡូសែន។




នៅកំហាប់ទាបរបស់អេតុកស៊ីត ល្បឿនប្រតិកម្មអាស្រ័យតែលើកំហាប់របស់អាលីលអាឡូសែន។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.១៨៖ 1-ក្លរ៉ូ-3-មេទីល-2-ប៊ុយតែនរងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសក្នុងល្បាយទឹក និងឌីអុកសានក្នុង ល្បឿនលឿនជាង1-ក្លរ៉ូ-2-ប៊ុយតែនរាប់ពាន់ដង។

- តើកត្តាណាខ្លះដែលធ្វើឱ្យប្រតិកម្មភាពខុសគ្នានេះ?
- តើផលិតផលណាដែលអ្នករំពឹងថាទទួលបាន?


(ឌីអុកសានជាអេទែររង់រលាយក្នុងទឹកគ្រប់សមាមាត្រ និងមានប្រយោជន៍ជាសហធាតុរំលាយសម្រាប់ប្រតិកម្មបែបនេះ ប៉ុន្តែឌីអុកសានជាសមាសធាតុបង្កមហារីកដូចអេទែរផ្សេងទៀតដែរ វាទំនោរនឹងបង្កើតព័រកុស៊ីត)។



ឌីអុកសាន


លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.១៩៖ អាឡូសែនថ្នាក់ទី១ប្រភេទ ROCH_2X រងប្រតិកម្ម $\text{S}_{\text{N}}1$ តែអាល់គឺលអាឡូសែនថ្នាក់ទី១ផ្សេងទៀតមិនរងប្រតិកម្មទេ។ តើអ្នកអាចពន្យល់តាមរសូណង់អំពីលទ្ធភាពអាឡូសែននេះរងប្រតិកម្ម $\text{S}_{\text{N}}1$ យ៉ាងម៉េច?

លំហាត់អនុវត្តន៍១៥.២០៖ ក្លរ៉ូខាងក្រោមរងប្រតិកម្មសុលវ៉ូលីសក្នុងអេតាណុលនៅល្បឿនក្នុងរងក្រចក។ តើអ្នកអាចពន្យល់អំពីលទ្ធផលនេះដូចម្តេច?




១៦. ប្រតិកម្មរេដុកម្មសមាសធាតុអរ៉ូម៉ាទិច

អ៊ីដ្រូសែនកម្មនៃបង់សែនក្រោមសំពាធដោយប្រើកាតាលីករលោហៈមួយដូចជានីកែលធ្វើឱ្យកើតក្នុងការបូកអ៊ីដ្រូសែនម៉ូលសមមូល និងការកើតស៊ីក្លូអ៊ីចសាន។ អង្គធាតុកណ្តាលស៊ីក្លូអ៊ីចសាឌីអែន និងស៊ីក្លូអ៊ីចសាឌីអែនមិនអាចព្រាកចេញពីគ្នា ពីព្រោះពួកវារងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មកាតាលីសលឿនជាងបង់សែន មានប្រតិកម្ម។




➤ **ប្រតិកម្មបេដុកម្ម Birch**

បង់សែនអាចត្រូវបានបេដុកម្មទៅជា 1,4-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាឌីអែន ដោយដាក់វាក្នុងលោហៈអាល់កាឡាំង (សូដ្យូម លីត្យូម ឬ ប៉ូតាស្យូម) ក្នុងល្បាយមួយនៃអាម៉ូញាក់រាវ និងអាល់កុលមួយ។ ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានគេហៅថាបេដុកម្ម Birch បន្ទាប់ពី A. J. Birch ជាអ្នកគីមីអូស្ត្រាលីដែលបានបង្កើតវា។




បេដុកម្ម Birch ជាប្រតិកម្មបេដុកម្មលោហៈរំលាយ ហើយចលនការបស់វាដូចនឹងចលនការបស់ប្រតិកម្មនៃអាល់ស៊ីនដែលយើងបានសិក្សាក្នុងមេរៀនទី៧។ លំដាប់នៃការបន្ថែមអេឡិចត្រុងពីលោហៈអាល់កាឡាំង និងប្រូតុងពីអាល់កុលកើតឡើង ដោយបង្កើត 1,4-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាឌីអែនមួយ។ មូលហេតុនៃការកើត 1,4-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាឌីអែនគឺការកើតនូវ 1,3-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាឌីអែនឆ្លាស់មានស្ថេរភាពជាង ដែលគេមិនទាន់យល់ច្បាស់នៅឡើយ។

❖ **ចលនការប្រតិកម្មបេដុកម្ម Birch**



ក្រុមជំនួសលើវង់បង់សែនជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការប្រតិកម្ម។ វេជ្ជកម្មBirch នៃមេតុកស៊ីបង់សែន (អានីសូល) ធ្វើឱ្យកើត 1-មេតុកស៊ី-1,4-ស៊ីក្លូអ៊ីចសាឌីអែន ដែលជាសមាសធាតុមួយដែលអាចរងអុីដ្រូលីស ដោយអាស៊ីតរាវបង្កើត 2-ស៊ីក្លូអ៊ីចសូន។ វិធីសាស្ត្រផ្តល់ជាការសំយោគមានប្រយោជន៍មួយនៃ 2-ស៊ីក្លូអ៊ីចសែ ណូន៖




&&&&&&&


លំហាត់មេរៀនទី១៥

ចលនការប្រតិកម្ម

១. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



២. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




៣. វែងមួយរបស់ផេនីលបង់សូអាតរងប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូគីលដោយស្រួលជាងមួយទៀត។

a. តើវាជាវែងមួយណា?

b. ចូរពន្យល់។

៤. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



ប្រតិកម្ម និងការសំយោគ


៥. ចូរប៉ាន់ស្មានផលិតផលឧត្តមភាព (មួយ ឬច្រើន) ដែលកើតពីសមាសធាតុខាងក្រោមមានប្រតិកម្មជាមួយ Cl_2 និង FeCl_3 ៖

- អេទីលបង់សែន
- អានីសូល (មេតុកស៊ីបង់សែន)
- ក្លុយអ៊ុបង់សែន
- អាស៊ីតបង់សូអ៊ិច
- នីត្រូបង់សែន
- ក្លរូបង់សែន
- ប៊ីផេនីល ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-C}_6\text{H}_5$)
- អេទីលផេនីលអេទែរ

៦. ចូរឱ្យផលិតផលឧត្តមភាព (មួយ ឬច្រើន) ដែលទទួលបាន នៅពេលសមាសធាតុខាងក្រោមមានប្រតិកម្មជាមួយល្បាយ HNO_3 និង H_2SO_4 ។

- អាសេតានីលីត
- ផេនីលអាសេតាត
- អាស៊ីត 4-ក្លរូបង់សូអ៊ិច
- អាស៊ីត 3-ក្លរូបង់សូអ៊ិច
- បង់សូផេណូន

៧. តើផលិតផលប្រតិកម្មម៉ូណូប្រូមកម្ម (មួយ ឬច្រើន) ដែលអ្នករំពឹងថានឹងទទួលបាននៅពេលសមាសធាតុខាងក្រោមរងប្រតិកម្មប្រូមកម្មរងជាមួយ Br_2 និង FeBr_3 ?

















៨. ដោយផ្ដើមចេញពីបង់សែន ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម៖

- អ៊ីសូប្រូពីលបង់សែន

- b. ទែរ-ប៊ុយទីលបង់សែន
- c. ប្រូពីលបង់សែន
- d. ប៊ុយទីលបង់សែន
- e. 1-ទែរ-ប៊ុយទីល-4-ក្លរ៉ូបង់សែន
- f. 1-ផេនីលស៊ីក្លូបង់តែន
- g. ត្រង់-2-ផេនីលស៊ីក្លូបង់តាណុល
- h. m-ប្រូម៉ូនីត្រូបង់សែន
- i. o-ប្រូម៉ូនីត្រូបង់សែន
- j. p-ប្រូម៉ូនីត្រូបង់សែន
- k. អាស៊ីត p-ក្លរ៉ូបង់សែនស៊ុលផូនិច
- l. o-ក្លរ៉ូនីត្រូបង់សែន
- m. អាស៊ីត m-នីត្រូបង់សែនស៊ុលផូនិច

៩. ដោយចាប់ផ្តើមពីស្ទីរ៉េន ចូរសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម៖



១០. ដោយចាប់ផ្តើមពីតូលុយអែន ចូរសេរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម៖


- a. អាស៊ីត m-ក្លរ៉ូបង់សូអ៊ិច
- b. p-មេទីលអាសេតូផែណុន
- c. 2-ប្រូម៉ូ-4-នីត្រូតូលុយអែន
- d. អាស៊ីត p-ប្រូម៉ូបង់សូអ៊ិច

- e. 1-ក្លរ៉ូ-3-ទ្រីក្លរ៉ូមេទីលបង់សែន
- f. p-អ៊ីសូប្រូពីលតូលុយអែន (p-គុយមែន)
- g. 1-ស៊ីក្លូអ៊ីបស៊ីល-4-មេទីលបង់សែន
- h. 2,4,6-ទ្រីនីត្រូតូលុយអែន (TNT)
- i. អាស៊ីត 4-ក្លរ៉ូ-2-នីត្រូបង់សូអ៊ីច
- j. 1-ប៊ុយទីល-4-មេទីលបង់សែន


១១. ដោយចាប់ផ្តើមពីអាស៊ីលីន ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម៖

- a. p-ប្រូម៉ូអាស៊ីលីន
- b. o-ប្រូម៉ូអាស៊ីលីន
- c. 2-ប្រូម៉ូ-2-នីត្រូអាស៊ីលីន
- d. 4-ប្រូម៉ូ-2-នីត្រូអាស៊ីលីន


១២. ការសំយោគទាំងពីរខាងក្រោមបរាជ័យ។ ចូរពន្យល់ថាមានអ្វីខុស ?



១៣. ចូរឱ្យទម្រង់សមាសធាតុ G – I ៖



១៤. 2-មេទីលណាប់ផ្តាឡែនអាចត្រូវបានសំយោគពីតូលុយអែនតាមសង្វាក់ប្រតិកម្មខាងក្រោម។ ចូរឱ្យទម្រង់អង្គធាតុកណ្តាលនីមួយៗ។




%%%%%%%%%

មេរៀនទី១៦


អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

១. សេចក្តីផ្តើម

- អាល់ដេអ៊ីតមានក្រុមកាបូនីលចងសម្ព័ន្ធជាមួយកាបូនម្ខាង និងម្ខាងទៀតចងជាមួយអ៊ីដ្រូសែនមួយ (ផរម៉ាល់ដេអ៊ីតគឺជាករណីលើកលែង ពីព្រោះវាមានអាតូមអ៊ីដ្រូសែនទាំងសងខាង) ។
- សេតូនមានក្រុមកាបូនីលមួយចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមកាបូនទាំងសងខាង។



រូបមន្តទូទៅរបស់អាល់ដេអ៊ីត



រូបមន្តទូទៅរបស់សេតូន


ទោះបីក្នុងមេរៀនមុនយើងបានសិក្សាខ្លះអំពីសមាសធាតុកាបូនីលហើយ យើងនឹងសិក្សាលម្អិតក្នុងមេរៀននេះ។ មូលហេតុ៖ ការសិក្សាអំពីក្រុមកាបូនីលជាមណ្ឌលនៃការសិក្សាលើមេរៀនទាំងអស់។

ក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងផ្តោតលើទង្វើរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន លក្ខណៈរូប និងជាពិសេសប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលលើក្រុមកាបូនីល។


២. ការបោះឈ្មោះអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

- អាល់ដេអ៊ីតអាស្រ័យទីតាំងត្រូវបានហៅឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធថ្មី IUPAC ដោយជំនួសមជ្ឈីមបទ **អាន** របស់អាល់កានដែលត្រូវគ្នាដោយមជ្ឈីមបទ **អាល់**។


ដោយសារតែក្រុមអាល់ដេអ៊ីតត្រូវតែនៅខាងចុងរបស់ខ្សែកាបូន ដូចនេះមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ទីតាំងរបស់វាទេ។ នៅពេលមានវត្តមានក្រុមជួស កាបូនក្រុមកាបូនីលត្រូវដាក់មានទីតាំងលេខ 1។ អាល់ដេអ៊ីតជាច្រើនក៏មានឈ្មោះអសាធារណៈដែរ ឈ្មោះទាំងនេះត្រូវបានឱ្យក្នុងរង្វង់ក្រចក។ ឈ្មោះអសាធារណៈទាំងនេះត្រូវបានមកពីឈ្មោះអសាធារណៈរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចដែលត្រូវគ្នា ហើយខ្លះក៏ IUPAC ទទួលស្គាល់ដែរ។




មេតាណាល់
(ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត)




អេតាណាល់
(អាសេតាល់ដេអ៊ីត)



ប្រូប៉ាណាល់
(ប្រូប៉ូណាល់ដេអ៊ីត)




5-ក្លរ៉ូប៉ង់តាណាល់




ផេនីលអាតាណាល់
(ផេនីលអាសេតាល់ដេអ៊ីត)


- អាល់ដេអ៊ីតដែលមានក្រុម -CHO ភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធរង្វង់ត្រូវបានហៅឈ្មោះដោយបូកមជ្ឈីមបទ **កាបាល់ដេអ៊ីត**។ ឧទាហរណ៍៖



បង់សែនកាបាល់ដេអ៊ីត
(បង់សាល់ដេអ៊ីត)



ស៊ីក្លូអ៊ីចសានកាបាល់ដេអ៊ីត




2-ណាប៉្តាផ្លែឡែនកាបាល់ដេអ៊ីត


ឈ្មោះ: បង់សាល់ដេអ៊ីត ត្រូវបានគេប្រើក្នុងមកជាងបង់សែនកាបាល់ដេអ៊ីតសម្រាប់ C_6H_5CHO ហើយយើងនឹងប្រើវានៅក្នុងមេរៀននេះ។

- សេតូនអាស៊ីលិចជាទីចត្រូវបានហៅឈ្មោះដោយជំនួសមជ្ឈីមបទ *អាន* របស់អាល់កាន ដែលត្រូវគ្នាដោយមជ្ឈីមបទ *អូន*។


បន្ទាប់មកគេត្រូវបង់លេខឱ្យខ្សែតាមមធ្យោបាយណាដែលអាតូមកាបូនរបស់ក្រុមកាបូនីលទទួលបានលេខទាបបំផុត ហើយលេខនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្គាល់ទីតាំងរបស់ក្រុមនេះ។



ប៊ុយតាណូន
(អេទីល មេទីលសេតូន)




2-ប៉ង់តាណូន
(មេទីល ប្រូពីលសេតូន)




ប៉ង់-4-អែន-2-អូន
(មិនមែន 1-ប៉ង់តែន-4-អូន)
(អាស៊ីលមេទីលសេតូន)

ឈ្មោះក្រុមបង្គុំនាទីរបស់សេតូន (ក្នុងរង្វង់ក្រចកខាងលើ) ទទួលបានដោយងាយពីការហៅឈ្មោះ ក្រុមទាំងពីរដែលចងជាមួយក្រុមកាបូនីលផ្សេងគ្នា និងបន្ថែមពាក្យថា **សេតូន**។

នៅពេលចាំបាច់ត្រូវហៅឈ្មោះ ក្រុម $-CHO$ ជាបុព្វបទមួយ វាមានឈ្មោះថា **មេតាណូអ៊ីល** ឬ **ផរមីល**។ ក្រុម $-CO-CH_3$ ត្រូវបានគេហៅថាក្រុម**អេតាណូអ៊ីល** ឬ **អាសេទីល** (អក្សរកាត់: Ac) ។ នៅពេលក្រុម $R-CO-$ ត្រូវបានហៅជាក្រុមជួស ពួកវាត្រូវបានគេហៅថា ក្រុម**អាល់កាណូអ៊ីល** ឬ **អាស៊ីល**។



អាស៊ីត2-មេតាណូអ៊ីលបង់សូអ៊ីច
(អាស៊ីត o-ផរមីលបង់សូអ៊ីច)



អាស៊ីត 4-អេតាណូអ៊ីលបង់សែនស៊ុលផូនិច
(អាស៊ីតp-អាសេទីលបង់សែនស៊ុលផូនិច)


លំហាត់អនុវត្ត ១៦.១ ៖

- ចូរហៅឈ្មោះ IUPAC របស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនទាំងអស់ដែលមានរូបមន្ត $C_5H_{10}O$ ។
- ចូរឱ្យទម្រង់ និងឈ្មោះ IUPAC រស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនទាំងអស់ដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុល C_8H_8O ។

៣. លក្ខណៈរូប

ក្រុមកាបូនីលជាក្រុមប៉ូលែមួយ ដូចនេះ អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងអ៊ីដ្រូកាបូ ដែលមានម៉ាសម៉ូលេគុលស្មើគ្នា។ ប៉ុន្តែ ដោយសារតែអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនមិនអាចមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ខ្លាំង *រវាងម៉ូ*


លេគុលពួកវា ពួកវាមានសីតុណ្ហភាពរំពុះទាបជាងអាល់កុលត្រូវគ្នា។ សមាសធាតុខាងក្រោម ដែល មានម៉ាសម៉ូលេគុលស្រដៀងគ្នា មានលក្ខណៈរូបដូចខាងក្រោម៖



លំហាត់អនុវត្ត ១៦.២ ៖ តើសមាសធាតុមួយណាក្នុងគូខាងក្រោមមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាង?


- ប៉ង់តាណាល់ ឬ 1-ប៉ង់តាណុល
- 2-ប៉ង់តាណុន ឬ 2-ប៉ង់តាណុល
- ប៉ង់តាន ឬ ប៉ង់តាណាល់
- អាសេតូផេណុន ឬ 2-ផេនីលអេតាណុល
- បង់សាល់ដេអ៊ីត ឬ បង់ស៊ីលអាល់កុល

អាតូមកាបូនអុកស៊ីសែនធ្វើឱ្យម៉ូលេគុលអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្លាំងជាមួយ ម៉ូលេគុលទឹក។ ជាលទ្ធផល អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនម៉ាសម៉ូលេគុលទាបមានកម្រិតរលាយល្អក្នុងទឹក។ អាសេតូន និងអាល់ដេអ៊ីតរលាយក្នុងទឹកគ្រប់សមាមាត្រ។




ការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាងម៉ូលេគុលទឹក និងសេតូន


តារាង១៦.១ បង្ហាញលក្ខណៈរូបរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនសំខាន់ៗមួយចំនួន។ អាល់ដេអ៊ីតខ្លះ ទទួលបានពីប្រភពធម្មជាតិមានក្លិនក្រអូបណាស់។ ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍បន្ថែម។



សាលីស៊ីឡាល់ដេអ៊ីត
(មានក្នុង meadowsweet)



ស៊ីត្រូនេឡាល់
(ក្លិនរបស់ក្រូចឆ្មារ)



ពីព័រ៉ូណាល់
(ក្លិនរបស់ hellotrope)


តារាង១៦.១ លក្ខណៈរូបរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

រូបមន្ត	ឈ្មោះ	m.p (°C)	b.p (°C)	កម្រិតរលាយ ក្នុងទឹក
HCHO	ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត	-92	-21	រលាយខ្លាំង
CH ₃ CHO	អាសេតាល់ដេអ៊ីត	-125	21	រលាយមិនកំណត់ (∞)
CH ₃ CH ₂ CHO	ប្រូប៉ាណាល់	-81	49	រលាយខ្លាំង
CH ₃ (CH ₂) ₂ CHO	ប៊ុយតាណាល់	-99	76	រលាយ
CH ₃ (CH ₂) ₃ CHO	ប៉ង់តាណាល់	-92	102	រលាយតិច
CH ₃ (CH ₂) ₄ CHO	អ៊ីចសាណាល់	-51	131	រលាយតិច
C ₆ H ₅ CHO	បង់សាល់ដេអ៊ីត	-26	178	រលាយតិច
C ₆ H ₅ CH ₂ CHO	ផេនីលអាសេតាល់ដេអ៊ីត	33	193	រលាយតិច
CH ₃ COCH ₃	អាសេតូន	-95	56.1	រលាយមិនកំណត់ (∞)
CH ₃ COCH ₂ CH ₃	ប៊ុយតាណូន	-86	80	រលាយខ្លាំង
CH ₃ COCH ₂ CH ₂ CH ₃	2-ប៉ង់តាណូន	-78	102	រលាយ
CH ₃ CH ₂ COCH ₂ CH ₃	3-ប៉ង់តាណូន	-39	102	រលាយ
C ₆ H ₅ COCH ₃	អាសេតូផេណូន	21	202	មិនរលាយ
C ₆ H ₅ COC ₆ H ₅	បង់សូផេណូន	48	306	មិនរលាយ


៤. ការសម្រេចរាល់ដេអ៊ីត

៤.១ រាល់ជេអ៊ីតដោយអ្នកស្ម័គ្រកម្មរាល់ក្នុង¹⁰


- ចំនួនអ្នកស្ថិតកម្មរបស់អាល់ដេអ៊ីតមួយស្ថិតនៅចន្លោះអាល់កុល¹⁰ និង អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច។



អាល់ដេអ៊ីតអាចទង្វើពីអាល់កុលថ្នាក់ទី១ដោយប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មSwern និងអុកស៊ីតកម្មជាពីរវិធីញ្ចូមក្នុងក្រ្រម៉ាត ($\text{C}_5\text{H}_5^+\text{NHCrO}_3\text{Cl}^-$) ឬ PCC៖




អ្នកស្ថិតក្នុងSwernអាចកុល¹⁰ ទៅជាអាចដេអ៊ីតមួយ



អ្នកស្ថិតកម្មPCCរបស់អាល់កុល1⁰ទៅជាអាល់ដេអ៊ីត


ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នៃការប្រើអុកស៊ីតកម្ម Swern និង PCC ក្នុងការសំយោគអាល់ដេអ៊ីត។



៤.២ អាល់ដេអ៊ីតដោយអូសូណូលីសអាល់សែន

- អាល់សែនអាចត្រូវបានបំប្លែងដោយប្រតិកម្មអូសូណូលីសនៃសម្ព័ន្ធពីរជាន់របស់វា។ ផលិតផលជាអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន។

ក្នុងមេរៀនទី៨យើងក៏បានឃើញអំពីរបៀបដែលដំណើរការនេះត្រូវបានប្រើក្នុងការកំណត់ទម្រង់។ ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមបង្ហាញការសំយោគអាល់ដេអ៊ីតដោយប្រតិកម្មអូសូណូលីសនៃអាល់សែន។



៤.៣ អាល់ដេអ៊ីតដោយដុកម្មនៃអាស៊ីតបុកស៊ីលីច អេស្តែរ និងស៊ីត្រីល

តាមទ្រឹស្តី គេអាចទង្វើអាល់ដេអ៊ីតដោយប្រតិកម្មដុកម្មនៃអាស៊ីតបុកស៊ីលីច។ តាមការអនុវត្តន៍វាមិនអាចទៅរួចដោយប្រើអាក់ទីបដូចជាលីចូម អាឡុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រីត ($LiAlH_4$ ឬ LAH)។ ទៅធ្វើដុកម្ម អាស៊ីតបុកស៊ីលីចតាមធម្មតាបានទេ។


- នៅពេលអាស៊ីតបុកស៊ីលីចយូរងប្រតិកម្មជាមួយ LAH វាត្រូវបានដុកម្មគ្រប់ផ្លូវទៅជាអាល់កុល 1° ។
- ការធ្វើដុកម្មនេះអាចកើតឡើង ដោយសារ LAH ជាភ្នាក់ងារដុកម្មខ្លាំងណាស់ ហើយអាល់ដេអ៊ីតត្រូវបានធ្វើដុកម្មយ៉ាងងាយ។

អាល់ដេអ៊ីតណាមួយដែលអាចត្រូវបានបង្កើតក្នុងល្បាយប្រតិកម្មត្រូវបានដុកម្មយ៉ាងរហ័សដោយ LAH បង្កើតអាល់កុល 1° ។




អាចកំណត់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសំយោគនេះ គឺមិនត្រូវប្រើអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចខ្លួនវាទេ ប៉ុន្តែ ត្រូវប្រើស្រឡាយរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចដែលងាយស្រួលរងអ៊ុកស៊ីដង និងស្រឡាយអាណូយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូ ដែលមានប្រតិកម្មខ្សោយជាង LAH ។

- អាស៊ីលក្លរ (ROCl) អេស្តេរ (RCO₂R') និងនីទ្រីល (RCN) ត្រូវបានទង្វើយ៉ាងងាយស្រួលពីអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច (មេរៀនទី១៧) ហើយពួកវាងាយស្រួលរងអ៊ុកស៊ីដង។
- ស្រឡាយអាណូយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូពីរដែលមានប្រតិកម្មភាពខ្សោយជាង LAH (ពីព្រោះពួកវាមាន រចនាសម្ព័ន្ធស្ថេរច្រើនជាង) គឺលីចូមទ្រីទែរ-ប៊ុយតុកស៊ីអាណូយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូ និង ឌីអ៊ីសូប៊ុយទីលអាមីនីញ៉ូមអ៊ីដ្រូ (DIBAL-H) ៖



លីចូមទ្រីទែរ-ប៊ុយតុកស៊ីអាណូយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូ ឌីអ៊ីសូប៊ុយទីលអាមីនីញ៉ូមអ៊ីដ្រូ (DIBAL-H)


- ដ្យាក្រាមខាងក្រោមសង្ខេបពីរបៀបដែលលីចូមទ្រីទែរ-ប៊ុយតុកស៊ីអាណូយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូ និង DIBAL-H អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីសំយោគអាល់ដេអ៊ីតពីស្រឡាយអាស៊ីត៖




ឥឡូវនេះ យើងសិក្សាលអត្ថបទសំយោគអាល់ដេអ៊ីតនីមួយៗ។

➢ **អាល់ដេអ៊ីតពីអាស៊ីលក្លរ៖** $\text{RCOCl} \rightarrow \text{RCHO}$

- អាស៊ីលក្លរអាចត្រូវបានរងអ៊ុកស៊ីដងទៅជាអាល់ដេអ៊ីតដោយធ្វើឱ្យប្រតិកម្មជាមួយ LiAlH[OC(CH₃)₃]₃ លីចូមទ្រីទែរ-ប៊ុយតុកស៊ីអាណូយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូនៅ -78°C ។
- អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចអាចត្រូវបានបម្លែងទៅជាអាស៊ីលក្លរដោយប្រើ SOCl₂ ។



ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងមួយ៖




3-មេតុកស៊ី-4-មេទីលបង់ស៊ីអ៊ីលក្លរួ

3-មេតុកស៊ី-4-មេទីលបង់សាល់ដេអ៊ីត


តាមចលនការប្រតិកម្ម ប្រតិកម្មបំប្លែងកើតឡើងដោយការផ្ទេរអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូមួយពីអាក្រូមអាលុយមីញ៉ូម ទៅកាបូនកាបូនីលរបស់អាស៊ីលក្លរួ។ បន្ទាប់មកប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសបង្កើតជាអាល់ដេអ៊ីត។

❖ ចលនការប្រតិកម្មបំប្លែងអាស៊ីលក្លរួទៅជាអាល់ដេអ៊ីតមួយ



ការបន្ថែមអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូមួយទៅកាបូន កាបូនីលធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មបំប្លែង

មានអំពើជាអាស៊ីតឡើយសម្រាប់ អាក្រូមអាលុយមីញ៉ូម ទទួលទ្វេតាមទ្រង់ពីអ៊ុកស៊ីសែន



អង្គធាតុកណ្តាលបាត់បង់អ៊ីយ៉ុងក្លរួមួយ នៅពេលមានជំនួសពីទ្វេតាមទ្រង់ របស់អ៊ុកស៊ីសែន


ប្រតិកម្មបូកទឹកធ្វើឱ្យមានអ៊ីដ្រូលីសលើកំផ្លិច អាលុយមីញ៉ូមនេះកើតឡើងបង្កើតអាល់ដេអ៊ីតមួយ

➢ អាល់ដេអ៊ីតពីអេស្តេរ និងនីត្រីលៈ $RCO_2R \rightarrow RCHO$ និង $RC \equiv N \rightarrow RCHO$

- ទាំងអេស្តេរ និងនីត្រីលអាចបំប្លែងបំប្លែងទៅជាអាល់ដេអ៊ីតដោយ DIBAL-H។

គេត្រូវតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យបរិមាណ DIBAL-H ដើម្បីរារាំងបំប្លែងកាបូនីលស្ទើរតែទាំងស្រុង ហើយបំប្លែងអេស្តេរត្រូវតែធ្វើនៅសីតុណ្ហភាពទាប។ បំប្លែងទាំងពីរនេះបង្កើតអង្គធាតុកណ្តាលស្ថេរភាពមួយដោយបូកអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូលីសកាបូនកាបូនីលរបស់អេស្តេរ ឬលើកាបូនរបស់ក្រុម $C \equiv N$ ។ អ៊ីដ្រូលីសអង្គធាតុកណ្តាលបង្កើតអាល់ដេអ៊ីត។ ដូច្នេះប្រតិកម្មត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

❖ ចលនការប្រតិកម្មបំប្លែងអេស្តេរទៅជាអាល់ដេអ៊ីត




អាតូមអាលុយមីញ៉ូមទទួលទ្វេតាមួយពីអ្នកស៊ីសែនកាបូនីលក្នុងប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាស ឡឺវីស

បន្ទុកអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូមួយទៅកាបូនកាបូនីលធ្វើឱ្យវាងអ៊ុកស៊ីត

បូកទឹកនៅចុងបញ្ចប់នៃប្រតិកម្ម អ៊ីដ្រូលីសកំផ្លិចអាលុយមីញ៉ូម និងបង្កើតអាល់ដេអ៊ីត

❖ ចលនការប្រតិកម្មអ៊ុកស៊ីតនីត្រីលទៅជាអាល់ដេអ៊ីត




អាតូមអាលុយមីញ៉ូមទទួលទ្វេតាមួយពីនីត្រីលក្នុងប្រតិកម្ម អាស៊ីត-បាសឡឺវីស

បន្ទុកអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូមួយទៅកាបូន នីត្រីលធ្វើឱ្យវាងអ៊ុកស៊ីត

ការបូកនៅចុងបញ្ចប់នៃប្រតិកម្មធ្វើ អ៊ីដ្រូលីសកំផ្លិចអាលុយមីញ៉ូម និងបង្កើតអាល់ដេអ៊ីតមួយ

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់លាក់នៃការសំយោគនេះ៖



លំហាត់អនុវត្តន៍ ១៦.៣ ៖ ចូរបង្ហាញពីរបៀបសំយោគប្រូប៉ាណាល់ពីសមាសធាតុខាងក្រោម៖


- 1-ប្រូប៉ាណាល
- អាស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ីច

៥. ការសំយោគសេតូន


៥.១ សេតូនពីអាល់សែន អាវ៉ែន និងអាល់កុលថ្នាក់ទី២

យើងបានឃើញវិធីសាស្ត្រប្រើសម្រាប់ទង្វើសេតូនក្នុងមេរៀនមុនៗ៖

1. សេតូន (និងអាល់ដេអ៊ីត) ដោយប្រតិកម្មអូសូណូលីសនៃអាល់សែន




2. សេតូនពីអាវ៉ែនដោយប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Craft ។ ឧទាហរណ៍៖




អាស់ត័លអាវីលសេតូន

ឧទាហរណ៍៖



ឌីអាវីលសេតូន



3. សេតូនពីអាស់កុលថ្នាក់ទី២ដោយប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម Swern និងវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត៖



៥.២ សេតូនពីនីត្រីល


ការដាក់នីត្រីល ($\text{R-C}\equiv\text{N}$) ជាមួយអេកាក់ទីប Grignard ឬ អេកាក់ទីបសរីរាង្គលីចូម បន្ទាប់មកធ្វើអ៊ីដ្រូលីស បង្កើតជាសេតូនមួយ៖

ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ចលនការប្រតិកម្មរបស់ដំណាក់កាលអ៊ីដ្រូលីស គឺបញ្ជ្រាសនឹងចលនការដែលយើងនឹងសិក្សាសម្រាប់ បង្កើតអ៊ីមីន ក្នុងផ្នែកទី៨។

ឧទាហរណ៍៖




2-ស្យ៉ាណូប្រូប៉ាន




2-មេទីល-1-ផេនីលប្រូប៉ាណូន
(អ៊ីសូប្រូពីលផេនីលសេតូន)

ទោះបីជានីត្រីលមានសម្ព័ន្ធបីជាន់មួយក៏ដោយ ប្រតិកម្មបូករ៉េអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ ឬលីចូមកើតឡើងតែម្តង ទេ។ មូលហេតុ៖ បើសិនជាវាកើតឡើងពីរដង ប្រតិកម្មនេះនឹងអាចធ្វើឱ្យមានបន្ទុកអវិជ្ជមានទ្វេដងលើ អាសូត។



ឌីអាញ៉ុងនេះមិនអាចកើតទេ


លំហាត់អនុវត្តន៍ ១៦.៤ ៖ ចូរឱ្យរ៉េអាក់ទីប និងអង្គធាតុកណ្តាលក្នុងការសំយោគនីមួយៗខាងក្រោម៖




៦. ប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូភីលលើសម្ព័ន្ធពីរបស់កាបូន-អុកស៊ីសែន

- ប្រតិកម្មកំណត់លក្ខណៈអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនជាប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូភីលលើសម្ព័ន្ធពីរ ជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែន។


ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍៖



អេមីសេតាល់



អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនងាយស្រួលទទួលប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូភីល ពីព្រោះលក្ខណៈទម្រង់ដែលយើងបានសិក្សាក្នុងមេរៀនទី១២ ហើយត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម៖




- បណ្តុះទីតាំងបង្កើតត្រីកោណនៃក្រុមជុំវិញអាតូមកាបូនកាបូនីលមានន័យថា អាតូមកាបូនកាបូនីលងាយស្រួលប្រយុទ្ធពីលើ ឬក្រោមនៃបង្ករបស់ក្រុមកាបូនីល (មើលខាងលើ)។
- បន្ទុកវិជ្ជមានលើអាតូមកាបូនកាបូនីលមានន័យថា វាអាចទទួលការប្រយុទ្ធពីនុយក្លេអូភីល។
- បន្ទុកវិជ្ជមានលើអាតូមអុកស៊ីសែនកាបូនីលមានន័យថា ប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូភីលអាចទទួលរងកាតាលីករអាស៊ីត។

ដូចនេះ ប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូភីល លើសម្ព័ន្ធពីជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែនកើតឡើងតាមផ្លូវទូទៅពីរ៖

១. នៅពេលអែក់ទីបជានុយក្លេអូភីលខ្លាំងមួយ (Nu^-) ប្រតិកម្មបូកតែងតែកើតឡើងតាមមធ្យោបាយខាងក្រោម (មើលចលនការខាងក្រោម) បម្លែងអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនបង្កើតត្រីកោណទៅជាផលិតផលចតុមុខ។

ក្នុងប្រតិកម្មបូកនេះ នុយក្លេអូភីលប្រើទ្វេតាអេឡិចត្រុងបង្កើតសម្ព័ន្ធជាមួយអាតូមកាបូនកាបូនីល។ នៅពេលប្រតិកម្មនេះកើតឡើង ទ្វេតាអេឡិចត្រុងរបស់សម្ព័ន្ធកាបូន-អុកស៊ីសែន រំកិលទៅកាន់ អាតូមអុកស៊ីសែន ហើយភាពអ៊ីប្រីតរបស់កាបូន និងអុកស៊ីសែនប្រែប្រួលពី sp^2 ទៅ sp^3 ។ **ទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃដំណាក់កាលនេះគឺជាលទ្ធភាពរបស់អាតូមអុកស៊ីសែនកាបូនីលក្នុងការទទួលទ្វេតាអេឡិចត្រុងរបស់សម្ព័ន្ធពីជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែន។**

❖ ចលនការប្រតិកម្មបូកនៃនុយក្លេអូភីលខ្លាំងលើអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូន




ក្នុងដំណាក់កាលនេះ នុយក្លេអូភីលបង្កើតសម្ព័ន្ធជាមួយកាបូនដោយឱ្យទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយទៅលើ ឬពីក្រោមនៃ ក្រុមកាបូនីល (គន្លង(a) ឬ (b))។ ទ្វេតាអេឡិចត្រុងរំកិលទៅកាន់អុកស៊ីសែន

ក្នុងដំណាក់កាលទី២ អុកស៊ីសែន អាល់កុកស៊ីតដកយកប្រូតុងមួយចេញពី H-Nu ឬ អាស៊ីតផ្សេងទៀត។

ក្នុងដំណាក់កាលទី២ អាតូមអុកស៊ីសែនទទួលប្រូតុងមួយ។ នេះកើតឡើង ពីព្រោះអាតូមអុកស៊ីសែនមាន ភាពកម្លាំងបានខ្លាំង វាមានបន្ទុកអវិជ្ជមានពេញលេញ ជាអាញ៉ុងអាល់កុកស៊ីតមួយ។


២. នៅពេលកាតាលីកអាស៊ីតមួយមានវត្តមាន ហើយនុយក្លេអូកីលខ្សោយ ប្រតិកម្មរបស់ អុកស៊ីសែន កាបូនីលជាមួយអាស៊ីតធ្វើឱ្យបង្កើនកម្លាំងអេឡិចត្រូកីលរបស់ក្រុមកាបូនីល។

❖ ចលនការប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលលើអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូន
ដំណាក់កាលទី១៖



ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ទ្វេតាអេឡិចត្រុងរបស់អុកស៊ីសែនកាបូនីលទទួលយកប្រូតុងមួយពីអាស៊ីត (ឬបន្សំជាមួយ អាស៊ីតឡឺវីស) បង្កើតកាចុងអុកសូនីញ៉ូមមួយ។ កាបូនរបស់កាចុងអុកសូនីញ៉ូមកាន់តែងាយស្រួលទទួល ការប្រយុទ្ធពីនុយក្លេអូកីលជាកាបូនីលរបស់សេតូនដើម។

ដំណាក់កាលទី២៖



ជាដំបូងកាចុងអុកសូនីញ៉ូមទទួលទ្វេតាអេឡិចត្រុងរបស់នុយក្លេអូកីល។ បន្ទាប់មក បានដកយកប្រូតុង មួយពីអាតូមបន្ទុកវិជ្ជមាន បង្កើតអាស៊ីតឡឺវីសវិញ។

ចលនការនេះកើតឡើងនៅពេលសមាសធាតុកាបូនីលត្រូវបានដាក់ជាមួយអាស៊ីតខ្លាំងក្រោមវត្តមាននុយ ក្លេអូកីលខ្សោយ។ ក្នុងដំណាក់កាលទី១ អាស៊ីតឱ្យប្រូតុងមួយទៅទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយរបស់អាតូមអុកស៊ីសែនកាបូនីល។ សមាសធាតុកាបូនីលដែលរងប្រូតុងកម្មច្រើន អ៊ីយ៉ុងអុកសូនីញ៉ូម មានប្រតិកម្មភាពចំពោះ ការប្រយុទ្ធនុយក្លេអូកីល លើអាតូមកាបូនកាបូនីល ពីព្រោះអាតូមកាបូនកាបូនីលមានបន្ទុកវិជ្ជមានធំជាងក្នុង ពេលវាមិនទាន់រងប្រូតុងកម្ម។

៦.១ លទ្ធភាពត្រលប់នៃប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលលើសម្ព័ន្ធពីជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែន

- ប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលលើសម្ព័ន្ធពីជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែនអាចត្រលប់វិញ។ ដូចនេះផលិតផល របស់ប្រតិកម្មនេះអាស្រ័យលើទីតាំងរបស់លំនឹង។

ប្រតិកម្មនេះផ្ទុយទៅនឹងប្រតិកម្មបូកអេឡិចត្រូកីលលើសម្ព័ន្ធពីជាន់កាបូន-កាបូន និងប្រតិកម្មជំនួស នុយ ក្លេអូកីលលើកាបូនផ្តុំត។ ប្រតិកម្មទាំងពីរនេះមានអាចត្រលប់វិញបានទេ ហើយលទ្ធផលជាតូនាទីរបស់ ល្បឿន ប្រតិកម្ម។


៦.២ ប្រតិកម្មភាព៖ អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

- ជាទូទៅ អាល់ដេអ៊ីតមានប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលខ្លាំងជាងសេតូន។ ទាំងកត្តាស្តេរិច និងកត្តា អេឡិចត្រុងសម្របសម្រួលឱ្យអាល់ដេអ៊ីត។


កត្តាស្តេរិច៖ ក្នុងអាល់ដេអ៊ីត ដែលមានក្រុមមួយជាអាតូមអ៊ីដ្រូសែន កាបូនមណ្ឌលរបស់ផលិតផលចតុមុខ ដែលក កើតពីអាល់ដេអ៊ីតមានរហ័សតិចជាង ហើយផលិតផលនេះមានស្ថេរភាពជាង។ ដូចនេះ ការកកើត ផលិតផលត្រូវ បានសម្របសម្រួលនៅលំនឹង។ ចំពោះសេតូន ក្រុមជួសអាល់គីលពីរលើកាបូនកាបូនីល ធ្វើឱ្យមានរហ័សលើកាបូន

កាបូនីលធ្វើឱ្យមានរបាំងស្តេរិចជុំវិញផលិតផលចតុមុខ និងធ្វើឱ្យវាកាន់តែអស់ ស្ថេរភាព។ ដូចនេះ កំហាប់តិចតួចនៃផលិតផលមានវត្តមានក្នុងលំនឹង។

កត្តាអេឡិចត្រុង៖ ដោយសារក្រុមអាល់គីលជាត្រូមឱ្យអេឡិចត្រុង អាល់ដេអ៊ីតក៏មានប្រតិកម្មភាពខ្លាំងដែលអាស្រ័យលើផលអេឡិចត្រុងផងដែរ។ អាល់ដេអ៊ីតមានក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុងតែមួយ ដែលធ្វើឱ្យវាណឺត និងបន្ស៊ប់បន្ទុកវិជ្ជមាននៅលើកាបូនកាបូនីល។ សេតូនមានក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុងពីរ និងត្រូវបានបន្ស៊ប់ខ្លាំងជាង។ ការបន្ស៊ប់កាន់តែខ្លាំងនេះសេតូន (ប្រតិករ) ធៀបទៅនឹងផលិតផលរបស់វា មានន័យថា ចេលំនឹងក្នុងការ កកើតផលិតផលចតុមុខពីសេតូនមួយគឺតូចជា ហើយប្រតិកម្មត្រូវបានសម្របសម្រួលតិចជាង៖



អាល់ដេអ៊ីត




សេតូន

កាបូនកាបូនីលសេតូនមានបន្ទុកវិជ្ជមានតិចជាង
ពីព្រោះវាមានក្រុមអាល់គីលឱ្យអេឡិចត្រុងពីរ

ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្រុមជួសទាញអេឡិចត្រុង (ដូចជា $-CF_3$, ឬ $-CCl_3$) ធ្វើឱ្យកាបូនកាបូនីលកាន់តែវិជ្ជមាន (ហើយសមាសធាតុផ្ដើមកាន់តែអស់ស្ថេរភាព) ធ្វើមានការសម្របសម្រួលប្រតិកម្មបូក។

៦.៣ ផលិតផលប្រតិកម្មបូកលេចទេប្រតិកម្មបន្ថយ

ប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលលើក្រុមកាបូនីលមួយបង្កើតផលិតផលមួយដែលមានស្ថេរភាព ក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិកម្មដែលយើងប្រើ។ បើសិនជាវាជាករណីដូចនេះ យើងអាចញែកសម្គាល់ផលិតផលដែលមានទម្រង់ទូទៅដូចខាងក្រោម៖



ក្នុងប្រតិកម្មផ្សេងទៀត ផលិតផលដែលកកើតដំបូងអាចមិនមានស្ថេរភាព និងអាចរងប្រតិកម្មបន្តបន្ទាប់ដោយឯកឯង។ ប្រតិកម្មសំខាន់មួយគឺ *ប្រតិកម្មបណ្តាច់* ។ ទោះបីជាផលិតផលប្រតិកម្មបូកដំបូងមានស្ថេរភាពយើងអាចឱ្យវារងប្រតិកម្មបន្តមួយតាមជម្រើសនៃលក្ខខណ្ឌប្រតិកម្មរបស់យើង។

លំហាត់អនុវត្តន៍ ១៦.៥ ៖ ប្រតិកម្មរបស់អាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនមួយជាមួយអ្នកកំទេចប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលលើសម្ព័ន្ធពីជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែន។

- តើប្រភេទគីមីណាជានុយក្លេអូកីល?
- ផ្នែកម៉ាញ៉េស្យូមរបស់អ្នកកំទេចប្រតិកម្មមានតួនាទីជាផ្នែកសំខាន់មួយក្នុងប្រតិកម្មនេះ។ តើជាតួនាទីអ្វី?
- តើផលិតផលណាមួយដែលកកើតដំបូង?
- តើផលិតផលណាដែលកកើត នៅពេលគេបន្ថែមទឹក?

លំហាត់អនុវត្តន៍ ១៦.៦ ៖ ប្រតិកម្មរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនជាមួយ $LiAlH_4$ និង $NaBH_4$ ជាប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលលើក្រុមកាបូនីល។ តើប្រភេទគីមីអ្វីជានុយក្លេអូកីលក្នុងប្រតិកម្មនេះ?


៧. ប្រតិកម្មបូករបស់អាល់កុល៖ អេមីអាសេតាល់ និងអាសេតាល់

- អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនមានប្រតិកម្មជាមួយអាល់កុលបង្កើតអេមីអាសេតាល់ (hemiacetals) និងអាសេតាល់ (acetals) ដោយប្រតិកម្មលំនឹងមួយ។

៧.១ អេមីអាសេតាល់

- លក្ខណៈទម្រង់សំខាន់របស់អេមីអាសេតាល់គឺក្រុម -OH និង -OR មួយចង់លើអាតូមកាបូនដូចគ្នា។ អេមីអាសេតាល់ដែលកើតពីប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូភីលនៃអុកស៊ីសែនរបស់អាល់កុលមួយលើកាបូនក្រុមកាបូនីលនៃអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូន។


❖ ចលនការប្រតិកម្មបង្កើតអេមីអាសេតាល់




ក្នុងដំណាក់កាលនេះ អាល់កុលប្រយុទ្ធកាបូនកាបូនីល

ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរមូលេគុលពីរ ប្រូតុងមួយត្រូវបានដកចេញពីអុកស៊ីសែនដែលមាន ហើយប្រូតុងមួយត្រូវបានទទួលនៅលើអុកស៊ីសែនអវិជ្ជមាន

- អេមីអាសេតាល់ខ្សែបើកមិនមានស្ថេរភាពគ្រប់គ្រាន់អាចឱ្យគេប្លែកវាចេញបានទេ។ ប៉ុន្តែអេមីអាសេតាល់ស្ថិតិចដែលមានសមាជិករង្វង់ តែងតែមានស្ថេរភាពជាង។




ស្ត្រេងរង្វង់តែទាំងអស់មានទម្រង់អេមីអាសេតាល់ស្ថិតិចមួយ។ ឧទាហរណ៍ ៖ គ្លុយកូស៖




(+) - គ្លុយកូស (អេមីអាសេតាល់ស្ថិតិចមួយ)

មិនថាប្រតិកម្មកាបូនីលជាអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូន ផលិតផលដែលមានក្រុម -OH និង -OR ត្រូវបាន គេហៅថា អេមីអាសេតាល់។



- ការកកើតអេមីអាសេតាល់ដេកាតាលីសដោយអាស៊ីត និងបាស។


❖ ចលនការប្រតិកម្មអេមីអាសេតាល់កាតាលីករអាស៊ីត



(R' អាចជា H)


ម៉ូលេគុលអាល់កុលមួយបូកលើកាបូនរបស់កាតុងអុកស៊ីត្យូម

ប្រូតុងកម្មលើអាតូមអុកស៊ីសែនអាល់ដេអ៊ីត
ឬសេតូនធ្វើឱ្យកាបូនកាបូនីលកាន់តែងាយ
ទទួលរង ការប្រយុទ្ធពីនុយក្លេអូភីល
(អាល់កុលរងប្រូតុងកម្មកើតពី ប្រតិកម្ម
របស់អាល់កុលជាមួយ កាតាលីករអាស៊ីត
ដូចជាឧស្ម័ន HCl)។



ការបន្ថែមប្រូតុងមួយពីអុកស៊ីសែនវិជ្ជមានទៅម៉ូលេគុលមួយទៀតរបស់ អាល់កុលនាំ
ឱ្យកើតអេមីអាសេតាល់


❖ ចលនការប្រតិកម្មបង្កើតអេមីអាសេតាល់កាតាលីករបាន



អាញ់ដាអាល់កុកស៊ីតមានអំពើជានុយក្លេអូភីលប្រយុទ្ធលើ
អាតូមកាបូនកាបូនីលទ្វេតាមដេអ៊ីតប្រូតុងមួយរំកិលទៅលើ
អាតូមអុកស៊ីសែន បង្កើតជាអាញ់ដា អាល់កុកស៊ីតថ្មីមួយ

អាញ់ដាអាល់កុកស៊ីតជកប្រូតុងមួយពីម៉ូលេគុលអាល់កុល បង្កើតអេមីអា
សេតាល់ និងបង្កើតអាញ់ដាអាល់កុកស៊ីតឡើងវិញ

អាល់ដេអ៊ីតអ៊ីដ្រាតេ: ចិម-ឌីអុល ៖ ការរំលាយអាល់ដេអ៊ីតមួយដូចជាអាសេតាល់ដេអ៊ីតក្នុងទឹកធ្វើឱ្យកើត លំនឹង
មួយរវាងអាល់ដេអ៊ីត និងអ៊ីដ្រាតេរបស់វា។ តាមពិតអ៊ីដ្រាតេនេះជា 1,1-ឌីអុល ហៅថា **ចិម-ឌីអុល**។




អាសេតាល់ដេអ៊ីត

អ៊ីដ្រាតេ (ចិម-ឌីអុល)

ចិម-ឌីអុលកកើតពីប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូភីលមួយរបស់ទឹកលើក្រុមកាបូនីលរបស់អាល់ដេអ៊ីត។

❖ ចលនការប្រតិកម្មបង្កើតអ៊ីដ្រាតេ




ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ទឹកប្រយុទ្ធ
លើអាតូមកាបូនកាបូនីល


ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរម៉ូលេគុលពីរ ប្រូតុងមួយត្រូវបានបាត់បង់ពីអាតូម
អុកស៊ីសែនវិជ្ជមាន ហើយអាតូម អុកស៊ីសែនអវិជ្ជមានចំណេញប្រូតុងមួយ

លំនឹងសម្រាប់ប្រតិកម្មបូកទឹកលើសេតូនស្ទើរគ្រប់ទាំងអស់មិនត្រូវបានសម្របសម្រួលទេ តែអាល់ដេអ៊ីត
ខ្លះ (ឧទាហរណ៍៖ ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត) ស្ថិតនៅក្នុងសូលុយស្យុងទឹកជាចិម-ឌីអុល។

គេមិនអាចព្យាករណ៍ចិម-ឌីអុលភាគច្រើនពីសូលុយស្យុងទឹកដែលពួកវាត្រូវបានកកើតទេ។ ឧទាហរណ៍ការ
រំហួតទឹកបានធ្វើឱ្យលំនឹងរំកិលទៅខាងស្តាំ ហើយ ចិម-ឌីអុលត្រូវបានបង្កើនទៅជាសមាសធាតុកាបូនីលវិញ៖



សមាសធាតុដែលមានក្រុមទាញអេឡិចត្រុងខ្លាំងចងជាមួយក្រុមកាបូនីល អាចបង្កើតចិម-ឌីអុល ស្ថេរភាពមួយ។ ឧទាហរណ៍មួយគឺសមាសធាតុហៅថា ក្លរ៉ាល់អ៊ីដ្រាតេ៖



ក្លរ៉ាល់អ៊ីដ្រាតេ


លំហាត់អនុវត្តន៍១៦.៧ ៖ ការរំលាយផែរម៉ាល់ដេអ៊ីតក្នុងទឹកបង្កើតជាសូលុយស្យុងមួយដែលមានចិម-ឌីអុល $\text{CH}_2(\text{OH})_2$ ។ ចូរបង្ហាញដំណាក់កាលក្នុងការកើតវាពីផែរម៉ាល់ដេអ៊ីត។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៦.៨ ៖ នៅពេលអាសេតូនត្រូវបានរំលាយក្នុងទឹកដែលមាន ^{18}O ជំនួស ^{16}O ធម្មតា អាសេតូនទទួល ^{18}O ហើយក្លាយជា $\text{CH}_3\text{C}^{18}\text{OCH}_3$ ។ ការកើតនៃសេតូនស្លាកអុកស៊ីសែននេះត្រូវបានរងកាតាឡីសដោយស្នាមអាស៊ីតខ្លាំង និងដោយបាសខ្លាំង (ដូចជា OH^-)។ ចូរសរសេរដំណាក់កាលពន្យល់ទាំងប្រតិកម្ម កាតាលីករអាស៊ីត និងប្រតិកម្មកាតាលីករបាស។


៧.២ អាសេតាល់

- អាសេតាល់មានក្រុម $-\text{OR}$ ពីរភ្ជាប់ជាមួយអាតូមកាបូនដូចគ្នា។

បើសិនជាយើងសូលុយស្យុងអាល់កុលនៃអាល់ដេអ៊ីត (ឬសេតូន) ហើយឱ្យឧស្ម័ន HCl ជាសឧស្ម័នអេមីអាសេតាល់មួយកកើត និងបន្ទាប់មកអេមីអាសេតាល់ប្រតិកម្មជាមួយម៉ូលទី២នៃអាល់កុលបង្កើតអាសេតាល់មួយ។




លំហាត់អនុវត្តន៍ ១៦.៩ ៖ ខាងក្រោមនេះជាទម្រង់របស់ស៊ីចក្រូស (ស្ករស)។ ស៊ីចក្រូសមានក្រុមអាសេតាល់ពីរ។ ចូរសម្គាល់ក្រុមទាំងពីរនេះ។






- ចលនការនៃការកើតអាសេតាល់ទាក់ទងនឹងការបង្កើតអេមីអាសេតាល់ ដោយកាតាលីករ អាស៊ីត បន្ទាប់មកប្រតិកម្មបណ្តាច់កាតាលីករអាស៊ីតនៃទឹក អនុលោមន៍ដោយប្រតិកម្មបូកទីពីរ របស់អាល់កុល និងការបាត់បង់ប្រូតុងមួយ។
- គ្រប់ដំណាក់កាលនៃការកើតអាសេតាល់ពីអាល់ដេអ៊ីតជាប្រតិកម្មទៅវិញទៅមក។

បើសិនជាយើងរំលាយអាល់ដេអ៊ីតមួយក្នុងអាល់កុលលើសមួយ ហើយបន្ថែមអាស៊ីតសុទ្ធតិចតួច (ឧទាហរណ៍ឧស្ម័ន HCl ឬ H₂SO₄ ខាប់) លំនឹងនឹងសម្របសម្រួលដល់ការកកើតអាសេតាល់មួយ។ បន្ទាប់ពីប្រតិកម្មឈានដល់លំនឹង យើងអាចញែកអាល់សេតាល់ដោយបន្សាបអាស៊ីត និងបំបាយអាល់កុលលើសចេញ។


បើសិនជាយើងដាក់អាសេតាល់នេះក្នុងទឹក ហើយបន្ថែមកាតាលីករអាស៊ីត ដំណាក់កាលទាំងអស់នឹងត្រលប់ក្រោយវិញ។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ (ទឹកលើស) លំនឹងសម្របសម្រួលឱ្យមានការកើតអាល់ដេអ៊ីតមួយ។ អាសេតាល់នេះងប្រតិកម្ម **អ៊ីដ្រូលីស**។



❖ ចលនការប្រតិកម្មបង្កើតអាសេតាល់កាតាលីករអាស៊ីត



ប្រូតុងកម្មនៃក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មបណ្តាច់នៃទឹក និងកកើតកាបូងអ៊ុកសូនីញ៉ូមសកម្មមួយ




ការប្រយុទ្ធលើកបូនរបស់អ៊ុយ៉ុងអ៊ុកសូនីញ៉ូមដោយម៉ូលេគុលអាល់កុលទី២ និងអនុលោមន៍ដោយការដកប្រូតុងមួយ ធ្វើឱ្យកកើតអាសេតាល់មួយ


លំហាត់អនុវត្តន៍១៦.១០៖ ចូរសរសេរចលនការលម្អិតនៃការកកើតអាសេតាល់ពីរបង់សាល់ដេអ៊ីតនិងមេតាណុល ក្រោមវត្តមានកាតាលីករអាស៊ីត។

📌 អាសេតាល់វង់

- ការកើតអាសេតាល់វង់ត្រូវបានសម្របសម្រួលនៅពេលសេតូន ឬអាល់ដេអ៊ីតមួយត្រូវបានដាក់ឱ្យរងប្រតិកម្មជាមួយ 1,2-ឌីអុលលើស និងស្នាមអាស៊ីតតិចតួច។



គេអាចធ្វើប្រតិកម្មនេះឱ្យត្រលប់មកក្រោយវិញដោយដាក់អាសេតាល់ជាមួយអាស៊ីតរ៉ាវ៖




ការកើតអាសេតាល់មិនត្រូវបានសម្របសម្រួលទេ នៅពេលសេតូនត្រូវបានដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្ម ជាមួយអាល់កុលងាយ និងឧស្ម័ន HCl។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៦.១១៖ ចូរសរសេរដំណាក់កាលទាំងអស់ក្នុងចលនការបង្កើតអាសេតាល់វង់មួយពីអាសេតូន និងអេទីឡែនឌីកុល (1,2-អេតានឌីអុល) ក្រោមវត្តមានឧស្ម័ន HCl។


៧.៣ ការប្រើអាសេតាល់ជាក្រុមការពារ

- ទោះបីអាសេតាល់វង់អ៊ីដ្រូលីសទៅជាអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនក្នុងអាស៊ីតរ៉ាវក៏ដោយ **អាសេតាល់មានស្ថេរភាពក្នុងសូលុយស្យុងបាស៖**




- អាសេតាល់ត្រូវបានប្រើការពារអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនពីប្រតិកម្មមិនចង់បានក្នុងសូលុយស្យុងបាស។ យើងអាចបង្កើនអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនមួយទៅជាអាសេតាល់មួយ ដោយធ្វើប្រតិកម្មលើផ្នែកមួយទៀតនៃម៉ូលេគុល ហើយបន្ទាប់មកធ្វើអ៊ីដ្រូលីសអាសេតាល់ក្នុងអាស៊ីតរ៉ាវ។

ជាឧទាហរណ៍ ចូរយើងពិចារណាលើបញ្ហានៃការបង្កើនពីសមាសធាតុ A ទៅសមាសធាតុ B ខាងក្រោម។




ក្រុមសេតូនត្រូវបានរងអ៊ីដ្រូលីសយ៉ាងងាយស្រួលជាក្រុមអេស្តែរ។ ភ្នាក់ងារអ៊ីដ្រូលីស (ដូចជា LiAlH_4 ឬ H_2/Ni) ដែលអាចធ្វើអ៊ីដ្រូលីសក្រុមអេស្តែរបស់សមាសធាតុ A អាចធ្វើអ៊ីដ្រូលីសក្រុមសេតូនផងដែរ។ ប៉ុន្តែ បើសិនជាយើងការពារក្រុមសេតូនដោយបង្កើនទៅជាអាសេតាល់វង់មួយ (ក្រុមអេស្តែរនេះមិនរងប្រតិកម្មទេ) យើងអាចធ្វើអ៊ីដ្រូលីសក្រុមអេស្តែរក្នុងសូលុយស្យុងបាស ដោយគ្មានឥទ្ធិពលលើអាសេតាល់វង់ទេ។ បន្ទាប់ ពីយើងបញ្ចប់ ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសអេស្តែរ យើងអាចធ្វើអ៊ីដ្រូលីសអាសេតាល់វង់នេះ និងទទួលបានផលិតផល B ដែលយើងចង់បាន៖



លំហាត់អនុវត្តន៍១៦.១២៖ តើផលិតផលអ្វីដែលអាចទទួលបាន បើសិន A ធ្វើប្រតិកម្មជាមួយលីចូមអាឡុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូសាយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតជាអាសេតាល់វែងមុន ?


លំហាត់អនុវត្តន៍១៦.១៣៖

- a. ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកអាចប្រើអាសេតាល់វែងមួយក្នុងការធ្វើបម្លែងខាងក្រោម៖



- b. ហេតុអ្វីបានជាប្រតិកម្មបូកផ្ទាល់នៃមេទីលម៉ាញ៉េស្យូមប្រើលើ A មិនអាចបង្កើត B ?


លំហាត់អនុវត្តន៍១៦.១៤៖ ឌីអ៊ីដ្រូពីរ៉ានប្រតិកម្មយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយអាល់កុលមួយក្រោមវត្តមានបរិមាណតិចតួចនៃឧស្ម័ន HCl ឬ H₂SO₄ រាវ ដើម្បីបង្កើត តេត្រាអ៊ីដ្រូពីរ៉ានីល (THP) អេទែរមួយ៖



- ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មនេះ។
- តេត្រាអ៊ីដ្រូពីរ៉ានីលអេទែរមានស្ថេរភាពក្នុងបាសរាវ ប៉ុន្តែឌីអ៊ីដ្រូពីរ៉ានីលយ៉ាងស្រួលក្នុងអាស៊ីតរាវ បង្កើតអាល់កុលដើម និងសមាសធាតុមួយទៀត។ ចូរពន្យល់។ តើសមាសធាតុមួយទៀតនោះជាអ្វី ?
- ក្រុមតេត្រាអ៊ីដ្រូពីរ៉ានីលអាចត្រូវបានប្រើជាក្រុមការពារអាល់កុល និងផេណុល។ ចូរបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការសំយោគ 5-មេទីល-1,5-អ៊ីចសាឌីអុលដោយផ្ដើមពី 4-ក្លរូ-1-ប៊ុយតាណុល។


៧.៤ ត្យូអាសេតាល់

- អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនប្រតិកម្មជាមួយត្យូលបង្កើតត្យូអាសេតាល់៖



ត្យូអាសេតាល់មានសារៈសំខាន់ក្នុងការសំយោគសរីរាង្គ ពីព្រោះពួកវាមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រូសែន និងនីកែលRaney បង្កើតអ៊ីដ្រូកាបូ។ នីកែលRaneyជាកាតាលីករនីកែលពិសេសមួយដែលមានអ៊ីដ្រូសែន។

- ការកើតត្យូអាសេតាល់ដោយប្រតិកម្មដេសុលផ្វូរីសាស្យុង (desulfurization) (ដកស្កាន់ជ័រ) ជាមួយអ៊ីដ្រូសែន និងនីកែលRaney ជាវិធីសាស្ត្រមួយអាចឱ្យយើងបម្លែងក្រុមកាបូនីលរបស់ អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនទៅជាក្រុម-CH₂៖



វិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលយើងបានសិក្សារួចហើយគឺប្រតិកម្មរេដុកម្មClemensen និងប្រតិកម្មរេដុកម្ម Wolff-Kishner។ ក្នុងផ្នែកទី៨.៣ យើងនឹងសិក្សាអំពីចលនការរបស់ប្រតិកម្មរេដុកម្ម Wolff-Kishner។


លំហាត់អនុវត្ត៩៦.១៥៖ ចូរបង្ហាញអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីការកើតត្យូអាសេតាល់ និងប្រតិកម្ម ដេសុលផ្វូរីសាស្យុងនីកែលRaney៖

- ស៊ីក្លូអ៊ីចសាណូនទៅជាស៊ីក្លូអ៊ីចសាន
- បង់សាល់ដេអ៊ីតទៅជាតូលុយអែន។

៨. ប្រតិកម្មប្រភេទអ៊ីមីនថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២


- អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនប្រតិកម្មជាមួយអាមីនថ្នាក់ទី១បង្កើតអ៊ីមីន (imines) ហើយមានប្រតិកម្ម ជាមួយអាមីនថ្នាក់ទី២បង្កើតអេណាមីន (enamines)។

អ៊ីមីនមានសម្ព័ន្ធពីជាន់កាបូន-អាសូតមួយ។ អេណាមីនមានក្រុមអាមីនមួយចងលើសម្ព័ន្ធពីជាន់កាបូន- កាបូន (ពួកវាត្រូវបានគេហៅថាអាល់សែនអាមីន)។



៨.១ អ៊ីមីន


សមីការទូទៅមួយនៃការកើតអ៊ីមីនពីអាមីនថ្នាក់ទី១ និងអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនមួយត្រូវបានបង្ហាញខាង ក្រោម។ ការកើតអ៊ីមីនត្រូវការកាតាលីករអាស៊ីត ហើយផលិតផលអាចកើតជាល្បាយនៃអ៊ីសូមែរ E និង Z៖



ជាទូទៅការកើតអ៊ីមីនកើតឡើងរហ័សបំផុតក្នុងចន្លោះ pH = 4 – 5 ហើយកើតឡើងយឺតនៅ pH ទាប និងខ្ពស់។ យើងអាចយល់អំពីមូលហេតុដែលកាតាលីករអាស៊ីតមានភាពចាំបាច់ បើសិនជាយើងពិចារណាលើ ចលនការថាត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់ការកើតអ៊ីមីន។ ដំណាក់កាលសំខាន់គឺជាដំណាក់កាលដែលអាមីណូ

អាល់កុលរងប្រតិកម្មបោះបង់ម៉ូលេគុលទឹកមួយក្លាយជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីមីញ៉ូម។ ដោយធ្វើប្រតិកម្មក្រុមអាល់កុល អាស៊ីតបង្កើនក្រុមចាក់ចេញអន់ (ក្រុម -OH) ទៅជាក្រុមចាក់ចេញល្អ (ក្រុម -OH₂⁺)។

➢ ចលនការប្រតិកម្មបង្កើតអ៊ីមីន




អាល់ដេអ៊ីតឬសេតូន អ៊ីមីន^{1°}

អាមីនបូកលើក្រុមកាបូនីលបង្កើតអង្គធាតុកណ្តាល ចតុមុខឌីប៉ូលមួយ

អង្គធាតុកណ្តាលឌីប៉ូល

បន្ទុកប្រតិកម្មអន្តរម៉ូលេគុលពីអាសូតទៅអ៊ុកស៊ីសែន បង្កើតអាមី ណូអាល់កុលមួយ

អាមីណូអាល់កុល



អាមីណូអាល់កុលរងប្រតិកម្ម

អ៊ីយ៉ុងអ៊ីមីញ៉ូម

អ៊ីមីន E និង Z

ប្រតិកម្មនៃអ៊ុកស៊ីសែនបង្កើតក្រុមចាក់ចេញល្អមួយ។

ការបាត់បង់ម៉ូលេគុលទឹកមួយបង្កើត អ៊ីយ៉ុងអ៊ីមីញ៉ូម

បន្ទុកប្រតិកម្មមួយទៅឱ្យទឹកបង្កើតអ៊ីមីន និងបង្កើត

អ៊ីយ៉ុងអ៊ីមីញ៉ូមកាតាលីករឡើងវិញ

ប្រតិកម្មដំណាក់កាលនៃកាន់តែយឺត បើសិនកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីមីញ៉ូមខ្ពស់ពេក ពីព្រោះប្រតិកម្មអាមីនខ្លួន វាកើតឡើង ដែលធ្វើឱ្យថយចុះនូវកំហាប់នុយក្លេអូតីលដែលត្រូវការក្នុងដំណាក់កាលទី១។ បើសិនកំហាប់អ៊ីយ៉ុង អ៊ីមីញ៉ូមទាបពេក ប្រតិកម្មកាន់តែយឺត ពីព្រោះកំហាប់អាមីណូអាល់កុលរងប្រតិកម្មកាន់តែទាប។ pH=4-5 ជា មជ្ឈដ្ឋានមានប្រសិទ្ធភាព។

ការកើតអ៊ីមីនកើតឡើងក្នុងប្រតិកម្មគីមីជីវៈ ពីព្រោះអង់ស៊ីមតែងតែប្រើក្រុម-NH₂ ប្រតិកម្មជាមួយអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូន។ សម្ព័ន្ធអ៊ីមីនមានសារសំខាន់ក្នុងគីមីជីវៈនៃពីរ៉ូដាល់ផូស្វាត (ដែលទាក់ទងនឹងវីតាមីន B₆)។

អ៊ីមីនក៏ត្រូវបានបង្កើតជាអង្គធាតុកណ្តាលក្នុងការសំយោគអាមីនក្នុងទីពិសោធន៍ ដែលយើងនឹងសិក្សាក្នុង មេរៀនទី២០។

៨.២ អុកស៊ីម និងអ៊ីប្រាសូន

- សមាសធាតុដូចជាអ៊ីប្រុកស៊ីឡាមីន (NH₂OH) អ៊ីប្រាស៊ីន (NH₂NH₂) និងអ៊ីប្រាស៊ីនជួស ដូចជាផេនីល អ៊ីប្រាស៊ីន (C₆H₅NHNH₂) និង 2,4-ឌីនីត្រូផេនីលអ៊ីប្រាស៊ីនបង្កើតស្រលាយC=N នៃ អាល់ដេអ៊ីត និង សេតូន។

ស្រលាយទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថាអុកស៊ីម អ៊ីប្រាសូន ផេនីលអ៊ីប្រាសូន និង 2,4-ឌីនីត្រូផេនីលអ៊ីប្រាសូន រៀងគ្នា។ ចលនការប្រតិកម្មបង្កើតស្រលាយ C=N ស្រដៀងគ្នានឹងចលនការប្រតិកម្មបង្កើតអ៊ីមីនពីអាមីនថ្នាក់ទី១ ដែរ។ ដូចអ៊ីមីនដែរ គេអាចទទួលបានអ៊ីសូមែរ E និង Zដែរ។

ជួនកាល អុកស៊ីមនិងស្រលាយអ៊ីប្រាសូនផ្សេងៗរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ កំណត់អត្តសញ្ញាណអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនមិនស្គាល់។ ស្រលាយទាំងនេះតែងតែជាសារធាតុរឹងមិនរលាយដែល មានចំណុចរលាយជាក់លាក់។ ចំណុចរលាយរបស់ស្រឡាយនៃសមាសធាតុមិនស្គាល់អាចត្រូវបានប្រៀបធៀប ជាមួយនឹងចំណុចរលាយស្រលាយដូចគ្នានៃសមាសធាតុស្គាល់ ឬប្រៀបធៀបជាមួយទិន្នន័យក្នុងតារាងយោង


ហើយតាមមូលដ្ឋាននេះ គេអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណសមាសធាតុមិនស្គាល់មួយ។ សៀវភៅពិសោធន៍គីមីសរីរាង្គ ស្ទើរតែទាំងអស់មានតារាងនៃចំណុចរលាយរបស់ស្រលាយទាំងនេះ។ ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រប្រៀបចំណុចរលាយមានសារប្រយោជន៍តែចំពោះសមាសធាតុមានចំណុចរលាយនៅក្នុងឯកសារយោងទេ។ វិធីសាស្ត្រស្បិច (ជាពិសេស IR, NMR និងស្បិចម៉ាស់) ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសមាសធាតុមិនស្គាល់ជាង។

បម្រើបម្រាស់សំខាន់មួយទៀតរបស់អ៊ីដ្រាសូនគឺប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាសូន Wolff-Kishner ដែលបានលើកឡើងក្នុងមេរៀនទី១៥ ហើយចលនការរបស់វាឃើងនឹងសិក្សាខាងក្រោម។


៨.៣ ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាសូន Wolff-Kishner

សេតូនមួយអាចត្រូវបានអ៊ីដ្រាសូនទៅជាក្រុមមេទីឡែនដោយប្រើប្រតិកម្ម Wolff-Kishner ដែលទាក់ទងនឹងការកម្តៅសេតូនជាមួយអ៊ីដ្រាស៊ីន និងបាស។ ចលនការប្រតិកម្ម Wolff-Kishner ទាក់ទងនឹងការកើតដំបូងនៃអ៊ីដ្រាសូន បន្ទាប់មកប្រតិកម្មតូតូមែរកម្ម និងបណ្តាច់អាសូត។ ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាសូន Wolff-Kishner ជាដៃគូនឹងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាសូន Clemmensen ដែលទាក់ទងនឹងអាស៊ីត ហើយជាដៃគូនឹងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាសូននៃឌីត្យូអាសេតាល់ ដែលទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាសូនសែនកម្មកតាលីស។

ឧទាហរណ៍ បង់សូផេណូនអាចត្រូវបានអ៊ីដ្រាសូនទៅជាឌីផេនីលមេតានដោយប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាសូន Wolff-Kishner ៖



➤ ចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាសូន Wolff-Kishner




អ៊ីដ្រាស៊ីនអ៊ីដ្រាសូនប្រតិកម្មជាមួយសមាសធាតុកាបូនីលបង្កើតអ៊ីដ្រាសូនមួយ

បាសធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មតូតូមែរកម្មប្រូតុងពីអាសូតទៅកាបូន

ប្រតិកម្មបណ្តាច់ N_2 បង្កើតកាប៉ាញ៉ុងមួយ បន្ទាប់មកវាប្រូតុងកម្ម

៨.៤ អែណាមីន


អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនប្រតិកម្មជាមួយអាមីនថ្នាក់ទី២បង្កើតអែណាមីន។ ខាងក្រោមនេះជាសមីការទូទៅក្នុងការបង្កើតអែណាមីន៖



ចលនការសម្រាប់ប្រតិកម្មនេះមាននៅផ្នែកខាងក្រោម។ ចូរកត់សម្គាល់ភាពខុសគ្នារវាងចលនការក្នុងការបង្កើតអ៊ីមីន និងចលនការក្នុងការបង្កើតអែណាមីននេះ។ ក្នុងការកើតអែណាមីន ដែលទាក់ទងនឹងអាមីនថ្នាក់ទី២ មិនមានការដកប្រូតុងមួយពីអាសូតក្នុងអង្គធាតុកណ្តាលកាបូនអ៊ីមីញ៉ូមទេ។ ដូចនេះ អ៊ីមីនណ្នាតមួយមិនអាចកើតបានទេ។ តែ ប្រូតុងមួយត្រូវបានដកចេញពីអាតូមកាបូននៅជាប់ក្រុមកាបូនីល ដែលធ្វើឱ្យកើតអែណាមីន។ យើងនឹងឃើញក្នុងមេរៀនទី១៨ ថាអែណាមីនមានសារប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធ កាបូន-កាបូន។

អាមីនថ្នាក់ទី៣មិនបង្កើតផលិតផលបូកស្ថេរភាពជាមួយអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន ពីព្រោះនៅលើអង្គធាតុកណ្តាលចតុមុខ បន្ទុកវិជ្ជមានដែលកើតមិនអាចធ្វើឱ្យណ្តាតដោយបោះបង់ប្រូតុងមួយទេ។


➤ ចលនការប្រតិកម្មបង្កើតអែណាមីន
ជំណាក់កាលទី១



អាមីនបូកលើកាបូនីលសេតូន ឬអាល់ដេអ៊ីតបង្កើតអាជាក់ចតុមុខមួយ។

ការបន្ថែមប្រូតុងអន្តរម៉ូលេគុលធ្វើឱ្យកើតអង្គធាតុអាមីណូអាល់កុល។


ជំណាក់កាលទី២



អង្គធាតុកណ្តាលអាមីណូអាល់កុលរងប្រូតុងកម្មដោយកាតាលីករអាស៊ីត។ ការចូលរួមនៃទ្វេតាអេឡិច

ត្រង់សេរីពីអាសូត និងការចាកចេញរបស់ម៉ូលេគុលទឹកបង្កើតអង្គធាតុកាបូនអ៊ីមីញ៉ូម

ជំណាក់កាលទី៣៖




ប្រូតុងមួយត្រូវបានដកពីកាបូននៅជាប់ក្រុមអ៊ីមីញ៉ូម។ ការដកប្រូតុងកើតឡើងពីកាបូន ពីព្រោះ គ្មានប្រូតុងដែលត្រូវបានដក ពីអាសូតរបស់កាបូនអ៊ីមីញ៉ូមទេ (ដូចដែលបានកើតឡើង បើសិនគេប្រើអាមីនថ្នាក់ទី១)។ ជំណាក់កាលនេះបង្កើតអែណាមីន ធ្វើឱ្យណ្តាតបន្ទុក និងបង្កើតកាតាលីករអាស៊ីតឡើងវិញ។


តារាង១៦.២ សង្ខេបប្រតិកម្មរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនជាមួយស្រលាយអាម៉ូញាក់។

តារាង១៦.២ ប្រតិកម្មរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនជាមួយស្រលាយអាម៉ូញាក់


1. ការកើតអ៊ីមីន ៖ ប្រតិកម្មជាមួយអាមីនថ្នាក់ទី១




2. ការកើតអុកស៊ីម ៖ ប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រុកស៊ីឡាមីន



3. ការកើតអ៊ីដ្រាសូននិងអ៊ីដ្រាសូនជួស៖ ប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រាស៊ីន ផេនីលអ៊ីដ្រាស៊ីននិង 2,4-ឌីនីត្រូផេនីលអ៊ីដ្រាស៊ីន (ស្រលាយនីមួយៗអាចបង្កើតអ៊ីសូមែរ E និង Z)




4. ការកើតអែណាមីន ៖ ប្រតិកម្មជាមួយអាមីនថ្នាក់ទី២




៩. ប្រតិកម្មបូកអ៊ីដ្រូសែនស្យាឡូ ៖ ស្យាឡូអ៊ីឌ្រីន

- អ៊ីដ្រូសែនស្យាឡូបូកលើក្រុមកាបូនីលនៃអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនស្ទើរតែទាំងអស់បង្កើតសមាសធាតុហៅថា ស្យាឡូអ៊ីឌ្រីន (cyanohydrins) (សេតូនដែលមានក្រុមកាបូនីលដែលមានរបាំងច្រើនមិនរងប្រតិកម្មនេះទេ)។



ស្យាណូអ៊ីឌ្រីនកកើតរហ័សជាងគេក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលអាញ់ស្យាណូមានវត្តមាន និងមានអំពើជានុយក្លេអូគីល។ ការប្រើប៉ូតាស្យូមស្យាណូ ឬបាសណាមួយដែលអាចបង្កើតអាញ់ស្យាណូពីHCN បានបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មបើប្រៀបធៀបនឹងការប្រើHCN តែឯង។ ប្រតិកម្មបូកអ៊ីដ្រូសែនស្យាណូលើក្រុមកាបូនីលខ្លួនវាយីត ពីព្រោះកម្លាំងអាស៊ីតរបស់HCNខ្សោយ ($pK_a=9$) ផ្តល់ឱ្យអាញ់ស្យាណូនុយក្លេអូគីលកំហាប់ទាប។ ខាងក្រោមនេះជាចលនការប្រតិកម្មបង្កើតស្យាណូអ៊ីឌ្រីនមួយ។

➢ ចលនការប្រតិកម្មបង្កើតស្យាណូអ៊ីឌ្រីន




គេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅពេលគេប្រើអ៊ីដ្រូសែនស្យាណូដោយសារតែវាមានកម្រិតខ្ពស់ និងកម្រិតហើរខ្ពស់ ប្រតិកម្មទាក់ទងនឹង HCN ត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្នុងទូសម្រប


ស្យាណូអ៊ីឌ្រីនជាអង្គធាតុមានប្រយោជន៍ក្នុងការសំយោគសរីរាង្គ ពីព្រោះពួកវាអាចត្រូវបានបម្លែងជាក្រុមបង្កំនាទីជាច្រើន។

- អ៊ីដ្រូសែនសមជ្ឈជ្ជានអាស៊ីតបម្លែងស្យាណូអ៊ីឌ្រីនទៅជាអាស៊ីត α -អ៊ីដ្រិកស៊ី ឬទៅជាអាស៊ីត α,β -មិនផ្អែត។

ចលនការប្រតិកម្មសម្រាប់ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែននេះនឹងត្រូវបានសិក្សាក្នុងមេរៀនទី១៧។ ការទង្វើអាស៊ីត α -អ៊ីដ្រិកស៊ីជាផ្នែកមួយនៃការសំយោគស្ត្រូកីលKiliani-Fischer:




- ដេកុម្មស្យាណូអ៊ីឌ្រីនមួយជាមួយលីចូមអាឡុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូសែន បង្កើត β -អាមីណូអាស់កុលមួយ៖



លំហាត់អនុវត្តន៍១៦.១៦៖


- ចូរបង្ហាញអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចបង្កើតអាស៊ីតឡាក់ទិចពីអាសេតាល់ដេអ៊ីត និងពីអង្គធាតុស្យាណូអ៊ីឌ្រីន។
- តើទម្រង់ស្តេរ៉េអូអ៊ីសូមែរបស់អាស៊ីតឡាក់ទិចណា ដែលអ្នករំពឹងថាទទួលបាន?



១០. ប្រតិកម្មបូករបស់អ៊ីល្ល័: ប្រតិកម្ម Wittig

- អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនប្រតិកម្មជាមួយផូស្វរអ៊ីល្លបង្កើតអាល់សែន និងទ្រីផេនីលផូស្វីន អុកស៊ីត (ផលិតផលបន្ទាប់បន្សំ)។ ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានគេហៅថាប្រតិកម្ម Wittig។

គេបានបង្ហាញថា ប្រតិកម្មWittigជាវិធីសាស្ត្រមានប្រយោជន៍ក្នុងការសំយោគអាល់សែន។ អ៊ីល្ល (ylides) ដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រតិកម្មនេះជាម៉ូលេគុលដែលគ្មានបន្ទុកសរុប ប៉ុន្តែវាជាម៉ូលេគុលដែលមានអាតូមកាបូនអវិជ្ជមានជាប់នឹងអេឡិចត្រូអាតូមវិជ្ជមានមួយ ហើយដែលក្នុងប្រតិកម្មWittig ជាអាតូមផូស្វរ។ ផូស្វរអ៊ីល្លក៏ត្រូវបានគេហៅថាផូស្វរ៉ានផងដែរ។




ប្រតិកម្មWittigអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះសមាសធាតុជាច្រើន ហើយទោះបីជាវាបង្កើតផលិតផលជាល្បាយនៃអ៊ីសូមែរ E និង Z ក៏ដោយ ប្រតិកម្មWittigផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការសំយោគអាល់សែនដោយជ្រើសរើសទីតាំងរបស់សម្ព័ន្ធពីជាន់ក្នុងផលិតផលច្បាស់លាស់ (ប្រតិកម្មនេះផ្ទុយពីប្រតិកម្មបណ្តាច់ ដែលឱ្យផលិតផលអាល់សែនច្រើន ដោយបណ្តូរទីតាំងទៅជាអង្គធាតុកាបូនចុងស្ថេរភាព ហើយទាំងប្រតិកម្មបណ្តាច់E1 និង E2 ដែលអាចបង្កើតផលិតផលច្រើននៅពេលមានអ៊ីដ្រូសែនβត្រូវបានដកចេញ)។


ផូស្វរអ៊ីល្លត្រូវបានទង្វើយ៉ាងងាយស្រួលពីទ្រីផេនីលផូស្វីន និងអាល់គីលអាឡូសែនថ្នាក់ទី១ ឬទី២។ ទង្វើរបស់ពួកវាទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មពីរ៖

ប្រតិកម្មទូទៅ

ប្រតិកម្មទី១៖




ប្រតិកម្មទី២៖




ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់៖

ប្រតិកម្មទី១៖




មេទីលទ្រីផេនីលផូស្វូរីនីញ៉ូមប្រូម (89%)

ប្រតិកម្មទី២៖




ប្រតិកម្មទី១ជាប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូកីល។ ទ្រីផេនីលផូស្វ័រជានុយក្លេអូកីលល្អ និងជាបាសខ្សោយមួយ។ វាមានប្រតិកម្មយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយអាល់គីលអាឡូសែន^{1°} និង ^{2°} ដោយចលនការប្រតិកម្ម S_N2 ដើម្បីជំនួសអ៊ីយ៉ុងអាឡូសែនមួយពីអាល់គីលអាឡូសែន បង្កើតជាអំបិលអាល់គីលទ្រីផេនីលផូស្វូរីនីញ៉ូម។ ប្រតិកម្មទី២ជាប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាស។ បាសខ្លាំងមួយ (តែងតែអាល់គីលលីចូម ឬផេនីលលីចូម) ដកយក ប្រូតុងមួយពីកាបូនដែលភ្ជាប់ជាមួយផូស្វ័របង្កើតជាអ៊ីល្ល។

ផូស្វ័រអ៊ីល្លអាចត្រូវបានតាងដោយអ៊ីប្រីតមួយនៃទម្រង់រេសូណង់ពីរដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។ ការគណនាមេកានិចកង់ទិចបញ្ជាក់ថាវាបាយដែលបង្កើតដោយទម្រង់ទី១មិនមានសារសំខាន់ទេ។




ការសិក្សាដោយ E. Vedejs (សាកលវិទ្យាល័យ Michigan) បញ្ជាក់ថា ប្រតិកម្មWittig កើតឡើងពីរដំណាក់កាល។ ក្នុងដំណាក់កាលទី១ (ខាងក្រោម) អាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនផ្គុំជាមួយអ៊ីល្លក្នុងប្រតិកម្មបូករវែងមួយបង្កើតរង្វង់៤អាតូមរបស់អុកសាផូស្វេតាន។ បន្ទាប់មក ក្នុងដំណាក់កាលទី២អុកសាផូស្វេតានបំបែកបង្កើតអាល់សែន និងទ្រីផេនីលផូស្វ័រអុកស៊ីត។ កម្លាំងជម្រុញប្រតិកម្មគឺការកើតសម្ព័ន្ធផូស្វ័រ-អុកស៊ីសែនខ្លាំង (DH⁰=540kJ mol⁻¹) ក្នុងទ្រីផេនីលផូស្វ័រអុកស៊ីត។

➤ ចលនការប្រតិកម្មWittig



ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់៖



មេទីឡែនស៊ីក្លូអ៊ីចសាន (86%)

នៅពេលការសំយោគ Wittig មានភាពស្មុគ្រស្មាញ តាមការអនុវត្ត ពួកគេងាយស្រួលធ្វើប្រតិកម្ម។ ដំណាក់កាលស្ទើរតែទាំងអស់អាចត្រូវបានធ្វើក្នុងដើងប្រតិកម្មដូចគ្នា ហើយការសំយោគទាំងមូលអាចសម្រេច ទៅបាន។ លទ្ធផលសរុបនៃការសំយោគ Wittig គឺ៖




១០.១ របៀបគ្រោងសំយោគWittig

ការគ្រោងសំយោគWittigមួយចាប់ផ្តើមពីការកត់សម្គាល់ក្នុងអាល់សែនចង់បាន ដែលអាចជាផ្នែករបស់អាល់ដេអ៊ីត ឬ សេតូន និងអាចជាផ្នែករបស់អ៊ីលួ។ ក្រុមRណាមួយ ឬទាំងអស់អាចជាអ៊ីដ្រូសែន ទោះបីផលិតផលល្អជាង នៅពេលមានយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមមួយជាអ៊ីដ្រូសែន។ ផ្នែកអាឡូសែនត្រូវតែជាអាឡូសែនថ្នាក់ទី១ ទី២ ឬមេទីលអាឡូសែន។

ឧទាហរណ៍៖ សំយោគ 2-មេទីល-ផេនីលប្រូ-1-អែន ដោយប្រើប្រតិកម្មWittigមួយ។ ចូរចាប់ផ្តើមពីការសរសេរការសំយោគត្រលប់។


យើងពិចារណាលើទម្រង់សមាសធាតុនេះ ដោយផ្ដោតសំខាន់លើក្រុមនៅសងខាងសម្ព័ន្ធពីរជាន់៖



2-មេទីល-ផេនីលប្រូ-1-អែន


យើងឃើញថា ការវិភាគសំយោគត្រលប់អាចមានដូចខាងក្រោម៖

ការវិភាគសំយោគត្រលប់៖




ការសំយោគ៖

ទៅតាមការវិភាគត្រលប់ (a) យើងចាប់ផ្តើមដោយការបង្កើតអ៊ីលួមួយពី 2-អាឡូប្រូប៉ាន ហើយបន្ទាប់ មក ឱ្យអ៊ីលួមានប្រតិកម្មជាមួយបង់សាល់ដេអ៊ីត៖



ទៅតាមការសំយោគត្រលប់ (b) យើងបង្កើតអ៊ីលីយ៉ាតបង់ស៊ីលអាឡូសែនមួយ ហើយឱ្យវាមានប្រតិកម្មជាមួយអាសេតូន៖




១០.២ ប្រតិកម្ម Horner-Wadsworth-Emmons ៖ ការបង្កើនប្រតិកម្ម Wittig

ប្រតិកម្ម Wittig ជាច្រើនជាប្រតិកម្មបង្កើន Horner-Wadsworth-Emmons។

- ប្រតិកម្ម Horner-Wadsworth-Emmons ទាក់ទងនឹងការប្រើអេស្ទែរផូស្វាតជំនួសអំបិលទ្រីផេនីលផូស្វូនីញ៉ូម។ ផលិតផលឧត្តមភាពតែងតែជាអ៊ីសូមែរ E។


បាសខ្លាំងដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតកាបាញ់អេស្ទែរផូស្វាត រួមមានសូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្រីយីត ប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូក្រីយីត និងប៊ូយទីលីត។ លំដាប់ប្រតិកម្មខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍មួយ៖

ជំណាក់កាលទី១




អេស្ទែរផូស្វាត


ជំណាក់កាលទី២៖




អេស្ទែរផូស្វាតត្រូវបានគេទង្វើដោយប្រតិកម្មរបស់ទ្រីអាស់គីលផូស្វូរ $[(RO)_3P]$ ជាមួយអាឡូសែនមួយ (ដំណើរការនេះហៅថាប្រតិកម្ម Arbuzov)។ ឧទាហរណ៍៖



លំហាត់អនុវត្ត៍១៦.១៧៖ ក្នុងប្រតិកម្មបូកទ្រទ្រង់លូផូស្វ័ន សន្មត់ថាអ្នកមានសារធាតុផ្ដើមដែលចាំបាច់ដូចជា អាល់ដេអ៊ីត សេតូន និងអាឡូសែន្សរីវាងៗ។ ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកអាចសំយោគអាល់សែននីមួយៗខាងក្រោម ដោយប្រើប្រតិកម្ម Wittig៖




លំហាត់អនុវត្ត៍១៦.១៨៖ ទ្រីផេនីលផូស្វ័នអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបម្លែងអេប៉ូកស៊ីតទៅជាអាល់សែន។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



១១. ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មអាល់ដេអ៊ីត


អាល់ដេអ៊ីតងាយរងអុកស៊ីតកម្មជាងសេតូន។ អាល់ដេអ៊ីតងាយអុកស៊ីតកម្មដោយភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មខ្លាំងដូចជាប៉ូតាស្យូមពែរម៉ង់កាណាត ហើយពួកវាក៏រងអុកស៊ីតកម្មដោយភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មខ្សោយដូចជាប្រាក់អុកស៊ីតផងដែរ៖



ចូរកត់សម្គាល់ថា ក្នុងប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មអាល់ដេអ៊ីតទាំងនេះ មានការបាត់បង់អ៊ីដ្រូសែនចងជាមួយ អាតូមកាបូនកាបូនីល។ ដោយសារតែសេតូនមិនមានអ៊ីដ្រូសែននេះ ពួកវាអាចធន់ទៅនឹងប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម បាន។ អាល់ដេអ៊ីតរងប្រតិកម្មយឺតដោយអុកស៊ីសែនក្នុងខ្យល់ ដូចនេះភាគសំណាកអាល់ដេអ៊ីតដែលស្តុកទុក តែងតែមានលាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចជាសារធាតុមិនសុទ្ធមួយ។

១២. អុកស៊ីតកម្ម Baeyer-Villiger

ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម Baeyer-Villiger ជាវិធីសាស្ត្រមានប្រយោជន៍មួយដើម្បីបម្លែងអាល់ដេអ៊ីត ឬ សេតូនទៅជាអេស្ទ័រ ដោយបញ្ចូលអាតូមអុកស៊ីសែនមួយពីអាស៊ីតពែរីកស៊ីកាបូកស៊ីលិច (RCO_3H)។ ឧទាហរណ៍ប្រតិកម្មរបស់អាសេតូផេណូនជាមួយអាស៊ីតពែរីកស៊ីកាបូកស៊ីលិចបម្លែងវាទៅជាអេស្ទ័រ ផេនីល អាសេតាត។




អាសេតូផេណូន


ផេនីលអាសេតាត

ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម Baeyer-Villiger ក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីសំយោគឡាក់តូន (អេស្ទេរ) ពីសេតូនដែរ។ អ្នករៀនសំខាន់មួយដែលបានប្រើដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម Baeyer-Villiger គឺ អាស៊ីតមេតា-ក្លរូពែរអុកស៊ីបង់សូអ៊ីច (*m*CPBA)។ គេក៏អាចប្រើអាស៊ីតពែរអុកស៊ីកាបូកស៊ីលិចផ្សេងទៀតផងដែរ។ ខាងក្រោម នេះជាចលនការប្រតិកម្មមួយរបស់ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម Baeyer-Villiger ។

➤ ចលនការប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម Baeyer-Villiger



អាស៊ីតពែរអុកស៊ីកាបូកស៊ីលិច (ដូចជា *m*CPBA ដែល Ar ជាក្រុម 3-ក្លរូផេនីល) ប្រយុទ្ធលើក្រុមកាបូនីល របស់សេតូន ឬអាល់ដេអ៊ីត បង្កើតអង្គធាតុកណ្តាលចតុមុខ



ក្រុមមួយដែលចង់សម្ព័ន្ធជាមួយសេតូន ឬអាល់ដេអ៊ីតដំបូងរំកិលទៅអុកស៊ីសែន បង្កើតអេស្ទេរ (ឬ ឡាក់តូន) ជាអាស៊ីតពែរអុកស៊ីកាបូកស៊ីលិចត្រូវបានបង្កើតដូចជា អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមួយ

ក្រុមដែលរំកិលពីកាបូនសេតូន ឬអាល់ដេអ៊ីតដើរទៅកាន់អុកស៊ីសែនរបស់អាស៊ីតពែរអុកស៊ីកាបូកស៊ីលិច មានតួនាទីជា **ក្រុមរំកិលល្អ** (migratory aptitude)។ ការសិក្សាត្រូវបានបង្ហាញថា ក្រុមរំកិលល្អមានលំដាប់ ៖ H> ផេនីល>អាល់គីល^{3°}> អាល់គីល^{2°}> អាល់គីល^{1°}> មេទីល។

លំហាត់អនុវត្ត៩៦.១៩៖ នៅពេលបងសាល់ដេអ៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតពែរអុកស៊ីមួយ ផលិតផលគឺ អាស៊ីតបង់សូអ៊ីច។ ចលនការរបស់ប្រតិកម្មនេះស្រដៀងគ្នានឹងចលនការរបស់ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មអាសេតូផេណូន ហើយលទ្ធផលបង្ហាញអំពីការរំកិលល្អរបស់អាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយទៅកាន់ផេនីល។ ចូរសរសេរដំណាក់កាលទាំងអស់របស់ចលនការនេះ។

លំហាត់អនុវត្ត៩៦.២០៖ ចូរឱ្យទម្រង់ផលិតផលដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម Baeyer-Villiger នៃ ស៊ី ក្លូប៉ង់តាណូន។

លំហាត់អនុវត្ត៩៦.២១៖ ចូរឱ្យផលិតផលឧត្តមភាពដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម Baeyer-Villiger នៃ 3-មេទីល-2-ប៊ុយតាណូន។


១៣. ការវិភាគគីមីនៃអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

១៣.១ ស្រលាយអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនអាចត្រូវបានញែកសម្គាល់ភាពខុសគ្នាពីសមាសធាតុមិនមែនកាបូនីលតាមរយៈប្រតិកម្មរបស់ពួកវាជាមួយស្រលាយអាម៉ូញាក់។ 2,4-ឌីនីត្រូផេនីលអ៊ីដ្រាស៊ីត (2,4-DNPH) និងអ៊ីដ្រុកស៊ីលអាមីនមានប្រតិកម្មជាមួយអាល់ដេអ៊ីតបង្កើតកក។ អុកស៊ីមតែងតែគ្មានពណ៌ តែ 2,4-ឌីនីត្រូផេនីលអ៊ីដ្រាស៊ីតមានពណ៌ទឹកក្រូច។ ចំណុចរលាយរបស់ស្រលាយទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្គាល់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន។

១៣.២ តេស្តតូឡង់ (Tollens' Test) (តេស្តកញ្ចក់ប្រាក់)

ភាពងាយស្រួលនៃប្រតិកម្មរបស់អាល់ដេអ៊ីតអាចញែកឱ្យខុសគ្នាពីសេតូនទាំងអស់។ ការលាយប្រាក់នីត្រាតជាមួយអាម៉ូញាក់បង្កើតសូលុយស្យុងមួយត្រូវបានគេហៅថា **រ៉េអាក់ទីបតូឡង់**។ រ៉េអាក់ទីបនេះមានអ៊ីយ៉ុងប្រាក់(I) ឌីអាមីណូ $\text{Ag}(\text{NH}_2)_2^+$ ។ ទោះបីជាអ៊ីយ៉ុងនេះជាភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មខ្សោយក៏ដោយ វាធ្វើអុកស៊ីតកម្មអាល់ដេអ៊ីតទៅជាអាញ់ដកាបូកស៊ីឡាត។ ដូចដែលវាធ្វើប្រតិកម្មដូចនេះ ប្រាក់រេអ៊ីដ្រុកស៊ីតពីចំនួនអុកស៊ីត1+ (នៃ $\text{Ag}(\text{NH}_2)_2^+$) ទៅជាលោហៈប្រាក់។ បើសិនជាប្រតិកម្មយឺត ហើយជញ្ជាំងរបស់បំពង់សាកស្អាត លោហៈប្រាក់កកលើជញ្ជាំងបំពង់សាកដូចជាកញ្ចក់មួយ បើមិនដូចនេះទេវាកកជាកករពណ៌ប្រផេះទៅខ្មៅ។ រ៉េអាក់ទីបតូឡង់ឱ្យលទ្ធផលអវិជ្ជមានជាមួយសេតូនទាំងអស់លើកលែងតែ α -អ៊ីដ្រុកស៊ីសេតូន៖





១៤. លក្ខណៈស្បៀងរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន


១៤.១ ស្បៀង IR របស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

- ក្រុមកាបូនីលរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនមានបង់សម្រូបខ្លាំងនៃ $\text{C}=\text{O}$ ក្នុងតំបន់ $1665-1780\text{cm}^{-1}$ ។ ទីតាំងពិតប្រាកដរបស់សម្រូប IR កាបូនីល (តារាង១៦.៣) អាស្រ័យលើទម្រង់របស់អាល់ដេអ៊ីត ឬ សេតូន ហើយជាសម្រូបមានប្រយោជន៍ និងកំណត់លក្ខណៈក្នុងស្បៀង IR។
- អាល់ដេអ៊ីតអាស៊ីតិចតែងមានសម្រូបនៅក្បែរ 1730cm^{-1} ស្រដៀងគ្នានឹងសេតូនដែលស្រូបនៅក្បែរ 1715cm^{-1} ។
- ភាពឆ្លាស់នៃក្រុមកាបូនីលជាមួយសម្ព័ន្ធពីរជាន់មួយ ឬរងបង់សែនមួយរំកិលសម្រូប $\text{C}=\text{O}$ ទៅកាន់ប្រេកង់ទាបជាងមុន 40cm^{-1} ។

តារាង១៦.៣ បង់សម្របកាបូនីលរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

ប្រេកង់ទំនាញសម្ព័ន្ធ C = O			
សមាសធាតុ	ចន្លោះ: (cm ⁻¹)	សមាសធាតុ	ចន្លោះ: (cm ⁻¹)
R-CHO	1720-1740	RCOR	1705-1720
Ar-CHO	1695-1715		1665-1680
	1680-1690	ស៊ីក្លូអ៊ីចសាណូន	1715
		ស៊ីក្លូប៉ង់តាណូន	1751
		ស៊ីក្លូហ៊ិយតាណូន	1785


ការរំកិលទៅកាន់ប្រេកង់ខ្ពស់នេះកើតឡើង ពីព្រោះសម្ព័ន្ធពីរជាន់កាបូនីលនៃសមាសធាតុឆ្លាស់មានលក្ខណៈសម្ព័ន្ធមួយជាន់ (មើលទម្រង់រេសូណង់ខាងក្រោម) និងសម្ព័ន្ធមួយងាយស្រួលទាញជាងសម្ព័ន្ធពីរ ជាន់។



ទីតាំងរបស់សម្របកាបូនីលរបស់សេតូនវែងអាស្រ័យលើទំហំរបស់វែង (ប្រៀបធៀបជាមួយសមាសធាតុវែងក្នុងតារាង១៦.៣)។ នៅពេលដែលវែងកាន់តែតូច ពិកទំនាញសម្ព័ន្ធ C=O រំកិលទៅប្រេកង់កាន់តែធំ។

ព្រំរបស់សម្ព័ន្ធ C-Hរបស់ក្រុមCHO របស់អាល់ដេអ៊ីតក៏ឱ្យបង់ពិកពីក្នុងតំបន់2700-2775cm⁻¹ និង 2820-2900cm⁻¹ ដែលងាយស្រួលសម្គាល់។

រូប១៦.១ បង្ហាញស្ទីច IR របស់ផេនីលអេតាណាល់។



រូប១៦.១ ស្ទីច IR របស់ផេនីលអេតាណាល់


១៤.២ ស្ប៉ិច NMR របស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

ក. ស្ប៉ិច ^{13}C NMR


- កាបូនកាបូនីលរបស់អាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនឱ្យស្ប៉ិច NMR ក្នុងតំបន់ $180\text{--}220\text{cm}^{-1}$ នៃស្ប៉ិច ^{13}C ។
ដោយសារតែគ្មានស៊ីញ៉ាល់ផ្សេងទៀតកើតឡើងក្នុងតំបន់នេះ វាមានរបស់ស៊ីញ៉ាល់មួយក្នុងតំបន់នេះ (ជិត $\delta=200$) បង្ហាញអំពីវត្តមានរបស់ក្រុមកាបូនីលមួយ។

ខ. ស្ប៉ិច ^1H NMR

- ប្រូតុងអាល់ដេអ៊ីតមួយឱ្យស៊ីញ៉ាល់ ^1H NMR ដែនក្រោមក្នុងតំបន់ $\delta=9\text{--}12$ ដែលជា តំបន់ដែលស្ទើរតែគ្រប់សមាសធាតុមិនមានសម្រប ដូចនេះ វាងាយស្រួលសម្គាល់ ដោយប្រើស្ប៉ិចនេះ។
ប្រូតុងអាល់ដេអ៊ីតរបស់អាល់ដេអ៊ីតអាស៊ីតជាទីបង្ហាញបង្កគូស្តីន-ស្តីនជាមួយប្រូតុងលើកាបូន α ហើយគំរូបំបែកពិកបង្ហាញកម្រិតជំនួសរបស់កាបូន α ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងអាសេតាល់ដេអ៊ីត (CH_3CHO) ស៊ីញ៉ាល់ប្រូតុងអាល់ដេអ៊ីតត្រូវបានបំបែកជាឌុបឆ្នែកដោយប្រូតុងអាល់ដេអ៊ីត។ ប៉ុន្តែ ថេរបង្កគូតូច (ប្រហែល 3Hz បើប្រៀបធៀបជាមួយការបំបែកស៊ីញ៉ាល់រីកដែលមាន ប្រហែល 7Hz)។
 - ប្រូតុងលើកាបូន α មិនត្រូវបានបាំងដោយក្រុមកាបូន និងស៊ីញ៉ាល់របស់ពួកវាបង្ហាញក្នុងតំបន់ $\delta=2.0\text{--}2.3$ ។
 - មេទីលសេតូនបង្ហាញស៊ីញ៉ាល់ត្រួត (3H) នៅ $\delta=2.1$ ។
- រូប១៦.២ និងរូប១៦.៣ បង្ហាញស្ប៉ិច ^1H និង ^{13}C របស់ផេនីលអេតាណាល់។



រូប១៦.២ ស្ប៉ិច ^1H NMR របស់ផេនីលអេតាណាល់។ បង្អួចរវាងប្រូតុងអាល់ដេអ៊ីត និងមេទីឡែន (2.6Hz) ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងផ្នែកពង្រីក។



រូប១៦.៣ ស្ត្រីច ^{13}C NMR របស់ផេនីលអេតាណាល់។ ព័ត៌មាន DEPT ^{13}C NMR និងការរកកាបូនត្រូវបានបង្ហាញក្បែរពិកនីមួយៗ

១៤.៣ ស្ត្រីចម៉ាសរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

ស្ត្រីចម៉ាសរបស់សេតូនតែងតែបង្ហាញពិកមួយត្រូវទៅនឹងអ៊ីយ៉ុងម៉ូលេគុល។ អាល់ដេអ៊ីតបង្កើតពិក $M^+ + 1$ ក្នុងស្ត្រីចម៉ាសពីបណ្តាញតាមអ៊ីដ្រូសែនអាល់ដេអ៊ីត។ សេតូនតែងតែរងបណ្តាច់ផ្នែកសងខាងនៃក្រុមកាបូនីលបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីលីញ៉ូម $\text{RC}\equiv\text{O}^+$ ដែល R អាចត្រូវជាក្រុមអាល់គីលពីផ្នែកទាំងពីរនៃកាបូនីលសេតូន។ បណ្តាច់តាមរយៈបណ្តាទីតាំង McLafferty ក៏អាចកើតមានក្នុងអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនមួយចំនួន។

១៤.៤ ស្ត្រីច UV

ក្រុមកាបូនីលរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនផ្តិតឱ្យបង់សម្របខ្សោយមួយក្នុងតំបន់ UV រវាង 270 និង 300 nm។ បង់នេះត្រូវបានកើតប្រព័ន្ធលើកវែង (300-350 nm) នៅពេលក្រុមកាបូនីលត្រូវបានធ្លាស់ជាមួយសម្ព័ន្ធពីរជាន់។


១៥. សង្ខេបប្រតិកម្មបូករបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

ប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនដែលកើតឡើងលើអាតូមកាបូនកាបូនីលដែលយើងបានសិក្សារួចហើយត្រូវបានសង្ខេបខាងក្រោម។ ក្នុងមេរៀនទី១៨ និង ១៩ យើងនឹងឃើញឧទាហរណ៍ ផ្សេងទៀត។


ប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីលរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

1. ប្រតិកម្មបូកសមាសធាតុសរីរាង្គលោហៈ


ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ដោយប្រើអ្នកកំទីបត្រីញ៉ាំង៖




2. ប្រតិកម្មបូកអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូ
ប្រតិកម្មទូទៅ




ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ដោយប្រើលោហៈអ៊ីដ្រូ




3. ប្រតិកម្មបូកអ៊ីដ្រូសែនស្យាង
ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់៖



4. ប្រតិកម្មរបស់អ៊ីល
ប្រតិកម្ម Wittig



5. ប្រតិកម្មបូកអាស័រកុល
ប្រតិកម្មទូទៅ៖




អេមីអាសេតាល់

អាសេតាល់


ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់៖



6. ប្រតិកម្មបូកនៃស្រលាយអាម៉ូញាក់
អ៊ីមីន៖



អែណាមីន៖



((((()))))))



លំហាត់មេរៀនទី១៦

ប្រតិកម្ម និងការហៅឈ្មោះ

១. ចូរឱ្យទម្រង់ និងឈ្មោះមួយទៀតរបស់សមាសធាតុខាងក្រោម៖

- a. ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត
- b. អាសេតាល់ដេអ៊ីត
- c. ផេនីលអាសេតាល់ដេអ៊ីត
- d. អាសេតូន
- e. អេទីលមេទីលសេតូន
- f. អាសេតូផេណូន
- g. បង់សូផេនូន
- h. សាលីស៊ីឡាល់ដេអ៊ីត
- i. វ៉ានីលីន
- j. ឌីអេទីលសេតូន
- k. អេទីលអ៊ីសូប្រូពីលសេតូន
- l. ឌីអ៊ីសូប្រូពីលសេតូន
- m. ឌីប៊ុយទីលសេតូន
- n. ឌីប្រូពីលសេតូន
- o. ស៊ីណាម៉ាល់ដេអ៊ីត

២. ចូរឱ្យរូបមន្តរបស់ផលិតផលដែលទទួលបាន នៅពេលប្រូប៉ាណាល់មានប្រតិកម្មជាមួយអ្នកកំទីបខាងក្រោម៖


- a. NaBH_4 ក្នុងសូលុយស្យុងទឹក NaOH
- b. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$ បន្ទាប់មក H_3O^+
- c. LiAlH_4 បន្ទាប់មក H_2O
- d. Ag_2O , HO^-
- e. $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{P}^+-\text{CH}_2^-$
- f. H_2 និង Pt
- g.  និង HA
- h. 
- i. $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$
- j. អ៊ីដ្រូស៊ីលឡាមីន
- k. ផេនីលអ៊ីដ្រាស៊ីន
- l. KMnO_4 រាវត្រជាក់
- m. , HA

n. HS-CH2-CH2-SH, HA, បន្ទាប់មកនីកែល Raney








o. *m*CPBA

៣. ចូរឱ្យទម្រង់របស់ផលិតផលដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មរបស់សេតូនជាមួយអ្នកកំណត់ទីបីមួយៗក្នុងលំហាត់ទី២។





៤. តើផលិតផលដែលអាចទទួលបាននៅពេលអាសេតូផេណូនប្រតិកម្មក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម?




អាសេតូផេណូន





៥. ចូរឱ្យផលិតផលសរីរាង្គរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖







៦. ចូរឱ្យផលិតផលឧត្តមភាពដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មខាងក្រោម៖






៧. ចូរឱ្យផលិតផលឧត្តមភាពពីប្រតិកម្មខាងក្រោម៖







៨. ចូរឱ្យអ្នកកំណត់ទីបំផុតដែលត្រូវការដើម្បីសម្រេចការបង្កើនប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



៩. ចូរសរសេរចលនការរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



១០. ចូរឱ្យដាក់ទីបំផែលត្រូវការដើម្បីសំយោគខាងក្រោម៖



ការសំយោគ

១១. ចូរសំយោគផេនីលប្រូពីលសេតូនពីបង់សែន និងវ៉េអាក់ទីបចាំបាច់ផ្សេងទៀត។

១២. ចូរឱ្យវិធីសាស្ត្រពីរសម្រាប់បង្កើនផេនីលប្រូពីលសេតូនទៅជាប៊ុយទីលបង់សែន។

១៣. ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកអាចបង្កើនបង់សាល់ដេអ៊ីតទៅជាសមាសធាតុខាងក្រោម។ អ្នកអាច ប្រើវ៉េអាក់ទីបំផែលត្រូវការ ហើយអ្នកអាចប្រើច្រើនដំណាក់កាល។

- បង់ស៊ីលអាល់កុល
- អាស៊ីតបង់សូអ៊ីច
- បង់សូអ៊ីលក្លរ
- បង់សូផេណូន
- 1-ផេនីលអេតាណុល
- 3-មេទីល-1-ផេនីល-1-ប៊ុយតាណុល
- បង់ស៊ីលប្រូម


- h. តូលុយអែន
- i. $C_6H_5CH(OCH_3)_2$
- j. $C_6H_5CH^{18}O$
- k. C_6H_5CHDOH
- l. $C_6H_5CH(OH)CN$
- m. $C_6H_5CH=NOH$
- n. $C_6H_5CH=NNHC_6H_5$
- o. $C_6H_5CH=CHCH=CH_2$

១៤. ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអេទីលផេនីលសេតូន ($C_6H_5COCH_2CH_3$) អាចត្រូវបានសំយោគពីសមាសធាតុខាងក្រោម៖


- a. បង់ស៊ីលអាល់កុល
- b. អាស៊ីតបង់សូអ៊ីច
- c. ផេនីលអេទីន
- d. ផេនីលអេតែន (ស្ទីរ៉េន)
- e. $C_6H_5CO_2CH_3$
- f. $C_6H_5C\equiv N$

ការទាញរកទម្រង់



១៥. ចូរឱ្យទម្រង់សមាសធាតុពី A ទៅ E



១៦. ដោយចាប់ផ្តើមពីបង់ស៊ីលប្រូម ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកអាចសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម៖



១៧. សមាសធាតុ Y និង Z ជាអ៊ីសូមែរដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុល $C_{10}H_{22}O$ ។ ស្តីពី IR របស់សមាសធាតុនីមួយៗបង្ហាញបង់សម្របខ្លាំងក្បែរ $1710cm^{-1}$ ។ ស្តីពី 1H NMR របស់ Y និង Z ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។ ចូរឱ្យទម្រង់ Y និង Z។




ψψψψψψψψ

សង្ខេបបទការប្រតិកម្ម


រោសតាល់ អ៊ីមីន និងអែណាមីន៖ បទការប្រែក្លាយការកើតដោយការស៊ីតិករណ៍នៃដេអ៊ីត និងសេតូន

ដំណាក់កាលជាច្រើនស្ទើរតែដូចគ្នាក្នុងប្រតិកម្មកាតាលីករអាស៊ីតនៃអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនជាមួយអាល់កុល និងអាមីន។ ប្រៀបធៀបបទលទ្ធការតាមទិសឈរ ដើម្បីឱ្យឃើញភាពស្រដៀងគ្នា និងភាពខុសគ្នា។ កត់សម្គាល់ភាពខុសគ្នាក្នុងការប្រឆាំងប្រឆាំងនៃបទលទ្ធការប្រភេទនីមួយៗរបស់ផលិតផល។


១. ការកើតអែរូសតាល់ និងរោសតាល់៖ ប្រតិកម្មជាមួយអាល់កុល



២. ការកើតអ៊ីមីន៖ ប្រតិកម្មជាមួយអេម៉ូញ៉ាក់




៣. ការកើតអែណាមីន៖ ប្រតិកម្មជាមួយអេមីន^២



សង្ខេបបទការប្រតិកម្ម

ប្រតិកម្មបូកតុល្យនៃអ៊ុកស៊ីត្យូមលើរោសដេអ៊ីត និងសេតូនក្រោមលក្ខខណ្ឌបាត

ប្រតិកម្មបូកតុល្យនៃអ៊ុកស៊ីត្យូមលើរោសដេអ៊ីត ឬសេតូន



ឧទាហរណ៍	នុយក្លេអ៊ីល	អនុផលិតផល	ផលិតផល
	H^-		
អ៊ីដ្រូ (ឧទាហរណ៍ NaBH4 ឬ LiAlH4)	$\text{Li}-\text{R}$		អាល់កុល(អដុកម្យ)
អាល់គីលលីច្យូម	$\text{XMg}-\text{R}$		អាល់កុល(ជាមួយការកើតសម្ព័ន្ធ C-C)
ដេអាក់ទីបត្រីញ៉ាដ	$\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}$		អាល់កុល(ជាមួយការកើតសម្ព័ន្ធ C-C)
អាញ់ឯអាល់ស៊ីន	$\text{C}\equiv\text{N}$		អាល់ស៊ីនអាល់កុល(ជាមួយការកើតសម្ព័ន្ធ C-C)
ស្យាតូ			ស្យាតូអ៊ីត្រីន






មេរៀនទី១៧

អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងស្រលាយរបស់វា

១. សេចក្តីផ្តើម

ក្រុមកាបូកស៊ីល (-CO₂H ឬ -COOH) ជាក្រុមបង្កនាទីក្នុងគីមី និងគីមីជីវៈ។ មិនមែនត្រឹមតែអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចដែលមានសារសំខាន់នោះទេ ក្រុមកាបូកស៊ីលជាក្រុមមេនៃស្រលាយសមាសធាតុជាច្រើនដែលគេហៅថាសមាសធាតុអាស៊ីលឬស្រលាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច ដូចដែលបង្ហាញក្នុងតារាង១៧.១ខាងក្រោម។

តារាង១៧.១ ស្រលាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច


ទម្រង់	ឈ្មោះ	ទម្រង់	ឈ្មោះ
	អាស៊ីលក្លរ		អាមីត
	អាស៊ីតអានីទ្រីត		
	អេស្តែរ		
	នីទ្រីល		

២. ការហៅឈ្មោះ និងលក្ខណៈរូប


២.១ អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច

- ឈ្មោះជំនួសនិងឈ្មោះជាប្រព័ន្ធរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចបានមកពីការលុបពាក្យខាងចុងអានរបស់ឈ្មោះអាល់កានដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងខ្សែវែងជាងក្នុងអាស៊ីត ហើយជំនួសដោយពាក្យអូអ៊ិច។ អាតូមកាបូនកាបូកស៊ីលត្រូវបានគេបង់លេខ 1។

ឧទាហរណ៍៖



អាស៊ីត 4-មេទិលអ៊ិចសាណូអ៊ិច



អាស៊ីត (E)-3-អ៊ិបតែណូអ៊ិច

ឬ អាស៊ីត (E)-អ៊ិប-3-អែណូអ៊ិច

អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមួយចំនួនមានឈ្មោះធម្មតាដែលបានមកពីភាសាឡាតាំង ឬភាសាក្រិចដែលបញ្ជាក់អំពីប្រភពរបស់ពួកវា។ អាស៊ីតមេតាណូអ៊ិចត្រូវវាងគេហៅថាអាស៊ីតផរមិច (ភាសាឡាតាំង៖ formica =ស្រមោច)។ អាស៊ីតអេតាណូអ៊ិចត្រូវបានគេហៅថា អាស៊ីតអាសេទិច (ភាសាឡាតាំង៖ acetum=ទឹកខ្មេះ)

។ អាស៊ីតប៊ុយតាណូអ៊ិចជាសមាសធាតុមួយដែលធ្វើឱ្យមានក្លិនរបស់បំរែឡើងខា ដូចនេះឈ្មោះធម្មតារបស់វា គឺអាស៊ីតប៊ុយទីរិច (ភាសាឡាតាំង៖ Butyrum= បំរែ)។ អាស៊ីតប៉ង់តាណូអ៊ិច កើតឡើងក្នុងស្បែកម្យ៉ាងហៅថា វ៉ាឡេរិច (valeric) ដូចនេះវាមានឈ្មោះអាស៊ីតវ៉ាឡេរិច។ អាស៊ីតអ៊ិចសាណូអ៊ិចជាសមាសធាតុមួយដែលធ្វើឱ្យ ពពែមានក្លិន ដូចនេះឈ្មោះធម្មតារបស់វាត្រូវបានហៅថា អាស៊ីតកាប្រូអ៊ិច (ឡាតាំង៖Caper=ពពែ)។ អាស៊ីត អុកតាដេកាណូអ៊ិចមានឈ្មោះធម្មតាជា អាស៊ីតស្តេអារិចបានមកពីពាក្យក្រិច stear មានន័យថាខ្លាញ់។

ឈ្មោះធម្មតាទាំងនេះត្រូវបានប្រើតាំងពីយូរយាណាស់មកហើយ ហើយខ្លះនៅតែត្រូវបានប្រើដដែល ដូចនេះវាមានប្រយោជន៍ដែលត្រូវស្គាល់វា។ ក្នុងសៀវភៅនេះ យើងនឹងប្រើពាក្យអាស៊ីតសម្ពមិចជំនួសឱ្យ អាស៊ីតមេតាណូអ៊ិច និងអាស៊ីតអាសេទិចជំនួសឱ្យអាស៊ីតអេតាណូអ៊ិច។ ប៉ុន្តែ ចំពោះសមាសធាតុភាគច្រើន ផ្សេងទៀត យើងនឹងប្រើឈ្មោះជំនួស ឬឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធ IUPAC។


អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចជាសមាសធាតុប៉ូលែ។ ម៉ូលេគុលរបស់ពួកវាអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្លាំង ជាមួយគ្នា និងជាមួយទឹក។ ដូចនេះជាទូទៅ អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមានសីតុណ្ហភាពរំពុះទាប ហើយអាស៊ីតកា បូកស៊ីលិចម៉ាសម៉ូលេគុលទាបមានកម្រិតរលាយល្អក្នុងទឹក។ នៅពេលខ្សែកាបូនកាន់តែវែង កម្រិតរលាយ ក្នុងទឹកកាន់តែថយចុះ។

២.២ អំបិលកាបូកស៊ីឡាត

អំបិលរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចត្រូវបានគេហៅឈ្មោះថា **អាត** ទាំងក្នុងឈ្មោះធម្មតា និងឈ្មោះ IUPACដែលពាក្យ**អាត**ជំនួសឱ្យពាក្យ**អាស៊ីត....អ៊ិច**។ ឈ្មោះរបស់កាចុងត្រូវដាក់ពីមុខអាញ៉ុងកាបូកស៊ីឡាត ដូចនេះ $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ ត្រូវបានគេហៅថាសូដ្យូមអាសេតាត ឬសូដ្យូមអេតាណូអាត។

អំបិលសូដ្យូម និងប៉ូតាស្យូមរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចរលាយក្នុងទឹកទាំងស្រុង ទោះបីជាអាស៊ីត កាបូកស៊ីលិចខ្សែវែងក៏រលាយក្នុងទឹកដែរ។ អំបិលសូដ្យូម ឬប៉ូតាស្យូមរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចខ្សែវែងជា គ្រឿងផ្សំសំខាន់របស់សាប៊ូ។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.១ ៖ ចូរឱ្យឈ្មោះរបស់សមាសធាតុខាងក្រោមតាមប្រព័ន្ធថាម IUPAC។




លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.២ ៖ ការពិសោធបង្ហាញថាម៉ាសម៉ូលេគុលរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចក្នុងផាសចំហាយ (លើចំណុចរំពុះ) ប្រហែល120។ ចូរពន្យល់អំពីមូលហេតុនៃទិន្នន័យពិសោធន៍ដោយប្រៀបធៀបជាមួយ ទិន្នន័យពិតដែលមានតែ 60។

២.៣ កម្លាំងអាស៊ីតរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច

អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមិនជួសស្ទើរតែទាំងអស់មានតម្លៃ K_a ក្នុងចន្លោះ 10^{-4} - 10^{-5} ($\text{p}K_a=4-5$) ។ $\text{p}K_a$ របស់ទឹកគឺ16 ហើយ $\text{p}K_a$ របស់ H_2CO_3 គឺ 7។ កម្លាំងអាស៊ីតទាំងនេះមានន័យថា អាស៊ីតអាចមានប្រតិកម្ម


ជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត និងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតបង្កើតអំបិលសូដ្យូមរលាយក្នុងទឹក។ ដូចនេះ យើងអាចប្រើតេស្តកម្រិតរលាយដើម្បីញែកអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចមិនរលាយក្នុងទឹកពីផេណុល និង អាល់កុលមិនរលាយក្នុង។

- អាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចមិនរលាយក្នុងទឹករលាយទាំងក្នុងសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត ឬ សូលុយស្យុងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាត។




- ផេណុលមិនរលាយក្នុងទឹករលាយក្នុងសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត (លើកលែងតែនីត្រូផេណុល) ប៉ុន្តែមិនរលាយក្នុងសូលុយស្យុងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតទេ។
- អាល់កុលមិនរលាយក្នុងទឹកមិនរលាយទាំងក្នុងសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត និងសូលុយស្យុងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាត។

អាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចដែលមានក្រុមទាញអេឡិចត្រុងមានកម្លាំងអាស៊ីតខ្លាំងជាអាស៊ីតមិនផ្តុត។
ឧទាហរណ៍ អាស៊ីតក្លរូអ៊ាសេទិចបង្ហាញលំដាប់នៃកម្លាំងអាស៊ីតខាងក្រោម៖




ដូចដែលយើងបានឃើញក្នុងមេរៀនទី៣៩ទី៣០លបង្កើនកម្លាំងអាស៊ីតរបស់ក្រុមទាញអេឡិចត្រុងបានមកពីការផ្លាស់ប្តូររវាងផលអាំងឌុចទីវី និងផលអង់ត្រូពី។ យើងអាចឃើញភាពមិនដៅកន្លែងនៃបន្ទុកតាមផលអាំងឌុចទីវី នៅពេលយើងប្រៀបធៀបគំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់អាញ៉ុងកាបូកស៊ីឡាតរបស់អាស៊ីតអាសេទិច និងទ្រីក្លរូអ៊ាសេទិចក្នុងរូប១៧.១។ គំរូទាំងនេះបង្ហាញបន្ទុកអវិជ្ជមានមានទីតាំងក្បែរក្រុមកាបូកស៊ីលអាសេតាតជាងក្រុមកាបូកស៊ីលទ្រីក្លរូអ៊ាសេតាត។ ការមិនដៅកន្លែងនៃបន្ទុកអវិជ្ជមានក្នុងទ្រីក្លរូ អាសេតាតដោយផលទាញអេឡិចត្រុងរបស់អាតូមក្លរទាំងបីរបស់វា ធ្វើឱ្យកម្លាំងអាស៊ីតខ្លាំងជាងអាស៊ីត អាសេទិច។

- ជាទូទៅ មានភាពមិនដៅកន្លែងនៃបន្ទុកកាន់តែច្រើនក្នុងបាសឆ្លាស់ អាញ៉ុងកាន់តែមានស្ថេរភាពហើយ អាស៊ីតកាន់តែខ្លាំង។




រូប១៧.១៖ គំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់អាញ៉ុងកាបូកស៊ីឡាតរបស់
(a) អាស៊ីតអាសេទិច (b) អាស៊ីតទ្រីក្លរូអ៊ាសេទិច។

ដោយសារតែផលអាំងឌុចទីវមិនត្រូវបានដាច់ខាតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមសម្ព័ន្ធក្បាលឡើយ ផលបង្កើនកម្លាំងអាស៊ីតចំពោះនៅពេលចម្ងាយរវាងក្រុមទាញអេឡិចត្រុង និងក្រុមកាបូកស៊ីលកើនឡើង។ ក្នុងចំណោមអាស៊ីតក្លរូប៊ីយតាណូអ៊ីចខាងក្រោមអាស៊ីតដែលខ្លាំងជាងគេគឺអាស៊ីត 2-ក្លរូប៊ីយតាណូអ៊ីច៖




អាស៊ីត2-ក្លរូប៊ីយតាណូអ៊ីច

pKa=2.85



អាស៊ីត3-ក្លរូប៊ីយតាណូអ៊ីច

pKa=4.05




អាស៊ីត4-ក្លរូប៊ីយតាណូអ៊ីច


pKa=4.50

លំហាត់អនុវត្ត៧.៣៖ តើអាស៊ីតមួយណាខ្លាំងជាង ក្នុងចំណោមគូអាស៊ីតខាងក្រោម៖


(a)




ឬ




(b)




ឬ




(c)




ឬ




(d)




ឬ



(e)






ឬ



២.៤ អាស៊ីតឌីកាបូកស៊ីលិច

អាស៊ីតឌីកាបូកស៊ីលិចត្រូវបានហៅឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធ IUPAC ថា អាស៊ីតអាល់កានឌីអ៊ុអ៊ីច។ អាស៊ីតឌីកាបូកស៊ីលិចងាយស្រួលតែទាំងអស់មានឈ្មោះធម្មតា (តារាង១៧.២)។


តារាង ១៧.២ ស្រទាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីនិច

ទម្រង់	ឈ្មោះធម្មតា	m.p (°C)	pKa (25°C)	
			pKa1	pKa2
$\text{HO}_2\text{C} - \text{CO}_2\text{H}$	អាស៊ីតអុកសាលិច	189	1.2	4.2
$\text{HO}_2\text{CCH}_2\text{CO}_2\text{H}$	អាស៊ីតម៉ាឡូអ៊ិច	136	2.9	5.7
$\text{HO}_2\text{C}(\text{CH}_2)_2\text{CO}_2\text{H}$	អាស៊ីតស៊ីយស៊ីនិច	187	4.2	5.6
$\text{HO}_2\text{C}(\text{CH}_2)_3\text{CO}_2\text{H}$	អាស៊ីតគ្លុយតារិច	98	4.3	5.4
$\text{HO}_2\text{C}(\text{CH}_2)_4\text{CO}_2\text{H}$	អាស៊ីតអាឌីពិច	153	4.4	5.6
ស៊ីស- $\text{HO}_2\text{C}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CO}_2\text{H}$	អាស៊ីតម៉ាឡេអ៊ិច	131	1.9	6.1
ត្រង់- $\text{HO}_2\text{C}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CO}_2\text{H}$	អាស៊ីតផ្ទួម៉ារិច	287	3.0	4.4
	អាស៊ីតផ្តាលិច	206-208	2.9	5.4
	អាស៊ីតអ៊ីសូផ្តាលិច	345-348	3.5	4.6
	អាស៊ីតតេរេផ្តាលិច	រំហើរ	3.5	4.8


២.៥ អេស្តែរ

ឈ្មោះរបស់អេស្តែរទទួលបានពីឈ្មោះរបស់អាល់កុល (បញ្ចប់ដោយអ៊ីល) និងឈ្មោះរបស់អាស៊ីត (បញ្ចប់ដោយអាត ឬ អូអាត)។ គេតែងសរសេរឈ្មោះដែលបានពីអាល់កុលមុន៖






មេទីលp-ក្លរ៉ូបង់សូអាត




ឌីអេទីលម៉ាឡូណាត

អេស្ត័រជាសមាសធាតុប៉ូលែ ប៉ុន្តែដោយកង្វះអ៊ីដ្រូសែនលើអុកស៊ីសែន ម៉ូលេគុលមិនអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្លាំងជាមួយគ្នាទេ។ ដូចនេះ អេស្ត័រមានចំណុចរំពុះទាបជាងអាស៊ីត និងអាល់កុលប៊ីម៉ាស ម៉ូលេគុលប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ចំណុចរំពុះរបស់អេស្ត័រប្រហាក់ប្រហែលនឹងចំណុចរំពុះរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន។

មិនដូចអាស៊ីតម៉ាសម៉ូលេគុលទាបទេ អេស្ត័រតែងតែមានក្លិនក្រអូប ខ្លះមានក្លិនដូចផ្លែឈើ ហើយពួកវាត្រូវបានប្រើក្នុងការផលិតផលរសជាតិសំយោគ៖




អ៊ីសូប៉ង់ទីអាសេត
(ប្រើសម្រាប់បង្កើតរសជាតិចេក)




អ៊ីសូប៉ង់ទីលប៉ង់តាណូអាត
(ប្រើសម្រាប់បង្កើតរសជាតិប៉ោម)

២.៦ អានីត្រីតកាបូកស៊ីលីច


អានីត្រីតស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានហៅឈ្មោះដោយលុបពាក្យអាស៊ីត ពីឈ្មោះរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលីច ហើយបន្ទាប់មកបន្ថែមពាក្យថា អានីត្រីត៖




អានីត្រីតអាសេទិច
(អានីត្រីតអេតាណូអ៊ីច)
mp = -73°C



អានីត្រីតស៊ុយស៊ីនិច
mp = 121°C




អានីត្រីតផ្កាលិច
mp=131°C




អានីត្រីតម៉ាឡេអ៊ីច
mp=53°C

២.៧ អាស៊ីលក្លរួ


គេហៅអាស៊ីលក្លរួថាអាស៊ីតក្លរួ។ គេហៅឈ្មោះពួកវាដោយលុបពាក្យ អាស៊ីត ...អ៊ីចពីឈ្មោះរបស់អាស៊ីត បន្ទាប់មកបន្ថែមពីល -អ៊ីលក្លរួ។ ឧទាហរណ៍៖



អាសេទីលក្លរួ ឬអេតាណូអ៊ីលក្លរួ
mp = -112°C , bp=51°C



ប្រូប៉ាណូអ៊ីលក្លរួ
mp=-94°C, bp=80°C




បង់សូអ៊ីលក្លរួ
mp=-1°C, bp=197°C


អាស៊ីលក្លរួ និងអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមានចំណុចរំពុះក្នុងចន្លោះដូចគ្នានឹងអេស្តេរ បើមានម៉ាសមូលេគុលប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។

២.៨ អាមីត


អាមីតដែលគ្មានក្រុមជួសលើអាសូតត្រូវបានគេហៅឈ្មោះដោយលុប អាស៊ីត...អ៊ីច ចេញពីឈ្មោះធម្មតារបស់អាស៊ីត (ឬ អាស៊ីត...អ៊ីចពីឈ្មោះជំនួស) ហើយដាក់ពាក្យថា អាមីត។ ក្រុមអាល់គីលនៅលើអាតូមអាសូតត្រូវបានគេហៅឈ្មោះជាក្រុមជួស ហើយក្រុមជួសទាំងនេះត្រូវបានដាក់ពីមុខដោយអក្សរ N- ឬ N,N-។ ឧទាហរណ៍៖




អាសេតាមីត (អេតាណាមីត)
mp=82°C , bp=221°C




N,N-ឌីមេទីលអាសេតាមីត
mp=-20°C , bp=166°C



N-អេទីលអាសេតាមីត
bp=205°C



N-ផេនីល-N-ប្រូពីលអាសេតាមីត
mp=49°C , bp=226°Cនៅ 712torr




បង់សាមីត
mp=130°C , bp=290°C


- អាមីតដែលមានអាតូមអាសូតចងអាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយ ឬពីរអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្លាំងនឹងគ្នា។ អាមីតមានចំណុចរំពុះ និងចំណុចរលាយខ្ពស់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត មូលេគុលរបស់ អាមីតN,N-ឌីជំនួសមិនអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្លាំងជាមួយគ្នា ពួកវាមានចំណុចរំពុះ និងចំណុចរលាយទាប។ ទិន្នន័យនៃចំណុចរំពុះ និងចំណុចរលាយដែលបានលើកឡើងខាងលើទៅអំពីទំនោរនេះ។

- ការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាងក្រុមអាមីតមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងមធ្យោបាយដែលប្រូតេអ៊ីន និងប៊ុបទីតបត់បង្កើតជាទម្រង់របស់ពួកវា។

ប្រូតេអ៊ីន និងប៊ុបទីត(ប្រូតេអ៊ីនខ្លី) ជាប៉ូលីមែររបស់អាស៊ីតអាមីនដែលចងសម្ព័ន្ធដោយក្រុមអាមីត។ ទម្រង់សំខាន់មួយនៃទម្រង់របស់ប្រូតេអ៊ីនជាច្រើនគឺទម្រង់បន្ទះβ (β sheet) ដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម៖




ការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន (ចំណុច) រវាងមូលេគុលអាមីត



ការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាងក្រុមអាមីតរបស់ខ្សែប៊ុបទីត។ អន្តរកម្មរវាង ខ្សែទាំងនេះ (ហៅថាបន្ទះβ) មានសារៈសំខាន់ចំពោះទម្រង់ប្រូតេអ៊ីន

២.៩ នីត្រីល

អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចអាចត្រូវបានបម្លែងទៅជានីត្រីល និងប្រាសមកវិញ។ ក្នុងការហៅឈ្មោះ IUPAC នីត្រីលអាស៊ីតត្រូវបានហៅឈ្មោះដោយបូកដាក់មជ្ឈិមបទ **-នីត្រីល** ទៅលើឈ្មោះអ៊ីដ្រូកាបូដែលត្រូវគ្នា។ អាតូមកាបូនរបស់ក្រុម-C≡N ត្រូវបានបង់លេខ1។ ឧទាហរណ៍របស់នីត្រីលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងមេរៀនទី២ រួចហើយ។ ឈ្មោះ អាសេតូនីត្រីលជាឈ្មោះធម្មតាដែលគេទទួលស្គាល់របស់ CH_3CN និងអាគ្រីឡូនីត្រីលជាឈ្មោះធម្មតាដែលគេទទួលស្គាល់របស់ $\text{CH}_2=\text{CHCN}$ ៖



អេតានីត្រីល

ប្រូប៉ែនីត្រីល

(អាសេតូនីត្រីល)

(អាគ្រីឡូនីត្រីល)

លំហាត់អនុវត្ត៩៧.៤៖ ចូរគូរទម្រង់របស់សមាសធាតុខាងក្រោម៖

- មេទីលប្រូប៉ាណូអាត
- អេទីល p-នីត្រូបង់សូអាត
- ឌីមេទីលម៉ាឡូអាត
- N,N-ឌីមេទីលបង់សាមីត
- បង់តានីត្រីល
- ឌីមេទីលផ្កាឡាត
- ឌីប្រូពីលម៉ាឡូអាត
- N,N-ឌីមេទីលផេរ៉ាត
- 2-ប្រូម៉ូប្រូប៉ាណូអ៊ីលប្រូម
- ឌីអេទីលស៊ីស៊ីណាត

២.១០ លក្ខណៈស្បៀងរបស់សមាសធាតុអាស៊ីល

ក. ស្បៀង IR

អាំងប្រាស្បៀងត្រួសត្រូវមានសារសំខាន់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងស្រលាយរបស់វា។ បង់ទំនាញសម្ព័ន្ធ $\text{C}=\text{O}$ ជាស្បៀង IR លេចធ្លោជាងគេមួយ ដោយសារតែវាជាបង់ខ្លាំងមួយ។ រូប ១៧.២ បង្ហាញពីទីតាំងរបស់បង់របស់សមាសធាតុអាស៊ីលស្ទើរតែទាំងអស់។

- បង់ទំនាញសម្ព័ន្ធ $\text{C}=\text{O}$ កើតឡើងនៅប្រេកង់ខុសគ្នាសម្រាប់អាស៊ីត អេស្ទែរ និងអាមីត ហើយទីតាំងជាក់លាក់របស់វាតែងតែមានប្រយោជន៍ក្នុងការកំណត់ទម្រង់សមាសធាតុ។
- ភាពធ្លាស់ និងក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុងដែលចងសម្ព័ន្ធលើកាបូនីលរំកិលទីតាំងនៃសម្រូប $\text{C}=\text{O}$ ទៅកាន់ប្រេកង់ទាបជាង។


ក្រុមមុខនាទី	ប្រេកង់ (cm ⁻¹)	1840	1820	1800	1780	1760	1740	1720	1700	1680	1660	1640	1620	1600
អាស៊ីតក្លរ	1815–1785 1800–1770 (conj.)													
អាស៊ីតអានីទ្រីត	1820–1750 1775–1720 (conj.)													
អេស្តែរ/ឡាក់តូន	1750–1735 1730–1715 (conj.)													
អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច	~1760 or 1720–1705 1710–1680 (conj.)													
អាល់ដេអ៊ីត	1740–1720 1710–1685 (conj.)													
អាមីត/ឡាក់តាម	1720–1710 1685–1665 (conj.)													
សេតូន	1700–1620													
អំបិលកាបូកស៊ីឡាត	1650–1550													

រូប១៧.២ ប្រេកង់សម្រប IR កាបូនីល

- ក្រុមទាញអេឡិចត្រុងចងសម្ព័ន្ធលេកាបូនលរេកលសម្រប C=O ទៅប្រេកង់ខ្ពស់ជាង។
- ក្រុមអ៊ីដ្រូកស៊ីលរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចក៏ឱ្យពិកធម្មយក្នុងតំបន់ 2500-3100cm⁻¹ ដែកបានមកពីរំញ័រនៃទំនាញសម្ព័ន្ធ O—H ។
- រំញ័រទំនាញសម្ព័ន្ធ N—H របស់អាមីតស្របនៅចន្លោះ 3140-3500cm⁻¹។

វត្ថុមាន ឬអវត្ថុមាននៃសម្រប O—H ឬ N—H អាចជាគន្លឹះសំខាន់ ដើម្បីឱ្យដឹងថាមានវត្ថុមានបង្កនាទីកាបូនីលក្នុងសមាសធាតុមិនស្គាល់ឬអត់។

រូប១៧.៣បង្ហាញស្ទីចរបស់អាស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ិច។ នីទ្រីលបង្ហាញបង់សម្របIRលេចធ្លោរក្សា 2250cm⁻¹ ដែលបានមកពីទំនាញសម្ព័ន្ធកាបូន-អាសូតបីជាន់។




រូប១៧.៣ ស្ទីច IR របស់អាស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ិច

ខ. ស្បៀង ^1H NMR

- ប្រូតុងអាស៊ីតរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមិនមានរបាំងខ្ពស់ ហើយស្រូបដែនក្រោមនៅតំបន់ $\delta = 10-12$
- ប្រូតុងកាបូន α របស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចស្រូបក្នុងតំបន់ $\delta = 2.0 - 2.5$


រូប១៧.៤ បង្ហាញស្បៀង ^1H NMR របស់អេស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ាត។ វាបង្ហាញគំរូបំបែកធម្មតា (ឧតតេត និងទ្រីប្លេត) របស់ក្រុមអេស៊ីលមួយ ហើយយើងនឹងរំពឹងវាបង្ហាញក្រុមអេស៊ីលមិនបំបែកស្បៀងមួយ។



រូប១៧.៤ ស្បៀង ^1H NMR របស់អេស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ាត


គ. ស្បៀង ^{13}C NMR

- កាបូនកាបូនីលរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងស្រលាយរបស់វាកើតឡើងក្នុងដែនក្រោមក្នុងតំបន់ $\delta = 160-180$ (មើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម) ប៉ុន្តែមិនស្ថិតក្នុងដែនក្រោមឆ្ងាយពេកដូចអាល់ដេអ៊ីត និង សេតូនទេ ($\delta = 180-220$)។
- កាបូននីទ្រីលមិនត្រូវបានរំកិលទៅដែនក្រោមទេ ហើយវាស្រូបក្នុងតំបន់ $\delta = 115-120$ ។



រំកិលគីមី ^{13}C NMR របស់អាតូមកាបូនកាបូនីល ឬនីទ្រីល


អាតូមកាបូនរបស់ក្រុមអាល់គីលនៃអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងស្រលាយរបស់វាមានរំកិល ^{13}C ទៅដែនលើឆ្ងាយ។ រំកិលគីមីរបស់កាបូននីមួយៗក្នុងអាស៊ីតបង់តាណូអ៊ីចត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម៖




៣. ធ្វើអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច

វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖


១. ដោយអុកស៊ីតកម្មអាល់សែន ៖ យើងបានសិក្សាក្នុងមេរៀនទី៨រួចហើយថា អាល់សែនអាចរងអុកស៊ីតកម្មទៅជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចជាមួយ KMnO_4 ក្តៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាស៖




ម្យ៉ាងវិញទៀត អូសូន (មេរៀនទី៨) អាចរងអុកស៊ីតកម្មចំពោះភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មបង្កើតជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច៖




២. ដោយអុកស៊ីតកម្មអាល់ដេអ៊ីត និងអាល់កុលថ្នាក់ទី១៖ អាល់ដេអ៊ីតអាចរងអុកស៊ីតកម្មទៅជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចដោយភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មខ្សោយ ដូចជា $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+\text{HO}^-$ (មេរៀនទី១៦) ។ អាល់កុល^{1°} អាចរងអុកស៊ីតកម្មដោយ KMnO_4 ។ អាល់ដេអ៊ីត និងអាល់កុលថ្នាក់ទី១រងអុកស៊ីតកម្មទៅជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចដោយអាស៊ីតក្រូមិច (H_2CrO_4) ក្នុងអាសេតូនរាវ (ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម Jones មេរៀនទី១២) ៖




៣. ដោយអុកស៊ីតកម្មបង់ស៊ីលិចនៃអាល់គីលបង់សែន៖ ក្រុមអាល់គីលថ្នាក់ទី១ និងទី២ (មិនមែនថ្នាក់ទី៣) ដែលភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយរង្វង់សែន រងអុកស៊ីតកម្មដោយ KMnO_4 ទៅជាក្រុម $-\text{CO}_2\text{H}$ (មេរៀនទី១៥ ផ្នែកទី១៣គ) ។



៤. ដោយអុកស៊ីតកម្មនៃរង្វង់សែន៖ រង្វង់សែនរបស់អាល់គីលបង់សែនមួយអាចត្រូវបានបម្លែងជាក្រុមកាបូនីលដោយប្រតិកម្មអូសូណូលីស និងបន្ទាប់មកដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រូសែនពែរអុកស៊ីត (មេរៀនទី១៥ ផ្នែកទី១៣ឃ) ៖




៥. ដោយប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសនៃស្យាណូអ៊ីត្រីន និងនីត្រីលផ្សេងទៀត៖ យើងបានឃើញក្នុងមេរៀនទី ១៦ ផ្នែកទី៩ រួចហើយថា អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនអាចត្រូវបានបម្លែងទៅជាស្យាណូអ៊ីត្រីន ហើយស្យាណូអ៊ីត្រីននេះអ៊ីដ្រូលីសបង្កើតជាអាស៊ីត α -អ៊ីដ្រូកស៊ី។ ក្នុងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសនេះ ក្រុម-CN ត្រូវបានបម្លែងជាក្រុម $-CO_2H$ ។ យើងនឹងសិក្សាចលនការនៃអ៊ីដ្រូលីសនីត្រីលនេះក្នុងផ្នែកទី៨នៃមេរៀននេះ។




គេក៏អាចធ្វើនីត្រីលដោយប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូគីលរបស់អាល់គីលអាឡូសែន្នជាមួយសូដ្យូមស្យាណ្យា។ អ៊ីដ្រូលីសនៃនីត្រីលបង្កើតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចដែលមានខ្សែកាបូនវែងជាងខ្សែកាបូនអាល់គីលអាឡូសែន្នមួយ។

ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍៖




វិធីសាស្ត្រសំយោគនេះមានលីមីតឱ្យប្រើតែអាល់គីលអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី១។ អ៊ីយ៉ុងស្យាណ្យាជាបាសខ្លាំងមួយ ហើយការប្រើអាល់គីលអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី២ និងថ្នាក់ទី៣ នឹងបង្កើតអាល់សែនមួយ (តាម ប្រតិកម្មបណ្តាច់E2) មិនបង្កើតនីត្រីល (តាមប្រតិកម្មជំនួសS_N2)។ អាវីលអាឡូសែន្ន (លើកលែង តែអាវីលអាឡូសែន្នដែលមានក្រុមនីត្រូលីទីតាំងអរតូ និងប៉ារ៉ា) មិនមានប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូម ស្យាណ្យា។


៦. ដោយប្រតិកម្មកាបូនកម្មនៃអ័រ៉ាក់ទីត្រីញ៉ាដ៖ អ័រ៉ាក់ទីបត្រីញ៉ាដមានប្រតិកម្មជាមួយកាបូនឌីអុកស៊ីតបង្កើតម៉ាញ៉េស្យូមកាបូកស៊ីឡាត។ អាស៊ីតកម្មបង្កើតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីច៖



ឬ




ការសំយោគអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍ចំពោះអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី១ ទី២ ទី៣ អាលីល បង់ស៊ីល និងអាវីល ដែលពួកគេគ្មានក្រុមអាចប្រណាំងប្រជែងជាមួយប្រតិកម្មគ្រីញ៉ាដ (មេរៀន ទី១២ ផ្នែកទី៨ខ) ៖




ទែរ-ប៊ុយទីលក្លរ

អាស៊ីត 2,2-ឌីមេទីលប្រូប៉ាណូអ៊ិច (79-80%)



ប៊ុយទីលក្លរ



អាស៊ីតបង់តាណូអ៊ិច (80%)





ប្រមូបង់សែន

អាស៊ីតបង់សូអ៊ិច (85%)

លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.៥៖ ចូរបង្ហាញអំពីរបៀបដែលសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោមត្រូវបានបម្លែងទៅជា អាស៊ីតបង់សូអ៊ិច៖





(e) បង់ស៊ីលអាល់កុល



(f) បង់សាល់ដេអ៊ីត

លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.៦៖ ចូរពីរបៀបដែលអ្នកអាចទង្វើអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចខាងក្រោមពីការសំយោគគ្រីញ៉ាដ៖




(d) អាស៊ីត 4-មេទីលបង់សូអ៊ិច

(e) អាស៊ីតអ៊ីបសាណូអ៊ិច

លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.៧៖


- តើអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចក្នុងលំហាត់ទី១៧.៦ណាខ្លះដែលអាចទង្វើដោយសកាសំយោគនីទ្រីល?
- តើសំយោគគ្រីញ៉ាដ ឬនីទ្រីលដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីទង្វើសមាសធាតុ(b) ពីសមាសធាតុ(a) ខាងក្រោម? ហេតុអ្វី?



៤. ប្រតិកម្មជំនួសអាស៊ីល ៖ ប្រតិកម្មបូក - បណ្តាច់នុយក្លេអូភីលលើកាបូនអាស៊ីល

ប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងស្រលាយរបស់វាត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូភីលលើអាតូមកាបូនអាស៊ីល (កាបូនីល) របស់ពួកវា។ លទ្ធផលគឺជាការជំនួសមួយលើកាបូនអាស៊ីល។ ចំណុចសំខាន់នៃចលនការប្រតិកម្មគឺការកើតអង្គធាតុកណ្តាលចតុមុខមួយដែលអាចក្លាយជាក្រុមកាបូនីលវិញ បន្ទាប់ពីបណ្តាច់ក្រុមចាកចេញ។ យើងនឹងឃើញប្រតិកម្មជាច្រើននៃប្រភេទទូទៅនេះដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងចលនការខាងក្រោម។

➤ **ចលនការប្រតិកម្មជំនួសអាស៊ីលដោយប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូភីល**




ប្រតិកម្មដូចនេះជាច្រើនកើតឡើងក្នុងការវេស ហើយអ្នកគីមីជីវៈហៅប្រតិកម្មទាំងនេះថាជា**ប្រតិកម្មបន្ថែមអាស៊ីល** (acyl transfer reactions)។ អាសេទីល-កូអង់ស៊ីម A តែងតែមាននាទីជាភ្នាក់បន្ថែមអាស៊ីលគីមីជីវៈ។ ប្រតិកម្មជំនួសអាស៊ីលមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មផងដែរ។

- ដំណាក់កាលដំបូងក្នុងប្រតិកម្មជំនួសអាស៊ីលគឺប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូភីលលើអាតូមកាបូនកាបូនីល។ ដំណាក់កាលនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយភាពចំហស្ថេរិចនៃអាតូមកាបូនកាបូនីល និងលទ្ធភាពនៃអាតូមអុកស៊ីសែនកាបូនីលក្នុងការទទួលទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយរបស់សម្ព័ន្ធពីរជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែន។
 - ក្នុងដំណាក់កាលទី១ អង្គធាតុកណ្តាលចតុមុខផ្តាច់ក្រុមចាកចេញមួយ (L ក្នុងចលនការខាងលើ)។ ប្រតិកម្មបណ្តាច់នេះធ្វើឱ្យកើតឡើងវិញនូវសម្ព័ន្ធពីរជាន់កាបូន-អុកស៊ីសែនហើយបង្កើតផលិតផលប្រតិកម្មជំនួស។
- ដូចនេះ ដំណើរការសរុបគឺ**ប្រតិកម្មជំនួសអាស៊ីល** តាមចលនការប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូភីល។ សមាសធាតុអាស៊ីលមានប្រតិកម្មទាំងនេះ ដោយសារពួកវាទាំងអស់មានក្រុមចាកចេញល្អ (ឬពួកវាត្រូវបានរងប្រែក្លាយបង្កើតក្រុមចាកចេញល្អ) ភ្ជាប់លើអាតូមកាបូនកាបូនីល។
- ប្រតិកម្មជំនួសអាស៊ីលត្រូវការក្រុមចាកចេញមួយលើអាតូមកាបូនកាបូនីល។

ឧទាហរណ៍ អាស៊ីលក្លរួមួយតែងតែមានប្រតិកម្មដោយបោះបង់អ៊ីយ៉ុងក្លរួមួយ ដែលជាបាសខ្សោយ និងជាក្រុមចាកចេញល្អមួយ។ ប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីលក្លរួមួយទឹកជាឧទាហរណ៍មួយ។


ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង៖



អាស៊ីតអាស៊ីតមួយតែងតែមានប្រតិកម្មដោយបោះបង់អាញ្ច័ងកាបូកស៊ីឡាត ឬម៉ូលេគុលអាស៊ីត កាបូកស៊ីលីចមួយ ដែលពួកវាទាំងពីរជាបាសខ្សោយ និងជាក្រុមចាកចេញល្អ។

ដូចដែលយើងនឹងឃើញនៅពេលក្រោយអេស្ត័រតែងតែមានប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូភីលដោយ បោះបង់ម៉ូលេគុលអាល់កុលមួយ (ផ្នែកទី៧ខ)។ អាស៊ីតមានប្រតិកម្មនេះដោយបោះបង់ម៉ូលេគុលទឹកមួយ (ផ្នែកទី៧ក) ហើយអាមីតមានប្រតិកម្មដោយបោះបង់ម៉ូលេគុលអាម៉ូញាក់មួយ ឬអាមីនមួយ (ផ្នែកទី៨ឆ)។ ម៉ូលេគុលដែលបោះបង់ទាំងអស់ក្នុងប្រតិកម្មទាំងនេះជាបាសខ្សោយ និងជាក្រុមចាកចេញល្អ។


ចំពោះអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូន ដើម្បីឱ្យមានប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូភីល អង្គធាតុកណ្តាលចតុមុខ អាចត្រូវការបោះបង់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូមួយ (H^-) ឬ អ៊ីយ៉ុងអាល់កានូ (R^-)។ ទាំងពីរនេះជាបាសខ្លាំងណាស់ ដូចនេះ ក្រុមចាកចេញអន់ណាស់៖



ប្រតិកម្មអាឡូឌីមជាប្រតិកម្មមួយដែលមានអាញ្ច័ងអាល់កានូអាចមានអំពើជាក្រុមចាកចេញមួយប៉ុន្តែ ដូចដែលយើងនឹងឃើញ គឺនៅពេលតែក្រុមចាកចេញអាញ្ច័ងទ្រីលអាឡូមេទីលដែលជាបាសខ្សោយមួយប៉ុណ្ណោះ។

៤.១ ប្រតិកម្មភាពរបស់សមាសធាតុអាស៊ីល

ក្នុងចំណោមស្រលាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចដែលយើងបានសិក្សាក្នុងមេរៀននេះ អាស៊ីលក្លរួមមានប្រតិកម្មភាពចំពោះប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូភីលខ្លាំងជាងគេ ហើយអាមីតមានប្រតិកម្មភាពខ្សោយជាងគេ។ ជាទូទៅ លំដាប់ប្រតិកម្មភាពគឺ៖



អាស៊ីលក្លរួ អាស៊ីតអាស៊ីត អេស្តេរ អាមីត

ក្រុមពណ៌បៃតងក្នុងទម្រង់ខាងលើ (Cl, R'COO, OR', NH₂) អាចជាក្រុមចាកចេញ L ក្នុងចលនការប្រតិកម្មខាងលើ។

- លំដាប់ទូទៅនៃប្រតិកម្មភាពស្រលាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចអាចត្រូវបានពន្យល់ ដោយពិចារណាលើកម្លាំងបាសរបស់ក្រុមចាកចេញ។

នៅពេលអាស៊ីលក្លរួមានប្រតិកម្ម ក្រុមចាកចេញជាអ៊ីយ៉ុងក្លរួ។ នៅពេលអាស៊ីតអាស៊ីតមានប្រតិកម្ម ក្រុមចាកចេញជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចមួយ ឬជាអ៊ីយ៉ុងកាបូកស៊ីឡាតមួយ។ នៅពេលអេស្តេរមានប្រតិកម្ម ក្រុមចាកចេញជាអាល់កុលមួយ ហើយនៅពេលអាមីតមានប្រតិកម្ម ក្រុមចាកចេញជាអាមីន (ឬអាម៉ូញាក់)។ ក្នុងចំណោមបាសទាំងនេះ អ៊ីយ៉ុងក្លរួជាបាសខ្សោយបំផុត ហើយអាស៊ីលក្លរួជាសមាសធាតុអាស៊ីលមានប្រតិកម្មភាពខ្លាំងជាងគេ។ អាមីន (អាម៉ូញាក់) ជាបាសខ្លាំងជាងគេ ហើយអាមីតជាសមាសធាតុអាស៊ីលមានប្រតិកម្មភាពខ្សោយជាងគេ។

៤.២ ការសំយោគស្រលាយអាស៊ីត

នៅពេលនេះ យើងចាប់ផ្តើមរកវិធីសាស្ត្រសំយោគស្រលាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីច យើងនឹងឃើញថាក្នុងប្រតិកម្មជាច្រើន ស្រលាយអាស៊ីតអាចត្រូវបានសំយោគពីប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូក៏លមួយផ្សេងទៀត។ លំដាប់នៃប្រតិកម្មដែលយើងបានបង្ហាញខាងលើផ្តល់ឱ្យនូវគន្លឹះថាធ្វើសំយោគមួយណា ហើយមិនត្រូវ ធ្វើសំយោគណា។ ជាទូទៅ **សមាសធាតុអាស៊ីលប្រតិកម្មភាពខ្សោយអាចត្រូវបានសំយោគពីសមាសធាតុ អាស៊ីលប្រតិកម្មភាពខ្លាំងជាង ប៉ុន្តែប្រតិកម្មបញ្ច្រាសតែងតែមានការលំបាក ហើយនៅពេលអាចធ្វើទៅបាន លុះត្រាតែប្រើអាក់ទីបពិសេស។**


- ការសំយោគស្រលាយអាស៊ីតដោយការជំនួសអាស៊ីល ត្រូវការអាក់ទីបដែលមានក្រុមចាកចេញនៅលើកាបូនអាស៊ីលល្អជាងនៅក្នុងផលិតផល។

៥. អាស៊ីលក្លរួ

៥.១ ការសំយោគអាស៊ីលក្លរួ


ដោយសារតែអាស៊ីលក្លរួមានប្រតិកម្មភាពខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមស្រលាយអាស៊ីតទាំងអស់ យើងត្រូវតែប្រើអាក់ទីបពិសេសដើម្បីទង្វើពួកវា។ យើងប្រើអាស៊ីតក្លរួផ្សេងទៀត ដែលជាអាស៊ីតក្លរួនៃអាស៊ីតអសរីរាង្គ ៖ PCl₅ (អាស៊ីតក្លរួរបស់អាស៊ីតផូស្វ័រិច) PCl₃ (អាស៊ីតក្លរួរបស់អាស៊ីតផូស្វ័រី) និង SOCl₂ (អាស៊ីតក្លរួរបស់អាស៊ីតស៊ុលផួរី)។ អាក់ទីបទាំងអស់នេះមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចបង្កើតអាស៊ីលក្លរួក្នុងទិន្នផលខ្ពស់៖

ប្រតិកម្មទូទៅ៖



ប្រតិកម្មទាំងអស់នេះទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូក្លីលដោយអ៊ីយ៉ុងក្លរួលើអង្គធាតុសកម្ម ដូចជា៖ អាស៊ីលក្លរួស៊ីលផ្ទៃប្រតិកម្ម អាស៊ីលក្លរួស្ទួ ឬ អាស៊ីលក្លរួស្ទួតងប្រតិកម្ម។ អង្គធាតុកណ្តាល ទាំងនេះមានក្រុមចាក់ចេញអាស៊ីលល្អជាងផលិតផលអាស៊ីលក្លរួ។ ឧទាហរណ៍ តូនីលក្លរួ ប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចតាមមធ្យោបាយខាងក្រោម។

➤ **ចលនការប្រតិកម្មសំយោគអាស៊ីលក្លរួដោយប្រើតូនីលក្លរួ**




៥.២ ប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីលក្លរួ

ដោយសារតែអាស៊ីលក្លរួជាស្រលាយអាស៊ីលមានប្រតិកម្មភាពខ្លាំងជាងគេ ពួកវាត្រូវបានបម្លែងជាស្រលាយមួយទៀតយ៉ាងងាយ។

- ការសំយោគដែលតែងតែជាផ្លូវសំយោគល្អបំផុតក្នុងការបង្កើតអាស៊ីតមួយ អេស្តែរមួយឬអាមីតមួយ ការសំយោគអាស៊ីលក្លរួពីអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច បន្ទាប់មកបម្លែងអាស៊ីលក្លរួទៅជាស្រលាយអាស៊ីលដែលចង់បាន។

ដូចក្រាមប្រតិកម្មក្នុងរូប១៧.៥ បង្ហាញអំពីការសំយោគនេះ។ យើងនឹងសិក្សាលម្អិតអំពីប្រតិកម្មក្នុងផ្នែកទី៦-៨។


អាស៊ីលក្លរួក៏មានប្រតិកម្មជាមួយទឹក និងជាមួយសូលុយស្យុងបាស ប៉ុន្តែប្រតិកម្មទាំងនេះមិនអាចធ្វើដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នទេ ពីព្រោះពួកវាអាចបំផ្លាញអេក្រង់អាស៊ីលក្លរួដែលមានប្រយោជន៍ ដោយបង្កើតទាំងអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងអំបិលរបស់វាឡើងវិញ៖



៦. អានីទ្រីតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច

៦.១ ការសំយោគអានីទ្រីតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច

អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីលក្លរួក្រោមវត្តមានពីរីឌីន បង្កើតអានីទ្រីតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមួយ។ ពីរីឌីនដកប្រូតុងមួយពីអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច បង្កើននូវកម្រិតនុយក្លេអូភីលរបស់វា។




គេតែងប្រើវិធីសាស្ត្រនេះក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ទង្វើអានីទ្រីត។ វិធីនេះមានភាពទូទៅណាស់ ហើយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទង្វើល្បាយអានីទ្រីត ($R \neq R'$) ឬអានីទ្រីតស៊ីមេទ្រី ($R = R'$)។

អំបិលសូដ្យូមរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចក៏អាចមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីលក្លរូបង្កើតអានីទ្រីតដែរ៖



ជួនកាលអានីទ្រីតវែងអាចត្រូវបានទង្វើដោយដុតកម្ដៅអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចសមស្របណាមួយ។ ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនេះទទួលបានជោគជ័យតែនៅពេលការកើតអានីទ្រីតបង្កើតជាវ៉ង់សមាជិក៥ ឬ៦អាតូម៖




លំហាត់អនុវត្ត៩៧.៨៖ នៅពេលគេកម្ដៅអាស៊ីតម៉ាលេអ៊ីចនៅ 200°C វាបាត់បង់ទឹក ហើយក្លាយជាអានីទ្រីតម៉ាលេអ៊ីច។ អាស៊ីតផ្ទូម៉ារិច ជាដ្យាស្តេអេម៉ែរបស់អាស៊ីតម៉ាលេអ៊ីចត្រូវការសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង មុនពេលវាបាត់បង់ទឹក ហើយនៅពេលវាធ្វើប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មនេះ វាក៏បង្កើតអានីទ្រីតម៉ាលេអ៊ីចដែរ។ ចូរពន្យល់ការសង្កេតទាំងនេះ។




៦.២ ប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច

ដោយសារតែអាស៊ីតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមានប្រតិកម្មភាពខ្ពស់ គេប្រើពួកវាដើម្បីទង្វើអេស្តែរ និងអាមីត (រូប១៧.៦)។ យើងនឹងសិក្សាលម្អិតក្នុងផ្នែកទី៧ និងទី៨។



អាស៊ីតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចក៏អាចរងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសដែរ៖




៧. អេស្តែរ



៧.១ សំយោគអេស្តែរ៖ ប្រតិកម្មអេស្តែរកម្ម

អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចប្រតិកម្មជាមួយអាល់កុលបង្កើតអេស្តែរតាមប្រតិកម្មក្នុងដងកម្ម ដែលគេហៅថាប្រតិកម្មអេស្តែរកម្ម (esterification) ៖

ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង៖



- អេស្តែរកម្មកាតាលីករអាស៊ីតដូចឧទាហរណ៍ខាងលើត្រូវបានគេហៅថាប្រតិកម្មអេស្តែរកម្មFischer។

ប្រតិកម្មអេស្តែរកម្មFischer ប្រព្រឹត្តទៅយឺតក្រោមអវត្តមានអាស៊ីតខ្លាំង ប៉ុន្តែប្រតិកម្មទាំងនេះមកដល់ លំនឹងក្នុងរយៈពេល២ ឬ៣ម៉ោង នៅពេលអាស៊ីតមួយ និងអាល់កុលមួយត្រូវបានធ្វើរក្សជាមួយអាស៊ីតស៊ីលីផ្លិចខាប់តិចតួច ឬជាមួយអ៊ីដ្រូសែនក្លរួ។ ដោយសារតែទីតាំងលំនឹងកំណត់បរិមាណអេស្តែរដែលទទួលបាន ការប្រើទាំងអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងអាល់កុលលើបានបង្កើនទិន្នផលអាស្រ័យលើប្រតិករកំណត់។ ការជ្រើសរើសសមាសធាតុលើសដើម្បីបង្កើនផលិតផលអាស្រ័យលើភាពសំបូរ និងតម្លៃរបស់វា។ ទិន្នផលរបស់ប្រតិកម្មអេស្តែរកម្មក៏អាចត្រូវបានបង្កើនដោយដកទឹកចេញពីល្បាយប្រតិកម្មនៅពេលវាកកើត។


នៅពេលអាស៊ីតបង់សូអ៊ីចមានប្រតិកម្មជាមួយមេតាណុលដែលត្រូវបានដាក់ស្លាក¹⁸O អុកស៊ីសែនស្លាកនេះកើតឡើងក្នុងអេស្តែរ។ លទ្ធផលនេះបង្ហាញអំពីការដាច់សម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិកម្មអេស្តែរកម្មនេះ។



លទ្ធផលនៃការពិសោធន៍ដាក់ស្លាកអុកស៊ីសែននេះ និងការពិតដែលប្រតិកម្មអេស្តែរកម្មត្រូវការកាតាលីករអាស៊ីតត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយចលនការខាងក្រោម។ ចលនការនេះជាប្រភេទប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូកីលកាតាលីករអាស៊ីតលើអាតូមកាបូនអាស៊ីត។


បើសិនជាយើងអនុលោមន៍តាមប្រតិកម្មទៅមុខក្នុងចលនការនេះ យើងមានចលនការរបស់**ប្រតិកម្មអេស្តែរកម្មកាតាលីករអាស៊ីត**មួយ ។ ប៉ុន្តែ បើសិនជាយើងអនុលោមន៍តាមប្រតិកម្មត្រលប់ យើងមានចលនការ**ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសកាតាលីករអាស៊ីតនៃអេស្តែរ**មួយ។

ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសអេស្តែរកាតាលីករអាស៊ីត៖



លទ្ធផលដែលយើងទទួលបានអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌដែលយើងជ្រើសរើស។ បើសិនជាយើងចង់ធ្វើអេស្តែរកម្មអាស៊ីតមួយ យើងប្រើអាល់កុលលើស ហើយបើសិនជាអាច ត្រូវដកទឹកចេញនៅពេលវាកកើត។ បើសិនជាយើងចង់ធ្វើអ៊ីដ្រូលីសអេស្តែរមួយ យើងប្រើបរិមាណលើសលុបរបស់ទឹក ដែលយើងធ្វើរក្សជាមួយ HCl រាវ ឬ H₂SO₄ រាវ។


➤ **ចលនការប្រតិកម្មអេស្តែរកម្មកាតាលីករអាស៊ីត**



អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចទទួលប្រូតុងមួយពីកាតាលីករអាស៊ីតខ្លាំង

អាល់កុលប្រយុទ្ធលើក្រុមកាបូនីលរងប្រូតុងកម្មបង្កើតអង្គធាតុ កណ្តាលចតុមុខមួយ

ប្រូតុងមួយបាត់បង់ពីអាតូមអុកស៊ីសែនមួយ ហើយអាតូមអុកស៊ីសែន មួយទៀតទទួល



ការបាត់បង់ម៉ូលេគុលទឹកមួយបង្កើត
អេស៊ែរេងប្រូតុងកម្មមួយ

បន្ទេរប្រូតុងទៅឱ្យបានបង្កើតអេស៊ែរមួយ


លំហាត់អនុវត្ត៩៧.៩៖ តើកន្លែងណាដែលអ្នករំពឹងថាជាកន្លែងរបស់អុកស៊ីសែនស្លាក ប៊េសិនជាអ្នកធ្វើប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសលើមេទីលបង់សូអាតក្នុងទឹកស្លាក¹⁸O? ចូរសរសេរចេលនការប្រតិកម្មដើម្បីគាំទ្រចម្លើយរបស់អ្នក។

កត្តាស្ថេរិចប៉ះពាល់លើល្បឿនប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសកាតាលីករអាស៊ីតនៃអេស៊ែរ។ ក្រុមជំនៅជិតមណ្ឌលប្រតិកម្ម មិនថាក្នុងអាល់កុល ឬក្នុងអាស៊ីត ធ្វើឱ្យល្បឿនប្រតិកម្មយឺត។ ឧទាហរណ៍ អាល់កុលថ្នាក់ទី៣មានប្រតិកម្មអេស៊ែរកម្មកាតាលីករអាស៊ីតយឺតណាស់ ដោយសារពួកវាតែងតែរងប្រតិកម្មបណ្តាច់។ ប៉ុន្តែ ពួកវាអាចត្រូវបានបម្លែងទៅជាអេស៊ែរដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈការប្រើអាស៊ីលក្លរួ និងអាស៊ីតក្នុងមធ្យោបាយខាងក្រោម។


៧.២ អេស៊ែរពីអាស៊ីលក្លរួ

- ប្រតិកម្មនៃអាស៊ីលក្លរួជាមួយអាល់កុលគឺជាមធ្យោបាយល្អបំផុតក្នុងការសំយោគអេស៊ែរ។
- ប្រតិកម្មនៃអាស៊ីលក្លរួជាមួយអាល់កុលមួយបង្កើតអេស៊ែរមួយ កើតឡើងយ៉ាងរហ័ស និងមិនត្រូវការកាតាលីករអាស៊ីតទេ។ គេតែងបន្ថែមពីរីឌីនទៅក្នុងល្បាយប្រតិកម្មដើម្បីឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយ HCl ដែលកកើត (ពីរីឌីនក៏អាចមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីលក្លរួបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីលពីរីឌីញ៉ូមមួយ ដែលជាអង្គធាតុកណ្តាលមានប្រតិកម្មភាពចំពោះនុយក្លេអូភីលខ្លាំងជាងអាស៊ីលក្លរួ)។

ប្រតិកម្មទូទៅ៖



ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង៖




៧.៣ អេស៊ែរពីអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច

អាស៊ីតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចក៏មានប្រតិកម្មជាមួយអាល់កុលបង្កើតអេស៊ែរក្រោមវត្តមានកាតាលីករអាស៊ីតមួយដែរ។

ប្រតិកម្មទូទៅ៖



ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង៖




អានីត្រីតអាសេទិច

បង់ស៊ីលអាល់កុល


បង់ស៊ីលអាសេតាត

- ការសំយោគអេស្ត័រត្រូវបានអនុវត្តន៍ល្អបំផុតដោយប្រតិកម្មរបស់អាល់កុលមួយជាមួយអាស៊ីលលក្ខណៈឬអានីត្រីតមួយ។ អេក្រង់ទីបទាំងនេះអាចបញ្ចៀសនូវការប្រើអាស៊ីតខ្លាំង ដូចដែលប្រតិកម្មអេស្ត័រកម្មកាតាលីករអាស៊ីតត្រូវការ។ អាស៊ីតខ្លាំងមួយអាចបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មបន្ទាប់បន្សំកើតឡើងអាស្រ័យលើវត្តមានរបស់បង្គំនាទីផ្សេងទៀត។


អានីត្រីតដែលមានប្រតិកម្មជាមួយអាល់កុល១ម៉ូលបង្កើតសមាសធាតុមួយដែលជាអេស្ត័រផង និងអាល់កុលផង៖



លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.១០៖ អេស្ត័រអាចត្រូវបានសំយោគដោយប្រតិកម្មត្រង់អេស្ត័រកម្ម (transesterifications) ៖




ក្នុងដំណើរការនេះ យើងរំកិលលំនឹងទៅខាងស្តាំដោយធ្វើបំណិតអាល់កុល bp ទាបពីល្បាយប្រតិកម្ម។ ចលនការប្រតិកម្មត្រង់អេស្ត័រកម្មស្រដៀងគ្នាទៅនឹងចលនការប្រតិកម្មអេស្ត័រកម្មកាតាលីករអាស៊ីត (ឬអ៊ីដ្រូលីសអេស្ត័រកាតាលីករអាស៊ីត)។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មត្រង់អេស្ត័រកម្មខាងក្រោម៖



៧.៤ អ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈជ្ជានបាសនៃអេស្ត័រ៖ ប្រតិកម្មសាមីកម្ម

- អេស្ត័ររងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈជ្ជានបាស រួមទាំងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសក្នុងមជ្ឈជ្ជានអាស៊ីតផងដែរ។


អ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានបានត្រូវបានគេហៅថាប្រតិកម្មសាបូនីកម្ម (saponification) ពីពាក្យឡាតាំង sapo មានន័យថាសាបូ (soap) ។ ឧទាហរណ៍ ការធ្វើក្លេចអេស្ទែរមួយជាមួយសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតបង្កើតអាល់កុល មួយ និងអំបិលសូដ្យូមរបស់អាស៊ីត៖



អ៊ីយ៉ុងកាបូកស៊ីឡាតមានប្រតិកម្មភាពខ្សោយចំពោះប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូកីល ពីព្រោះវាមានបន្ទុកអវិជ្ជមាន។ ដូចនេះ ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានបាននៃអេស្ទែរមួយជាប្រតិកម្មមិនអាចត្រលប់វិញបាន។

ចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានបាននៃអេស្ទែរមួយក៏ទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូកីលនៅលើកាបូនអាស៊ីលដែរ។

➢ ចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានបាននៃអេស្ទែរ




អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីតប្រយុទ្ធលើកាបូនកាបូនីល


អង្គធាតុចតុមុខបោះបង់អ៊ីយ៉ុងអាល់កុកស៊ីតមួយ

បន្ទុកប្រូតុងមួយបង្កើតផលិតផលរបស់ប្រតិកម្ម


ភស្តុតាងនៃចលនការនេះបានមកពីការសិក្សាដែលធ្វើលើអេស្ទែរមានស្លាកអ៊ីសូតូប។ នៅពេលអេទីលប្រូប៉ាណូអាតតដែលស្លាក¹⁸O លើអុកស៊ីសែនអេទែរបស់អេស្ទែរ (ខាងក្រោម) រងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសជាមួយ NaOH វា¹⁸O ទាំងអស់បង្ហាញឡើងក្នុងអេតាណុលដែលកើត។ មិនមែន¹⁸O កើតឡើងក្នុងអ៊ីយ៉ុងប្រូប៉ាណូអាតទេ៖



ការធ្វើស្លាកនេះគាំទ្រដល់ចលនការខាងលើ (ចូរសរសេរដំណាក់កាលទាំងអស់ដោយខ្លួនឯង ហើយតាមមើលអុកស៊ីសែនស្លាករហូតដល់ផលិតផល)។ បើសិនអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីតប្រយុទ្ធលើកាបូនអាល់គីលជំនួសឱ្យកាបូនអាស៊ីល អាល់កុលដែលទទួលបានអាចមិនមានអុកស៊ីសែនស្លាកទេ។ គេមិនដែលសង្កេតឃើញមានការប្រយុទ្ធលើកាបូនអាល់គីលទេ។




ទោះបីជាការប្រយុទ្ធនុយក្លេអូគីលលើកាបូនអាល់គីលកើតឡើងដោយកម្រជាមួយអេស្ទែរនៃអាស៊ីត កាបូកស៊ីលិចក៏ដោយ វាជារបៀបប្រយុទ្ធដែលគេចង់បានលើអេស្ទែរអាស៊ីតស៊ីលផូនិច (ដូចជាតូស៊ីឡាត មេស៊ីឡាត និងទ្រីផ្លាត)។



គេចង់បានចលនការនេះជាមួយអាល់គីលស៊ីលផូនាត


លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.១១៖

a. ចូរសរសេររូបមន្តស្តេរ៉េអូគីមីរបស់សមាសធាតុ A – F៖



b. តើវិធីទី3 ឬ ទី4 ដែលអ្នករំពឹងថានឹងអាចបង្កើត Fក្នុងទិន្នផលខ្ពស់? ហេតុអ្វី?

លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.១២៖ អ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានបាសនៃមេទីលមេស៊ីតូអាតកើតឡើងតាមរយៈការប្រយុទ្ធលើ កាបូនអាល់កុល មិនមែនកាបូនអាស៊ីលទេ៖




មេទីលមេស៊ីតូអាត

a. ចូរឱ្យមូលហេតុដែលធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈមិនធម្មតានេះ?


b. ចូរលើកការពិសោធន៍ដោយប្រើសមាសធាតុស្លាកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរបៀបប្រយុទ្ធនេះ។

៧.៥ ឡាក់តូន


អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចដែលម៉ូលេគុលមានក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលមួយលើកាបូន γ ឬ δ ងប្រតិកម្មអេស្ទែរកម្ម អន្តរម៉ូលេគុលបង្កើតអេស្ទែរវង់ ដែលគេហៅថា γ - ឬ δ -ឡាក់តូន។ ប្រតិកម្មនេះត្រូវការកាតាលីករអាស៊ីត៖




ឡាក់តូនរងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសដោយបានរាវដូចអេស្ទែរផ្សេងទៀតដែរ។ ប៉ុន្តែអាស៊ីតកម្មនៃអំបិលសូដ្យូមអាចធ្វើឱ្យត្រលប់ថយក្រោយទៅជា γ - ឬ δ -ឡាក់តូន ជាពិសេសបើសិនជាគេប្រើអាស៊ីតលើស៖



ឡាក់តូនជាច្រើនកើតឡើងក្នុងធម្មជាតិ។ ឧទាហរណ៍ វីតាមីន C (ខាងក្រោម) ជា γ -ឡាក់តូនមួយ។ អង់ទីប្យូទិចខ្លះដូចជាអ៊ីរីត្រូមីស៊ីន និងណូណាក់ទីនជាឡាក់តូនដែលមានវង់ធំ (ហៅថាឡាក់តូនម៉ាក្រូស៊ីក្លិច) ប៉ុន្តែឡាក់តូនដែលកើតក្នុងធម្មជាតិស្ទើរតែទាំងអស់ជា γ - ឬ δ -ឡាក់តូន ដែលមានវង់សមាជិកតែ៥ ឬ៦អាតូមប៉ុណ្ណោះ។



β -ឡាក់តូន (ឡាក់តូនដែលមានសមាជិកវង់៤អាតូម) ត្រូវបានរកឃើញជាអង្គធាតុកណ្តាលក្នុងប្រតិកម្មខ្លះ ហើយខ្លះទៀតត្រូវបានញែកចេញ។ ប៉ុន្តែពួកវាមានប្រតិកម្មភាពខ្ពស់ បើសិនជាគេចង់បង្កើត β -ឡាក់តូនពី អាស៊ីត β -អ៊ីដ្រូកស៊ី ប្រតិកម្មបណ្តាប់ៗ តែងតែកើតឡើងជំនួសវិញ៖




៨. អាមីត

៨.១ ការសំយោគអាមីត

គេអាចសំយោគអាមីតតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗ ដោយចាប់ផ្តើមពីអាស៊ីលក្លរួ អាស៊ីតអាស៊ីត អេស្ត័រ អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងអំបិលកាបូកស៊ីឡាត។ វិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់ នុយក្លេអូកីល ដោយអាម៉ូញាក់ ឬអាមីនមួយលើកាបូនអាស៊ីល។ ដូចដែលយើងរំពឹងទុក អាស៊ីតក្លរួមាន ប្រតិកម្មភាពខ្លាំងជាងគេ ហើយអាញ់កាបូកស៊ីឡាតមានប្រតិកម្មភាពខ្សោយជាងគេ។

៨.២ អាមីតពីអាស៊ីលក្លរួ

អាម៉ូញាក់ អាមីនថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២ទាំងអស់មានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតក្លរួយ៉ាងលឿនបង្កើតអាមីត គេប្រើអាម៉ូញាក់ ឬអាមីនលើសដើម្បីបន្សាប HCl ដែលកកើត៖



ប្រតិកម្ម

អាម៉ូញាក់៖ $\text{R}', \text{R}'' = \text{H}$

អាមីន^{1°} ៖ $\text{R}' = \text{H}, \text{R}'' = \text{អាល់គីល}, \text{អាវីល}$

អាមីន^{2°} ៖ $\text{R}', \text{R}'' = \text{អាល់គីល}, \text{អាវីល}$

ផលិតផល

អាមីតមិនជួស៖ $\text{R}', \text{R}'' = \text{H}$


អាមីត N-ជួស ៖ $\text{R}' = \text{H}, \text{R}'' = \text{អាល់គីល}, \text{អាវីល}$

អាមីត N,N-ឌីជួស៖ $\text{R}', \text{R}'' = \text{អាល់គីល}, \text{អាវីល}$

- ប្រតិកម្មរស់អាមីនមួយជាមួយអាស៊ីលក្លរួត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយជាវិធីសាស្ត្រពិសោធន៍សំរាប់ សំយោគអាមីត ពីព្រោះអាស៊ីលក្លរួងាយស្រួលទង្វើពីអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច។

ប្រតិកម្មរវាងអាស៊ីលក្លរួ និងអាមីនមួយ (ឬអាម៉ូញាក់) តែងតែកើតឡើងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ (ឬក្រោម) ហើយបង្កើតអាមីតក្នុងទិន្នផលខ្ពស់។

អាស៊ីលក្លរួក៏មានប្រតិកម្មជាមួយអាមីនថ្នាក់ទី៣ដោយប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូកីលមួយដែរ។ ប៉ុន្តែអ៊ុយ៉ុងអាស៊ីលអាម៉ូញ៉ូមដែលកកើតមិនមានស្ថេរភាពក្រោមវត្តមានទឹក ឬធាតុរំលាយអ៊ីដ្រូកស៊ីលណា មួយទេ៖




អាស៊ីលក្លរួ អាមីន^{3°} អាស៊ីលអាម៉ូញ៉ូមក្លរួ

អ៊ុយ៉ុងអាស៊ីលពីរីឌីញ៉ូមក៏ទាក់ទងជាអង្គធាតុកណ្តាលក្នុងប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីលក្លរួទាំងនេះដែរ បើ សិន ជាប្រតិកម្មធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានពីរីឌីន។

៨.៣ អាមីតពីអាស៊ីតអាមូកស៊ីលិច

អាស៊ីតអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញាក់ ឬអាមីនថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២ បង្កើតអាមីតពី ប្រតិកម្ម ដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីលក្លរួ៖

O=C1OC(=O)c2ccccc12.N>[H2O, warm]>NC(=O)c1ccccc1C(=O)O[NH4+]>[H3O+, (-NH4+)]>NC(=O)c1ccccc1C(=O)O


អាស្ម័តផ្កាលិច (81%)

NC(=O)c1ccccc1C(=O)O.CC(=O)NCC(=O)C>>O=C1NC(=O)c2ccccc12.O

ផ្កាឡាអ៊ីមីត (~100%)

$$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OR}''' + \text{H}-\underset{\text{R}''}{\underset{|}{\text{N}}}-\text{R}' \longrightarrow \text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\underset{\text{R}''}{\underset{|}{\text{N}}}-\text{R}' + \text{R}'''\text{OH}$$


R' និង/ឬ R'' អាចជា H



ក្នុងអាស័យដ្ឋាន

៨.៥ អាមីតពីអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងអាម៉ូញ៉ូមកាបូកស៊ីឡាត

អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមានប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញ៉ាកំរាលបង្កើតអំបិលអាម៉ូញ៉ូម៖



អាម៉ូញ៉ូមកាបូកស៊ីឡាត


ដោយសារតែប្រតិកម្មភាពរបស់អ៊ីយ៉ុងកាបូកស៊ីឡាតចំពោះប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូគីល ខ្សោយ ប្រតិកម្មបន្ថែមមិនអាចកើតឡើងនៅក្នុងសូលុយស្យុងទឹកទេ។ ប៉ុន្តែ បើសិនយើងរំហួតទឹកចេញ ហើយដុតកម្ដៅអំបិលស្អាត ប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មបង្កើតអាមីតមួយ៖




ជាទូទៅនេះជាវិធីសាស្ត្រអន់មួយក្នុងការទង្វើអាមីត។ វិធីសាស្ត្រល្អជាងនេះមួយគឺបម្លែងអាស៊ីតទៅជា អាស៊ីលក្លរួ ហើយបន្ទាប់មកដាក់វាឱ្យធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញ៉ាក ឬអាមីនមួយ (ផ្នែកទី៨ខ)។

អាមីតមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងគីមីជីវៈ។ ចំណងដែលភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេជាប់គ្នាបង្កើតជាប្រូតេអ៊ីន ជាចំណងអាមីត។ ជាផលវិបាក ការស្រាវជ្រាវជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រងាយក្នុងការ សំយោគអាមីត។ ឌីអាល់គីលកាបូឌីអ៊ីមីត ($\text{R}-\text{N}=\text{C}=\text{C}-\text{R}$) ដូចជាឌីអ៊ីស្យូប្រូពីលកាបូឌីអ៊ីមីត និងឌីស៊ីក្លូអិច ស៊ីលកាបូឌីអ៊ីមីត(DCC) ជាអែក់ទីបពិសេសសម្រាប់សំយោគអាមីត។ ឌីអាល់គីលកាបូឌីអ៊ីមីតជំរុញ ឱ្យមាន ការកើតដោយប្រតិកម្មជាមួយក្រុមកាបូកស៊ីលរបស់អាស៊ីត និងធ្វើឱ្យវាសកម្មចំពោះប្រតិកម្មបូក- បណ្តាច់នុយក្លេអូគីល។

➤ ចលនការប្រតិកម្មសំយោគអាមីតជំរុញដោយ DCC



ឌីស៊ីក្លូអិចស៊ីលកាបូឌីអ៊ីមីត (DCC)




អង្គធាតុកណ្តាលក្នុងការសំយោគនេះមិនត្រូវការព្រែកចេញទេ ហេយដំណាក់កាលទាំងពីរកើតឡើង នៅស្ថានភាពបន្ទប់។ អាមីតត្រូវបានបង្កើតក្នុងទិន្នផលខ្ពស់។


៨.៦ អ៊ីដ្រូលីសអាមីត

- អាមីតរងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសនៅពេលពួកវាត្រូវបានដុតកម្ដៅជាមួយអាស៊ីត ឬបាសរាវ។

អ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត




អ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានបាន



អាមីត N-ជំនួស និងអាមីត N,N-ឌីជំនួសរងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត ឬបាសរាវ។ អ៊ីដ្រូលីសអាមីតតាមវិធីសាស្ត្រទាំងពីរកើតឡើងយឺតយ៉ាវជាងអ៊ីដ្រូលីសអេស្ទែរដែលត្រូវគ្នា។ ដូចនេះ ជាទូទៅ អ៊ីដ្រូលីសអាមីតត្រូវការលក្ខខណ្ឌជម្រុញនៃកម្ដៅ និងអាស៊ីត ឬបាសខ្លាំង។

ចលនការអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតរបស់អាមីតមួយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងផ្នែកទី៧ក របស់ចលនការ អ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតនៃអេស្ទែរ។ ទឹកមានអំពើជានុយក្លេអូភីល ហើយប្រយុទ្ធលើអាមីតរងប្រតិកម្ម។ ក្រុមចាកចេញក្នុងអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតរបស់អាមីតគឺអាម៉ូញាក់ (អាមីនមួយ)។


➤ **ចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានរបស់អាមីត**



កាបូនីលអាមីតទទួលប្រតិកម្ម មួយពីអាស៊ីតរាវ

ម៉ូលេគុលទឹកប្រយុទ្ធលើកាបូនីលរងប្រតិកម្ម បង្កើតអង្គធាតុកណ្តាលចតុមុខមួយ

អាតូមអុកស៊ីសែនបោះបង់ប្រតិកម្ម ហើយអាសូតទទួលយកប្រតិកម្មនេះ




ការបាត់បង់ម៉ូលេគុលអាម៉ូញាក់បង្កើតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចរងប្រតិកម្ម

ការបន្ថែមប្រតិកម្មមួយទៅទៀត អាម៉ូញាក់បង្កើតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីច និងអ៊ីយ៉ុងអាម៉ូញ៉ូម

មានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានបាននៃអាមីត អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូកស៊ីតមានអំពើជានុយក្លេអូភីលផង និងជាបាសផង។

➤ **ចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានបាននៃអាមីត**




អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូកស៊ីតប្រយុទ្ធលើកាបូនីលអាស៊ីតរបស់អាមីត

អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូកស៊ីត ជកប្រតិកម្មមួយបង្កើត ឌីអាញ៉ុង

ឌីអាញ៉ុងបោះបង់ម៉ូលេគុលរបស់អាម៉ូញាក់ (ឬអាមីន) ដំណាក់ កាលនេះត្រូវបានកើតឡើង ជាមួយបន្ថែមប្រតិកម្មពីទឹកដោយសារតែកម្លាំងបាសរបស់ NH_2^-


លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.១៣៖ តើផលិតផលណាដែលអ្នកទទួលបានពីអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត និងបាសរបស់ អាមីតខាងក្រោម?

- N, N-ឌីមេទីលបង់សាមីត
-



៨.៧ នីទ្រីលពីលេអ៊ីដ្រាតកម្មអាមីត

អាមីតមានប្រតិកម្មជាមួយ P_4O_{10} (សមាសធាតុមួយដែលគេតែងតែហៅថាផូស្វរអុកស៊ីត និងសរសេរ P_2O_5) ឬអាស៊ីតអាសេទិចកំពុងពុះបង្កើតនីទ្រីល៖




នេះជាវិធីសាស្ត្រសំយោគមានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ទង្វើនីទ្រីលដែលមិនអាចទង្វើពីប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូក៏លរវាងអាល់គីលអាឡូសែន និងអ៊ីយ៉ុងស្យាន។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.១៤៖

- ចូរឱ្យអែក់ទីបដែលត្រូវការសម្រាប់ធ្វើការបម្លែងខាងក្រោម៖




- តើផលិតផលណាដែលអ្នកទទួលបាន បើសិនអ្នកចង់សំយោគនីទ្រីលខាងលើដោយវិធីសាស្ត្រខាងក្រោម៖



៨.៨ អ៊ីដ្រូលីសនីទ្រីល


- នីទ្រីលមានទំនាក់ទំនងនឹងអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច ពីព្រោះអ៊ីដ្រូលីសសព្វនៃនីទ្រីលមួយបង្កើតអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមួយ ឬអាញ៉ុងកាបូកស៊ីឡាតមួយ (មើលផ្នែក១៦.៩ និង១៧.៣)៖



ចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសទាំងនេះទាក់ទងនឹងចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសអាមីតក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត និងបាស។


ក្នុងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតរបស់នីត្រីល ដំណាក់កាលទី១ជាការធ្វើប្រូតុងកម្មលើអាតូមអាសូត។ ប្រូតុងកម្មនេះ (ក្នុងលំដាប់ប្រតិកម្មខាងក្រោម) បង្កើនភាពប៉ូលែរបស់ក្រុមនីត្រីលហើយធ្វើឱ្យអាតូមកាបូនកាន់តែងាយទទួលការប្រយុទ្ធពីនុយក្លេអូភីលខ្សោយគឺទឹក។ ការបាត់បង់ប្រូតុងពីអាតូមអុកស៊ីសែនបង្កើតទម្រង់តូតូមែរបស់អាមីត។ ការទទួលប្រូតុងលើអាតូមអាសូតបង្កើតអាមីតរងប្រូតុងកម្មមួយ ហើយពីចំណុចនេះទៅដំណាក់កាលទាំងអស់ដូចគ្នាទៅនឹងដំណាក់កាលក្នុងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសអាមីតមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត (ផ្នែក១៧.៨.៨) (ក្នុង H_2SO_4 ខាប់ ប្រតិកម្មឈប់ត្រង់អាមីតរងប្រូតុងកម្ម ហើយនេះជាមធ្យោបាយមានប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើតអាមីតពីនីត្រីល)។

➤ ចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសនីត្រីលមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត



ក្នុងអ៊ីដ្រូលីសមជ្ឈដ្ឋានបាស អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីតប្រយុទ្ធលើកាបូននីត្រីល ហើយប្រូតុងកម្មបន្តបន្ទាប់បង្កើតតូតូមែអាមីត។ ការប្រយុទ្ធបន្ថែមដោយអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីតធ្វើឱ្យអ៊ីដ្រូលីសប្រព្រឹត្តទៅស្រដៀងគ្នានឹងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសអាមីតមជ្ឈដ្ឋានបាស (ផ្នែក១៧.៨២) (ក្រោមលក្ខខណ្ឌសមស្រប អាមីតអាចត្រូវបានញែក ចេញនៅពេលនីត្រីលរងអ៊ីដ្រូលីស)។

➤ ចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសនីត្រីលមជ្ឈដ្ឋានបាស



៨.៩ ឡាក់តាម

អាមីតរងត្រូវបានគេហៅថា **ឡាក់តាម** (lactams)។ ទំហំរបស់រងឡាក់តាមត្រូវបានតាងដោយអក្សរក្រិច ក្នុងមធ្យោបាយមួយស្រដៀងគ្នានឹងការហៅឈ្មោះឡាក់តូន។


គម្រោងបង្រៀនស្តីពីស្ថាប័ន

$$\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{—} \quad \text{Penicillin G}$$

$$\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{NH}_2)\text{—} \quad \text{Ampicillin}$$

$$\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_2\text{—} \quad \text{Penicillin V}$$

អង់ស៊ីមសកម្ម ពេនីស៊ីលីន អង់ស៊ីមសកម្ម អង់ស៊ីមអសកម្ម




ពីនីស៊ីលីន

អាស៊ីតពេនីស៊ីឡិច

၂၈၈

កាបូនីលឌីក្លរ (ClCOCl) ជាសមាសធាតុពុលខ្លាំងដែលគេហៅថា **ផូស្វែន (phosgene)** អាចត្រូវបានគេគិតថាជាឌីអាស៊ីលក្លររបស់អាស៊ីតកាបូនិច។ កាបូនីលឌីក្លរមានប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់ជាមួយអាល់កុល ២ម៉ូលបង្កើត**អាល់គីលកាបូណាត**មួយ៖




កាបូនីលឌីក្លរ

ឌីអេទីលកាបូណាត

គេតែងបន្ថែមអាមីនថ្នាក់ទី៣ទៅប្រតិកម្មដើម្បីបន្សាបអ៊ីដ្រូសែនក្លរដែលកើត។

កាបូនីលឌីក្លរមានប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញាក់បង្កើតអ៊ុយរ៉េ (urea) ៖



អ៊ុយរ៉េជាផលិតផលសម្រេចនៃមេតាប៉ូលីសរបស់សមាសធាតុមានអាសូតក្នុងថង់សត្វ ហើយត្រូវបានបញ្ចេញចោលតាមទឹកនោម។


៩.១ អាល់គីលក្លរ

ការដាក់កាបូនីលឌីក្លរជាមួយអាល់កុល១ម៉ូលធ្វើឱ្យកើតអាល់គីលក្លរ័រីផរម៉ាតមួយ៖




អាល់គីលក្លរ័រីផរម៉ាត

ឧទាហរណ៍៖




បង់ស៊ីលក្លរ័រីផរម៉ាត

អាល់គីលក្លរ័រីផរម៉ាតមានប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញាក់ឬអាមីនបង្កើតសមាសធាតុដែលគេហៅថា **កាប៉ាម៉ាត (carbamates)** ឬ **អ៊ុយរ៉េតាន (urethanes)** ៖




បង់ស៊ីលក្លរ័រីផរម៉ាតត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារក្រុមអាមីណូហៅថាក្រុមបង់ស៊ីលអុកស៊ីកាបូនីល។ សារប្រយោជន៍មួយរបស់ក្រុមបង់ស៊ីលអុកស៊ីកាបូនីលគឺថា វាអាចត្រូវបានដកចេញក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌងាយ។ ការដាក់ស្រលាយបង់ស៊ីលអុកស៊ីកាបូនីលជាមួយអ៊ីដ្រូសែន និងកាតាលីកមួយ ឬ HBr ត្រជាក់ក្នុងអាស៊ីត អាសេទិច អាចដកក្រុមការពារនេះបាន៖


ការការពារ៖




ដកក្រុមការពារ៖



គេក៏អាចទង្វើកាបាម៉ាតដោយឱ្យអាល់កុលមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីសូស្យាណាត $R-N=C=O$ (កាបាម៉ាតទំនោងជាអង្គធាតុរឹងក្រាម និងជាស្រលាយមានប្រយោជន៍សម្រាប់សម្គាល់អាល់កុល)។ ប្រតិកម្មនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូភីលលើកាបូនអាស៊ីល៖



ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតហៅថា **សេវ៉ែន** ជាកាបាម៉ាតមួយដែលបង្កើតដោយ 1-ណាប់ផ្តុលមានប្រតិកម្មជាមួយមេទីលអ៊ីសូស្យាណាត៖






សោកវាដកមួយកើតឡើងក្នុងទីក្រុម Bophal ប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៤ បណ្តាលមកពីការលេច មេទីលអ៊ីសូស្យាណាតពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មមួយ។ មេទីលអ៊ីសូស្យាណាតជាឧស្ម័នមានកម្រិតពុលខ្ពស់ ហើយប្រជាជនច្រើនជាង១៨០០នាក់នៅក្បែររោងចក្រនោះត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត។

លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.១៥៖ ចូរគូរទម្រង់ផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖


- $C_6H_5CH_2OH + C_6H_5N=C=O \rightarrow$
- $ClCOCl + CH_3NH_2$ លីស $\rightarrow$
- គ្លីស៊ីន ($H_3N^+CH_2CO_2^-$) + $C_6H_5CH_2OCOCl \xrightarrow{OH^-}$

- d. ផលិតផលពី (c) + H_2 , Pd $\rightarrow$
 e. ផលិតផលពី (c) + HBr ត្រជាក់, $CH_3CO_2H \rightarrow$
 f. អ៊ុយរ៉េ + OH^- , H_2O កម្ដៅ $\rightarrow$

ទោះបីជា អាល់គីលក្លរួម៉ាត ($ROCOCl$) គឺអាល់គីលកាបូណាត ($ROCOOR$) និងកាប៉ាម៉ាត ($ROCONH_2$, $ROCONHR$, ។ល។) មានស្ថេរភាព អាស៊ីតក្លរួម៉ាត ($HOCOCl$) អាល់គីលអ៊ីដ្រូសែនកាបូណាត ($ROCOOH$) និងអាស៊ីតកាប៉ាម៉ាត ($HOCONH_2$) មិនមានស្ថេរភាពទេ។ សមាសធាតុទាំងនេះបំបែកដោយឯក ឯងបំបែកកាបូនឌីអុកស៊ីត៖




អស្ថេរភាពគឺជាលក្ខណៈមួយដែលបញ្ជាក់ថាសមាសធាតុទាំងនេះមានបង្គុំនាទីអាស៊ីតកាបូនិច៖



១០. ប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្មរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច


ប្រតិកម្មដែលអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចបាត់បង់ CO_2 ត្រូវបានគេហៅថាប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្ម (decarboxylation) ៖



ទោះបីជាស្ថេរភាពមិនធម្មតារបស់កាបូនឌីអុកស៊ីតមានន័យថា ប្រតិកម្មកាបូកស៊ីលកម្មរបស់អាស៊ីតទាំងអស់ជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅក៏ដោយ ក្នុងការអនុវត្តន៍ ប្រតិកម្មមិនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទេ ប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅយឺតយ៉ាវ។ ក្រុមពិសេសតែងតែមានវត្តមានក្នុងម៉ូលេគុលសម្រាប់ប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្មដើម្បីឱ្យប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅលឿនគ្រប់គ្រាន់ មានប្រយោជន៍ក្នុងការសំយោគ។

- អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចដែលមានក្រុមកាបូនីលដកកាបូនមួយចេញពីក្រុមអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច ត្រូវបានគេហៅថា អាស៊ីត β -សេតូ (β -keto acids) ។ អាស៊ីតនេះធ្វើប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្មយ៉ាងងាយនៅ


ពេលពួកវាត្រូវបានដុតកម្ដៅនៅសីតុណ្ហភាព 100-150°C។ អាស៊ីត β -សេតូខ្លះក៏អាចធ្វើប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្មយឺតៗនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ដែរ។



អាស៊ីត β -សេតូ


មានមូលហេតុពីរដែលធ្វើឱ្យងាយស្រួលដល់ប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្ម៖

១. នៅពេលអាស៊ីតទាំងនេះធ្វើប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីតកម្ម វាអាចធ្វើដោយឆ្លងកាត់អន្តរភាពដ៏ងាយម្នាក់ៗ៖



ប្រតិកម្មនេះបង្កើតអែណុលមួយ (អាល់សែន-អាល់កុល) ផ្តាច់ និងរាវរាងអន្តរកម្មអាញ្ចីងមួយ។ បន្ទាប់មកអែណុលធ្វើតួតួមែរកម្មបង្កើតជាមេទីលសេតូនមួយ។

២. នៅពេលអាញ្ចីងកាបូកស៊ីឡាតធ្វើប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្ម វាបង្កើតអាញ្ចីងស្ថេរភាពដោយផលរេសូណង់មួយ៖



ប្រភេទអាញ្ចីងនេះ ដែលយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមក្នុងមេរៀនទី១៩ មានស្ថេរភាពខ្លាំងជាងអាញ្ចីង RCH_2^- ជាអាញ្ចីងដែលអាចបង្កើតដោយប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្មបើសិនអវត្ថមានក្រុម β -កាបូនីល។ វាត្រូវបានគេហៅថា អែណូឡាតមួយ។

ប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្មរបស់រ៉ាឌីកាល់កាបូកស៊ីល

ទោះបីជាអ៊ីយ៉ុងកាបូកស៊ីឡាត (RCO_2^-) របស់អាស៊ីតអាលីផាទីចងាយមិនមានប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្ម រ៉ាឌីកាល់កាបូកស៊ីល ($\text{RCO}_2\cdot$) មានប្រតិកម្ម។ ពួកវាធ្វើប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្មដោយបោះបង់ CO_2 និង បង្កើតរ៉ាឌីកាល់អាល់គីល៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១៧.១៦៖ ដោយប្រើប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្ម ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោមពីសារធាតុផ្ដើមសមស្រប៖

- a. 2-អិចសាណូន
- b. អាស៊ីត2-មេទីលប៊ុយតាណូអិច
- c. ស៊ីក្លូអិចសាណូន
- d. អាស៊ីតប៉ង់តាណូអិច

លំហាត់អនុវត្ត៍១៧.១៧: ឌីអាស៊ីលពែរអុកស៊ីត RCO-O-O-COR បំបែកយ៉ាងងាយនៅពេលដុតកម្ដៅ៖

- a. តើកត្តាណាខ្លះដែលធ្វើឱ្យវាមិនមានស្ថេរភាពដូចនេះ។
- b. ការបំបែកឌីអាស៊ីលពែរអុកស៊ីតមួយបង្កើត CO_2 ។ តើវាត្រូវបានបង្កើតតាមរបៀបណា ?
- c. ឌីអាស៊ីលពែរអុកស៊ីតតែងតែត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ដើមប្រតិកម្មវ៉ាឌីកាល់សេរី ឧទាហរណ៍ ប្រតិកម្ម ប៉ូលីមែរកម្មអាល់សែនមួយ៖




ចូរសរសេរដំណាក់កាលដែលទាក់ទង។

១១. តេស្តគីមីរបស់សមាសធាតុអាស៊ីល

- អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចជាអាស៊ីតខ្សោយ ហើយកម្លាំងអាស៊ីតរបស់វាជួយឱ្យយើងសម្គាល់ពួកវា។
- សូលុយស្យុងរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចរលាយក្នុងទឹកឱ្យតេស្តអាស៊ីតមួយដោយប្រើក្រដាសតូណីសុលខៀវ។
- អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមិនរលាយក្នុងទឹករលាយក្នុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីតរាវ និងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាត។
- សូដ្យូមប៊ីកាបូណាតជួយឱ្យយើងព្រែកសម្គាល់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចពីផេណុលទាំងអស់។ លើកលែងតែឌី និងទ្រីផេណុល ផេណុលមិនរលាយក្នុងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតរាវទេ។ នៅពេលអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចរលាយក្នុងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាត ពួកវាក៏ធ្វើឱ្យមានកាយកាបូនឌីអុកស៊ីតដែរ។

១២. ម៉ូលីអេស្តេរ និងម៉ូលីអាមីត

យើងបានឃើញក្នុងផ្នែកទី១៧.៧ក រួចហើយថា អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមានប្រតិកម្មបង្កើតអេស្តេរ៖




អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច

អាល់កុល

អេស្តេរ

ក្នុងមធ្យោបាយស្រដៀងគ្នាមួយ ស្រលាយអាស៊ីត (L ជាក្រុមចាកចេញមួយ) មានប្រតិកម្មជាមួយអាមីន (ផ្នែក១៧.៨) បង្កើតអាមីត។



ស្រលាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច អាមីន


អាមីត

ក្នុងប្រតិកម្មនីមួយៗ អង្គធាតុប្រតិករពីរផ្សំគ្នា ហើយបោះបង់ម៉ូលេគុលមួយ។ ប្រតិកម្មដូចនេះត្រូវបានគេហៅថា **ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម** (Condensation reactions) ។

ប្រតិកម្មកុងដង់កម្មស្រដៀងគ្នាដែលចាប់ផ្តើមពីអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងឌីអុល ឬឌីអាមីន អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតប៉ូលីមែរដែលអាចជាប៉ូលីអេស្ទែរ ឬប៉ូលីអាមីត។ ប៉ូលីមែរទាំងនេះត្រូវបានគេហៅ**ប៉ូលីមែរលូតលាស់តាមដំណាក់កាល** (step-growth polymers) ។


➤ ប៉ូលីអេស្ទែរ

នៅពេលអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមានប្រតិកម្មជាមួយឌីអុលមួយក្រោមលក្ខខណ្ឌសមស្រប ផលិតផលជាប៉ូលីអេស្ទែរមួយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីត 1,4-បង់សែនឌីកាបូកស៊ីលិច (អាស៊ីតតេរេផ្តាលិច) ជាមួយ 1,2-អេតានឌីអុលបង្កើតប៉ូលីមែរហៅថា **ដាក្រុន** (Dacron), **តេរេលែន** (Terelene) ឬ **ម៉ៃឡា** (Mylar) ហើយត្រូវបានគេហៅជាប្រព័ន្ធថា ប៉ូលី (អេទីឡែនតេរេផ្តាឡាត) ។



➤ ប៉ូលីអាមីត

នៅពេលអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច ឬអាស៊ីតក្លរ ឬអាស៊ីតឌីអ៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយឌីអាមីនមួយក្រោមលក្ខខណ្ឌសមស្រប ផលិតផលជាប៉ូលីអាមីតមួយ។ ឧទាហរណ៍ អាស៊ីត 1,6-អិចសានឌីអុអ៊ិច (អាស៊ីត អាឌីពិច) អាចមានប្រតិកម្មជាមួយ 1,6-អិចសានឌីអាមីនជាមួយកម្លៅក្នុងដំណើរការឧស្សាហកម្មមួយ ដើម្បីបង្កើតប៉ូលីអាមីតមួយហៅថា **នីឡុង** (Nylon)។ ឧទាហរណ៍នៃនីឡុងនេះគឺនីឡុង 6,6 ពីព្រោះកាត ផ្សំទាំងពីររបស់ប៉ូលីមែរមានអាតូមកាបូន៦។ គេអាចបង្កើតនីឡុងផ្សេងទៀតតាមមធ្យោបាយស្រដៀង គ្នានេះ។




១៣. សង្ខេបប្រតិកម្មអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងស្រណាយរបស់វា


ប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងស្រណាយរបស់វាត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម។ ប្រតិកម្មជាច្រើនក្នុងចំណោមប្រតិកម្មទាំងនេះជាប្រតិកម្មជំនួសអាស៊ីល។

> ប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច


១. ប្រតិកម្មជាអាស៊ីត




២. ប្រតិកម្មជ្រុក




៣. ប្រតិកម្មបម្លែងជាអាស៊ីលក្លរួ




៤. ប្រតិកម្មបម្លែងជាអេស្ត័រ



៥. ប្រតិកម្មបម្លែងជាអាមីត



៦. ប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្ម




> ប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីលក្លរួ


១. ប្រតិកម្មបម្លែង (អ៊ីដ្រូលីស) ទៅជាអាស៊ីត



២. ប្រតិកម្មបង្កើនជាអាស៊ីត



៣. ប្រតិកម្មបង្កើនជាអេស្ត័រ




៤. ប្រតិកម្មបង្កើនជាអាមីត




R' និង/ឬ R'' អាចជា H

៥. ប្រតិកម្មបង្កើនជាសេតូន




៦. ប្រតិកម្មបង្កើនជាអាស៊ីតដេអ៊ីត



➤ ប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីតឌីកាបូឡិក


១. ប្រតិកម្មបង្កើន (អ៊ីដ្រូលីស) ជាអាស៊ីត



២. ប្រតិកម្មបង្កើនជាអេស្ត័រ




៣. ប្រតិកម្មបង្កើនជាអាមីត





R' និង/ឬ R'' អាចជា H

៤. ប្រតិកម្មបង្កើនជាសេតូន (ប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម Friedel-Craft)




➤ **ប្រតិកម្មរបស់អេស្ត័រ**


១. ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីស




២. ប្រតិកម្មបម្លែងជាអេស្ត័រផ្សេងៗ៖ ប្រតិកម្មត្រង់អេស្ត័រកម្ម




៣. ប្រតិកម្មបម្លែងជាអាមីត



៤. ប្រតិកម្មជាមួយអាក់ទីបត្រីញ្ចាជ





៥. ប្រតិកម្មរេដុកម្ម




➤ **ប្រតិកម្មរបស់អាមីត**

១. ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីស





R' និង/ឬ R'' អាចជា H

២. ប្រតិកម្មបម្លែងជានីទ្រីល




➤ ប្រតិកម្មរបស់នីទ្រីល


១. ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសទៅជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច ឬអាញ្ច័ងកាបូកស៊ីឡាតមួយ



២. ប្រតិកម្មរេដុកម្មទៅជាអាល់ដេអ៊ីតដោយ (t-Bu)₂AlH (DIBAL-H)



៣. ប្រតិកម្មបម្លែងទៅជាសេតូនដោយអែក់ទីបត្រីញ៉ាដ ឬសរីរាង្គលីចូម៖











XXXXXX

លំហាត់មេរៀនទី១៧

ទម្រង់ និងការហៅឈ្មោះ

១. ចូរគូរទម្រង់របស់សមាសធាតុខាងក្រោម៖
 - a. អាស៊ីតអុកតាណូអ៊ីច
 - b. ប្រូប៉ាណាមីត
 - c. N,N-ឌីមេទីលអ៊ីចសាណាមីត
 - d. អាស៊ីត 2-មេទីល-4-អ៊ីចសែណូអ៊ីច
 - e. អាស៊ីតប៊ុយតានឌីអុអ៊ីច
 - f. អាស៊ីត 1,2-បង់សែនឌីអុអ៊ីច (អាស៊ីតផ្កាលិច)
 - g. អាស៊ីត 1,4-បង់សែនឌីអុអ៊ីច (អាស៊ីតតេរេផ្កាលិច)
 - h. អាស៊ីតឌីអ៊ីដ្រូក្លរិក
 - i. អ៊ីសូប៊ុយទីលប្រូប៉ាណូអាត
 - j. បង់ស៊ីលអាសេតាត
 - k. អេតាណូអ៊ីលក្លរួ (អាសេទីលក្លរួ)
 - l. 2-មេទីលប្រូប៉ានីទីល
 - m. អេទីល 3-អុកស៊ុប៊ុយតាណូអាត (អេទីលអាសេតូអាសេតាត)
 - n. ឌីអេទីលប្រូប៉ានឌីអុអាត (ឌីអេទីលម៉ាឡណាត)

២. ចូរឱ្យឈ្មោះ IUPAC ឬឈ្មោះធម្មតារបស់សមាសធាតុខាងក្រោម៖



ការបម្លែងក្រុមបង្គុំនាទី

៣. តើផលិតផលរីករាលដាលចំបងមួយដែលអ្នករំពឹងថាទទួលបាននៅពេលអាសេទីលក្លរួមានប្រតិកម្មជាមួយសមាសធាតុខាងក្រោម៖

- a. H_2O
- b. BuLi (លីស)
- c. 1-ប៊ុយតាណុល និងពីរីឌីន
- d. NH_3 (លីស)
- e. តូលុយអែន និង AlCl_3
- f. $\text{LiAlH}(\text{t-BuO}_3)$

- g. $\text{NaOH}/\text{H}_2\text{O}$
- h. CH_3NH_2 (លើស)
- i. $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ (លើស)
- j. EtOH និង ពីរីឌីន
- k. $\text{CH}_3\text{CO}_2^-\text{Na}^+$
- l. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ និងពីរីឌីន

៤. តើផលិតផលសរីរាង្គចំបងមួយណាដែលអ្នកទទួលបាន នៅពេលអានីទ្រីតអាសេទិចមានប្រតិកម្ម ជាមួយសមាសធាតុខាងក្រោម?

- a. NH_3 (លើស)
- b. H_2O
- c. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- d. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{AlCl}_3$
- e. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ (លើស)
- f. $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{NH}$ (លើស)

៥. តើផលិតផលសរីរាង្គចំបងមួយណាដែលអ្នកទទួលបាននៅពេលអានីទ្រីតស៊ីស្តីនិចមានប្រតិកម្មជាមួយអ្នកកំទីបខាងក្រោម?

- a. NH_3 (លើស)
- b. H_2O
- c. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- d. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{AlCl}_3$
- e. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ (លើស)
- f. $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{NH}$ (លើស)

៦. តើផលិតផលណាខ្លះដែលអ្នកទទួលបាននៅពេលអេទីលប្រូប៉ាណូអាតមានប្រតិកម្មជាមួយសមាសធាតុខាងក្រោម?

- a. H_3O^+ , H_2O
- b. HO^- , H_2O
- c. 1-អុកតាណុល, HCl
- d. CH_3NH_2
- e. LiAlH_4 បន្ទាប់មក H_2O
- f. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$ លើស បន្ទាប់មក H_2O , NH_4Cl

៧. តើផលិតផលណាខ្លះដែលទទួលបាន នៅពេលប្រូប៉ាណាមីតមានប្រតិកម្មជាមួយសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោម?

- a. H_3O^+ , H_2O

b. HO^- , H_2O

c. P_4O_{10} និងកម្ដៅ

៨. តើផលិតផលណាខ្លះដែលអ្នករំពឹងថានឹងទទួលបាននៅពេលសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោមត្រូវបានដុតកម្ដៅ?


a. អាស៊ីត 4-អ៊ីដ្រូកស៊ីប៊ុយតាណូអ៊ីច

b. អាស៊ីត 3-អ៊ីដ្រូកស៊ីប៊ុយតាណូអ៊ីច


c. អាស៊ីត 2-អ៊ីដ្រូកស៊ីប៊ុយតាណូអ៊ីច

d. អាស៊ីតគ្លុយតារិច

e.








f.




លំហាត់ទូទៅ

៩. ចូរឱ្យទម្រង់របស់ផលិតផលសរីរាង្គចំបងដែលបានមកពីប្រតិកម្មនីមួយៗខាងក្រោម៖







១០. ចូរឱ្យដាក់ទីបំផុតដែលត្រូវបានការសម្រាប់ការបំប្លែងខាងក្រោម។ ក្នុងករណីខ្លះអាចប្រតិកម្មច្រើន។



១១. ចូរឱ្យទម្រង់ផលិតផលសរីរាង្គចំបងដែលបានមកពីប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




១២. ចូរគូរទម្រង់ផលិតផលសរីរាង្គចំបងដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



ចលនការប្រតិកម្ម

១៣. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មរបស់ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសប្រូប៉ាណាមីតក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត និង ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាស។


១៤. ចូរឱ្យចលនការរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



ការសំយោគ

១៥. ចូរបង្ហាញពីរបៀបបង្កើន អាស៊ីត p-ក្លរូប៉ង់សូអ៊ីចទៅសមាសធាតុខាងក្រោម៖








- អាស៊ីត p-ក្លរូប៉ង់សូអ៊ីច
- អាស៊ីត p-ក្លរូប៉ង់សូអ៊ីច
-



១៦. ចូរបង្ហាញពីរបៀបទង្វើអាស៊ីតប៉ង់តាណូអ៊ីចពីសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោម៖

- 1-ប៉ង់តាណូល
- 1-ប្រូម៉ូប៊ុយតាន (២ផ្លូវ)
- 5-ដេសែន
- ប៉ង់តាណាល់

១៧. ចូរឱ្យទម្រង់របស់សមាសធាតុពី A – Q ៖



#####


មេរៀនទី១៨

ប្រតិកម្មលើកាបូន α របស់សមាសធាតុកាបូនីល

១. សេចក្តីផ្តើម

ក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាអំពី៖

- ប្រតិកម្មដែលបានមកពីភាពអាស៊ីតខ្សោយរបស់អាតូមអ៊ីដ្រូសែនលើអាតូមកាបូនជាប់នឹងក្រុមកាបូនីល។ អាតូមអ៊ីដ្រូសែនទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថាអ៊ីដ្រូសែន α ហើយកាបូនដែលវាចងជាមួយត្រូវបានគេហៅថាកាបូន α ។



- ដំណើរការដែលអាចបង្កើតអែណុល និងអែណូឡាត។
- បញ្ញត្តិនៃប្រូតុងកម្មស៊ីនេទិច និងទែម៉ូឌីណាមិចដើម្បីបង្កើតអែណូឡាតខុសៗគ្នាពីសមាសធាតុផ្អែមដូចគ្នា។
- អាល់គីលកម្ម អាល់ស៊ីលកម្ម និងប្រតិកម្មបូកអេឡិចត្រូនផ្សេងទៀតលើអែណុល និង អែណូឡាត។
- មេរៀនពិសេសនៃគីមីដូចគ្នាដោយប្រើស្រលាយអាសូតរបស់អែណុល គឺអេណាមីន។


២. ភាពអាស៊ីតរបស់អ៊ីដ្រូសែន α នៃសមាសធាតុកាបូនីល ៖ អាញ៉ូនអែណូឡាត

នៅពេលយើងនិយាយថាអ៊ីដ្រូសែន α របស់សមាសធាតុកាបូនីលជាអាស៊ីត យើងមានន័យថាពួកវាជាអាតូមអ៊ីដ្រូសែនមានលក្ខណៈអាស៊ីតមិនធម្មតានៅលើកាបូន។

- តម្លៃ pKa របស់អ៊ីដ្រូសែន α របស់អាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនងាយស្ថិតនៅចន្លោះ 19-20។

នេះមានន័យថា ពួកវាមានលក្ខណៈអាស៊ីតខ្លាំងជាងអាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់អេទីន pKa=25 ហើយមានលក្ខណៈអាស៊ីតខ្លាំងជាងអ៊ីដ្រូសែនរបស់អេតែន (pKa=44) ឬ អេតាន (pKa=50) ខ្លាំងណាស់។


- ក្រុមកាបូនីលជាក្រុមទាញអេឡិចត្រូនខ្លាំង ហើយនៅពេលសមាសធាតុកាបូនីលមួយបោះបង់ប្រូតុង α មួយ អាញ៉ូនដែលទទួលបានហៅថាអែណូឡាតត្រូវបានបន្ស៊ប់ដោយភាពមិនដៅកន្លែង។



ទម្រង់រេសូណង់របស់អែណូឡាត

ទម្រង់រេសូណង់ពីរ A និង B អាចត្រូវបានសរសេរតាងឱ្យអែណូឡាត។ ក្នុងទម្រង់A បន្ទុកអវិជ្ជមានស្ថិតនៅលើកាបូន ហើយក្នុងទម្រង់B បន្ទុកអវិជ្ជមាននេះស្ថិតនៅលើអុកស៊ីសែន។ ទម្រង់ទាំងពីរនេះរួមគ្នា

បង្កើតអ៊ីប៊្រីតមួយ។ ទោះបីជាទម្រង់ A ត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយកម្លាំងនៃសម្ព័ន្ធអាបូន-អុកស៊ីសែនបើប្រៀបធៀបនឹងសម្ព័ន្ធអាបូន-អាបូនរបស់ B ក៏ដោយ ទម្រង់ B មានរបាយទៅកាន់អ៊ីប៊្រីតធំជាង ពីព្រោះអុកស៊ីសែនមានលទ្ធភាពមានបន្ទុកអវិជ្ជមានជាង។ យើងអាចតាងទម្រង់អ៊ីប៊្រីតរបស់អែណូឡាតដូចខាងក្រោម៖




ទម្រង់អ៊ីប៊្រីតរសូណង់របស់អែណូឡាត

នៅពេលអែណូឡាតនេះទទួលយកប្រូតុងមួយ វាអាចធ្វើឡើងតាមមធ្យោបាយពីរ៖ វាអាចទទួលប្រូតុងលើកាបូនបង្កើតសមាសធាតុកាបូនីលដើម ដែលគេហៅថាទម្រង់សេតូ (keto form) ឬវាអាចទទួលប្រូតុងលើ អុកស៊ីសែនបង្កើតអែណូលមួយ (អាល់សែនអាល់កុល)។


- អែណូឡាតជាបាសឆ្លាស់របស់ទម្រង់អែណូល និងសេតូ។
- ប្រតិកម្មទាំងពីរខាងក្រោមជាប្រតិកម្មអាចត្រលប់។

ប្រូតុងអាចបូកលើទីនេះ៖



ប្រូតុងអាចបូកលើទីនេះ៖

គំរូបូតុងស្វ័យលេខអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់អែណូឡាតនៃសេតូនត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។ គំរូនេះបង្ហាញពីទំហំដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រូនក្រៅបង្គស់ (ផ្ទៃ Van der Waals) របស់អែណូឡាតសេតូ។ ពណ៌ក្រហមជិតអុកស៊ីសែនបញ្ជាក់ថាវាអាចបន្ស៊ុបបន្ទុកអវិជ្ជមានលើសរបស់អ៊ីយ៉ុង។ ពណ៌លឿងនៅលើកាបូនដែលត្រូវបានដកអាតូមអ៊ីដ្រូសែន α បញ្ជាក់ថា បន្ទុកអវិជ្ជមានលើសខ្លះមានទីតាំងនៅទីនេះផងដែរ។ ការអនុវត្តន៍នេះសមស្របទៅនឹងការសន្និដ្ឋានអំពីរបាយបន្ទុកខាងលើក្នុងអ៊ីប៊្រីត ដែលពឹងផ្អែកលើភាពមិនដេកនៃកន្លែង និងឥទ្ធិពល នៃកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមាន។




អែណូឡាតរបស់សេតូន

៣. តូតូមែរសេតូ និងអែណុល


ទម្រង់សេតូ និងអែណុលរបស់សមាសធាតុកាបូនីលជាអ៊ីសូមែរទម្រង់នឹងគ្នា ប៉ុន្តែជាប្រភេទពិសេសមួយ។ ដោយសារតែពួកវាងាយស្រួលបម្លែងទៅវិញទៅមកដោយផ្ទៃប្រែតុងក្រោមវត្តមានអាស៊ីត ឬបាស អ្នកគីមីប្រើពាក្យពិសេសដើម្បីបរិយាយអ៊ីសូមែរទម្រង់ទាំងនេះ។

- ទម្រង់សេតូ និងអែណុលដែលអាចបម្លែងទៅវិញទៅមកត្រូវបានគេហៅថា **តូតូមែរ** (tautomers) ហើយ ការបម្លែងទៅវិញទៅមករបស់វាត្រូវបានគេហៅថា **តូតូមែរកម្ម** (tautomization) ។


ស្ទើរតែគ្រប់កាលៈទេសៈ យើងជួបប្រទះតូតូមែរសេតូ-អែណុលក្នុងភាពលំនឹង (ផ្ទៃរបស់ឧបករណ៍កែវពិសោធន៍អាចជាកតាលីកក្នុងការបម្លែងទៅវិញទៅមក និងបង្កើតលំនឹង)។ ចំពោះសមាសធាតុម៉ូណូកាបូនីល ដូចជាអាសេតូន និងអាសេតាល់ដេអ៊ីត បរិមាណរបស់អែណុលដែលមានវត្តមាននៅលំនឹងគឺតិចតួចណាស់។ ក្នុងអាសេតូន វាមានបរិមាណតិចជាង 1% ក្នុងអាសេតាល់ដេអ៊ីត កំហាប់អែណុលមានបរិមាណតូចពេកមិនអាចសម្គាល់បាន។ ស្ថេរភាពកាន់តែខ្ពស់របស់ទម្រង់សេតូពីសមាសធាតុម៉ូណូកាបូនីលអាចទាក់ទងនឹងកម្លាំងសម្ព័ន្ធអាតូម-អុកស៊ីសែនខ្លាំងជាងសម្ព័ន្ធអាតូម-កាបូន (~ 364 នឹង $\sim 250 \text{ kJ mol}^{-1}$) ៖



ក្នុងសមាសធាតុដែលម៉ូលេគុលមានក្រុមកាបូនីលពីរព្រែកពីគ្នាដោយអាតូមកាបូនមួយ (សមាសធាតុ β -ឌីកាបូនីល) បរិមាណរបស់អែណុលនៅលំនឹងច្រើនជាងឆ្ងាយណាស់។ ឧទាហរណ៍ ប៉ង់តាន-2,4-ឌីអ៊ុន មាន ទម្រង់អែណុលរហូតដល់ 76% ៖



- ស្ថេរភាពខ្លាំងជាងនៃទម្រង់អែណូលរបស់សមាសធាតុβ-ឌីកាបូនីលអាចបានមកពីបន្ទុកអវិជ្ជមានស្ថេរភាពរបស់សម្ព័ន្ធពីរជាន់ឆ្លាស់ និង តាមរយៈការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន (ក្នុងទម្រង់វែងមួយ)។




បន្ទុកអវិជ្ជមានរបស់ទម្រង់អែណូល

លំហាត់អនុវត្ត៩៨.១ ៖ គ្រប់គោលបំណងទាំងអស់ សមាសធាតុ ស៊ីក្លូអ៊ីចសា-2,4-ឌីអែន-1-អូន ស្ថិតក្នុងទម្រង់អែណូលរបស់វា។ ចូរសរសេរទម្រង់របស់ស៊ីក្លូអ៊ីចសា-2,4-ឌីអែន-1-អូន និងទម្រង់អែណូលរបស់វា។ តើកត្តាណាខ្លះដែលធ្វើឱ្យទម្រង់អែណូលរបស់វាមានស្ថេរភាព?

៤. ប្រតិកម្មតាមអែណូល និងអែណូឡាត

៤.១ វ៉ាសេមិចកម្ម


នៅពេលសូលុយស្យុង (R)-(+)-2-មេទីល-1-ផេនីលប៊ុយតាន-1-អូន (មើលប្រតិកម្មខាងក្រោម) ក្នុងអេតាណុលរាវត្រូវបានដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតផង និងបាសផង ជាទូទៅសូលុយស្យុងនេះបាត់បង់ សកម្មភាពអុបទិចរបស់វា។ មួយសន្ទុះមក ការព្រែកសេតូនបង្ហាញថាវាត្រូវបានរកវ៉ាសេមិចកម្មទាំងស្រុង។ ទម្រង់(+)-របស់សេតូនត្រូវបានបង្កើនជាល្បាយស្មើម៉ូលនៃអេណង់តូមែរបស់វាតាមទម្រង់អែណូលរបស់វា។




- វ៉ាសេមិចកម្មលើកាបូន α កើតឡើងក្រោមវត្តមានអាស៊ីត ឬបាសពីព្រោះទម្រង់សេតូនកើតយឺត ប៉ុន្តែអាចត្រលប់ទៅអែណូលវិញ ហើយ អែណូលជាម៉ូលេគុលអតីរ៉ាល់។

នៅពេលអែណូលបង្កើតទៅជាទម្រង់សេតូន វាអាចបង្កើតអេណង់តូមែរពីរដែលមានបរិមាណស្មើគ្នា។ បាសមួយដើរតួជាភាគីក្នុងការបង្កើតអែណូល ដោយឆ្លងកាត់អង្គធាតុជាអាញ៉ុងអែណូឡាតមួយ។

➢ ចលនការប្រតិកម្មអែណូលកម្មភាគលីករបាន




➢ ចលនការប្រតិកម្មអែណុលកម្មកាតលីកអាស៊ីត




ក្នុងសេតូនអាស៊ីតិច អែណុល ឬអែណូឡាតអាចជា(E) ឬ (Z)។ ប្រូតុងកម្មលើមុខមួយរបស់អ៊ីសូមែរ (E) និងប្រូតុងកម្មលើមុខដូចគ្នាលើអ៊ីសូមែរ (Z) បង្កើតអែណង់តូមែរ។

លំហាត់អនុវត្ត៩៨.២ ៖ តើសេតូនសកម្មអុបទិបខាងក្រោមអាចរងវ៉ាសេមិចកម្មកាតលីកអាស៊ីត ឬបាស ឬទេ? ចូរពន្យល់។



- ដ្យាស្តេរ៉េអ៊ីសូមែរដែលមានកុងក្លាវ៉ាស្យុងខុសគ្នាតែលើមណ្ឌលគីរ៉ាល់មួយជួនកាលត្រូវបានគេហៅថា **អេពីមែរ** (epimers) ។


ជួនកាលគេប្រើវ៉ាសេមិចកម្មសេតូ-អែណុលដើម្បីបង្កើនអេពីមែរអន់ស្ថេរភាពមួយទៅជាអេពីមែរមានស្ថេរភាពមួយ។ ដំណើរការលំនឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃ**អេពីមែរកម្ម** (epimerization) ។ ឧទាហរណ៍មួយជាប្រតិកម្មអេពីមែរកម្មនៃស៊ីស-ដេកាឡូន ទៅជាត្រងូ-ដេកាឡូន៖



លំហាត់អនុវត្ត៩៨.៣ ៖ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មមួយដោយប្រើសូដ្យូមអេតុកស៊ីតក្នុងអេតាណុលសម្រាប់ប្រតិកម្មអេពីមែរកម្មរបស់ស៊ីស-ដេកាឡូនទៅជាត្រងូ-ដេកាឡូន។ ចូរគូរទម្រង់កុងផរម៉ាស្យុងកៅអីដែលបង្ហាញពីមូលហេតុដែលធ្វើឱ្យត្រងូ-ដេកាឡូនមានស្ថេរភាពជាងស៊ីស-ដេកាឡូន។

៤.២ អាឡូសែនកម្មលើកាបូន α


- សមាសធាតុកាបូនីលដែលមានអ៊ីដ្រូសែន α អាចរងប្រតិកម្មជំនួសអាឡូសែនលើកាបូន α ក្រោមវត្តមាន អាស៊ីត ឬបាស។




➤ អាឡូសែនកម្មជំរុញដោយបាស

ក្រោមវត្តមានបាស អាឡូសែនកម្មកើតឡើងដោយឆ្លងកាត់ការកើតអាញ៉ុងអែណូឡាត ឬ អែណុល យឺតៗ បន្ទាប់មកប្រតិកម្មរវាងអែណុល ឬអែណូឡាតជាមួយអាឡូសែនកើតឡើងយ៉ាងរហ័ស។

- ចលនការប្រតិកម្មអាឡូសែនកម្មជំរុញដោយបាស
ជំណាក់កាលទី១



- ជំណាក់កាលទី២




ដូចដែលយើងនឹងឃើញក្នុងផ្នែកទី១៨.៤.៣ ប្រតិកម្មពហុអាឡូសែនអាចកើតឡើង។


➤ អាឡូសែនកម្មជំរុញដោយអាស៊ីត

ក្រោមវត្តមានអាស៊ីត ប្រតិកម្មអាឡូសែនកម្មកើតឡើងដោយឆ្លងកាត់ការកើតអែណុលមួយយឺតៗ បន្ទាប់មកប្រតិកម្មរបស់អែណុលជាមួយអាឡូសែនកើតឡើងយ៉ាងរហ័ស។


- ចលនការប្រតិកម្មអាឡូសែនកម្មកាតាលីកអាស៊ីតរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន
ជំណាក់កាលទី១



- ជំណាក់កាលទី២



- ជំណាក់កាលទី៣



ភស្តុតាងមួយផ្នែកដែលគាំទ្រចលនការប្រតិកម្មនេះបានមកពីការសិក្សាស៊ីនេទិចប្រតិកម្ម។ ទាំងប្រតិកម្ម អាឡូសែនកម្មជំរុញដោយអាស៊ីត និងបាសរបស់សេតូន បង្ហាញល្បឿនដើមដែលមិនអាស្រ័យលើកំហាប់

អាឡូសែន។ ចលនការប្រតិកម្មដែលយើងបានសរសេរខាងលើមានការសង្កេតនេះ៖ ក្នុងប្រតិកម្មទាំងពីរ ដំណាក់កាលយឺតរបស់ចលនការកើតឡើងមុនពេលមានការប្រយុទ្ធពីអាឡូសែន។


លំហាត់អនុវត្ត៩៨.៤៖ ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាអាឡូសែនកម្មសេតូនក្នុងបាសមួយត្រូវបានជំរុញដោយបាស មិនមែនកាតាលីសដោយបាស?

លំហាត់អនុវត្ត៩៨.៥៖ ភស្តុតាងលើចលនការប្រតិកម្មអាឡូសែនកម្មដែលយើងទើបតែបានលើកឡើងពីការពិតខាងក្រោម៖

- 2-មេទីល-1-ផេនីលប៊ុយតាន-1-អូនសកម្មអុបទិចរងរ៉ាសេមិចកម្មកាតាលីករអាស៊ីតក្នុងល្បឿនប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងល្បឿននៅពេលរងប្រតិកម្មអាឡូសែនកម្មកាតាលីករអាស៊ីត។
 - 2-មេទីល-1-ផេនីលប៊ុយតាន-1-អូនរងអ៊ីយ៉ូតកម្មកាតាលីករអាស៊ីតក្នុងល្បឿនដូចទៅនឹងល្បឿននៅពេលរងប្រមូលកម្មកាតាលីករបាស។
 - 2-មេទីល-1-ផេនីលប៊ុយតាន-1-អូន រងប្រតិកម្មបណ្តុះអ៊ីដ្រូសែន-ដឺតេរ៉ូមកាតាលីករបាសក្នុងល្បឿនដូចទៅនឹងល្បឿននៅពេលរងប្រតិកម្មអាឡូសែនកម្មជំរុញដោយបាស។
- ចូរពន្យល់ពីរបៀបដែលការសង្កេតទាំងនេះគាំទ្រចលនការដែលយើងសរសេរខាងលើ។

៤.៣ ប្រតិកម្មអាឡូផង


នៅពេលមេទីលសេតូនមានប្រតិកម្មជាមួយអាឡូសែនក្នុងវត្តមានបាសលើស ប្រតិកម្មពហុអាឡូសែនកម្មតែងតែកើតឡើងលើកាបូនរបស់ក្រុមមេទីល។ ប្រតិកម្មពហុអាឡូសែនកម្មកើតឡើងពីព្រោះការបញ្ចូល អាឡូសែនទី១ (ដោយសារតែកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានរបស់វា) ធ្វើឱ្យអ៊ីដ្រូសែននៅសល់លើកាបូនមេទីល កាន់តែមានភាពអាស៊ីត។ ប៉ុន្តែ ក្រុម CX_3 ដែលទទួលបានចងសម្ព័ន្ធទៅក្រុមកាបូនីលអាចជាក្រុមចាកចេញមួយ។ ដូចនេះ នៅពេលអ៊ីដ្រូស៊ីតជាបាស ប្រតិកម្មជំនួសអាស៊ីលកម្មកើតឡើង បង្កើតអំបិលកាបូកស៊ីឡាតមួយ និងអាឡូផងមួយ (CHX_3 ដូចជា ក្លរូផង ប្រូមូផង ឬអ៊ីយ៉ូដូផង)។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍៖




ប្រតិកម្មអាឡូផងជាប្រតិកម្មមួយដែលមានកាប៉ូនមួយមានអំពើជាក្រុមចាកចេញ។ ប្រតិកម្មនេះកើតឡើងពីព្រោះ អាញ់ដ្រីអាឡូមេទីលមានស្ថេរភាពមិនធម្មតា បន្ទុកអវិជ្ជមានរបស់វាត្រូវបានពង្រាយដោយអាតូមអាឡូសែនបី (នៅពេល $X=Cl$ អាស៊ីតត្រួសជា $CHCl_3$ មាន $pK_a=13.6$)។ ក្នុងដំណាក់កាលទី១ បន្ទុកប្រូតុងមួយកើតឡើងរវាងអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងអាញ់ដ្រីអាឡូមេទីល។

ប្រតិកម្មអាឡូផងមានសារប្រយោជន៍សំយោគ ជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់បម្លែងមេទីលសេតូនទៅជាអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច។ នៅពេលប្រតិកម្មអាឡូផងត្រូវបានប្រើក្នុងការសំយោគគ្រួរ និងប្រូមត្រូវបានប្រើជាភាគីអាឡូសែន។ ក្លរូផង ($CHCl_3$) និងប្រូមូផង ($CHBr_3$) ជាសារធាតុរាវដែលមិនរលាយក្នុងទឹក ហើយងាយស្រួល ព្រែកចេញពីសូលុយស្យុងដែលមានអាញ់ដ្រីកាបូកស៊ីឡាត។ នៅពេលភាគីអាឡូសែនជាអ៊ីយ៉ូត កករឹងពណ៌ លឿងច្បាស់នៃអ៊ីយ៉ូដូផង (CHI_3) កកើតឡើង។ ប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មតេស្តចំណាត់ថ្នាក់អ៊ីយ៉ូដូផង


របស់មេទីលសេតូន និងមេទីលអាល់កុលថ្នាក់ទី២ (ដែលរងអុកស៊ីតកម្មទៅជាមេទីលសេតូនជាដំបូងក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិកម្មទាំងនេះ)៖



➢ ចលនការប្រតិកម្មអាឡូដម
ដំណាក់កាលអាឡូសែនកម្ម៖



ដំណាក់កាលជំនួសអាស៊ីល




អាញ៉ុងកាបូកស៊ីឡាត អាឡូដម


៤.៤ អាស៊ីត-អាឡូ កាបូកស៊ីលិច ៖ ប្រតិកម្ម Hell-Volhard-Zelinski

អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចដែលមានអាតូមអ៊ីដ្រូសែន α ប្រតិកម្មជាមួយប្រូម ឬក្លរក្រោមវត្តមានផូស្វរ (ឬផូស្វរអាឡូសែន) បង្កើតអាស៊ីត α -អាឡូកាបូកស៊ីលិច តាមប្រតិកម្មដែលគេហៅថា ប្រតិកម្ម Hell-Volhard-Zelinski (ឬ HVZ)។

ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍៖




បើសិនគេប្រើប្រូម ឬក្លរលើសពី១ម៉ូលក្នុងប្រតិកម្មនេះ ផលិតផលដែលទទួលបានជា អាស៊ីត α,α -ឌីអាឡូ ឬ អាស៊ីត α,α,α -ទ្រីអាឡូ។

ដំណាក់កាលសំខាន់ក្នុងប្រតិកម្មនេះជាការកើតអាស៊ីលក្លរួម និងអែណូលដែលបានពីអាស៊ីលក្លរួ។ អាស៊ីលក្លរួជាសមាសធាតុសំខាន់ ពីព្រោះអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចមិនអាចបង្កើតអែណូលទេ ដោយសារតែប្រូតុងរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចត្រូវបានដកចេញមុនអ៊ីដ្រូសែន α ។ អាស៊ីលក្លរួមិនមានអ៊ីដ្រូសែនកាបូកស៊ីលិចទេ។




ទម្រង់អែណូល

វិធីសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់ប្រតិកម្ម α -អាឡូសែនកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ D. N. Harpp (សាកលវិទ្យាល័យ McGill)។ អាស៊ីលក្លរួដែលបានកើតដោយប្រតិកម្មរបស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចជាមួយ SOCl_2 ត្រូវបានដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយ N-អាឡូស៊ីស៊ីនីមីត និងបរិមាណបន្តិចបន្តួចនៃ HX បង្កើត α -ក្លរូ ឬ α -ប្រូម៉ូអាស៊ីលក្លរួ។




α -អ៊ីយ៉ូដូអាស៊ីលក្លរួអាចទទួលបានដោយប្រើម៉ូលេគុលអ៊ីយ៉ូតក្នុងប្រតិកម្មស្រដៀងគ្នា។




អាស៊ីត α -អាឡូជាអង្គធាតុកណ្តាលសំយោគសំខាន់ ពីព្រោះពួកវាអាចធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនុយក្លេអូក្លីលផ្សេងៗ។

ការបម្លែងទីជាអាស៊ីត α -អ៊ីដ្រូកស៊ី




ឧទាហរណ៍៖



អាស៊ីត 2-អ៊ីដ្រូកស៊ីប៊ុយតាណូអ៊ីច


ការបម្លែងទៅជាអាស៊ីត α -អាមីនេ



អាស៊ីត α -អាឡូ

អាស៊ីត α -អាមីនេ

ឧទាហរណ៍៖



អាស៊ីតអាមីណូអាសេទិច

៥. លីចូមអែណូឡាត

ទីតាំងលំនឹងដែលអែណូឡាតមួយកើតអាស្រ័យលើកម្លាំងបានដែលបានប្រើ។ បើសិនជាគេប្រើបានខ្សោយជាងអែណូឡាត នោះលំនឹងរំកិលទៅខាងឆ្វេង។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាក្នុងករណី ពេលសេតូនមួយត្រូវបានប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូមអេតុកស៊ីតក្នុងអេតាណុល។



អាស៊ីតខ្សោយជាង

បានខ្សោយជាង

បានខ្លាំងជាង

អាស៊ីតខ្លាំងជាង

(pKa=19)

(pKa=16)

ម្យ៉ាងវិញទៀត បើសិនជាគេប្រើបានខ្លាំងមួយ លំនឹងនឹងរំកិលទៅខាងស្តាំ។ បានខ្លាំងសំខាន់មួយសម្រាប់បម្លែងសមាសធាតុកាបូនីលទៅជាអែណូឡាតគឺលីចូមឌីអ៊ីសូប្រូពីលអាមីត (LDA) ឬ $\text{LiN}(\text{i-Pr})_2$ ៖



សេតូន

LDA

អែណូឡាត

ឌីអ៊ីសូប្រូពីលអាមីន

(អាស៊ីតខ្លាំងជាង)

(បានខ្លាំងជាង)


(បានខ្សោយជាង)

(អាស៊ីតខ្លាំងជាង)

(pKa=19)

(pKa=38)

- លីចូមឌីអ៊ីសូប្រូពីលអាមីត (LDA) អាចត្រូវបានទង្វើដោយរំលាយឌីអ៊ីសូប្រូពីលអាមីនក្នុងធាតុរំលាយ មួយដូចជាឌីអេទីលអេទែរ ឬ THF និងដាក់ឱ្យធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអាល់គីលលីចូមមួយ៖




៥.១ ការកកើតជ្រើសតំបន់នៃអែណូឡាត

សេតូនអស៊ីមេទ្រីដូចជា 2-មេទីលស៊ីក្លូអិចសានអាចបង្កើតអែណូឡាតពីរ ដែលបានពីការដកអ៊ីដ្រូសែន α មួយពីមុខម្ខាង ឬមុខម្ខាងទៀតនៃក្រុមកាបូនីល។ អែណូឡាតណាដែលមានឧត្តមភាពក្នុងប្រតិកម្មអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌដែលសម្របសម្រួលលំនឹងអាស៊ីតបាន។


- អែណូឡាតទែម៉ូឌីណាមិចជាអែណូឡាតដែលមានស្ថេរភាពជាងគេ។ ស្ថេរភាពរបស់អែណូឡាតត្រូវបានវាយតម្លៃដូចជាលំនឹងដែរ មានន័យថា អែណូឡាតណាដែលមានក្រុមជួសច្រើនជាងគេមានស្ថេរភាពជាងគេ។
- អែណូឡាតទែម៉ូឌីណាមិចក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យទែម៉ូឌីណាមិច ដែលលំនឹងប្រូតុងកម្ម-ដេប្រូតុងកម្ម អាចធ្វើការបម្លែងទៅវិញទៅមករវាងអែណូឡាតដែលកើតមាន ដូចជាអែណូឡាតដែលមានស្ថេរភាពជាងគេមានកំហាប់ខ្ពស់ជាងគេ។ ករណីកើតឡើងនៅពេល pK_a របស់អាស៊ីតឆ្លាស់នៃបាននេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹង pK_a នៃអ៊ីដ្រូសែន α របស់សមាសធាតុកាបូនីល។ ដោយប្រើអ៊ីដ្រូស៊ីត ឬអាល់កុកស៊ីតក្នុងធាតុរំលាយប្រូតុងមួយធ្វើឱ្យសម្របសម្រួលដល់ការកកើតអែណូឡាតទែម៉ូឌីណាមិច។
- អែណូឡាតស៊ីនេទិចជាអែណូឡាតដែលកើតលឿនជាងគេ។ វាតែងតែកកើតពីការដកអ៊ីដ្រូសែន α ដែលមានរបាំងស្តេរិចតិច។
- អែណូឡាតស៊ីនេទិចមានឧត្តមភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យស៊ីនេទិចដែលមិនសម្របសម្រួលលំនឹងរវាងអែណូឡាតដែលកើតមាន។ ដោយប្រើបាសខ្លាំង និងមានរបាំងស្តេរិចច្រើនក្នុងធាតុរំលាយគ្មានប្រូតុង ដូចជា LDA ក្នុងតេត្រាអ៊ីដ្រូផ្សាណូ (THF) ឬ ឌីមេតុកស៊ីអេតាន (DME) ធ្វើឱ្យសម្របសម្រួលដល់ការកកើតអែណូឡាតស៊ីនេទិច។

លក្ខខណ្ឌដែលសម្របសម្រួលការកកើតអែណូឡាតទែម៉ូឌីណាមិច និងស៊ីនេទិច ពី 2-មេទីលស៊ីក្លូអិចសានត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។

ការកកើតអែណូឡាតទែម៉ូឌីណាមិចមួយ៖




ការកើតអែណូឡាតស៊ីនេទិចមួយ៖



៥.២ ប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មផ្ទាល់របស់សេតូនតាមលីចូមអែណូឡាត

ការកើតលីចូមអែណូឡាតដោយប្រើលីចូមឌីអ៊ីសូប្រូពីលអាមីតជាមធ្យោបាយមានប្រយោជន៍មួយ ទៀតនៃការធ្វើអាល់គីលកម្មសេតូនតាមផ្លូវជ្រើសតំបន់មួយ។ ឧទាហរណ៍ លីចូមអែណូឡាតដែលកើតពី 2-មេទីលស៊ីក្លូអិចសានអាចរងមេទីឡាតកម្ម ឬបង់ស៊ីឡាតកម្មលើកាបូន α មានរបាំងស្តេរីចិតិច ដោយអាច ធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយ LDA បន្ទាប់មកធ្វើប្រតិកម្មដោយមេទីលអ៊ីយ៉ូដ ឬបង់ស៊ីលប្រូម៖




ប៉ុន្តែប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មទាំងនេះមានលីមីតសំខាន់មួយ ពីព្រោះប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្ម S_N2 ហើយ ដោយសារតែអែណូឡាតជាបាសខ្លាំង។

- អាល់គីលកម្មអាចកើតឡើងតែនៅពេលគេប្រើអាល់គីលអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី១ បង់ស៊ីលអាឡូសែន្នថ្នាក់ ទី១ និងអាលីលអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី១។ ចំពោះអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី២ និងទី៣ ប្រតិកម្មបណ្តាច់នឹងកើត ឡើងជាប្រតិកម្មឧត្តមភាព។


៥.៣ អាល់គីលផ្ទាល់នៃអេស្តែរ

ឧទាហរណ៍នៃប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មនៃអេស្តែរត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។ ក្នុងឧទាហរណ៍ទី២ អេ ស្តែរជាឡាក់តូនមួយ៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១៨.៦៖

- a. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលទាក់ទងនឹងលីចូមអែណូឡាតមួយសម្រាប់បញ្ចូលក្រុមមេទីលទៅក្នុងសមាសធាតុខាងក្រោម (អង្គធាតុកណ្តាលក្នុងការសំយោគកាហ្វេស្តូលដោយ E. J. Corey ដែលជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលមានក្នុងគ្រាប់កាហ្វេ)។




- b. ឌីអែណូឡាតអាចត្រូវបានបង្កើតពីβ-សេតូអេស្តែរដោយប្រើLDAម៉ូល។ បន្ទាប់មកឌីអែណូឡាតអាចរងអាល់គីលកម្មជ្រើសរើសលើកាបូនអែណូឡាតពីរដែលមានភាពបាសខ្លាំងជាងគេ។ ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មសំរាប់សំយោគសមាសធាតុខាងក្រោមដោយប្រើឌីអែណូឡាតមួយ និងអាល់គីលអាឡូសែន្តសមស្រប។




៦. អែណូឡាតរបស់សមាសធាតុβ-ឌីកាបូនីល


- អាតូមអ៊ីដ្រូសែនដែលស្ថិតនៅចន្លោះក្រុមកាបូនីលពីរ ដូចជាក្នុងសមាសធាតុβ-ឌីកាបូនីលមានតម្លៃ pKa ក្នុងចន្លោះ 9 -11។ អាតូមអ៊ីដ្រូសែនα ទាំងនេះមានភាពអាស៊ីតខ្លាំងជាងអ៊ីដ្រូសែនαដែលនៅជាប់ ក្រុមកាបូនីលតែមួយ ដែលមានតម្លៃ pKa ក្នុងចន្លោះ 18-20។



- បាសខ្សោយខ្លាំងជាងLDA ដូចជាអាល់កុកស៊ីត អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតអែណូឡាតមួយពីសមាសធាតុβ-ឌីកាបូនីល។




យើងអាចបកស្រាយអំពីកម្រិតអាស៊ីតខ្លាំងជាងរបស់ប្រព័ន្ធប្រូតុង-ឌីកាបូនីល បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយសមាសធាតុម៉ូណូកាបូនីល ដោយភាពមិនដេកនៃបន្ទុកអវិជ្ជមានលើអាតូមអុកស៊ីសែនពីរ មិនមែនមួយ។ យើងអាចតាងភាពមិនដេកនៃបន្ទុកអវិជ្ជមាននេះដោយគូសទម្រង់រេសូណង់របស់β-ឌីកាបូនីលអែណូឡាត និងទម្រង់ អ៊ីប្រីតរបស់វា៖




ទម្រង់រេសូណង់

អ៊ីប្រីតរេសូណង់

យើងអាចបង្ហាញភាពមិនដេកនៃបន្ទុករបស់ β -ឌីកាបូនីលអែលីអូឡាតមួយដោយពិចារណាលើគំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់អែលីអូឡាតដែលបានមកពីប៉ង់តាន-2,4-ឌីអូន និងអាសេតូន។ នៅទីនេះយើងឃើញថា បន្ទុកអវិជ្ជមានរបស់អែលីអូឡាតបានមកពីប៉ង់តាន-2,4-ឌីអូនប្រមូលផ្តុំគ្នាលើអាតូមអុកស៊ីសែនពីរ បើប្រៀបធៀបជាមួយអែលីអូឡាតដែលបានមកពីអាសេតូន ដែលបន្ទុកអវិជ្ជមានក្នុងអែលីអូឡាតនៅសល់លើអាតូមកាបូន α ៖




ប៉ង់តាន-2,4-ឌីអូនអែលីអូឡាត




អាសេតូនអែលីអូឡាត

មានសមាសធាតុ β -ឌីកាបូនីលសំខាន់ពីរត្រូវបាននិយមប្រើក្នុងការសំយោគសរីរាង្គ។ ពួកវាគឺ អាសេតូអាសេទិចអេស្ត័រ (អេទីលអាសេតូអាសេតាត, អេទីល 3-អុកសូប៊ុយតាណូអាត) ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតស្រលាយអាសេតូនជួស និងមួយទៀតគឺ ឌីអេទីលម៉ាឡូណាត (អាស៊ីតឌីអេទីល 1,3-ប្រូប៉ានឌីកាបូកស៊ីលិច) ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតអាសេទិចជំនួស និងស្រលាយរបស់វា។ យើងនឹងសិក្សាអំពីការសំយោគដែលទាក់ទងនឹងអាសេតូអាសេតាត និងឌីអេទីលម៉ាឡូណាតក្នុងផ្នែកបន្ទាប់នៃមេរៀននេះ។




អាសេតូអាសេទិចអេស្ត័រ



ឌីអេទីលម៉ាឡូណាត

៧. ការសំយោគមេទីលសេតូន៖ ការអេស្ត័រសំយោគអាសេតូអាសេទិច

ដោយសារតែអេស្ត័រអាសេតូអាសេទិចជាសមាសធាតុកាបូនីល β អាចត្រូវបានបម្លែងជាអែលីអូឡាតមួយដោយប្រើសូដ្យូមអេតុកស៊ីត។ បន្ទាប់មក យើងអាចធ្វើប្រតិកម្មអាល់គីឡាតលើអែលីអូឡាតដែលកើត (ហៅថា អេស្ត័រសូដ្យូមអាសេតូអាសេទិច) ជាមួយអាល់គីលអាឡូសែនមួយ។ ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថា ការសំយោគអេស្ត័រអាសេតូអាសេទិច។



អេស្ត័រអាសេតូអាសេទិច


អេស្ត័រសូដ្យូមអាសេតូអាសេទិច

អេស្ត័រម៉ូណូអាល់គីលអាសេតូអាសេទិច

- ដោយសារតែអាល់គីលកម្មក្នុងប្រតិកម្មខាងលើជាប្រតិកម្ម S_N2 មួយ គេទទួលបានទិន្នផលល្អពីការប្រើអាល់គីលអាឡូសែនថ្នាក់ទី១ (រួមទាំងអាលីលអាឡូសែន និងបង់ស៊ីលអាឡូសែនថ្នាក់ទី១) ឬ មេទីលអាឡូសែន។ អាឡូសែនថ្នាក់ទី២ឱ្យទិន្នផលទាប ហើយអាឡូសែនថ្នាក់ទី៣ឱ្យប្រតិកម្មបណ្តាច់។

🚧 ឌីអាល់គីលកម្ម

ម៉ូណូអាល់គីលអាសេតូអាសេទិចអេស្ត័រដែលបង្ហាញខាងលើនៅតែមានអ៊ីដ្រូសែនអាស៊ីតមួយ ហើយបើសិនយើងចង់បាន យើងអាចធ្វើប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មទី២មួយទៀត។ ដោយសារតែអេស្ត័រម៉ូណូអាល់គីលអាសេតូអាសេទិចមានលក្ខណៈអាស៊ីតខ្សោយជាអេស្ត័រអាសេតូអាសេទិច ដោយសារតែផលឱ្យអេឡិចត្រុងរបស់ក្រុមអាល់គីល វាតែងតែមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើបាសខ្លាំងជាងអ៊ីយ៉ុងអេតុកស៊ីតសម្រាប់ប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មទី២។ គេនិយមប្រើប៉ូតាស្យូមទែរ-ប៊ុយតុកស៊ីត ដោយសារវាជាបាសខ្លាំងជាងសូដ្យូមអេតុកស៊ីត។ ដោយសារតែវាមានរបាំងស្តេរីចំ ប៉ូតាស្យូមទែរ-ប៊ុយតុកស៊ីតមិនធ្វើឱ្យកើតប្រតិកម្មត្រង់អេស្ត័រកម្មទេ។




អេស្ត័រម៉ូណូអាល់គីលអាសេតូអាសេទិច


អេស្ត័រអាសេតូអាសេទិច

🚧 មេទីលសេតូនជួស


ដើម្បីសំយោគមេទីលសេតូនម៉ូណូជំនួស (អាសេតូនម៉ូណូជំនួស) យើងអាចធ្វើប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មតែម្តង។ បន្ទាប់មក យើងធ្វើអ៊ីដ្រូលីសអេស្ត័រម៉ូណូអាល់គីលអាសេតូអាសេទិច ដោយប្រើសូលុយស្យុងរ៉ានីសូដ្យូម ឬប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រិកស៊ីត។ បន្ទាប់មកធ្វើអាស៊ីតកម្មលើល្បាយប្រតិកម្មបង្កើតអាស៊ីតអាល់គីល-អាសេតូអាសេទិចមួយ ហើយកម្ដៅអាស៊ីត β -សេតូរហូតដល់ 100°C ធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្ម៖



ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងលើការសំយោគ 2-អ៊ីបតាណូន៖




បើសិនជាគោលបំណងរបស់យើងចង់ទង្វើអាសេតូនឌីជីន្ទស យើងអាចធ្វើប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មទ្វេដង យើងអ៊ីដ្រូលីសអេស្តេរឌីអាល់គីលអាសេតូអាសេទីចដែលត្រូវបានបង្កើត ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្មអាស៊ីតឌីអាល់គីលអាសេតូអាសេទីច។ ឧទាហរណ៍មួយនៃដំណើរការនេះគឺការសំយោគ 3-ប៊ុយទីល-2-អ៊ីបតាណូន៖




ទោះបីជាអាល់គីលកម្មទាំងពីរក្នុងឧទាហរណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើអាល់គីលអាឡូសែនដូចគ្នាក៏ដោយ យើងអាចប្រើអាល់គីលអាឡូសែនខុសគ្នា បើសិនជាយើងចង់សំយោគវា។

- ដូចដែលយើងបានឃើញរួចហើយ អេទីលអាសេតូអាសេតាតជាអ្នកទទួលបានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ទង្វើអាសេតូនឌីជីន្ទស (មេទីលសេតូន) ដូចប្រភេទខាងក្រោម។




អាសេតូនម៉ូណូជំនួស



អាសេតូនឌីជំនួស

- ដូចនេះ អេទីលអាសេតូអាសេតាតដើរតួជាសមាសធាតុសមមូលសំយោគរបស់អែលូឡាតពីអាសេតូនដូចបង្ហាញខាងក្រោម។

ទោះបីជា វាអាចបង្កើតអ័ណ្ឌឡាតរបស់អាសេតូន មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើអេទីលអាសេតូអាសេតាតជាសមាសធាតុសមមូលសំយោគមួយ ពីព្រោះអ៊ីដ្រូសែន α មានភាពអាស៊ីត ($pK_a=9-11$) ខ្លាំងជាងអាសេតូន ($pK_a=19-20$)។ បើសិនជាយើងចង់ប្រើអាសេតូនអ័ណ្ឌឡាតផ្ទាល់ យើងត្រូវតែប្រើបានខ្លាំងជាង និងលក្ខខណ្ឌពិសេសផ្សេងទៀត (ដូចជា លីចូមអ័ណ្ឌឡាត)។



អ៊ីយ៉ុងអេទីលអាសេតូអាសេតាត

អាសេតូនអ័ណ្ឌឡាត


លំហាត់អនុវត្តន៍១៨.៧៖ ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកប្រើអេស្តែរអាសេតូអាសេទិចដើម្បីទង្វើ៖

- 3-ប្រូពីល-2-អ៊ីចសាណូន
- 4-ផេនីល-2-ប៊ុយតាណូន


លំហាត់អនុវត្តន៍១៨.៨៖ ការសំយោគអេស្តែរអាសេតូអាសេទិចតែងតែឱ្យលទ្ធផលល្អ នៅពេលគេប្រើអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី១ក្នុងដំណាក់កាលអាល់គីលកម្ម។ អាឡូសែន្នថ្នាក់ទី២ឱ្យទិន្នផលទាប ហើយអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី៣មិនឱ្យផលិតផលប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មទេ។

- ចូរពន្យល់។
- តើផលិតផលអ្វីដែលអ្នករំពឹងថាទទួលបានពីប្រតិកម្មនៃអេស្តែរសូដ្យូមអាសេតូអាសេទិច និងទែរ-ប៊ុយទីលប្រូម?
- គេមិនអាចប្រើប្រូម៉ូបង់សែនជាអ្នកកំទេចអាវីលកម្មក្នុងការសំយោគអេស្តែរអាសេតូអាសេទិចតាម គោលបំណងដែលយើងលើកឡើងខាងលើ។ ហេតុអ្វីក៏មិនអាច?

ការសំយោគអេស្តែរអាសេតូអាសេទិចអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើអាឡូអេស្តែរ និងអាឡូសេតូន។ ការប្រើអេស្តែរ α -អាឡូ ផ្តល់ឱ្យយើងនូវការសំយោគងាយស្រួលនៃអាស៊ីត γ -សេតូមួយ៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១៨.៩៖ ក្នុងការសំយោគអាស៊ីតសេតូ អាស៊ីតឌីកាបូកស៊ីលិចធ្វើប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលិចកម្មតាមផ្លូវមួយ វាឱ្យផលិតផល៖




ចូរពន្យល់។

ការប្រើសេតូន α -អាឡូមួយក្នុងសំយោគអេស្តែរអាសេតូអាសេទិចផ្តល់ឱ្យយើងនូវវិធីសាស្ត្រទូទៅមួយក្នុងការទង្វើ γ -ឌីសេតូន៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១៨.១០៖ តើអ្នកអាចប្រើការសំយោគអេស្តែរអាសេតូអាសេទិចដើម្បីទង្វើសមាសធាតុខាងក្រោមតាមរបៀបណា?




🧪 អាស៊ីលកម្ម

អាញ់ដដែលបានមកពីអេស្តែរអាសេតូអាសេទិចប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម នៅពេលពួកវាត្រូវបានដាក់ឱ្យធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីលក្លរ ឬអាស៊ីតអាស៊ីត។ ដោយសារភ្នាក់ងារអាស៊ីលកម្មទាំងពីរមានប្រតិកម្មជាមួយអាល់កុល ប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្មមិនអាចធ្វើឡើងក្នុងអេតាណុល ហើយត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងធាតុរំលាយគ្មានប្រូតុងដូចជា DMF ឬ DMSO (ឧទាហរណ៍ បើសិនគេធ្វើប្រតិកម្មក្នុងអេតាណុល ដោយប្រើសូដ្យូមអេតុកស៊ីតអាស៊ីលក្លរនឹងបម្លែងយ៉ាងរហ័សទៅជាអេទីលអេស្តែរមួយ និងអ៊ីយ៉ុងអេតុកស៊ីតនឹងត្រូវបានបន្សាប)។ គេអាច ប្រើសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីប្រីប្រីបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអែណូឡាតក្នុងធាតុរំលាយគ្មានប្រូតុង៖




លំហាត់អនុវត្តន៍១៨.១១៖ តើអ្នកប្រើការសំយោគអាស៊ីតអាសេទិចដើម្បីទង្វើសមាសធាតុខាងក្រោមតាមរបៀបណា?



៨. ការសំយោគអាស៊ីតអាសេទិចជួស៖ ការសំយោគអេស្តែរម៉ាឡូនិច


ដៃគូសំខាន់មួយរបស់ការសំយោគអេស្តែរអាស៊ីតអាសេទិច គឺត្រូវបានគេហៅថា ការសំយោគអេស្តែរម៉ាឡូនិច ដែលជាការសំយោគមួយបង្កើតអាស៊ីតអាសេទិចម៉ូណូ និងឌីជំនួស។ សមាសធាតុផ្អែមគឺឌីអេស្តែរនៃអាស៊ីត β -ឌីកាបូកស៊ីលិចហៅថាអេស្តែរម៉ាឡូនិច។ អេស្តែរម៉ាឡូនិចដែលគេនិយមប្រើគឺឌីអេទីលម៉ាឡូណាត។




ឌីអេទីលម៉ាឡូណាត (អេស្តែរអាស៊ីត β -ឌីកាបូកស៊ីលិច)

➢ ចលនការប្រតិកម្មសំយោគអេស្តែរម៉ាឡូនិចនៃអាស៊ីតអាសេទិចជួស

ដំណាក់កាលទី១៖ ឌីអេទីលម៉ាឡូណាត ជាសមាសធាតុផ្អែម បង្កើតអ័ណូឡាតស្ថេរភាពមួយ៖




ដំណាក់កាលទី២៖ អែណូឡាតនេះរងអាល់គីលកម្មក្នុងប្រតិកម្ម S_N2 មួយ៖



អែណូឡាត


អេស្ត័រម៉ូណូអាល់គីលម៉ាឡូនិច

ហើយផលិតផលនេះរងអាល់គីលកម្មម្តងទៀត បើសិនជាយើងចង់បានវា៖




អេស្ត័រឌីអាល់គីលម៉ាឡូនិច

ដំណាក់កាលទី៣៖ បន្ទាប់មកអេស្ត័រម៉ូណូ ឬឌីអាល់គីលម៉ាឡូនិចរងអ៊ីដ្រូលីសទៅជាអាស៊ីតម៉ូណូ ឬឌីអាល់គីលម៉ាឡូនិច និងអាស៊ីតម៉ាឡូនិចជួសធ្វើប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្មយ៉ាងរហ័ស។ ប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្មនេះបង្កើតអាស៊ីត ម៉ូណូ ឬឌីអាល់គីលអាសេទិចមួយ៖




អេស្ត័រម៉ូណូអាល់គីលម៉ាឡូនិច



អាស៊ីតម៉ូណូអាល់គីលអាសេទិច

ឬ បន្ទាប់ពីអាល់គីលកម្ម៖




Dialkylmalonic ester

Dialkylacetic acid



ឧទាហរណ៍ពីការសំយោគអេស្តែរម៉ាឡូនិចគឺការសំយោគអាស៊ីតអ៊ីបសាណូអ៊ីច និងអាស៊ីត2-អេទីលប៉ង់តាណូអ៊ីច ដូចខាងក្រោម៖

ការសំយោគអេស្តែរម៉ាឡូនិចនៃអាស៊ីតអ៊ីបសាណូអ៊ីច៖



ឌីអេទីលប៊ុយទីលម៉ាឡូណាត


ការសំយោគអេស្តែរម៉ាឡូនិចនៃអាស៊ីត2-អេទីលប៉ង់តាណូអ៊ីច




លំហាត់អនុវត្តន៍១៨.១២៖ ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មទាំងអស់ក្នុងការសំយោគអេស្តែរម៉ាឡូនិចរបស់សមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោម៖

- អាស៊ីតប៉ង់តាណូអ៊ីច
- អាស៊ីត2-អេទីលប៉ង់តាណូអ៊ីច
- អាស៊ីត 4-អេទីលប៉ង់តាណូអ៊ីច


មានបម្រែបម្រួលពីការសំយោគអេស្តែរម៉ាឡូនិចធ្វើឱ្យយើងប្រើឌីអាឡូអាល់កាន។ ក្នុងបម្រែបម្រួលទី១ អេស្តែរសូដ្យូមម៉ាឡូនិច២ម៉ូលមានប្រតិកម្មជាមួយឌីអាឡូអាល់កានមួយ។ ប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មបន្តបន្ទាប់ពីកើតឡើង បង្កើតជាតេត្រាអេស្តែរមួយ ហើយអ៊ីដ្រូលីស និងដេកាបូកស៊ីលកម្មនៃតេត្រាអេស្តែរនេះបង្កើតអាស៊ីតឌីកាបូកស៊ីលិចមួយ។ ឧទាហរណ៍មួយគឺការសំយោគអាស៊ីតគ្លុយតារិច៖




ក្នុងបម្រែបម្រួលទី២ អេស្តែរសូដ្យូមម៉ាឡូនីច១ម៉ូលត្រូវបានដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយឌីអាឡូអាល់ការ ១ម៉ូល។ ប្រតិកម្មនេះបង្កើតអេស្តែរអាឡូអាល់គីលម៉ាឡូនីច ដែលនៅពេលប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូមអេតុកស៊ីត រងប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មក្នុងមួយ។ វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីទង្វើ៣, ៤, ៥, និង៦។ ឧទាហរណ៍ ខាងក្រោមជាការសំយោគអាស៊ីតស៊ីក្លូប៊ុយតានកាបូកស៊ីលីច៖



- ដូចដែលយើងបានឃើញ ការសំយោគអេស្តែរម៉ាឡូនីចជាវិធីសាស្ត្រមានប្រយោជន៍ក្នុងការទង្វើអាស៊ីត ម៉ូណូ និងឌីអាល់គីលអាសេទិច៖




- ដូចនេះ ការសំយោគអេស្តែរម៉ាឡូនីចផ្តល់ឱ្យយើងនូវសមាសធាតុសមមូលសំយោគរបស់អេណូឡាត អេស្តែរនៃអាស៊ីតអាសេទិច ឬឌីអាញ់ឌីអាស៊ីតអាសេទិច។



ការកើតផ្ទាល់នៃអាញ់ទាំងនេះអាចទៅរួច ប៉ុន្តែវាតែងតែមានភាពងាយស្រួលជាង បើយើងប្រើ ឌីអេទីលម៉ាឡូណាតជាសមាសធាតុសមមូលសំយោគ ពីព្រោះអ៊ីដ្រូសែន α របស់វាងាយស្រួលដកចេញជាង។


៩. ប្រតិកម្មបន្ថែមនៃសមាសធាតុអ៊ីដ្រូសែនសកម្ម

ដោយសារតែភាពអាស៊ីតរបស់អ៊ីដ្រូសែនមេទីឡែនរបស់ពួកវា អេស្ទ័រម៉ាឡូនិច អេស្ទ័រអាសេតូអាសេតាត និងសមាសធាតុស្រដៀងគ្នាត្រូវបានគេហៅថាសមាសធាតុអ៊ីដ្រូសែនសកម្ម (Active hydrogen compounds) ឬសមាសធាតុមេទីឡែនសកម្ម (active methylene compounds) ។ ជាទូទៅ សមាសធាតុអ៊ីដ្រូសែនសកម្មមានក្រុមទាញអេឡិចត្រុងត្រង់ភ្ជាប់នឹងអាតូមកាបូនដូចគ្នា៖



តម្លៃ pKa របស់សមាសធាតុមេទីឡែនសកម្មស្ថិតនៅ ចន្លោះ 3 – 13 ។


ឧទាហរណ៍ អេទីឡែនស្យាណូអាសេតាតមានប្រតិកម្មជាមួយបាសមួយបង្កើតអាញ់ស្យាណូអាសេតាតដោយអសូណង់មួយ៖



អេទីលស្យាណូអាសេតាត

ទម្រង់អសូណង់របស់អាញ់អេទីលស្យាណូអាសេតាត


អាញ់អេទីលស្យាណូអាសេតាតក៏អាចរងប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មដែរ។ ឧទាហរណ៍ ពួកវាអាចរងឌីអាល់គីលកម្មជាមួយអ៊ីសូប្រូពីលអ៊ីយ៉ូដ៖



លំហាត់អនុវត្ត៩៨.១៣៖ អាស៊ីតវ៉ាល់ប្រូអ៊ិច ឬអាស៊ីត 2-ប្រូពីលប៉ង់តាណូអ៊ិចជាថ្នាំប្រឆាំងជំងឺឆ្លុតជ្រូក (anti-epileptic drug) ។ ការសំយោគលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មមួយនៃអាស៊ីតវ៉ាល់ប្រូអ៊ិចចាប់ផ្តើមពីអេទីលស្យាណូអាសេតាត។ ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការសំយោគនេះទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មដេកាបុកស៊ីលកម្មមួយ ហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះទាក់ទងនឹងការធ្វើអ៊ីដ្រូលីសនីទ្រីល។ ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មសំយោគនេះ។

១០. ការសំយោគអែណាមីន៖ ប្រតិកម្មអែណាមីន STORK

អាល់ដេអ៊ីត និង សេតូនមានប្រតិកម្មជាមួយអាមីនថ្នាក់ទី២បង្កើតសមាសធាតុហៅថាអែណាមីន (enamines) ។ ប្រតិកម្មទូទៅក្នុងការបង្កើតអែណាមីនអាចត្រូវបានសរសេរដូចខាងក្រោម៖



អាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូន អាមីនថ្នាក់ទី២


អែណាមីន

ចលនការប្រតិកម្មនៃការបង្កើតអែណាមីននេះមានក្នុងផ្នែកទី៩.៣។


ដោយសារតែការកើតអែណាមីនត្រូវការបោះបង់ម៉ូលេគុលទឹក ទើងអែណាមីនតែងតែត្រូវបានធ្វើឡើងតាមមធ្យោបាយដែលអាចដកទឹកចេញ ឬដោយភ្នាក់ងារសំងួតមួយ។ ការដកទឹកចេញពីជំរុញឱ្យប្រតិកម្មទៅវិញទៅមកបញ្ចប់។ ការកើតអែណាមីនក៏អាចរងកាតាលីសក្រោមវត្តមានស្នាមអាស៊ីតមួយដែរ។ គេនិយមប្រើអាមីនថ្នាក់ទី២ដើម្បីទង្វើអែណាមីនដូចជា ពីរ៉ូលីឌីន ពីពេរីឌីន និងម៉ូផូលីន៖




ឧទាហរណ៍ ស៊ីក្លូអិចសានូនប្រតិកម្មជាមួយពីរ៉ូលីឌីនតាមប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




អែណាមីនជានុយក្លេអូកីលល្អមួយ។ ការសិក្សាលើទម្រង់វេស្តូណង់ដែលបង្ហាញយើងថា អែណាមីនមានទាំងអាសូតនុយក្លេអូកីលផង និងកាបូននុយក្លេអូកីលផង។ គំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចបង្ហាញតំបន់ នុយក្លេអូកីលរបស់អែណាមីនមួយ។



របាយទៅអ៊ីប៊ីតបង្កើត
ដោយទម្រង់នេះមាន
លក្ខណៈនុយក្លេអូក្លីល
លើអាសូត




របាយទៅអ៊ីប៊ីតបង្កើតដោយ
ទម្រង់នេះមាន លក្ខណៈនុយក្លេ
អូក្លីលលើកាបូន ហើយបន្ថយ
កម្រិតនុយក្លេអូក្លីលលើអាសូត




គំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិច
របស់ N-(1-ស៊ីត្រូអ៊ីតសែនីល)
ពីរ៉ូលីឌីន បង្ហាញរបាយបន្ទុក
អវិជ្ជមាន និងតំបន់នុយក្លេអូក្លីល
របស់អែណាមីន

កម្រិតនុយក្លេអូក្លីលរបស់កាបូនអែណាមីនធ្វើឱ្យពួកវាជាអ្នករំលោភបំពានប្រយោជន៍ក្នុងការសំយោគសរីរាង្គ ដោយសារពួកវាអាចរងប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម អាស់ត្រីលកម្ម ហើយត្រូវបានប្រើក្នុងប្រតិកម្មបូក Michael (មើលផ្នែក១៩.៧.១)។ អែណាមីនអាចត្រូវបានប្រើជាសមាសធាតុសមមូលសំយោគរបស់អែណូឡាត អាស់ដេអ៊ីត ឬ សេតូន ពីព្រោះកាបូនអាស់សែនរបស់អែណាមីនមានប្រតិកម្មដូចគ្នាទៅនឹងកាបូន α របស់អែណូឡាត អាស់ដេអ៊ីត ឬសេតូន ហើយបន្ទាប់ពីរងអ៊ីដ្រូលីស ផលិតផលដែលទទួលបានដូចគ្នា។ បច្ចេកទេស ទាំងនេះមានប្រភពដើមពីការស្រាវជ្រាវរបស់ Gilbert Stork នៅសកលវិទ្យាល័យកូឡុំប៊ី ហើយដោយសារគាត់ មានឈ្មោះល្បីល្បាញ ប្រតិកម្មទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា ប្រតិកម្មអែណាមីន Stork។

នៅពេលអែណាមីនមួយមានមប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីលអាឡូសែន ឬអាស៊ីតអាស៊ីតមួយ ផលិតផលជាសមាសធាតុ C-អាស់ស៊ីលកម្ម (C-acylated compounds)។ អ៊ីយ៉ុងអ៊ីមីនីញ៉ូមដែលកើតឡើងអ៊ីដ្រូលីសនៅ ពេលគេបន្ថែមទឹក ហើយប្រតិកម្មសរុបជាការសំយោគ β -សេតូន៖




ទោះបីជា N-អាស៊ីលកម្មអាចកើតឡើងក្នុងការសំយោគនេះក៏ដោយ ផលិតផល N-អាស៊ីលមិនមានស្ថេរភាពទេ ហើយអាចមានអំពើជាភ្នាក់ងារអាស៊ីលកម្មខ្លួនវាផ្ទាល់៖




អែណាមីន អែណាមីនN-អាស៊ីលកម្ម អំបិលអ៊ីមីនីញ៉ូមC-អាស៊ីលកម្ម អែណាមីន

ដូចនេះ ផលិតផល C-អាស៊ីលកម្មមានទិន្នផលខ្ពស់។

អែណាមីនអាចរងអាល់គីលកម្ម រួមទាំងអាស៊ីលកម្មផងដែរ។ ទោះបី អាល់គីលកម្មអាចនាំឱ្យកើតបរិមាណផលិតផលN-អាល់គីលកម្មខ្លះក៏ដោយ ការកម្ដៅផលិតផលN-អាល់គីលកម្មតែងតែបម្លែងជាសមាសធាតុC-អាល់គីលកម្ម។ បណ្តុះទីតាំងនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលនៅពេលអាល់គីលអាឡូសែនជា បង់ស៊ីលអាឡូសែន ឬអេស្ទែរ α -អាឡូអាសេទិច៖




អាល់គីលកម្មអែណាមីនជាប្រតិកម្មS_N2 ដូចនេះ នៅពេលយើងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារអាល់គីលកម្ម យើងត្រូវបានកំណត់ឱ្យប្រើមេទីលអាឡូសែន អាស៊ីលអាឡូសែន និងបង់ស៊ីលអាឡូសែន។ គេក៏អាចប្រើអេស្ទែរ α -អាឡូជាភ្នាក់ងារអាល់គីលកម្ម ហើយប្រតិកម្មនេះផ្តល់ជាវិធីសាស្ត្រងាយស្រួលមួយក្នុងការសំយោគអេស្ទែរ β -សេត។




អេស្បែរ γ -សេតូ

លំហាត់អនុវត្តន៍១៨.១៤៖ ចូរបង្ហាញពីរបៀបប្រើអែណូមែរក្នុងការសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម៖



១១. សង្ខេបគីមីវិទ្យានៃអែណូឡាត


ក. ការកើតអែណូឡាត



អែណូឡាតបន្លំដោយផលរេសូណង់




ខ. វ៉ាសេមិចកម្ម




គ. អាឡូសែនកម្មនៃអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន


ប្រតិកម្មទូទៅ៖



ឧទាហរណ៍៖




យ. អាឡូសែនកម្មនៃអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច ៖ ប្រតិកម្ម HVZ




ង. អាល់គីលកម្មផ្ទាល់តាមលីចូមអាណូឡាត


ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍៖





ច. អាល់គីលកម្មផ្ទាល់នៃអេស្តែរ




ឆ. ការសំយោគអេស្តែរអាសេតូអាសេទិច



ជ. ការសំយោគអេស្ទែរម៉ាឡូនិច



ឈ. ប្រតិកម្មអែណូមែរ Stork




~~~~~


## លំហាត់មេរៀនទី១៨

### ប្រតិកម្មភាពកាបូនរបស់អណូឡាត អែណុល និងកាបូនីល


១. ចូររៀបតាមលំដាប់កើនឡើងនៃកម្រិតអាស៊ីតរបស់អាតូមអ៊ីដ្រូសែន(ដ៏ត) ខាងក្រោម (1=កម្រិតអាស៊ីត ទាបជាង គេ; 4=កម្រិតអាស៊ីតខ្ពស់ជាងគេ)។




២. ចូរឱ្យទម្រង់របស់ផលិតផលដែលបានមកពីប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




៣. ចូរសរសេរចលនការរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖







៤. ចូរសរសេរចលនការដំណាក់កាលនៃប្រតិកម្មខាងក្រោម៖





**ការសំយោគអេស្បែរអាសេតូអាសេទិច និងអេស្បែរម៉ាឡូរិច**

៥. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសមាសធាតុខាងក្រោមពីអេស្បែរអាសេតូអាសេទិច និងអ៊ែកទីបត្រូវការផ្សេងទៀត៖



- ទែរ-ប៊ុយទីលមេទីលសេតូន
- 2-អ៊ីចសាន
- 2,5-អ៊ីចសានឌីអុន
- អាស៊ីត 4-អ៊ីដ្រូកស៊ីប៉ង់តាណូអ៊ីច
- 2-អេទីល-1,3-ប៊ុយតានឌីអុល
- 1-ផេនីល-1,3-ប៊ុយតានឌីអុល

៦. ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោមពីឌីអេទីលម៉ាឡូណាត និងអ័រ៉ាក់ទីប ផ្សេងទៀត៖


- អាស៊ីត 2-មេទីលប៊ុយតាណូអ៊ិច
- 4-មេទីល-1-ប៉ង់តាណុល
- 



៧. ចូរឱ្យទម្រង់របស់ផលិតផលពីប្រតិកម្មខាងក្រោមដូចខាងក្រោម៖




- ក្នុងឆ្នាំ 1884 Perkin បានទទួលជោគជ័យលើការសំយោគអាស៊ីតស៊ីក្លូប្រូប៉ានកាបូកស៊ីលីចពីអេស្ត្រសូដ្យូមម៉ាឡូណាតនិង 1,2-ឌីប្រូម៉ូអេតាន។ ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មទាំងទងនឹងការសំយោគនេះ។
- ក្នុងឆ្នាំ 1985 Perkin បានយសំយោគសមាសធាតុកាបូកស៊ីលីចរង្វង់ 5 D និង E តាមផ្លូវខាងក្រោម៖




ដែល D និង E ជាដ្យាស្តេអ័រអូមែរ។ D ងាចសរសេរជាទម្រង់អេណង់តូមែរ ប៉ុន្តែ E មិនអាច។


ចូរឱ្យទម្រង់ពី A ទៅ E។

- ១០ឆ្នាំក្រោយមក Perkin អាចសំយោគ 1,4-ឌីប្រូម៉ូប៊ុយតាន ក្រោយមកគាត់ប្រើសមាសធាតុនេះ និង ឌីអេទីលម៉ាឡូណាតដើម្បីទង្វើអាស៊ីតស៊ីក្លូប៉ង់តានកាបូកស៊ីលីច។ ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មដែលទាក់ទង។
- សំយោគសមាសធាតុខាងក្រោមពីឌីអេទីលម៉ាឡូណាត ឬអេទីលអាសេតូអាសេតាត និងអ័រ៉ាក់ទីប សរីរាង្គ និងអសរីរាង្គចាំបាច់ផ្សេងទៀត។



១០. ចូរសរសេរសមីការខ្សែប្រតិកម្មសម្រាប់ការសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោមពីសារធាតុផ្ដើមខាងក្រោម និងអោក់ទីបសរីរាង្គ និងអសរីរាង្គដែលត្រូវការ៖





@@@@@@@@


## មេរៀនទី១៩

# ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម និងប្រតិកម្មបូកផ្គុំ របស់សមាសធាតុកាបូនីល


### ១. សេចក្តីផ្តើម

ក្នុងប្រតិកម្មកុងដង់កម្មកាបូនីល (carbonyl condensation reaction) ដែលឡាតរបស់សមាសធាតុកាបូនីល មានប្រតិកម្មជាមួយក្រុមកាបូនីលមួយទៀតដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតអង្គធាតុប្រតិករពីរ។ ក្នុងដំណើរការមួយ នៃប្រតិកម្ម ម៉ូលេគុលថ្មីមួយទទួលបានពីការភ្ជាប់រវាងកុងដង់កម្ម (កកើត)។ ម៉ូលេគុលទាំងនេះតែងតែជា ម៉ូលេគុលទឹក ឬអាល់កុល។ ប្រភេទចំបងនៃប្រតិកម្មកុងដង់កម្មដែលយើងនឹងសិក្សាជាប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen និងប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដូល (aldol condensation)។ ប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដូលត្រូវបាន ដំណើរការតាមចលនការប្រតិកម្មបូកអាល់ដូល ដែលយើងនឹងសិក្សាផងដែរ។ ឈ្មោះអាល់ដូលបានមកពី ក្រុមបង្កនាទីអាល់ដេអ៊ីត និង អាល់កុលដែលមានវត្តមានក្នុងផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មអាល់ដូល។

ឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្មកុងដង់កម្មClaisen




ឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម និងប្រតិកម្មបូកអាល់ដូល



ប្រតិកម្មបូកផ្គុំ (Conjugate addition reaction) ទាក់ទងនឹងនុយក្លេអូភីលមួយ ដែលតែងតែជា អ៊ីណូ ឡាតមួយ ឬក៏ទៅលើទីតាំងរបស់សមាសធាតុកាបូនីលβ-មិនផ្អែត។ ប្រតិកម្មបូកផ្គុំសំខាន់មួយគឺប្រតិកម្មបូកMichael។ ដូចដែលយើងនឹងឃើញ ប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដូលផ្តល់ជាមធ្យមមួយសម្រាប់សំយោគ សមាសធាតុកាបូនីលβ-មិនផ្អែត ដែលយើងអាចប្រើសម្រាប់ប្រតិកម្មបូកផ្គុំ។

ឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្មបូកផ្គុំ




### ២. ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen ៖ ការសំយោគអេស្ត័រβ-សេតូ

ប្រតិកម្មកុងដង់កម្មClaisen គឺជាប្រតិកម្មបង្កើតសម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូនមួយដែលមានសារប្រយោជន៍ក្នុងការសំយោគអេស្ត័រβ-សេតូ។ ក្នុងមេរៀនទី១៨ យើងបានឃើញរួចហើយពីរបៀបដែលអេស្ត័រβ-សេតូ

មានសារប្រយោជន៍ក្នុងការសំយោគ។ ក្នុងប្រតិកម្មកុងដង់កម្មClaisen អែលូឡាតរបស់ម៉ូលេគុលអេស្តែរមួយបូកលើក្រុមកាបូនីលរបស់ម៉ូលេគុលមួយទៀត ធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មជំនួសអាស៊ីលមួយកើតឡើងដែលបង្កើតអេស្តែរβ-សេតូ និងម៉ូលេគុលអាល់កុលមួយ។ ម៉ូលេគុលអាល់កុលដែលបានកកើតបានមកពីក្រុមអាល់កុលស៊ីរបស់អេស្តែរ។


ឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្មកុងដង់កម្មClaisen គឺការសំយោគអេទីលអាសេតូអាសេតាត (អេស្តែរអាសេតូអាសេទិច)។



អេស្តែរសូដ្យូមអាសេតូអាសេទិច (ដកចេញដោយបំណិត)


អេទីលអាសេតូអាសេតាត

ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen នៃម៉ូលេគុលអេទីលប៉ង់តាណូអាតពីរ បង្កើតអេទីល 3-អុកសូ-2-ប្រូពីលប៉ង់តាណូអាត។



អេទីល 3-អុកសូ-2-ប្រូប៊ីលអ៊ីបតាណូអាត

បើសិនជាយើងមើលឱ្យល្អិតល្អន់លើឧទាហរណ៍ទាំងនេះ យើងឃើញថា ប្រតិកម្មទាំងពីរទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មកុងដង់កម្មមួយដែលអេស្តែរមួយបោះបង់អ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ មួយ ហើយអេស្តែរមួយទៀតបោះបង់អ៊ីយ៉ុងអេតុកស៊ីតមួយ៖




(R ក៏អាចជា H )

អេស្តែរβ-សេតូ

យើងអាចយល់ពីរបៀបដែលប្រតិកម្មទាំងនេះកើតឡើង បើសិនយើងសិក្សាលើចលនការប្រតិកម្មលម្អិត។ យើងនឹងឃើញថា ចលនការប្រតិកម្មកុងដង់កម្មClaisenជាឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្មជំនួសអាស៊ីល (បូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូគីលលើក្រុមកាបូនីលមួយ)។


➢ ចលនការប្រតិកម្មក្នុងដង់កម្ម Claisen

ដំណាក់កាលទី១៖



បានអាល់កុកស៊ីតដកយកប្រូតុង $\alpha$ ពីអេស្ទ័រ បង្កើតអ៊ីយ៉ុងអែណូឡាតនុយក្លេអូក្លីល ( បានអាល់កុកស៊ីតបានប្រើដើម្បីបង្កើត អែណូឡាតគួរតែមានក្រុមអាល់គីលដូចគ្នាទៅនឹងអេស្ទ័រ ឧទាហរណ៍ អេតុកស៊ីតចំពោះអេស្ទ័រអេទីល បើដូចនេះទេ ប្រតិកម្ម ត្រង់អេស្ទ័រកម្មមិនកើតឡើងទេ ) ។ ទោះបីជាប្រូតុង $\alpha$ របស់អេស្ទ័រមួយមិនមានភាពអាស៊ីត ដូចប្រូតុងរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន អែណូឡាតដែលកើតត្រូវបានបន្ស៊ីបដោយផលរ៉េសូណង់ក្នុងមធ្យោបាយស្រដៀងគ្នា។

ដំណាក់កាលទី២៖




ប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូក្លីល  
និងប្រតិកម្មបណ្តាច់

អង្គធាតុកណ្តាលចតុមុខ

អែណូឡាតប្រយុទ្ធលើកាបូនកាបូនីលរបស់ម៉ូលេគុលអេស្ទ័រម៉ូលេគុលមួយទៀត បង្កើតអង្គធាតុកណ្តាលចតុមុខមួយទៀត។ អង្គធាតុកណ្តាលចតុមុខរុញអ៊ីយ៉ុងអាល់កុកស៊ីតចេញ ធ្វើឱ្យមានការជំនួសអាល់កុកស៊ីតដោយក្រុមដែលបានមកពីអែណូឡាត។ លទ្ធផលសរុបគឺប្រតិកម្មបូក-បណ្តាច់នុយក្លេអូក្លីលមួយលើក្រុមកាបូនីលអេស្ទ័រ។ ប៉ុន្តែលំនឹងសរុបសម្រាប់ដំណើរការនេះមិន បានសម្របសម្រួលទេ ប៉ុន្តែលំនឹងនេះទាញទៅកាន់ផលិតផលចុងក្រោយដោយដកអ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ អាស៊ីតចេញពីប្រព័ន្ធប-កាបូនីលថ្មី។

ដំណាក់កាលទី៣៖



អេស្ទ័រ $\beta$ -សេតូ

អ៊ីយ៉ុងអេតុកស៊ីត

អាញ៉ុងអេស្ទ័រ $\beta$ -សេតូ

អេតាណុល

(pKa=9 អាស៊ីតខ្លាំង)


( បានខ្លាំង )

( បានខ្សោយ )

( pKa=16 អាស៊ីតខ្សោយ )

អ៊ីយ៉ុងអាល់កុកស៊ីតដកយកប្រូតុង $\alpha$ មួយពីផលិតផលក្នុងដង់កម្មកើតថ្មី បង្កើតអ៊ីយ៉ុងអេស្ទ័រ $\beta$ -សេតូស្ថេរភាពដោយផលរ៉េសូណង់ មួយ។ ដំណាក់កាលនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលខ្ពស់ ហើយទាញលំនឹងសរុបទៅកាន់ការកើតផលិតផល។ ផលិតផលបន្ទាប់បន្សំជា អាល់កុល ( ក្នុងករណីជាអេតាណុល ) អាចត្រូវបានបិតយកពីល្បាយប្រតិកម្មនៅពេលវាកកើត ដូចនេះជួយទាញលំនឹងថែមទៀត ឱ្យទៅកាន់ផលិតផលដែលយើងចង់បាន។

ដំណាក់កាលទី៤៖



ទម្រង់សេតូ

ទម្រង់អែណុល

ការបន្ថែមអាស៊ីតធ្វើឱ្យប្រតិកម្មបញ្ចប់ដោយបន្ទាបបាត និងប្រូតុងកម្មផលិតផលក្នុងដងកម្ម Claisen ។


ផលិតផលអែស្តែរ-សេតូ កើតមានជាល្បាយលំនឹងនៃតួតួមែរសេតូ និងអែណុលរបស់វា។

- នៅពេលយើងគ្រោងធ្វើប្រតិកម្មមួយជាមួយអែស្តែរ និងអ៊ីយ៉ុងអាល់កុកស៊ីតមួយ វាមានសារសំខាន់ ណាស់ដែលត្រូវប្រើអាល់កុកស៊ីតមួយដែលមានក្រុមអាល់គីលដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមអាល់កុកស៊ីលរបស់ អែស្តែរ។

ក្រុមអាល់កុកស៊ីលរបស់អែស្តែរ និងអាល់កុកស៊ីតត្រូវតែដូចគ្នា ដើម្បីជៀសវាងនូវប្រតិកម្មត្រងូអែស្តែរកម្ម (ដែលកើតជាមួយអាល់កុកស៊ីតតាមចលនការដូចគ្នាទៅនឹងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសអែស្តែរមជ្ឈដ្ឋានបាត) ។ អេទីលអែស្តែរ និងមេទីលអែស្តែរ ជាប្រតិករអែស្តែរសំខាន់ជាងគេក្នុងការសំយោគប្រភេទនេះ។ ដូចនេះ យើងប្រើសូដ្យូមអេតុកស៊ីត នៅពេលគេប្រើអេទីលអែស្តែរ ហើយសូដ្យូមមេតុកស៊ីតនៅពេលគេប្រើមេទីលអែស្តែរ។ មានករណីខ្លះទៀតនៅពេលយើងប្រើបាតផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សានៅពេលក្រោយ។

- អែស្តែរដែលមានអ៊ីដ្រូសែន  $\alpha$  តែមួយមិនរងប្រតិកម្មក្នុងដងកម្ម Claisen ធម្មតាទេ។

ឧទាហរណ៍នៃអែស្តែរមួយដែលមិនមានប្រតិកម្មក្នុងដងកម្ម Claisen ធម្មតា ពីព្រោះវាមានអ៊ីដ្រូសែន  $\alpha$  តែមួយគឺអេទីល 2-មេទីលប្រូប៉ាណូអាត៖



- ការសង្កេតចលនការខាងលើនឹងធ្វើឱ្យយើងឃើញច្បាស់ហេតុអ្វីក៏ប្រតិកម្មដូចនេះ៖ អែស្តែរដែលមានអ៊ីដ្រូសែន  $\alpha$  តែមួយមិនមានអ៊ីដ្រូសែនអាស៊ីតនៅពេលមកដល់ដំណាក់ទី៣ ហើយដំណាក់កាលទី៣ផ្តល់នូវលំនឹងដែលធានានូវការដោតជ័យរបស់ប្រតិកម្មនេះ។

ក្នុងផ្នែកទី១៩.២.១យើងនឹងឃើញអំពីរបៀបដែលអែស្តែរមានអ៊ីដ្រូសែន  $\alpha$  តែមួយអាចត្រូវបានបម្លែងជាអែស្តែរ  $\beta$ -សេតូមួយ ដោយវិធីសាស្ត្រមួយដែលប្រើបាតខ្លាំង។

**លំហាត់អនុវត្តទី១៩.១ ៖**


- ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មក្នុងដងកម្ម Claisen ដែលកើតឡើងនៅពេលអេទីលប្រូប៉ាណូអាតមាន ប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីយ៉ុងអេតុកស៊ីត។
- តើផលិតផលណាខ្លះដែលកកកើតនៅពេលល្បាយប្រតិកម្មរងអាស៊ីតកម្ម។

**លំហាត់អនុវត្តទី១៩.២ ៖** ដោយសារតែផលិតផលដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មក្នុងដងកម្ម Claisen ជាអែស្តែរ  $\beta$ -សេតូ ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីស និងដេកាបុកស៊ីលកម្មនៃផលិតផលទាំងនេះផ្តល់ជាវិធីសាស្ត្រទូទៅមួយសម្រាប់សំយោគសេតូន។ ចូរប្រើបច្ចេកទេសនេះក្នុងការសំយោគ 4-អ៊ីបតាណូន។



**🚩 ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen អន្តរម៉ូលេគុល៖ ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Dieckmann**



ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen អន្តរម៉ូលេគុលមួយត្រូវបានគេហៅថា ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Dieckmann។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលឌីអេទីលអ៊ីបសានឌីអុអាតត្រូវបានកម្ដៅជាមួយសូដ្យូមអេតុកស៊ីត អាស៊ីតកម្មនៃល្បាយប្រតិកម្មនេះបង្កើត អេទីល 2-អុកសូប័ងតានកាបូកស៊ីឡាត៖



- ជាទូទៅ ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Dieckmann មានសារប្រយោជន៍តែសម្រាប់ទង្វើរង៥ និងរង៦។

រង៥តូចជាង៥មិនត្រូវបានសម្របសម្រួលទេ ដោយសារតែមានរមូលមុំ។ រង៦ធំជាង៧ត្រូវបានសម្របសម្រួលតិចតួចដោយសារតែចំនួនកុងផរម៉ាស្យុងកាន់តែច្រើនដែលបានពីសារធាតុផ្ដើមខ្សែរង៦ មានប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអន្តរម៉ូលេគុលប្រណាំងប្រជែង។

➤ **ចលនការប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Dieckmann**



មានប្រតិកម្ម


**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.៣ ៖**

- តើផលិតផលអ្វីដែលកកើតពីប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Dieckmann នៃឌីអេទីលអ៊ីបសានឌីអុអាត?
- ចូរពន្យល់ថាហេតុអ្វីឌីអេទីលប័ងតាឌីអុអាត (ឌីអេទីលគ្នាយតាវ៉ាត) មិនរងប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Dieckmann?

**🚩 ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen ខ្លែង**

- ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen ខ្លែង (Crossed Claisen Condensation) អាបប្រព្រឹត្តទៅបាននៅពេលអេស្តែរមិនមានអ៊ីដ្រូសែន  $\alpha$  ដូចនេះវាមិនអាចបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអែណូឡាត និងរងប្រតិកម្មកុងដង់កម្មខ្លួនវាទេ។

ឧទាហរណ៍ អេទីលបង់សូអាតធ្វើប្រតិកម្មក្នុងដង់កម្មជាមួយអេទីលអាសេតាតបង្កើតអេទីលបង់សូអ៊ីលអាសេតាត៖




អេទីលបង់សូអាត

(គ្មានអ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ )

អេទីលបង់សូអ៊ីលអាសេតាត

(60%)

អេទីលផេនីលអាសេតាតប្រតិកម្មជាមួយឌីអេទីលកាបូណាតបង្កើតឌីអេទីលផេនីលម៉ាឡូណាត៖



អេទីលផេនីលអាសេតាត

ឌីអេទីលកាបូណាត


ឌីអេទីលផេនីលម៉ាឡូណាត

(65%)


**លំហាត់ឧទាហរណ៍៖** ចូរសរសេរចេញនូវការគ្រប់ជំហានទាំងអស់នៃប្រតិកម្មក្នុងដង់កម្ម Claisen ខាងលើរវាងអេទីលបង់សូអាត និងអេទីលអាសេតាត។

**ចម្លើយ៖** អេទីលបង់សូអាតគ្មានអ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ ទេ ដូចនេះយើងចាប់ផ្តើមពីការដកអ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ មួយចេញពីអេទីលអាសេតាតបង្កើតជាអ៊ីណូឡាតមួយ៖


**ជំណាក់កាលទី១៖**




**ជំណាក់កាលទី២៖**



**ជំណាក់កាលទី៣៖**



**ដំណាក់កាលទី៤៖**




**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.៤ ៖** ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មសម្រាប់ផលិតផលដែលកើតពីប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen ខ្វែងដែលបានបង្ហាញខាងលើរវាងអេទីលផេនីលអាសេតាត និងឌីអេទីលកាបូណាត។

**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.៥ ៖** តើផលិតផលណាដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen ខ្វែងខាងក្រោម៖

- អេទីលប្រូប៉ាណូអាត + ឌីអេទីលអុកសាឡាត  $\xrightarrow[2. H_3O^+]{1. NaOEt}$
- អេទីអាសេតាត + អេទីលផេនីល  $\xrightarrow[2. H_3O^+]{1. NaOEt}$

ដូចដែលយើងបានសិក្សាក្នុងផ្នែកនេះរួចហើយ អេស្តែរដែលមានអ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ តែមួយមិនអាចបង្កើនជាអេស្តែរ $\beta$ -សេតូដោយសូដ្យូអេតុកស៊ីតបានទេ។ ប៉ុន្តែ ពួកវាអាចត្រូវបានបង្កើនទៅជាអេស្តែរ $\beta$ -សេតូដោយប្រតិកម្មដែលប្រើបានខ្លាំងដូចជាលីចូមឌីអ៊ីសូប្រូពីលអាមីត (LDA)។ បានខ្លាំងបង្កើនអេស្តែរទៅជាអ៊ីយ៉ុងអែណូឡាតក្នុងទិន្នផលខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍មួយនៃបច្ចេកទេសប្រើ LDA នេះត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម៖




**អេទីល 2,2-ឌីមេទីល-3-អុកសូ  
3-ផេនីលប្រូប៉ាណូអាត**


**៣. សមាសធាតុ $\beta$ -ឌីកាបូនីលដោយប្រតិកម្មរោស៊ីលកម្មនៃអែណូឡាតសេតូន**

អ៊ីយ៉ុងអែណូឡាតដែលបានមកពីសេតូនក៏មានប្រតិកម្មជាមួយអេស្តែរក្នុងប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូកីលដែលដូចគ្នានឹងប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen។ ក្នុងឧទាហរណ៍ទី១ខាងក្រោម ទោះបីអាញ្ចីងពីរអាចបានមកពីប្រតិកម្មនៃសេតូនជាមួយសូដ្យូអេតុកស៊ីដ ផលិតផលឧត្តមភាពទទួលបានពីការបញ្ចូលថ្នាក់ទី១។ នេះដោយសារតែ៖


- អ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ ថ្នាក់ទី១មានកម្រិតអាស៊ីតខ្លាំងជាងអ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ ថ្នាក់ទី២
- ក្រោមវត្តមានបានខ្លាំង ( $NaNH_2$ ) ក្នុងធាតុរំលាយគ្មានប្រូតុង ( $Et_2O$ ) អែណូឡាតស៊ីនេទិចត្រូវបានកើត។ LDA អាចត្រូវបានប្រើស្រដៀងគ្នានឹងបាននេះ។




**លំហាត់ឧទាហរណ៍៖** អេស្បែរសេតូអាចរងប្រតិកម្មបិទរង់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Dieckmann។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



**ចម្លើយ៖**




**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.៦ ៖** ចូរបង្ហាញពីរបៀបសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោមដោយប្រើសារធាតុផ្ដើមរបស់អ្នក អេស្បែរ សេតុន អាស៊ីលក្លរួ ។ល។



**៤. ប្រតិកម្មអាល់ដូលៈ ប្រតិកម្មបូកអែណូឡាត និងអែណូលលើអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន**

- ប្រតិកម្មបូក និងកុងដង់កម្មអាល់ដូលរួមគ្នាតាងឱ្យថ្នាក់សំខាន់មួយរបស់ប្រតិកម្មបង្កើតសម្ព័ន្ធភាបូន-កាបូន។

ប្រតិកម្មអាល់ដូលមួយចាប់ផ្តើមពីការបូកអែណូឡាត ឬអែណូលមួយលើក្រុមកាបូនីលរបស់អាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូន បង្កើតβ-អ៊ីដ្រិកស៊ីអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនជាផលិតផលដំបូង។ ឧទាហរណ៍ងាយមួយត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម គឺនៅពេលម៉ូលេគុលអាសេតាល់ដេអ៊ីតពីរ (អេតាណាល់) ប្រតិកម្មបង្កើត3-អ៊ីដ្រិកស៊ីប៊ុយតាណាល់ជាអាល់ដូលមួយ ពីព្រោះវាមានទាំងបង្គំនាទីអាល់ដេអ៊ីត និងអាល់កុល។ ប្រតិកម្មនៃប្រភេទទូទៅនេះ ត្រូវបានគេហៅថា **ប្រតិកម្មបូកអាល់ដូល**។



**3-អ៊ីដ្រិកស៊ីប៊ុយតាណាល់ (50%)**


ដូចដែលយើងនឹងឃើញ ផលិតផលប្រតិកម្មបូកអាល់ដូលដំបូងតែងតែរងដេអ៊ីដ្រាតកម្មបង្កើតអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនβ-មិនឆ្អែតមួយ។ នៅពេលសមាសធាតុនេះជាលទ្ធផល ប្រតិកម្មសរុបជា**ប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដូល**។ ដំបូងនេះ យើងសិក្សាលើចលនការប្រតិកម្មបូកអាល់ដូលសិន។

**៤.១ ប្រតិកម្មបូកអាល់ដូល**

ប្រតិកម្មបូកអាល់ដូលជាប្រតិកម្មលំនឹងមួយ នៅពេលវាត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងធាតុរំលាយគ្មានប្រូតុងជាមួយបានដូចជាអ៊ីដ្រិកស៊ីតឬអាល់កុលស៊ីត។ ចលនការប្រតិកម្មបូកអាល់ដូលដែលទាក់ទងនឹងអាល់ដេអ៊ីតមួយត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។

**➢ ចលនការប្រតិកម្មបូកអាល់ដូល**


**ដំណាក់កាលទី១៖ ការកើតអែណូឡាត**



**អាញ៉ុងអែណូឡាត**


ក្នុងដំណាក់កាលនេះ បាន (អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រិកស៊ីត) ដកយកប្រូតុងមួយពីកាបូនαរបស់ម៉ូលេគុលអាសេតាល់ដេអ៊ីតមួយបង្កើតជាអែណូឡាតបន្លិចដោយផលស្វេណង់មួយ

**ដំណាក់កាលទី២៖ បូកអែណូឡាត**



បន្ទាប់មកអែណូឡាតមានអំពើជានុយក្លេអូភីលមួយ ហើយប្រយុទ្ធលើកាបូនកាបូនីលរបស់ម៉ូលេគុលអាសេតាល់ដេអ៊ីតទី២ បង្កើតអាញ៉ុងអាល់កុលស៊ីតមួយ។

**ដំណាក់កាលទី៣៖ ប្រតិកម្មអាល់កុកស៊ីត**



បាសខ្លាំងជាង

ផលិតផលអាល់ដុល


បាសខ្សោយជាង

អាញ៉ុងអាល់កុកស៊ីតដកយកប្រតិកម្មមួយពីម៉ូលេគុលទឹកបង្កើតផលិតផលអាល់ដុលមួយ

ជាមួយសេតូន ដំណាក់កាលបូកបង្កើតអាល់ដុលដែលមិនចង់បាន ដោយសាររបាំងស្តេរិច និងលំនឹងធ្វើឱ្យកើតសារធាតុផ្ដើមអាល់ដុលជាជាងផលិតផលបូក (ផ្នែក១៩.៤.២)។ ប៉ុន្តែដូចដែលយើងនឹងឃើញក្នុងផ្នែក១៩.៤.៣ ដេអ៊ីដ្រាតកម្មនៃផលិតផលបូកអាល់ដុលអាចទាញលំនឹង ដែលមានអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនឱ្យសម្រេច។ ការបូកអែលូឡាតទាំងលើអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនមានភាពងាយស្រួល នៅពេលគេប្រើបាសខ្លាំង (ដូចជា LDA) ក្នុងធាតុរំលាយគ្មានប្រតិកម្ម (ផ្នែក១៩.៥.២)។

**៤.២ ប្រតិកម្មរេត្រូ-អាល់ដុល**

ដោយសារតែដំណាក់កាលនៅក្នុងចលនការប្រតិកម្មបូកអាល់ដុលមួយងាយត្រលប់ក្រោយប្រតិកម្មរេត្រូ-អាល់ដុល (retro-aldol reaction) អាចកើតឡើងដែលបម្លែងអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូន $\beta$ -អ៊ីដ្រកស៊ីទៅសារធាតុផ្ដើមប្រតិកម្មបូកអាល់ដុលមួយ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេល 4-អ៊ីដ្រកស៊ី-4-មេទីល-2-ប៉ង់តាណូនត្រូវបានកម្ដៅជាមួយអ៊ីដ្រកស៊ីតក្នុងទឹក ល្បាយលំនឹងមានអាល់ដេអ៊ីតពីដំបូង ដែលជាផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មរេត្រូ-អាល់ដុល។




លទ្ធផលនេះមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេ ដោយសារតែយើងដឹងថាលំនឹងរបស់ប្រតិកម្មបូកអាល់ដុល (ប្រាសពីប្រតិកម្មខាងលើ) មិនសម្របសម្រួល នៅពេលអែលូឡាតបូកលើសេតូនមួយ។ ប៉ុន្តែ ដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើ ដេអ៊ីដ្រាតកម្មនៃផលិតផលបូកអាល់ដុលមួយអាចទាញលំនឹងទៅមុខ។ យើងនឹងសិក្សាលើប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មអាល់ដុលនៅផ្នែក១៩.៤.៣។

**៤.៣ ប្រតិកម្មកុងដង់សង់កម្ម៖ អាល់ដុល៖ ប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មផលិតផលបូកអាល់ដុល**

ដេអ៊ីដ្រាតកម្មផលិតផលបូកអាល់ដុលមួយបង្កើតប្រព័ន្ធកាបូនីល $\alpha,\beta$ -មិនឆ្អែតឆ្លាស់មួយ។ ដំណើរការសរុបត្រូវបានគេហៅថា ប្រតិកម្មកុងដង់សង់កម្មអាល់ដុល (aldol condensation) ហើយផលិតផលត្រូវបានគេហៅ ថាអែណាល់ (អាល់សែនអាល់ដេអ៊ីត) ឬ អែណូន (អាល់សែនសេតូន) អាស្រ័យលើក្រុមកាបូនីលក្នុងផលិតផល។ ស្ថេរភាពរបស់ប្រព័ន្ធអែណាល់ ឬអែណូនឆ្លាស់មានន័យថា លំនឹងដេអ៊ីដ្រាតកម្មមិនអាចត្រលប់ ក្រោយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រតិកម្មបូកអាល់ដុលដែលបង្កើត 3-អ៊ីដ្រកស៊ីតប៊ុយតាណាល់ ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងផ្នែក ១៩.៤ ធ្វើដេអ៊ីដ្រាតកម្មដោយដុតកម្ដៅដើម្បីបង្កើត 2-ប៊ុយតាណាល់។ ចលនការប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មនេះត្រូវ បានបង្ហាញខាងក្រោម។

➢ ចលនការប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មនៃផលិតផលបូកអាល់ដូល




ទោះបីជាអ៊ីដ្រូសែនជាអ្នកចាកចេញមួយក្នុងប្រតិកម្មនេះ ម៉ូលេគុលរងដេអ៊ីដ្រាតកម្មនីមួយៗមិនអាចត្រលប់វិញបានទេ ពីព្រោះស្ថេរភាពរបស់ភាពឆ្លាស់ ទាញប្រតិកម្មទៅមុខ។

**៤.៤ ប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដូលកាតាលីកអាស៊ីត**


ប្រតិកម្មអាល់ដូលអាចកើតឡើងក្រោមកាតាលីសអាស៊ីត ក្នុងករណីដែលប្រតិកម្មទូទៅបង្កើតផលិតផល $\alpha,\beta$ -មិនផ្អែកដោយប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មផ្ទាល់នៃអង្គធាតុកណ្តាល $\beta$ -អ៊ីដ្រូស៊ីអាល់ដូល។ នេះជាមធ្យោបាយមួយ ដែលសេតូនអាចត្រូវបានប្រើក្នុងប្រតិកម្មអាល់ដូលមួយ។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ ដែលអាសេតូនបង្កើតផលិតផលកុងដង់កម្មអាល់ដូលរបស់វាគឺ 4-មេទីលប៉ង់-3-អែន-2-អូននៅពេលដាក់ជាមួយអ៊ីដ្រូសែនក្លរួ។

➢ ចលនការប្រតិកម្មអាល់ដូលកាតាលីកអាស៊ីត


ប្រតិកម្ម៖




ចលនការ៖



ចលនការប្រតិកម្មចាប់ផ្តើមពីការកើតដោយអែណូលកាតាលីកអាស៊ីត



បន្ទាប់មក អែណូលបូកក្រុមកាបូនីលប្រូតុងកម្មនៃម៉ូលេគុលសេតូនមួយទៀត



ចុងក្រោយ បន្ថែមប្រូតុង និងដេអ៊ីដ្រាតកម្មបង្កើតផលិតផល

កាតាលីសអាស៊ីតជំរុញប្រតិកម្មបន្ថែមបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម។ ឧទាហរណ៍មួយត្រូវបានឱ្យនៅក្នុងលំហាត់អនុវត្តន៍១៩.៨។ ជាទូទៅ វាមានសារសំខាន់ក្នុងការសំយោគសម្រាប់ប្រតិកម្មអាល់ដូលដែលធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌបាស មិនមែនអាស៊ីត។


**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.៧ ៖** ប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដូលកាតាលីកអាស៊ីតរបស់សេតូន (ទើបបានបង្ហាញខាងលើ) ក៏បង្កើត2,6-ឌីមេទីលអ៊ីបតា-2,5-ឌីអែន-4-អូនខ្លះដែរ។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មបង្កើតផលិតផល នេះ។

**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.៨ ៖** ការកម្លៅសេតូនជាមួយអាស៊ីតស៊ីលីកូនផ្ទុកធ្វើឱ្យកើតមេស៊ីទីឡែន (1,3,5-ទ្រីមេទីល បង់សែន)។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មនេះ។

### ៤.៥ ការអនុវត្តន៍សំយោគនៃប្រតិកម្មអាល់ដូល

ដូចដែលយើងបានឃើញពីដំបូងរួចហើយ ប្រតិកម្មបូកអាល់ដូល និងប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដូលជាវិធីសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់បង្កើតសម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូន។ ពួកវាក៏អាចបង្កើតសមាសធាតុកាបូនីល $\beta$ -អ៊ីដ្រិកស៊ី និង  $\alpha,\beta$ -មិនឆ្អែត ដែលពួកវាមានសារប្រយោជន៍សម្រាប់ការបម្លែងសំយោគបន្ថែម។ ប្រតិកម្មតំណាងខ្លះត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។


**ប្រតិកម្មអាល់ដូលក្នុងការសំយោគ**



**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.៩ ៖**

- ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មអាល់ដូលរបស់ប្រូប៉ាណាល់ខាងក្រោម៖





- b. តើអ្នកពន្យល់យ៉ាងម៉េចដែលផលិតផលប្រតិកម្មអាល់ដូលគឺ 3-អ៊ីដ្រូកស៊ី-2-មេទីលប៉ង់តាណាល់ មិនមែន 4-អ៊ីដ្រូកស៊ីអិចសាណាល់ទេ ?
- c. តើផលិតផលណាខ្លះដែលអាចទទួលបាន បើសិនល្បាយប្រតិកម្មនេះត្រូវបានដុតកម្ដៅ ?


**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.១០** ៖ ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលផលិតផលនីមួយៗខាងក្រោមត្រូវបានសំយោគពីប៊ុយតាណាល់៖

- 2-អេទីល-3-អ៊ីដ្រូកស៊ីអិចសាណាល់
- 2-អេទីលអិច-2-អែន-1-អុល
- 2-អេទីលអិចសាន-1-អុល
- 2-អេទីលអិចសាន-1,3-ឌីអុល (ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត)

ដូចនេះ កន្លងមកយើងមានតែឧទាហរណ៍នៃប្រតិកម្មអាល់ដូល ដែលអង្គធាតុប្រតិកបង្កើតផលិតផលមួយដោយប្រតិកម្មឌីមែរកម្ម។ ក្នុងផ្នែកបន្ទាប់ យើងនឹងពិភាក្សាអំពីបម្រើបម្រាស់ប្រតិកម្មអាល់ដូលដើម្បីទង្វើ សមាសធាតុ  $\beta$ -អ៊ីដ្រូកស៊ី និង  $\alpha,\beta$ -មិនផ្ដុតកាបូនីល។ បន្ទាប់មក យើងនឹងសិក្សាប្រតិកម្មហៅថា ប្រតិកម្មបូកផ្គុំដែលយើងអាចទង្វើប្រព័ន្ធហ្វី  $\alpha,\beta$ -មិនផ្ដុតកាបូនីល ដែលបានពីប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដូល។

### ៥. ប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដូលខ្វែង











ប្រតិកម្មអាល់ដូលមួយដែលចាប់ពីសមាសធាតុកាបូនីលពីរខុសគ្នាត្រូវបានគេហៅថា ប្រតិកម្មអាល់ដូលខ្វែង (crossed aldol reaction)។ បើគ្មានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ទេ ប្រតិកម្មអាល់ដូលខ្វែងអាចបង្កើតល្បាយផលិតផលពីបង្កំគូផ្សេងៗរបស់ប្រតិករកាបូនីល ដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោមរវាងអេតាណាល់ និងប្រូប៉ាណាល់៖




ដូចនេះ យើងអាចចាត់ប្រតិកម្មក្នុងដងកម្មអាល់ដូលខ្វែងដោយគោលការណ៍ពីរ ដែលអាចត្រួតពិនិត្យ លើរបាយផលិតផល។ គោលការណ៍ទី១អាស្រ័យលើកត្តាទម្រង់របស់ប្រតិកម្មកាបូនីល និងតួនាទីសំខាន់នៃ លំនឹងប្រតិកម្មបូកចង់បាន និងមិនចង់បានមាន ក្នុងការកំណត់របាយផលិតផល។ ក្នុងគោលការណ៍នេះ បានខ្សោយដូចជាអ៊ីដ្រូកស៊ីត ឬអាល់កុកស៊ីតត្រូវបានប្រើក្នុងធាតុរំលាយប៉ូលែមានប្រូតុងដូចជាទឹក និង អាល់កុល។ គោលការណ៍ទី២ ហៅថាប្រតិកម្មអាល់ដូលផ្ទាល់ ទាក់ទងនឹងការប្រើបាសខ្លាំងមួយដូចជាLDA ក្នុងធាតុរំលាយគ្មានប្រូតុង។ ដោយប្រើបាសខ្លាំង ប្រតិកម្មមួយអាចបម្លែងទាំងស្រុងទៅជាអែណូឡាតមួយ ដែល បន្ទាប់មកអាចឱ្យធ្វើប្រតិកម្មជាមួយប្រតិករកាបូនីលផ្សេងទៀត។

## ៥.១ ប្រតិកម្មក្នុងដងកម្មអាល់ដូលខ្វែងដោយប្រើបាសខ្សោយ

ប្រតិកម្មអាល់ដូលខ្វែងអាចកើតឡើងដោយប្រើបាសខ្សោយដូចជាអ៊ីដ្រូកស៊ីត ឬអាល់កុកស៊ីតនៅ ពេលប្រតិករកាបូនីលមួយមិនមានអ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ ។ ប្រតិករមួយគ្មានអ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ មិនអាចធ្វើក្នុងដងកម្មខ្លួនវាទេ ពីព្រោះវាមិនអាចបង្កើតអែណូឡាត។ យើងជៀសវាងប្រតិកម្មក្នុងដងកម្មខ្លួនឯងនៃប្រតិករផ្សេងទៀត ដែល មានអ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ មួយ ដោយបន្ថែមវាយ៉ាតៗទៅក្នុងសូលុយស្យុងនៃប្រតិករទី១និងបាស។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះ កំហាប់របស់ប្រតិករដែលមានអ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ មួយតែងតែទាប ហើយវាមានវត្តមានក្នុងទម្រង់អែណូឡាត មួយ។ ប្រតិកម្មសំខាន់ដែលកើតឡើងរវាងអែណូឡាតនេះ និងសមាសធាតុកាបូនីលដែលមិនមានអ៊ីដ្រូសែន  $\alpha$  ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង១៩.១ខាងក្រោម៖


| តារាង១៩.១ ប្រតិកម្មអាល់ដូលខ្វែង                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ប្រតិករគ្មានអ៊ីដ្រូសែន<br>$\alpha$ ជាក់ក្នុងបាស                                                      | ប្រតិករមានអ៊ីដ្រូសែន<br>$\alpha$ ត្រូវបានបន្ថែមយ៉ាតៗ                                                      | ផលិតផល                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>បង់សាល់ដេអ៊ីត | <br>ប្រូប៉ាណាល់        | <br><br>2-មេទីល-3-ផេនីល-2-ប្រូប៉ែណាល់<br>( $\alpha$ -មេទីលស៊ីណម៉ាល់ដេអ៊ីត) (80%) |
| <br>បង់សាល់ដេអ៊ីត | <br>ផេនីលអាល់ដេអ៊ីត    | <br><br>2,3-ឌីផេនីល-2-ប្រូប៉ែណាល់                                                |
| <br>ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត | <br>2-មេទីលប្រូប៉ាណាល់ | <br><br>3-អ៊ីដ្រូកស៊ី-2,2-ឌីមេទីលប្រូប៉ាណាល់<br>(>64%)                          |

អាល់ដុលខ្វែងត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង១៩.១ ទាក់ទងនឹងអាល់ដេអ៊ីតជាប្រតិកម្មទាំងពីរ។ ប៉ុន្តែគេអាចប្រើសេតូនជាអង្គធាតុប្រតិកម្មមួយ ពីព្រោះសេតូនមិនធ្វើកុងដង់កម្មខ្លួនវាទេ ដោយសារតែរបាំងស្តេរីក្នុងដំណាក់កាលប្រតិកម្មបូកអាល់ដុល។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នៃប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដុលខ្វែងដែល មានអង្គធាតុប្រតិកម្មជាសេតូន។ ជួនកាល ប្រតិកម្មដូចប្រតិកម្មទាំងនេះត្រូវបានហៅថាប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen-Schmidt។ Schidt បានរកឃើញ ហើយClaisen បានអភិវឌ្ឍប្រភេទនៃប្រតិកម្មអាល់ដុលក្នុងទសវត្ស 1800។




ក្នុងប្រតិកម្មនេះ ដេអ៊ីដ្រាតកម្មកើតឡើងយ៉ាងរហ័ស ពីព្រោះសម្ព័ន្ធពីរជាន់ដែលកកើតឆ្លាស់គ្នាទាំងជាមួយក្រុមកាបូនីល និងវង់បង់សែន។ ជាទូទៅ ប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មនៃអាល់ដុលត្រូវបានសម្របសម្រួលជាពិសេស នៅពេលវាអាចបង្កើនភាពឆ្លាស់។

ជាឧទាហរណ៍បន្ថែម ដំណាក់កាលសំខាន់មួយក្នុងការសំយោគវីតាមីនA ដោយប្រើប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម អាល់ដុលខ្វែងមួយរវាងជីវ៉ានៀល និងអាសេតូន៖




ជីវ៉ានៀលគឺជាអាល់ដេអ៊ីតកើតក្នុងធម្មជាតិមួយ ដែលអាចទទួលបានពីប្រេងក្រូចឆ្មារ។ អ៊ីដ្រូសែន $\alpha$ របស់វាជាអ៊ីដ្រូសែនវីនីល ដូចនេះ វាមិនមានភាពអាស៊ីតទេ។ ចូរកត់សម្គាល់ថា ក្នុងប្រតិកម្មនេះ ដេអ៊ីដ្រាតកម្មកើតឡើងយ៉ាងងាយ ពីព្រោះប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មធ្វើឱ្យមានការពង្រីកប្រព័ន្ធឆ្លាស់។


**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.១១** ៖ ចូរសរសេរសមីការក្នុងការសំយោគសមាសធាតុមួយដែលប្រើក្នុងទឹកអប់ ហៅថា លីលីអាល់ដេអ៊ីត។ ចូរផ្តល់ទម្រង់របស់សមាសធាតុទាំងអស់។



**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.១២៖** នៅពេលផរម៉ាល់ដេអ៊ីតលើសក្នុងសូលុយស្យុងបានដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយ ប្រតិកម្មខាងក្រោមអាចកើតឡើង។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មនេះ។




**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.១៣៖** នៅពេលស៊ីដូអ៊ីយ៉ូណូនត្រូវបានដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយ  $\text{BF}_3$  ក្នុងអាស៊ីតអាសេទិច ការបិទរង់កើតឡើង ហើយ  $\alpha$ - និង  $\beta$ -អ៊ីយ៉ូណូនត្រូវបានបង្កើត។ នេះជាដំណាក់កាលបន្ទាប់ក្នុងការសំយោគវីតាមីន A។



- ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មក្នុងការបង្កើត  $\alpha$ - និង  $\beta$ -អ៊ីយ៉ូណូននេះ។
- $\beta$ -អ៊ីយ៉ូណូនជាផលិតផលឧត្តមភាព។ ចូរពន្យល់។
- តើអ៊ីយ៉ូណូនមួយណាដែលសម្របប្រវែងរលក UV-Vis វែងជាងគេ? ហេតុអ្វី?

នីត្រីលដែលមានអ៊ីដ្រូសែន  $\alpha$  ក៏មានលក្ខណៈអាស៊ីតខ្សោយ ( $\text{pK}_a=25$ ) ហើយនីត្រីលទាំងនេះរងប្រតិកម្មក្នុងដង់កម្មប្រភេទអាល់ដុល។ ឧទាហរណ៍មួយគឺប្រតិកម្មក្នុងដង់កម្មនៃបង់សាល់ដេអ៊ីតដោយផេនីលអាសេតូនីត្រីល៖



**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.១៤៖**


- ចូរគូរទម្រង់រេសូណង់របស់អាញ្ចីងរបស់សេតូនីត្រីលដែលមានភាពអាស៊ីតខ្លាំងជាងអេតាន។
- ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មក្នុងដង់កម្មនៃបង់សាល់ដេអ៊ីតជាមួយអាសេតូនីត្រីល។

## ៥.២ ប្រតិកម្មក្នុងដង់កម្មអាល់ដុលខ្វែងដោយប្រើបាសខ្លាំង៖ លីចូមអែណូឡាត និងប្រតិកម្មអាល់ដុលផ្លាស់

មធ្យោបាយមួយមានប្រសិទ្ធភាព និងបត់បែនបានដើម្បីឱ្យមានប្រតិកម្មក្នុងដង់កម្មអាល់ដុលខ្វែងគឺប្រើលីចូមអែណូឡាតដែលទទួលបានពីសេតូនជាភាគីមួយ និងអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនជាភាគីមួយទៀត។

ឧទាហរណ៍នៃមធ្យោបាយនេះត្រូវបានគេហៅថា **ប្រតិកម្មអាល់ដុលផ្ទាល់** (directed aldol reaction) ត្រូវបានបង្ហាញ ដោយចលនការខាងក្រោម៖

➢ ចលនការប្រតិកម្មសំយោគអាល់ដុលផ្ទាល់ដោយប្រើលីចូមអែណូឡាត




សេតូនត្រូវបានបូកលើ  
 $\text{LiN}(\text{i-Pr})_2$  (LDA) ជាធាតុខ្លាំង  
 ដែលដកអ៊ីដ្រូសែន  $\alpha$  មួយពី  
 សេតូនបង្កើតអែណូឡាត

អាល់ដេអ៊ីតត្រូវបានបូក  
 ហើយអែណូឡាតមាន  
 ប្រតិកម្មជាមួយអាល់ដេអ៊ីត  
 លើកាបូនកាបូនីលរបស់វា

ប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាសកើត  
 ឡើងនៅពេលទឹកត្រូវបាន  
 បូកនៅចុង ប្រូតុងកម្មលីចូម  
 អាល់កុកស៊ីត

គេអាចទទួលបានកម្រិតជ្រើសរើសខ្ពស់ នៅពេលគេប្រើសេតូនអស៊ីមេទ្រីក្នុងប្រតិកម្មអាល់ដុលផ្ទាល់ ដោយបង្កើតអែណូឡាតស៊ីនេទិច ដោយប្រើលីចូមឌីអ៊ីសូប្រូពីលអាមីត (LDA)។ ប្រតិកម្មនេះធានាឱ្យមាន ការ បង្កើតអែណូឡាត ដែលបានបាត់បង់ប្រូតុងពីកាបូន  $\alpha$  ជួសតិច។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍មួយ៖


**ប្រតិកម្មអាល់ដុលតាមអែណូឡាតស៊ីនេទិច (ប្រើ LDA)**




ផលិតផលអាល់ដុល  
 ខ្វែងទោល

បើសិនប្រតិកម្មអាល់ដុលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងមធ្យោបាយមួយដោយប្រើអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីតជាធាតុ គេនឹងទទួលបានផលិតផលយ៉ាងហោចណាស់ពីរក្នុងបរិមាណសមស្របមួយ។ ទាំងអែណូឡាតស៊ីនេទិច និង ទែម៉ូឌីណាមិចអាចត្រូវបានបង្កើតពីសេតូន ហើយនីមួយៗអាចត្រូវបានបូកលើកាបូនកាបូនីលរបស់អាល់ដេអ៊ីត៖


**ប្រតិកម្មអាល់ដុលដែលបង្កើតល្បាយមួយតាមអែណូឡាតស៊ីនេទិច និងទែម៉ូឌីណាមិច  
 (ដោយប្រើបាសខ្សោយមួយក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រូតុង)**






ល្បាយនៃផលិតផលអាល់ដុលខ្លះ

លំហាត់ឧទាហរណ៍៖ ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មសំយោគអាល់ដុលផ្ទាល់នៃសមាសធាតុខាងក្រោម។




វិធីសាស្ត្រ និងចម្លើយ៖


ការវិភាគសំយោគត្រលប់



ការសំយោគ




លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.១៥៖ ដោយចាប់ផ្តើមពីសេតូន និងអាល់ដេអ៊ីត ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មសំយោគ អាល់ដុលផ្ទាល់នៃសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោម ដោយប្រើលីចូមអែណូឡាត៖



## ៦. ប្រតិកម្មប៊ិចវ៉ាត់តាមរយៈប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដុល

ប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដុលផ្តល់ជាមធ្យោបាយងាយម្នីសំយោគម៉ូលេគុលដែលមានវង់៥ និងវង់៦ (ហើយជួនកាលវង់ធំជាងនេះ)។ ប្រតិកម្មនេះអាចធ្វើឡើងដោយប្រតិកម្មកុងដង់កម្មអាល់ដុលអន្តរម៉ូលេគុល ដោយប្រើឌីអាល់ដេអ៊ីត សេតូអាល់ដេអ៊ីត ឬឌីសេតូនជាអង្គធាតុមេប្រតិករ។ ឧទាហរណ៍ សេតូអាល់ដេអ៊ីតខាងក្រោមធ្វើប្រតិកម្មប៊ិចវ៉ាត់បង្កើត 1-ស៊ីក្លូប៉ង់ទីលមេទីលសេតូន៖



ប្រតិកម្មទាំងនេះទាក់ទងនឹងការកើតនៃអែណូឡាតយ៉ាងហោចណាស់បី។ ប៉ុន្តែ វាជាអែណូឡាត បានពីខាងសេតូនដែលបូកលើក្រុមអាល់ដេអ៊ីត បង្កើតផលិតផល។


មូលហេតុក្រុមអាល់ដេអ៊ីតនៃប្រតិកម្មដែលចង់បានអាចកើតឡើងពីប្រតិកម្មភាពខ្លាំងរបស់អាល់ដេអ៊ីត ចំពោះប្រតិកម្មបូកនុយក្លេអូកីល។ អាតូមកាបូននុយក្លេអូកីលរបស់សេតូនមួយមានបន្ទុកវិជ្ជមានតិច (ដូច នេះមានប្រតិកម្មភាពទាបចំពោះនុយក្លេអូកីលមួយ) ពីព្រោះវាចងក្រុមអាល់គីលឱ្យអេឡិចត្រុងពីរ វាក៏មាន របាំងស្តេរីច្រើនដែរ។



សេតូនមានកម្រិតអេឡិចត្រូកីលខ្សោយជាងអាល់ដេអ៊ីត ហើយមានប្រតិកម្មភាពជាមួយ នុយក្លេអូកីលខ្សោយជាង ពីព្រោះសេតូនមានក្រុមអាល់គីលឱ្យអេឡិចត្រុង និងមានរបាំងស្តេរីច្រើន


ក្នុងប្រតិកម្មប្រភេទនេះ វង់៥កកើតងាយស្រួលជាងវង់៦ ហើយវង់៦ត្រូវបានសម្របសម្រួលជាងវង់៤ ឬវង់៨ នៅពេលអាចទៅរួច។

➢ ចលនការប្រតិកម្មបិទវង់អាល់ដុល



**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.១៦៖** សន្មត់ថាប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្មកើតឡើង ចូរគូរទម្រង់នៃផលិតផលផ្សេងពីរទៀត ដែលអាចទទួលបានពីប្រតិកម្មបិទវង់អាល់ដុលខាងលើ (ផលិតផលនេះមួយនឹងមានវង់៥ហើយមួយទៀត នឹង មានវង់៧)។


**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.១៧៖** តើសារធាតុផ្តើមណាដែលអ្នកអាចប្រើក្នុងប្រតិកម្មបិទវង់អាល់ដុលដើម្បីទង្វើ សមាសធាតុខាងក្រោម?




លំហាត់អនុវត្ត៩៩.១៨៖ តើលក្ខខណ្ឌពិសោធន៍ណាដែលសម្របសម្រួលដំណើរការបិទរងក្នុងប្រតិកម្ម អាល់ដុលអន្តរមូលេគុលលើប្រតិកម្មក្នុងដងកម្មអន្តរមូលេគុល?

**៧. ប្រតិកម្មបូករាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន  $\alpha,\beta$ -មិនឆ្អែត**

នៅពេល អាល់ដេអ៊ីត  $\alpha,\beta$ -មិនឆ្អែតមានប្រតិកម្មជាមួយអ្នកដក់ទីបន្ទុយក្លេអូកីល ពួកវាធ្វើប្រតិកម្មនេះ តាមផ្លូវពីរ។ ពួកវាអាចមានប្រតិកម្មដោយប្រតិកម្មបូកធម្មតា ដែលមួយជានុយក្លេអូកីលបូកលើសម្ព័ន្ធពីរជាន់ របស់ក្រុមកាបូនីល ឬពួកវាអាចមានប្រតិកម្មដោយប្រតិកម្មបូកឆ្លាស់។ ដំណើរការពីរនេះដូច ប្រតិកម្មបូក-1,2 និង ប្រតិកម្មបូក-1,4 នៃឌីអែនឆ្លាស់ (ផ្នែក១៣.១០)៖




ក្នុងកាលៈទេសៈជាច្រើន របៀបនៃប្រតិកម្មបូកទាំងពីរកើតឡើងក្នុងល្បាយដូចគ្នា។ ជាឧទាហរណ៍ មួយ ចូរយើងពិចារណាលើប្រតិកម្មត្រីញ៉ាដខាងក្រោម៖




ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ យើងឃើញថា ប្រតិកម្មបូកធម្មតាត្រូវបានសម្របសម្រួល ហើយវាជាករណីដែល ប្រតិកម្មជាមួយនុយក្លេអូកីលខ្លាំង។ ប្រតិកម្មបូកឆ្លាស់ត្រូវបានសម្របសម្រួល នៅពេលគេប្រើនុយក្លេអូកីល ខ្សោយជាង។



បើសិនយើងពិចារណាលើទម្រង់រេសូណង់ដែលចូលរួមបង្កើតអ៊ីប៊ីតសរុបរបស់អាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូន  $\alpha,\beta$ -មិនផ្អែត (មើលទម្រង់ A – C ) យើងនឹងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រតិកម្មទាំងនេះ៖




ទោះបីទម្រង់ B និង C ទាក់ទងនឹងបន្ទុក ពួកវាមានរបាយសំខាន់មួយទៅកាន់អ៊ីប៊ីត ពីព្រោះក្នុងទម្រង់ នីមួយៗបន្ទុកអវិជ្ជមានស្ថិតនៅលើអុកស៊ីសែន។ ទម្រង់ B និង C ក៏បញ្ជាក់ថា ទាំងកាបូនកាបូនីល និងកាបូន $\beta$  គួរតែមានបន្ទុកវិជ្ជមានដោយផ្នែក។ ពួកវាបញ្ជាក់ថា យើងអាចតាងអ៊ីប៊ីតដូចខាងក្រោម៖




ទម្រង់នេះប្រាប់យើងថា យើងអាចរំពឹងថាអាក់ទីបនុយក្លេអូកីលប្រយុទ្ធលើទាំងកាបូនកាបូនីលផង និងកាបូន $\beta$ ផង។


ទោះបីជាភ្នាក់ងារនុយក្លេអូកីលទាំងអស់ដែលបូកលើកាបូនកាបូនីលនៃអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនធម្មតា អាចបូកលើកាបូន $\beta$  នៃសមាសធាតុកាបូនីល $\alpha,\beta$ -មិនផ្អែត។ ក្នុងករណីជាច្រើន នៅពេលនុយក្លេអូកីលខ្សោយ ត្រូវបានប្រើ ប្រតិកម្មបូកផ្លាស់ជាប្រតិកម្មចំបង។ ចូរពិចារណាលើប្រតិកម្មបូកអ៊ីដ្រូសែនស្យាងខាងក្រោម៖




➤ ចលនការប្រតិកម្មបូកផ្លាស់នៃ HCN




អង្គធាតុកណ្តាលអែណូឡាត  
ស្យាងប្រយុទ្ធលើកាបូន $\beta$ វិជ្ជមានដោយផ្នែក។ បន្ទាប់មក  
អង្គធាតុកណ្តាលអែណូឡាតទទួលយកប្រូតុងមួយ តាមផ្លូវទាំងពីរ៖



ឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃប្រតិកម្មបូកប្រភេទនេះគឺ៖



➢ ចលនការប្រតិកម្មបូកផ្គុំនៃអាមីន



នុយក្លេអូហ្វីលប្រយុទ្ធ  
លើកាបូនប្រាំជួរមាន  
ដោយផ្នែក

ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ប្រូតុង មួយត្រូវបាន  
បាត់បង់ពីអាតូម អាសូត ហើយអ្នកស៊ីសែន  
ជា អ្នកទទួលយកប្រូតុងនេះ


ទម្រង់អែណុល

ទម្រង់សេតូ

៧.១ ប្រតិកម្មបូកផ្គុំនៃអែណូឡាត៖ ប្រតិកម្ម Michael

ប្រតិកម្មបូកផ្គុំនៃអែណូឡាតលើសមាសធាតុកាបូនីល  $\alpha, \beta$ -មិនផ្ដុំត្រូវបានគេហៅថា ប្រតិកម្ម Michael (បង្ហាត់ពី Arthur Michael រកឃើញ ក្នុងឆ្នាំ១៨៨៧)។ ចលនការប្រតិកម្មបូក Michael ត្រូវបានបង្ហាញ ខាងក្រោម។

➢ ចលនការប្រតិកម្មបូក Michael




បាសមួយដកប្រូតុង  $\alpha$   
បង្កើតអែណូឡាតពីប្រតិក  
កាបូនីល

អែណូឡាតនេះបូកលើកាបូនប្រាំជួរ សមាសធាតុ  
កាបូនីល  $\alpha, \beta$ -មិនផ្ដុំត បង្កើតសម្ព័ន្ធកាបូន-កាបូន  
ថ្មីមួយ រវាងពួកវា។ នៅពេលសម្ព័ន្ធកើតជំងឺស៊ីតេ  
អេឡិចត្រុងក្នុងសមាសធាតុ  $\alpha, \beta$ -មិនផ្ដុំតរំកិលទៅ  
កាន់អ្នកស៊ីសែនកាបូនីលបង្កើតអែណូឡាតថ្មីមួយ

ប្រូតុងកម្មលើអែណូឡាត ដែលក  
កើតបង្កើត ផលិតផលបូក  
Michael


ប្រតិកម្មបូក Michael កើតឡើងជាមួយអ្នកដទៃបន្ថែមទៀត រួមមានអេស្ទែរអាសេទីលេនិច និងនីទ្រីល  $\alpha, \beta$ -មិនផ្ដុំត៖



**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.១៩:** តើផលិតផលណាដែលទទួលបានពីប្រតិកម្ម Michael កាតាលីករបាននៃ៖


- 1,3-ឌីផេនីលប្រូ-2-អែន-1-អ៊ុន និងអាសេតូផេណូន
- 1,3-ឌីផេនីល-2-អែន-1-អ៊ុន និងស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែន ?
- ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មទាំងពីរ។

**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.២០:** នៅពេលអាក្រូលីន (ប្រូប៉ែណាល់) មានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រាស៊ីន ផលិតផលជាឌីអ៊ីដ្រូពីរ៉ាសុល៖




ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មនេះ។

អែណូមែនក៏អាចត្រូវបានប្រើក្នុងប្រតិកម្ម Michael ។ ឧទាហរណ៍៖



## ៧.២ ប្រតិកម្មអនុយឡាតកម្ម Robinson

ប្រតិកម្មបូក Michael អនុលោមន៍ដោយប្រតិកម្មដុះដង់កម្មអាល់ដូធម្មតាមួយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់រង្វង់មួយលើរង្វង់មួយទៀត។ ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថា **ប្រតិកម្មអនុយឡាតកម្ម Robinson** (បង្កើតឡើង) បន្ទាប់ពីអ្នកគីមីអង់គ្លេស Sir Robert Robinson ដែលជាអ្នកងារ៉ាន់ណូបែលផ្នែកគីមីក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៧ ក្នុងការស្រាវជ្រាវលើសមាសធាតុធម្មជាតិរបស់គាត់។




**លំហាត់អនុវត្តន៍១៩.២១:**

- ស្នើចលនការប្រតិកម្មសម្រាប់ការបម្លែងនៃប្រតិកម្មអនុយឡាតកម្ម ដូចបានបង្ហាញខាងលើ។
- តើ 2-មេទីលស៊ីក្លូអ៊ីចសាន-1,3-ឌីអ៊ុនមានភាពអាស៊ីតខ្សោយជាង ឬខ្លាំងជាងស៊ីក្លូអ៊ីចសានណូន ? ចូរពន្យល់។

## ៨. ប្រតិកម្មMannich

សមាសធាតុដែលបង្កើតអែណូលមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីមីនពីផរម៉ាល់ដេអ៊ីត និងអាមីនថ្នាក់ទី១ ឬទី២ បង្កើតសមាសធាតុកាបូនីលβ-អាមីណូអាល់គីល ហៅថា បាសMannich។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រតិកម្មនៃអាសេតូន ផរម៉ាល់ដេអ៊ីត និងឌីអេទីលអាមីន៖




បាស Mannich

ប្រតិកម្មMannichទំនោរជាដំណើរការតាមចលនការផ្សេងៗអាស្រ័យលើអង្គធាតុប្រតិករ និងលក្ខខណ្ឌដែលបានប្រើ។ ចលនការខាងក្រោមកើតឡើងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត។ ចូរកត់សម្គាល់ពីទិដ្ឋភាពសំខាន់ក្នុងការបង្កើតអ៊ីមីន និងប្រតិកម្មរវាងអែណូល និងក្រុមកាបូនីល។

### ➢ ចលនការប្រតិកម្ម Mannich


ដំណាក់កាលទី១៖



ប្រតិកម្មរវាងអាមីនថ្នាក់ទី២ជាមួយ  
អាល់ដេអ៊ីតបង្កើតអេមីអាមីណាល់

អេមីអាមីណាល់បោះបង់ម៉ូលេគុលទឹក  
មួយ បង្កើតកាបុងអ៊ីមីនីញ៉ូម


ដំណាក់កាលទី២៖



កាបុងអ៊ីមីនីញ៉ូម


ទម្រង់អែណូលរបស់មសមាសធាតុអ៊ីដ្រូសែនសកម្មប្រតិកម្មជាមួយកាបុងអ៊ីមីនីញ៉ូមបង្កើត  
សមាសធាតុ β-អាមីណូកាបូនីលមួយ ( បាស Mannich)

លំហាត់អនុវត្ត៩.២២៖ សរសេរចលនការប្រតិកម្មដែលបង្កើតផលិតផលពីប្រតិកម្មMannichខាងក្រោម៖




## ៩. សង្ខេបប្រតិកម្មសំខាន់ៗ

ក. ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen ( ផ្នែក១៩.២ )




ខ. ប្រតិកម្មអាល់ដូល ( ផ្នែក១៩.៤ )


ប្រតិកម្មទូទៅ៖



ឧទាហរណ៍៖




គ. ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen ខ្លីង ( ផ្នែក១៩.២២ )




ឃ. ប្រតិកម្មអាល់ដូលផ្ទាល់តាមលីចូមអែណូឡាត (ផ្នែក១៩.៥ខ)

ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍៖



ង. ប្រតិកម្មបូកឆ្លស់ (ផ្នែក១៩.៧)


ឧទាហរណ៍ទូទៅ៖




$\text{Nu}^- = \text{CN}^-$  , អែណូឡាតមួយ (ប្រតិកម្មបូក Michael) ,  $\text{R}'''\text{MgBr}$

$\text{Nu-H} =$  អាមីន  $1^\circ$  ឬ  $2^\circ$  , អែណូមីនមួយ


ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់៖



ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ (ប្រតិកម្មបូក Michael)



ច. ប្រតិកម្ម Mannich (ផ្នែក១៩.៨)




\$\$\$\$\$\$\$\$\$


## លំហាត់មេរៀនទី១៩

### ប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Claisen


១. ចូរគូរទម្រង់របស់ផលិតផលដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




២. ចូរសរសេរដំណាក់កាលក្នុងការសំយោគខាងក្រោម។ អ្នកអាចប្រើវេរីអាក់ទីបដែលចាំបាច់ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្តើមពីសមាសធាតុដែលបានឱ្យខាងក្រោម៖



៣. ចូរឱ្យទម្រង់សមាសធាតុផ្ដើមដែលត្រូវការសម្រាប់សំយោគសមាសធាតុខាងក្រោមដោយប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្មអែលីមីនាតមួយ៖




៤. ចូរឱ្យទម្រង់របស់ផលិតផលទាំងពីរដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Dieckmann ខាងក្រោម ហើយ តើមួយណាជាផលិតផលឧត្តមភាព។




៥. នៅពេលគេធ្វើប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម Dieckmann ដោយប្រើ ឌីអេទីលស៊ីស៊ីណាត ផលិតផលដែលទទួលបាន មានរូបមន្តម៉ូលេគុល  $C_{12}H_{16}O_6$ ។ ចូរឱ្យទម្រង់របស់សមាសធាតុនេះ។

៦. ចូរបង្ហាញពីរបៀបទង្វើឌីសេតូនខាងក្រោមនេះ ដោយប្រតិកម្មកុងដង់កម្ម៖




៧. ផ្ទុយពីប្រតិកម្មដែលប្រ បាសរាវ នៅពេលគេប្រើសូលុយស្យុង NaOH ខាប់ អេស្តែរអាសេតូអាសេទិចរង ប្រតិកម្មបណ្តាច់ដូចខាងក្រោម៖




ចូរសរសេរចេលនការប្រតិកម្មនេះ។

៨. ចូរសរសេរចេលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖






៩. ក្រោមវត្តមានសូដ្យូមអេតុកស៊ីត បង្កើនខាងក្រោមអាចកើតឡើង។ ចូរពន្យល់។




### ប្រតិកម្មអាល់ដូល


១០. ចូរឱ្យផលិតផលពីប្រតិកម្មនីមួយៗខាងក្រោម៖




១១. តើអាល់ដេអ៊ីត $\beta$ -អ៊ីដ្រូកស៊ីឌ៍ណាដែលកើតពីប្រតិកម្មអាល់ដូលខ្លះរវាងសមាសធាតុខាងក្រោម?




១២. ចូរបង្ហាញថា តើការបង្កើននីមួយៗខាងក្រោមអាចសម្រេចបានដូចម្តេច? អ្នកអាចប្រើវ៉ែអាក់ទីបផ្សេងទៀត។







១៣. តើសារធាតុផ្ដើមណាខ្លះដែលត្រូវការសម្រាប់សំយោគសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោមដោយប្រតិកម្មអាល់ដូល?



១៤. តើអ្នកទីបណ្តាដែលអ្នកត្រូវប្រើសម្រាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗក្នុងការសំយោគខាងក្រោម?




១៥. អាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់កាបូន $\gamma$  នៃក្រូតូណាល់ដេអ៊ីតមានលក្ខណៈអាស៊ីតបង្គុរ ( $pK_a=20$ )។




ក្រូតូណាល់ដេអ៊ីត

- ចូរសរសេរទម្រង់រេសូណង់ដែលពន្យល់អំពីមូលហេតុ។
- ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




១៦. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




### ប្រតិកម្មបូកធ្លាស់

១៧. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




១៨. ប្រតិកម្មក្នុងដង់កម្មដែលសមាសធាតុអ៊ីដ្រូសែនសកម្មជាអេស្បែរ-សេតូ ឬ ប្រ-ឌីសេតូន តែងតែបង្កើតផលិតផលដែលបានមកពីម៉ូលេគុលអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូនមួយ និងម៉ូលេគុលសកម្មមេឌីឡែនពីរ។ ឧទាហរណ៍៖




ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មបង្កើតផលិតផលទាំងនេះ។

១៩. ប្រតិកម្មខាងក្រោមជាប្រតិកម្មអានុយឡាតិកម្ម Robinson។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មនេះ។




២០. ចូរឱ្យទម្រង់សមាសធាតុរងដែលទទួលបាន បន្ទាប់ពីប្រតិកម្មបូក Michael នៃ 1 និង 2 ក្រោមវត្តមានសូដ្យូមអេតុកស៊ីត។




*លំហាត់ទូទៅ*


២១. ចូរសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម ដោយចាប់ផ្តើមពីស៊ីក្លូប៉ង់តាណូន៖




២២. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖







២៣. ចូរឱ្យផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មនីមួយៗខាងក្រោម៖






២៤. ចូរឱ្យផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



&&&&&&&&


**សង្ខេបបទលទការប្រតិកម្ម**  
**ប្រតិកម្មដែលទាញតាមយន្តការអេនីមីយ៉ូត្រូតីលកាមូស៊ីល**



**ខ្សែសំយោគ**

**ខ្សែសំយោគទាំងទងនឹងអេនីមីយ៉ូត្រូតីលកាមូស៊ីល**

- ការកើតអេនីមីយ៉ូត្រូតីលកាមូស៊ីល
- តួតួមែកម្មសេតូ-អេនីមីយ៉ូត្រូតីលកាមូស៊ីល
- អាឡូសែនកម្ម
- អាស់គីលកម្ម
- អាស៊ីលកម្ម




## មេរៀនទី២០

### អាមីន

#### ១. ការហៅឈ្មោះ


គេតែងហៅឈ្មោះអាមីនថ្នាក់ទី១ជា **អាល់គីលអាមីន**។ គេហៅឈ្មោះជាប្រព័ន្ធនៃអាមីនដោយបន្ថែមមជ្ឈិមបទ-**អាមីន** លើឈ្មោះនៃប្រព័ន្ធខ្សែ ឬរង្វង់ដែលចងជាមួយក្រុម  $\text{NH}_2$ ។ អាមីនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាអាមីន  $1^\circ$  អាមីន  $2^\circ$  ឬអាមីន  $3^\circ$  លើមូលដ្ឋាននៃក្រុមសរីរាង្គដែលចងជាមួយអាសូត។

##### អាមីនថ្នាក់ទី១




មេទីលអាមីន

(មេតានអាមីន)




អេទីលអាមីន

(អេតានអាមីន)



អ៊ីសូប៊ុយទីលអាមីន

(2-មេទីល-1-ប្រូប៉ានអាមីន)




ស៊ីក្លូអិចស៊ីលអាមីន

(ស៊ីក្លូអិចសានអាមីន)


អាមីនថ្នាក់ទី២ និងទី៣ត្រូវបានគេហៅតាមមធ្យោបាយទូទៅដូចគ្នា។ ក្នុងការហៅឈ្មោះ យើងហៅក្រុមសរីរាង្គនីមួយៗ បើសិនពួកវាខុសគ្នា ឬប្រើបុព្វបទ ឌី ឬ ទ្រី បើសិនពួកវាដូចគ្នា។ ក្នុងការហៅឈ្មោះជាប្រព័ន្ធ យើងប្រើអក្សរ N ដើម្បីសម្គាល់ទីតាំងក្រុមចងជាមួយអាតូមអាសូត។

##### អាមីនថ្នាក់ទី២



ទ្រីអាទីលអាមីន


(N, -មេទីលអាមីន)



អេទីលមេទីលប្រូពីលអាមីន


(N-អេទីលអេតាណាមីន)

##### អាមីនថ្នាក់ទី៣



ទ្រីអេទីលអាមីន


(N,N- ឌីអេទីលអេតាណាមីន)




អេទីលមេទីលប្រូពីលអាមីន

(N-អេទីល-N-មេទីល-1-ប្រូប៉ាណាមីន)

ក្នុងប្រព័ន្ធថ្នាក់ទី១ IUPAC ក្រុមជួស- $\text{NH}_2$ ត្រូវបានគេហៅថា ក្រុម **អាមីណូ**។ យើងតែងតែប្រើប្រព័ន្ធនេះសម្រាប់ ហៅឈ្មោះអាមីនដែលមានក្រុម OH ឬក្រុម  $\text{CO}_2\text{H}$  មួយ៖



2-អាមីណូអេតាណុល




អាស៊ីត 3-អាមីណូប្រូប៉ាណូអិច

#### ១.១ អរិលអាមីន


អរិលអាមីនសំខាន់មានឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖






អានីលីន

(បង់សែនអាមីន)




N-មេទីលអានីលីន

(N-មេទីល-បង់សែន)



p-តូលុយឌីន

(4-មេទីល-បង់សែនអាមីន)




p-អានីស៊ីឌីន

(4-មេតុកស៊ី-បង់សែនអាមីន)


## ១.២ អាមីនអេតេរ៉ូស៊ីក្លិច

អាមីនអេតេរ៉ូស៊ីក្លិចសំខាន់ៗទាំងអស់មានឈ្មោះធម្មតា។ ក្នុងការហៅឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធបុព្វបទ **អាសា- ឌីអាសា-** និង **-ទ្រីអាសា** ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីកំណត់ថា អាតូមអាសូតត្រូវបានជំនួសអាតូមកាបូនក្នុង អ៊ីដ្រូកាបូដែលត្រូវគ្នា។ អាតូមអាសូតមួយក្នុងរង្វង់ (ឬអេតេរ៉ូអាតូមម៉ាសអាតូមធំជាងគេ ដូចជាក្នុងករណីត្យាសុល) ត្រូវបានបង់លេខ 1 ហើយត្រូវបង់លេខបន្តយ៉ាងណាឱ្យអេតេរ៉ូអាតូមទាំងអស់មានលេខសរុបតូចបំផុត។




ពីរ៉ុល

(1-អាសាស៊ីក្លូ បង់តាន-2,4-ឌីអែន)




ពីរ៉ាសុល

(1,2-ឌីអាសា ស៊ីក្លូបង់តា-2,4-ឌីអែន)




អ៊ីមីដាសុល

(1,3-ឌីអាសា ស៊ីក្លូបង់តា-2,4-ឌីអែន)




អ៊ិនដុល

(1-អាសាអ៊ិនដែន)




ពីរីឌីន

(អាសាបង់សែន)




ពីរីឌីដាស៊ីន

(1,2-ឌីអាសាបង់សែន)




ពីរីមីឌីន

(1,3-ឌីអាសាបង់សែន)




គីណូលីន

(1-អាសាណាផ្កាឡែន)




ពីរីព័រីឌីន

(អាសាស៊ីក្លូអិចសាន)




ពីរីលីឌីន

(អាសាស៊ីក្លូបង់តាន)



ត្យាសុល

(1-ត្យា-3-អាសាស៊ីក្លូបង់តា-2,4-ឌីអែន)



ពូរីន

## ២. លក្ខណៈរូប និងទម្រង់របស់អាមីន

### ២.១ លក្ខណៈរូប


អាមីនជាសមាសធាតុប៉ូលែបង្គួរ ពួកវាមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងអាល់កានដែលត្រូវគ្នា ប៉ុន្តែទាបជាង អាល់កុលមានម៉ាសម៉ូលេគុលប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ម៉ូលេគុលអាមីនថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២អាចបង្កើតសម្ព័ន្ធ

អ៊ីដ្រូសែនខ្លាំងជាមួយគ្នា និងទឹក។ ម៉ូលេគុលអាមីនថ្នាក់ទី៣មិនអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនទៅវិញទៅមកទេ ប៉ុន្តែពួកវាអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនជាមួយម៉ូលេគុលទឹក ឬធាតុរំលាយអ៊ីដ្រុកស៊ីល។ ដូចនេះ អាមីនតែងតែ ពុះនៅសីតុណ្ហភាពទាបជាងអាមីនថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២ដែលមានម៉ាសម៉ូលេគុលប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ប៉ុន្តែ អាមីនម៉ាសម៉ូលេគុលទាបរលាយក្នុងទឹកល្អណាស់។ តារាង២០.១ បង្ហាញលក្ខណៈរូបរបស់អាមីនសំខាន់ មួយចំនួន។

| តារាង ២០.១ លក្ខណៈរូបរបស់អាមីន |                                                                 |            |        |                                               |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| ឈ្មោះ                         | ទម្រង់                                                          | mp<br>(°C) | Bp(°C) | កម្រិតរលាយ<br>(25°C) (g 100mL <sup>-1</sup> ) | pKa<br>(អ៊ីយ៉ុងអាម៉ូញ៉ូម) |
| <b>អាមីនថ្នាក់ទី១</b>         |                                                                 |            |        |                                               |                           |
| មេទីលអាមីន                    | CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub>                                 | -94        | -6     | រលាយខ្លាំង                                    | 10.64                     |
| អេទីលអាមីន                    | CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>                 | -81        | 17     | រលាយខ្លាំង                                    | 10.75                     |
| អ៊ីសូប្រូពីលអាមីន             | (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHNH <sub>2</sub>               | -101       | 33     | រលាយខ្លាំង                                    | 10.73                     |
| ស៊ីក្លូអិចស៊ីលអាមីន           | ស៊ីក្លូ-C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> NH <sub>2</sub>          | -18        | 134    | រលាយតិច                                       | 10.64                     |
| បង់ស៊ីលអាមីន                  | C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>   | 10         | 185    | រលាយតិច                                       | 9.30                      |
| អានីលីន                       | C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub>                   | -6         | 184    | 3.7                                           | 4.58                      |
| 4-មេទីលអានីលីន                | 4-CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> NH <sub>2</sub> | 44         | 200    | រលាយតិច                                       | 5.08                      |
| 4-នីត្រូអានីលីន               | 4-NO <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> NH <sub>2</sub> | 148        | 332    | មិនរលាយ                                       | 1.00                      |
| <b>អាមីនថ្នាក់ទី២</b>         |                                                                 |            |        |                                               |                           |
| ឌីមេទីលអាមីន                  | (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> NH                              | -92        | 7      | រលាយខ្លាំង                                    | 10.72                     |
| ឌីអេទីលអាមីន                  | (CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> NH              | -48        | 56     | រលាយខ្លាំង                                    | 10.98                     |
| ឌីផេនីលអាមីន                  | (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> NH                | 53         | 302    | មិនរលាយ                                       | 0.80                      |
| <b>អាមីនថ្នាក់ទី៣</b>         |                                                                 |            |        |                                               |                           |
| ទ្រីមេទីលអាមីន                | (CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> NH                              | -117       | 3      | រលាយខ្លាំង                                    | 9.70                      |
| ទ្រីអេទីលអាមីន                | (CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> NH              | -115       | 90     | 14                                            | 10.76                     |
| N,N-ឌីមេទីលអានីលីន            | C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>  | 3          | 194    | រលាយតិច                                       | 5.06                      |

## ២.២ ទម្រង់អាមីន

អាតូមអាសូតរបស់អាមីនទាំងអស់ដូចអាតូមអាសូតរបស់អាម៉ូញាក់ដែរ វាជាអាតូមអ៊ីប៊្រីតsp<sup>3</sup>។ ក្រុម អាល់គីលប៊ី (ឬអាតូមអ៊ីដ្រូសែន) ស្ថិតនៅលើជ្រុងរបស់ចតុមុខ អរប៊ីតាល់sp<sup>3</sup> ដែលមានទ្វេតាអេឡិចត្រុង សេរីត្រូវបានបញ្ចូលទៅជ្រុងផ្សេងទៀត។ យើងបរិយាយទម្រង់អាមីនដោយទីតាំងរបស់អាតូមជាពីរ៉ាមីតត្រីកោណ។ ប៉ុន្តែ បើសិនជាយើងចាត់ទុកទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីជាក្រុមមួយ យើងអាចបរិយាយធរណីមាត្ររបស់អាមីនជា ចតុមុខ។ គំរូបូតង់ស្វែលអេឡិចត្រូស្តាទិចសម្រាប់ផ្ទៃ van der Waals របស់ទ្រីមេទីលអាមីនបញ្ជាក់ពីទីតាំង របស់បន្ទុកអវិជ្ជមានដែលអេឡិចត្រុងមិនសម្ព័ន្ធស្ថិតនៅលើអាសូត៖




ទម្រង់អាមីនមួយ

ទម្រង់ទ្រីមេទីលអាមីន  
គណនាមួយ។ គំរូប៉ូតង់  
ស្បែកអេឡិចត្រូស្តាទិច  
បង្ហាញបន្ទុកលើអាសូតមាន  
ទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរី

មុំសម្ព័ន្ធរបស់វាមានតម្លៃស្រដៀងគ្នានឹងទម្រង់ចតុមុខ វាមានតម្លៃកៀកទៅនឹង  $109.5^{\circ}$ ។ ឧទាហរណ៍  
មុំសម្ព័ន្ធរបស់ទ្រីមេទីលអាមីន  $108^{\circ}$ ។


បើសិនក្រុមអាល់គីលរបស់អាមីនថ្នាក់ទី៣ខុសគ្នាទាំងអស់ អាមីនអាចជាម៉ូលេគុលគីរ៉ាល់។ មាន  
ទម្រង់អេណង់តូមែរពីររបស់អាមីនថ្នាក់ទី៣ ហើយតាមទ្រឹស្តី យើងគួរតែអាចព្រែកអេណង់តូមែរទាំងនេះ។  
ប៉ុន្តែតាមការអនុវត្ត ការព្រែកនេះមិនអាចធ្វើបានទេ ពីព្រោះអេណង់តូមែរទាំងពីរប្លែងទៅវិញទៅមក  
យ៉ាងរហ័ស៖



ការប្លែងទៅវិញទៅមកនៃអេណង់តូមែរអាមីន

ការប្លែងនេះកើតឡើងតាមរយៈការប្លែង ដែលគេហៅថាការប្លែងអាសូត (nitrogen inversion)  
ឬ ការប្លែងពីរ៉ាមីត (pyramidal inversion)។ របាំងថាមពលនៃការប្លែងទៅវិញទៅមកនេះគឺប្រហែល  
 $25\text{kJmol}^{-1}$  សម្រាប់ស្ទើរគ្រប់អាមីនទាំងអស់ ដែលជារបាំងថាមពលទាបគ្រប់គ្រាន់អាចកើតឡើងនៅសីតុណ្ហភាព  
បន្ទប់។ ក្នុងអន្តរភាពនៃការប្លែងនេះ អាតូមអាសូតក្លាយជាអាតូមអ៊ីប្រីត  $sp^2$  ដែលមានទ្វេតាអេឡិចត្រុង  
សេរីនៅលើអ័រប៊ីតាល់ p មួយ។

អំបិលអាម៉ូញ៉ូមមិនអាចរងការប្លែងនេះទេ ពីព្រោះពួកវាមិនមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីនេះទេ។ ដូច  
នេះ អំបិលអាម៉ូញ៉ូមថ្នាក់ទី៣ (quaternary ammonium salts) ដែលមានក្រុមបួនខុសគ្នាជាសមាសធាតុ  
គីរ៉ាល់ ហើយត្រូវបានព្រែកជាអេណង់តូមែរខុសគ្នា។




គេអាចព្រែកអំបិលអាម៉ូញ៉ូមថ្នាក់ទី៣ទាំងនេះ

### ៣. កម្រិតបាសរបស់អាមីន៖ អំបិលអាមីន

- អាមីនជាបាសខ្សោយណាស់។ ស្ទើរគ្រប់អាមីនទាំងអស់ជាបាសខ្លាំងជាងទឹក ប៉ុន្តែខ្សោយជាងបាស  
អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីត អាល់កុលស៊ីត និងអាញ៉ុងអាល់កាឡូខ្លាំងណាស់។


វិធីងាយក្នុងការប្រៀបធៀបកម្លាំងបាសរបស់អាមីន គឺត្រូវប្រៀបធៀបតម្លៃ  $pK_a$  របស់អាស៊ីតឆ្លាស់  
ពួកវា ដែលជាអ៊ីយ៉ុងអាល់គីលអាម៉ូញ៉ូមត្រូវគ្នា។




លំនឹងរបស់អាមីនដែលមានកម្រិតបានខ្លាំងនឹងរំកិលទៅខាងធ្វេងក្នុងប្រតិកម្មគីមីខាងលើជាងអាមីនដែលមានកម្រិតបានខ្សោយ។

- អ៊ីយ៉ុងអាម៉ូញ៉ូមរបស់អាមីនបានខ្លាំងនឹងមានតម្លៃ  $\text{p}K_a$  ធំជាងអ៊ីយ៉ុងអាម៉ូញ៉ូមរបស់អាមីនបានខ្សោយ

នៅពេលយើងប្រៀបធៀបកម្រិតអាស៊ីតរបស់អ៊ីយ៉ុងអាម៉ូញ៉ូមតាមលំនឹងនេះ យើងឃើញថា អ៊ីយ៉ុងអាល់គីលអាម៉ូញ៉ូមថ្នាក់ទី១ ( $\text{RNH}_3^+$ ) ស្ទើរតែទាំងអស់មានកម្រិតអាស៊ីតខ្សោយជាងអ៊ីយ៉ុងអាម៉ូញ៉ូម ( $\text{NH}_4^+$ )។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អាល់គីលអាមីនថ្នាក់ទី១ ( $\text{RNH}_2$ ) ជាបានខ្លាំងជាងអាម៉ូញ៉ាក់ ( $\text{NH}_3$ ) ៖




យើងអាចប្រៀបធៀបដូចនេះអាស្រ័យលើលទ្ធភាពឱ្យអេឡិចត្រុងរបស់ក្រុមអាល់គីល។ ក្រុមអាល់គីលមួយឱ្យអេឡិចត្រុង ហើយវាបន្ស៊ប់អ៊ីយ៉ុងអាល់គីលអាម៉ូញ៉ូមដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មអាស៊ីត-បានដោយពង្រាយបន្ទុកវិជ្ជមានរបស់វា។ វាបន្ស៊ប់អ៊ីយ៉ុងអាល់គីលអាម៉ូញ៉ូមខ្លាំងជាងវាបន្ស៊ប់អាមីន៖




### ៣.១ កម្រិតបានរបស់អាវិលអាមីន

- អាមីនអារ៉ូម៉ាទិចជាបានខ្សោយជាងអាល់គីលអាមីនខ្លាំងណាស់។

ដោយពិចារណាលើកម្រិតបានអាមីនពីកម្រិតអាស៊ីតរបស់អ៊ីយ៉ុងអាម៉ូញ៉ូម នៅពេលយើងគិតពីតម្លៃ  $\text{p}K_a$  របស់អាស៊ីតឆ្លាស់នៃអាមីនអារ៉ូម៉ាទិច (ឧទាហរណ៍៖ អានីលីន និង 4-មេទីលអានីលីន) ក្នុងតារាង ២០.១ យើងឃើញថា ពួកវាជាបានខ្សោយជាងអាមីនមិនអារ៉ូម៉ាទិច ដូចជាស៊ីក្លូអិចស៊ីលអាមីនខ្លាំងណាស់៖



យើងអាចគិតពីឥទ្ធិពលនេះ អាស្រ័យលើរបាយអសូណាង់ទៅអ៊ីប្រឹកសរុបរបស់អាវិលអាមីនមួយ។ ចំពោះអានីលីន ទម្រង់អសូណាង់ខាងក្រោមមានសារសំខាន់៖



ទម្រង់ 1 និង 2 ជាទម្រង់ Kekulé ដែលមានក្នុងស្រលាយបំបែកសំណាកមួយ។ ប៉ុន្តែ ទម្រង់ 3 – 5 មិនដាក់នៃរូបសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រុងសេរីរបស់អាសូតលើទីតាំងអរតូ និងប៉ារ៉ាបស់វែងទេ។ ការមិនដាក់នៃរូបសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រុងសេរីនេះធ្វើឱ្យមានទម្រង់ដែលមានប្រភូតមួយតិច ហើយ **ភាពមិនដាក់នៃរូបសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រុងបន្ទាប់អាស៊ីលីន**។

ឥទ្ធិពលសំខាន់មួយទៀតក្នុងការពន្យល់កម្រិតបាសខ្សោយរបស់អាមីនអារ៉ូម៉ាទិចគឺ **ឥទ្ធិពលទាញអេឡិចត្រុងនៃក្រុមផេនីល**។ ដោយសារតែអាតូមកាបូនរបស់ក្រុមផេនីលមួយជាអាតូម  $sp^2$  ពួកវាមានកម្រិតអេឡិចត្រុងវិជ្ជមាន (ដូចនេះ ទាញអេឡិចត្រុងខ្លាំង) ជាងអាតូមកាបូនអ៊ីប្រីត  $sp^3$  របស់ក្រុមអាល់គីល។ យើងនឹងសិក្សាពីឥទ្ធិពលនេះក្នុងផ្នែកទី២១.៥.១។

### ៣.២ កម្រិតបាសរបស់អាមីនអេតេរ៉ូស៊ីក្លិច

អាមីនអេតេរ៉ូស៊ីក្លិចមិនអារ៉ូម៉ាទិចមានកម្រិតបាសប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងកម្រិតបាសរបស់អាមីនអាស៊ីក្លិច៖

|                      |         |            |              |
|----------------------|---------|------------|--------------|
|                      |         |            |              |
|                      | ពីរេឌីន | ពីរ៉ូលីឌីន | ទីអេទីលអាមីន |
| pKa អ៊ីយ៉ុងអាម៉ូញ៉ូម | 11.20   | 11.11      | 10.98        |

ក្នុងសូលុយស្យុងទឹក អាមីនអេតេរ៉ូស៊ីក្លិចអារ៉ូម៉ាទិចដូចជា ពីរេឌីន ពីរ៉ូលីឌីន និងពីរ៉ូលជាបាសខ្សោយជាងអាមីនមិនអារ៉ូម៉ាទិច ឬអាម៉ូញ៉ាក់។


|                  |         |            |        |         |
|------------------|---------|------------|--------|---------|
|                  |         |            |        |         |
|                  | ពីរេឌីន | ពីរ៉ូមីឌីន | ពីរ៉ូល | គីណូលីន |
| pKa អ៊ីយ៉ុងអាម៉ូ | 5.23    | 2.70       | 0.40   | 4.50    |

### ៣.៣ អាមីត និងអាមីត


- អាមីតជាបាសខ្សោយជាងអាមីនខ្លាំងណាស់ (ទោះបីជាវាខ្សោយជាងអាមីនអាមីនក៏ដោយ)។ pKa នៃ អាស៊ីតឆ្លាស់របស់អាមីតមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលសូន្យ។

កម្រិតបាសរបស់អាមីតកាន់តែទាប នៅពេលយើងប្រៀបធៀបជាមួយអាមីនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បី យល់នូវផលស្នូណង់ និងផលអាំងឌុចទីវ។ អាមីតមួយត្រូវបានបន្ស៊ប់ដោយស្នូណង់ទាក់ទងនឹងទ្វេតា អេឡិចត្រុងសម្ព័ន្ធលើអាតូមអាសូត។ ប៉ុន្តែអាមីនដែលរងប្រូតុងកម្មលើអាតូមអាសូតរបស់វាមិនមានស្ថេរភាព បែបនេះទេ។ វាត្រូវបានបង្ហាញក្នុងទម្រង់ស្នូណង់ខាងក្រោម៖


**អាមីត**




**អាមីត N-រងប្រូតុងកម្ម**



ប៉ុន្តែ កត្តាវិវត្តសំខាន់មួយដែលធ្វើឱ្យអាមីតជាបាសខ្សោយជាងអាមីនគឺឥទ្ធិពលទាញអេឡិចត្រុង ខ្លាំងនៃក្រុមកាបូនីលរបស់អាមីត។ ឥទ្ធិពលនេះត្រូវបានបង្ហាញដោយគំរូបូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់ អេទីលអាមីន និងអាសេតាមីតដែលបានបង្ហាញក្នុងរូប២០.១។ បន្ទុកអវិជ្ជមានត្រូវបានបោះទីតាំងលើទ្វេតា អេឡិចត្រុងមិនសម្ព័ន្ធក្នុងអេទីលអាមីន (ពណ៌ក្រហម)។ ប៉ុន្តែក្នុងអាសេតាមីត បន្ទុកអវិជ្ជមាននៅក្បែរអាសូត តិចជាងក្នុងអេទីលអាមីន។




អេទីលអាមីន




អាសេតាមីត

**រូប២០.១ គំរូបូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់អេទីលអាមីន និងអាសេតាមីត**

ដោយប្រៀបធៀប លំនឹងខាងក្រោម ប្រតិកម្មអាមីតកំរិតទៅខាងឆ្វេងខ្លាំងជាងប្រតិកម្មរបស់អាមីន។




អាតូមអាសូតរបស់អាមីតជាបាសខ្សោយណាស់ ដែលនៅពេលអាមីតមួយទទួលប្រូតុង វាទទួល ដោយប្រើអាតូមអុកស៊ីសែនជំនួសវិញ (មើលចលនការនៃប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសអាមីតក្នុងផ្នែក១៧.៨.៦)។ ប្រូតុងកម្មលើអុកស៊ីសែនកើតឡើង ទោះបីជាអាតូមអុកស៊ីសែន (ដោយសារតែកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានធំ ជាង) មានកម្រិតបាសខ្សោយជាងអាតូមអាសូតក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែ ចូរកត់សម្គាល់ថា បើសិនអាមីតមួយទទួល យកប្រូតុងមួយលើ អាតូមអុកស៊ីសែនរបស់វា ស្ថេរភាពស្នូណង់ទាក់ទងនឹងទ្វេតាអេឡិចត្រុងមិនសម្ព័ន្ធ របស់អាតូមអាសូតដែលមាន៖




### ៣.៤ អំបិលអាមីញ៉ូម និងអំបិលអាម៉ូញ៉ូមថ្នាក់ទី៣


នៅពេលអាមីនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ មានអំពើជាបាស ហើយមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីត ពួកវាបង្កើត សមាសធាតុមួយហៅថា **អំបិលអាមីញ៉ូម** (aminium salts) ។ ក្នុងអំបិលអាមីញ៉ូមមួយ អាតូមអាសូតបន្ទុក វិជ្ជមានមានអាតូមអ៊ីដ្រូសែនយ៉ាងហោចណាស់មួយ៖



អេទីលអាមីញ៉ូមក្លរ  
(អំបិលអាមីញ៉ូមមួយ)




ឌីអេទីលអាមីញ៉ូមប្រូម



ទ្រីអេទីលអាមីញ៉ូមអ៊ីយ៉ូដ

នៅពេលអាតូមអាសូតមណ្ឌលរបស់សមាសធាតុមួយមានបន្ទុកវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែវាមិនមានអាតូមអ៊ីដ្រូសែន សមាសធាតុនេះត្រូវបានគេហៅថា**អំបិលអាម៉ូញ៉ូមថ្នាក់ទី៣** (quaternary ammonium salt) ។ ឧទាហរណ៍៖



តេត្រាអេទីលអាម៉ូញ៉ូមប្រូម  
(អំបិលអាម៉ូញ៉ូមថ្នាក់ទី៣)

អាម៉ូញ៉ូមអាឡូសែន្ទថ្នាក់ទី៣ ដោយសារតែពួកវាមិនមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរីលើអាតូមអាសូតមិនអាចមានអំពើជាបាសទេ។ ប៉ុន្តែ អាម៉ូញ៉ូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតថ្នាក់ទី៣ជាបាសខ្លាំង។ ដូចនេះ ជាអង្គធាតុរឹង ឬក្នុងសូលុយស្យុង ពួកវាមានកាចុងអាម៉ូញ៉ូមថ្នាក់ទី៣ ( $\text{R}_4\text{N}^+$ ) និងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីត ( $\text{HO}^-$ ) ពួកវាជាបាសខ្លាំងខ្លាំងដូចសូដ្យូម ឬប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត។ អាម៉ូញ៉ូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតថ្នាក់ទី៣មានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតបង្កើតអំបិល អាម៉ូញ៉ូមថ្នាក់ទី៣៖






ក្នុងផ្នែក២០.១២ក យើងនឹងឃើញពីរបៀបដែលអំបិលអាម៉ូញ៉ូមថ្នាក់ទី៣អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើត អាស់សែន ដោយប្រតិកម្មមួយហៅថា *ប្រតិកម្មបណ្តាប់ Hoffmann*។


### ៣.៥ កម្រិតរលាយរបស់អាមីនក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីតរាវ

- ស្ទើរតែគ្រប់ អំបិលអាស់សែនអាមីនក្នុង ប្រូម អ៊ីយ៉ូដ្យូ និងស៊ុលផាតរលាយក្នុងទឹក។ ដូចនេះអាមីនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ដែលមិនរលាយក្នុងទឹក នឹងរលាយក្នុងសូលុយស្យុង HCl, HBr, HI និង H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>។

កម្រិតរលាយក្នុងអាស៊ីតរាវផ្តល់ជាវិធីគីមីងាយមួយក្នុងការព្យាករណ៍ខុសគ្នានៃអាមីន ពីសមាសធាតុមិនមែនបាស ដែលមិនរលាយក្នុងទឹក។ កម្រិតរលាយក្នុងអាស៊ីតរាវក៏ផ្តល់ឱ្យយើងនូវវិធីមានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ព្យាករណ៍ពីសមាសធាតុមិនមែនបាស ដែលមិនរលាយក្នុងទឹក។ អាមីនអាចត្រូវបានយោបកទៅក្នុង សូលុយស្យុងអាស៊ីត (HCl រាវ) ហើយបន្ទាប់មកបម្លែងមកវិញដោយធ្វើឱ្យសូលុយស្យុងអាស៊ីតនេះក្លាយជា បាស ហើយយោបកអាមីនចេញដោយប្រើអេទែរ ឬ CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>។



ដោយសារតែ អាមីនមានកម្រិតបាសទាបជាងអាមីនខ្លាំង អាមីនមិនរលាយក្នុងទឹក មិនរលាយក្នុងសូលុយស្យុង HCl, HBr, HI ឬ H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ទេ។



អាមីតមិនរលាយក្នុងទឹក

(មិនរលាយក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីត)

**លំហាត់អនុវត្តន៍២០.១** ៖ ចូរសរសេរដំណើរការក្នុងការព្យាករណ៍ស៊ុលអាមីនចេញពីស៊ីក្លូអ៊ីចសានដោយប្រើ HCl រាវ សូលុយស្យុង NaOH និងឌីអេទែរអេទែរ។


**លំហាត់អនុវត្តន៍២០.២** ៖ ចូរសរសេរដំណើរការព្យាករណ៍អាស៊ីតបង់សូអ៊ុច 4-មេទីលផេណុល អាស៊ីលីន និងបង់សែនដោយប្រើអាស៊ីត បាស និងធាតុរំលាយសរីរាង្គ។

### ៣.៦ អាមីនជាភ្នាក់ងារព្យាករណ៍អេណង់តូមែរ

- គេតែងប្រើអេណង់តូមែរអាមីនសុទ្ធ ដើម្បីព្យាករណ៍រ៉ាសេមិចនៃសមាសធាតុអាស៊ីត ដោយបង្កើតអំបិលដ្យាស្តេរ៉េអូមែរ។

យើងអាចបង្ហាញគោលការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងការព្យាករណ៍ (resolution) ដោយបង្ហាញពីរបៀបដែលល្បាយ រ៉ាសេមិចរបស់អាស៊ីតសរីរាង្គអាចត្រូវបានព្យាករណ៍ជាអេណង់តូមែររបស់វា ដោយប្រើអេណង់តូមែរមួយ របស់អាមីន ជាភ្នាក់ងារព្យាករណ៍អេណង់តូមែរ (resolving agent) (រូប២០.២)។







រូប២០.២ ការព្រែកល្បាយវ៉ាសេមិចរបស់អាស៊ីតសរីរាង្គមួយដោយប្រើអាមីនសកម្មអុបទិចមួយ។ អាស៊ីតកម្មនៃអំបិលដ្យាស្តេរ៉េអូមែរដែលព្រែកចេញពីគ្នាហើយ ធ្វើឱ្យអេណង់តូមែរអាស៊ីតនីមួយៗ រងជាកករ (សន្មត់ថាពួកវាមិនរលាយក្នុងទឹក) ហើយនៅសល់ភ្នាក់ងារព្រែកអេណង់តូមែរក្នុងសូលុយស្យុងជាអាស៊ីតឆ្លាស់របស់វា។

ក្នុងដំណើរការនេះ អេណង់តូមែរទោលរបស់អាមីនមួយ (R)-1-ផេនីលអេទីលអាមីន ត្រូវបានបូកលើសូលុយស្យុងមួយដែលមានល្បាយវ៉ាសេមិចរបស់អាស៊ីតមួយ។ អំបិលដែលទទួលបានជាដ្យាស្តេរ៉េអូមែរ។ មណ្ឌលគីរ៉ាល់នៃផ្នែកអាស៊ីតរបស់អំបិលមានទំនាក់ទំនងអេណង់តូមែរនឹងគ្នា ប៉ុន្តែ មណ្ឌលគីរ៉ាល់នៃផ្នែកអាមីនមិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាទេ។ ដ្យាស្តេរ៉េអូមែរមានកម្រិតរលាយខុសគ្នា ហើយអាចត្រូវបានព្រែកដោយកំណកក្រាម។ បន្ទាប់មក អំបិលដែលព្រែកបានរងអាស៊ីតកម្មដោយអាស៊ីតក្លរីឌ្រីច ទទួលបានអេណង់តូមែរអាស៊ីតសូលុយស្យុងផ្សេងគ្នា។ អាមីននៅសល់ក្នុងសូលុយស្យុងជាអំបិលអ៊ីដ្រូក្លរីតរបស់វា។

អេណង់តូមែរទោលដែលបានប្រើជាភ្នាក់ងារញែកអេណង់តូមែរ តែងតែមានប្រភពពីធម្មជាតិ។ ដោយសារតែម៉ូលេគុលសរីរាង្គគីរ៉ាល់ស្ទើរតែទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្នុងការរស់ ត្រូវបានសំយោគដោយប្រតិកម្មកាតាលីករអង់ស៊ីម ពួកវាស្ទើរតែទាំងអស់កើតឡើងជាអេណង់តូមែរទោល។ អាមីនសកម្មអុបទិចដែលកើតឡើងក្នុងធម្មជាតិ ដូចជា (-)-គីនីន, (-)-ស្រូចនីន និង (-)-ប្រីស៊ីន តែងតែត្រូវបានប្រើជាភ្នាក់ងារញែក អេណង់តូមែរសម្រាប់អាស៊ីតរ៉ាសេមិច។ គេក៏តែងប្រើអាស៊ីតដូចជា (+)- ឬ (-)-តាកតារិច ជាភ្នាក់ងារញែក អេណង់តូមែរសម្រាប់បាសរ៉ាសេមិចដែរ។




(-)-ស្រូចនីន




(-)-ប្រីស៊ីន

សមាសធាតុសំខាន់ជាឱសថ និងក្នុងប្រព័ន្ធដីវសាស្ត្រមួយចំនួនធំជាអាមីន។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍សំខាន់ៗ៖




R = CH<sub>3</sub> ៖ អាដ្រេណលីន (អេពីណេត្រីន)

R=H ៖ ណូរ៉ាដ្រេណលីន (ណូរេពីណេត្រីន)




អំផេតាមីន


(បង់សែឌ្រីន)




2-ផេនីលអេទីលអាមីន




ដូប៉ាមីន



មេស្វាណីន




សេរ៉ូតូនីន




ម៉ែកីន (R=H)


កូដេអ៊ីន (R =CH<sub>3</sub>)




(-)-គីនីន




ពីរីដុកស៊ីន  
(វីតាមីន B<sub>6</sub>)




ទីអាមីនក្លរ  
(វីតាមីន B<sub>1</sub>)




នីកូទីន




អាស៊ីតនីកូទីនិច  
(នីអាស៊ីន)



ហ៊ីស្តាមីន



ក្លរីផេនីកាមីន



វ៉ាលីញ៉ូម (ផ្សាសេប៉ាម)


## ៤. ទង្វើអាមីន

ក្នុងផ្នែកនេះ យើងសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រសំយោគអាមីនផ្សេងៗ។ វិធីសាស្ត្រខ្លះជាវិធីសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់អ្នក តែខ្លះទៀតអ្នកបានសិក្សារួចហើយទាក់ទងនឹងក្រុមបង្កនាទី និងប្រតិកម្ម។

### ៤.១ ប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូតិល

#### ក. អាល់គីលកម្មនៃអាម៉ូញាក់


អំបិលអាមីនថ្នាក់ទី១ត្រូវបានទង្វើពីអាម៉ូញាក់ និងអាល់គីលអាឡូសែនដោយប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូតិល។ ការដាក់ឱ្យធ្វើប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៃអំបិលអាមីញ៉ូមដែលទទួលបានជាមួយបាសមួយបង្កើតអាមីនថ្នាក់ទី១៖




- វិធីសាស្ត្រនេះជាការសំយោគមានលីមីតបំផុត ពីព្រោះអាចមានប្រតិកម្មពហុអាល់គីលកម្មកើតឡើង។

ឧទាហរណ៍ នៅពេលអេទីលប្រូមមានប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញាក់ អេទីលអាមីញ៉ូមប្រូមដែលកើតអាច មានប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញាក់ និងប្រតិកម្មជាមួយអេទីលប្រូមបង្កើតឱ្យអេទីលអាមីញ៉ូមប្រូម។ ការកើតឡើងដដែលៗនៃប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម និងប្រតិកម្មបន្ថែមប្រូតុង បង្កើតអាមីនថ្នាក់ទី៣ខ្លះ ហើយអំបិលអាម៉ូញ៉ូមថ្នាក់ទី៣ខ្លះ បើសិនមានវត្តមានលើសនៃអាល់គីលអាឡូសែន។

#### ➤ ចលនការប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មនៃអាម៉ូញាក់




គេអាចបន្ថយពហុអាល់គីលកម្មអតិបរមាដោយប្រើបរិមាណលើខ្លាំងនៃអាម៉ូញាក់ (ហេតុអ្វី?)។  
ឧទាហរណ៍នៃបច្ចេកទេសនេះមានក្នុងការសំយោគអាមីនពី អាស៊ីត2-ប្រូម៉ូប្រូប៉ាណូអ៊ិច៖



## ខ. អាល់គីលកម្មនៃអ៊ីយ៉ុងអាសូ និងរេដុកម្ម


វិធីល្អមួយក្នុងការសំយោគអាមីនថ្នាក់ទី១ពីអាល់គីលអាឡូសែនគឺត្រូវបង្កើនអាល់គីលអាឡូសែនទៅជាអាល់គីលអាសូ ( $\text{R}-\text{N}_3$ ) ដោយប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីលសិន បន្ទាប់មក ធ្វើរេដុកកម្មអាសូទៅជាអាមីន ថ្នាក់ទី១ដោយប្រើអាឡុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រីដ។



**ចូរប្រុងប្រយ័ត្ន!** អាល់គីលអាសូជាសារធាតុផ្ទុះ ហើយអាល់គីលអាសូម៉ាសម៉ូលេគុលទាបមិនអាចព្រែកបានទេ ប៉ុន្តែគួរតែរក្សាទុកក្នុងសូលុយស្យុង។ សូមអានអំពីការប្រើក្នុងពេលវេលា។

## គ. ការសំយោគGabriel

ប៉ូតាស្យូមផ្កាលីមីត (មើលប្រតិកម្មខាងក្រោម) អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើអាមីនថ្នាក់ទី១ដោយវិធីមួយ ដែលគេហៅថាការសំយោគGabriel។ ការសំយោគនេះក៏អាចជៀសវាងនូវប្រតិកម្មពហុអាល់គីលស្មុគ្រស្មាញ ដែលកើតឡើងនៅពេលអាល់អាឡូសែនមានប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញាក់៖




ផ្កាលីមីតមានកម្រិតអាស៊ីតខ្លាំង ( $\text{pK}_\text{a}=9$ )។ វាអាចបង្កើនទៅជាប៉ូតាស្យូមផ្កាលីមីតដោយប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត (ជំណាក់កាលទី១)។ អាញ្ចង់ផ្កាលីមីតជានុយក្លេអូភីលខ្លាំងមួយ ហើយ (ក្នុងជំណាក់កាលទី២) វាអាចប្រតិកម្មជាមួយអាល់គីលអាឡូសែនមួយដោយចលនការ  $\text{S}_\text{N}2$  បង្កើត N-អាល់គីលផ្កាលីមីត។ នៅចំណុច នេះ N-អាល់គីលផ្កាលីមីតអាចរងអ៊ីដ្រូលីសដោយអាស៊ីត ឬបាសរាវ ប៉ុន្តែជារឿយៗអ៊ីដ្រូលីសនេះមាន


ការលំបាក។ វាងាយជាង បើយើងដាក់ N-អាល់គីលផ្កាលីមីតជាមួយអ៊ីដ្រាស៊ីន ( $\text{NH}_2\text{NH}_2$ ) ក្នុងអេតាណុល (ដំណាក់កាលទី៣) បង្កើតអាមីនថ្នាក់ទី១ និងផ្កាឡាស៊ីន-1,4-ឌីអ៊ុន។

**លំហាត់អនុវត្តន៍២០.៣ ៖**

- ចូរគូរទម្រង់រសូណង់របស់អាញ្ចីងផ្កាលីមីតដែលធ្វើឱ្យផ្កាលីមីតមានភាពអាស៊ីត។
- តើផ្កាលីមីតជាអាស៊ីតខ្លាំងជា ឬខ្សោយជាងបង់សាមីត? ហេតុអ្វី?
- ក្នុងដំណាក់កាលទី៣នៃប្រតិកម្មខាងលើ ដំណាក់កាលជាច្រើនត្រូវបានលុបចោល។ ចូរសរសេរចលនការរបស់ដំណាក់កាលទាំងនេះ។



ផ្កាលីមីត




បង់សាមីត

ការសំយោគអាមីនដោយប្រើការសំយោគ Gabriel អាចប្រើតែមេទីលអាឡូសែន្ន អាល់គីលអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី១ និងទី២។ ការប្រើអាល់គីលអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី៣នឹងធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មបណ្តាច់កើតឡើង។

**លំហាត់ឧទាហរណ៍ ៖** ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មសំយោគ 4-មេទីលបង់តាណាមីនដោយប្រើការសំយោគ Gabriel។


**ចម្លើយ៖**



**លំហាត់អនុវត្តន៍២០.៤ ៖** ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មទង្វើបង់ស៊ីលអាមីនដោយប្រើការសំយោគ Gabriel។


### ឃ. អាល់គីលកម្មនៃអាមីនថ្នាក់ទី៣

ពហុអាល់គីលកម្មមិនមែនជាបញ្ហាទេ នៅពេលអាមីនថ្នាក់ទី៣រងប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មជាមួយមេទីលអាឡូសែន្ន ឬអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី១។ ប្រតិកម្មដូចខាងក្រោមកើតឡើងដោយបង្កើតទិន្នផលខ្ពស់៖




## ៤.២ ទង្វើអាមីនអាវ៉ូម៉ាទិចតាមរយៈប្រតិកម្មរេដុកម្មនៃសមាសធាតុនីត្រូ

វិធីសាស្ត្រដែលគេនិយមប្រើដើម្បីទង្វើអាមីនអាវ៉ូម៉ាទិចទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មរបស់វែង ហើយបន្ទាប់មកប្រតិកម្មរេដុកម្មក្រុមនីត្រូទៅជាក្រុមអាមីណូ៖




យើងបានសិក្សាប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មក្នុងមេរៀនទី១៥រួចហើយ ហើយយើងឃើញថា វាអាចប្រើដើម្បី ទង្វើសមាសធាតុអាវ៉ូម៉ាទិចផ្សេងៗ។ ប្រតិកម្មរេដុកម្មនៃក្រុមអាមីណូក៏អាចប្រើក្នុងមធ្យោបាយជាច្រើនដែរ។ វិធីសាស្ត្រដែលគេនិយមប្រើជាគេតិប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មកាតាលីករ ឬដាក់ឱ្យសមាសធាតុនីត្រូឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីត ឬដែក។ ស័ង្កសី សំណប៉ាហាំង ឬអំបិលលោហៈមួយ ដូចជា  $\text{SnCl}_2$  ក៏អាចប្រើបាន ដែរ។ សរុបមក ប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មរេដុកម្ម 6៤។

**ប្រតិកម្មទូទៅ៖**




**ឧទាហរណ៍៖**




## ៤.៣ ទង្វើអាមីនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣តាមរយៈប្រតិកម្មអាមីនកម្ម

អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនអាចត្រូវបានបម្លែងទៅជាអាមីនតាមរយៈប្រតិកម្មរេដុកម្មកាតាលីករ ឬរេដុកម្មគីមី ក្រោមវត្តមានអាម៉ូញាក់ ឬអាមីនមួយ។ អាមីនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ត្រូវបានបម្លែងដូចខាងក្រោម៖



ដំណើរការនេះត្រូវបានហៅថាប្រតិកម្មអាមីនកម្មរេដុកម្ម (reductive amination) នៃអាល់ដេអ៊ីត ឬ សេតូន (ឬ អាល់គីលកម្មរេដុកម្មនៃអាមីន) កើតឡើងតាមចលនការខាងក្រោម (ត្រូវបានបង្ហាញជាមួយ អាមីន<sup>1°</sup>)។


➤ ប្រតិកម្មអាមីនកម្មរេដុកម្ម




នៅពេលគេប្រើអាម៉ូញាក់ ឬអាមីនថ្នាក់ទី១ មានផ្លូវពីរដែលអាចបង្កើតផលិតផល តាមរយៈអាល់កុល អាមីណូដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអេមីអាសេតាល់មួយ ហើយត្រូវបានគេហៅថា **អេមីអាមីណាល់** ឬតាមរយៈ អាមីនមួយ (ផ្នែក១៦.៨.១)។ នៅពេលគេប្រើអាមីនថ្នាក់ទី២ អ៊ីមីនមិនអាចកកើតបានទេ ដូចនេះផ្លូវ ប្រតិកម្មគឺត្រូវឆ្លងកាត់អេមីអាមីណាល់ ឬឆ្លងកាត់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីមីនីញ៉ូមមួយ៖



ភ្នាក់ងាររេដុកម្មដែលបានប្រើរួមមានអ៊ីដ្រូសែន និងកាតាលីករមួយ (ដូចជានីកែល) ឬ  $\text{NaBH}_2\text{CN}$  ឬ  $\text{LiBH}_3\text{CN}$  (សូដ្យូម ឬលីត្យូមស្យាណូបូរ៉េអ៊ីដ្រា)។ ភ្នាក់ងាររេដុកម្មពីក្រោយនេះស្រដៀងគ្នានឹង  $\text{NaBH}_4$  ហើយ មានប្រសិទ្ធភាពពិសេសក្នុងប្រតិកម្មអាមីនកម្មរេដុកម្ម។ ឧទាហរណ៍បីនៃប្រតិកម្មអាមីនកម្មរេដុកម្មត្រូវបាន បង្ហាញខាងក្រោម៖






ស៊ីក្លូអ៊ីបសាណូន


N,N-ឌីមេទីលស៊ីក្លូអ៊ីបសាណូនអាមីន (52-54%)

លំហាត់ឧទាហរណ៍៖ ប្រតិកម្មខាងក្រោមជាការសំយោគរបស់អំផេតាមីន។ ចូរឱ្យទម្រង់សមាសធាតុ A និង B។




អំផេតាមីន

ចម្លើយ




លំហាត់ឧទាហរណ៍២០.៥៖ ចូរបង្ហាញអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចសំយោគអាមីនខាងក្រោមតាមរយៈប្រតិកម្មអាមីនកម្មដុកម្ម៖




### ៤.៤ ទង្វើអាមីនថ្នាក់ទី១ ទី២ ឬទី៣ តាមរយៈប្រតិកម្មរេដុកម្មនីត្រីល អុកស៊ីម និងអាមីត


គេអាចធ្វើដុកម្មនីត្រីល អុកស៊ីម និងអាមីតទៅជាអាមីន។ ប្រតិកម្មដុកម្មនៃនីត្រីល ឬអុកស៊ីមមួយបង្កើតអាមីនថ្នាក់ទី១។ ប្រតិកម្មដុកម្មអាមីតមួយអាចបង្កើតអាមីនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣៖



នីត្រីលអាចទង្វើពីអាល់គីលអាឡូសែន និង CN<sup>-</sup> (ផ្នែក១៧.៣) ឬពីអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនជាស្វាណូអ៊ីត្រីន (ផ្នែក១៦.៩)



អុកស៊ីមអាចទង្វើពីសេតូន និងសេតូន (ផ្នែក១៦.៦ខ)






អាចទង្វើពីអាស៊ីតក្លរូ អាស៊ីតអាស៊ីត និងអេស្ទែរ (ផ្នែក១៧.៨)




(ក្នុងឧទាហរណ៍ចុងក្រោយ បើសិន  $R'=H$  ហើយ  $R''=H$  ផលិតផលជាអាមីនថ្នាក់ទី២)

ប្រតិកម្មអេដុកម្យទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើជាមួយអ៊ីដ្រូសែន និងកាតាលីកម្ម ឬជាមួយ  $LiAlH_4$  អុកស៊ីមក៏អាចរងអេដុកម្យយ៉ាងងាយដោយសូដ្យូមក្នុងអេតាណុល។


ឧទាហរណ៍៖



ប្រតិកម្មអេដុកម្យអាមីតមួយជាដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងដំណើរការមួយរបស់ប្រតិកម្មម៉ូណូអាស់ត្រីលក្ខណៈអាមីន។ ដំណើរការនេះចាប់ផ្តើមដោយប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្មអាមីនមួយដោយប្រើអាស៊ីលក្លរួឬអាស៊ីតអាស៊ីត បន្ទាប់មក អាមីតរងអេដុកម្យជាមួយលីចូមអាឡុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រីដ្រ៖ ឧទាហរណ៍៖



លំហាត់ឧទាហរណ៍២០.៦ ៖ ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកអាចប្រើប្រតិកម្មអេដុកម្យអាមីត អុកស៊ីម ឬនីទ្រីលមួយដើម្បីធ្វើការបំប្លែងខាងក្រោម៖






## ៤.៥ ធ្វើអាមីនថ្នាក់ទី១តាមប្រតិកម្មបណ្តុរទីតាំង Hofmann និង Curtius

### ក. ប្រតិកម្មបណ្តុរទីតាំង Hofmann


អាមីតគ្មានក្រុមជួសលើអាសូតមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងប្រូម ឬក្លរក្នុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីត បង្កើតអាមីនតាមរយៈការបោះបង់កាបូនកាបូនីលរបស់វា ដោយប្រតិកម្មមួយគេហៅថាប្រតិកម្មបណ្តុរទីតាំង Hofmann (Hofmann rearrangement) ឬ ប្រតិកម្មបំបែក Hofmann (Hofmann degradation) ៖



ពីសមីការនេះ យើងឃើញថា អាតូមកាបូនកាបូនីលរបស់អាមីតត្រូវបានបាត់បង់ (ជា  $\text{CO}_3^{2-}$ ) ហើយដែលក្រុម R របស់អាមីតទៅចងជាមួយអាតូមអាសូតរបស់អាមីននេះវិញ។ អាមីនថ្នាក់ទី១ដែលត្រូវបានបង្កើតតាមមធ្យោបាយនេះ មិនកកើតលាយជាមួយអាមីនថ្នាក់ទី២ ឬថ្នាក់ទី៣ទេ។


ចលនការរបស់ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។ ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង អាមីតរងប្រតិកម្មប្រូមកម្មជំរុញដោយបាសមួយ ដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រតិកម្មអាឡូសែនកម្មជំរុញដោយសេតូន ដូចដែលយើងបានសិក្សាក្នុងផ្នែក១៨.៣២ (ក្រុមអាស៊ីលទាញអេឡិចត្រុងរបស់អាមីតធ្វើឱ្យអ៊ីដ្រូសែនអាមីដូកាន់តែមានភាពអាស៊ីតជាអ៊ីដ្រូសែនរបស់អាមីន)។ បន្ទាប់មក N-ប្រូមអាមីតមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូស៊ីត បង្កើតអាញីដមួយ ដែលធ្វើបណ្តុរទីតាំងដោយឯកឯងដោយបោះបង់អ៊ីយ៉ុងប្រូមមួយបង្កើតអ៊ីសូស្យាណាត (ផ្នែក ១៧.៩ក)។ ក្នុងប្រតិកម្មបណ្តុរទីតាំងនេះ ក្រុម R រំកិលនាំយកអេឡិចត្រុងរបស់វាពីកាបូនអាស៊ីលទៅអាតូមអាសូតក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងការចាកចេញរបស់អ៊ីយ៉ុងប្រូម។ អ៊ីសូស្យាណាតដែលកកើតក្នុងល្បាយរងអ៊ីដ្រូលីសយ៉ាងរហ័សដោយបាសរាវទៅអ៊ីយ៉ុងកាប៉ាម៉ាត ដែលរងប្រតិកម្មដេកាបូកស៊ីលកម្មដោយឯកឯងបង្កើតអាមីន។

### ➤ ចលនការប្រតិកម្មបណ្តុរទីតាំង Hofmann



**ក្រុម R រំកិលទៅអាតូមអាសូតនៅពេល**

## អ៊ីយ៉ុងប្រូម្នូបាក្រេញ បង្កើតអ៊ីសូស្យាណា




ការសិក្សាលើដំណាក់កាលពីរដំបូងនៃចលនការនេះបង្ហាញថា ដំបូងអាតូមអ៊ីដ្រូសែនពីរត្រូវតែមានវត្តមានលើអាសូតរបស់អាមីតដើម្បីឱ្យប្រតិកម្មកើតឡើង។ ដូចនេះ បណ្តាវិទ្យាសាស្ត្រនៃ Hofmann អាចកើតឡើងលើតែអាមីតប្រភេទ  $RCONH_2$ ។

## ខ. ប្រតិកម្មបណ្តោះទីតាំង Curtus

$$\begin{array}{ccccccc}
 \begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C}-\text{Cl} \\ \vdots \\ \text{Cl} \end{array} & \xrightarrow[\text{(-NaCl)}]{\text{NaN}_3} & \begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C}-\ddot{\text{N}}-\text{N}^+\equiv\text{N}^- \\ \curvearrowright \quad \quad \quad \curvearrowright \end{array} & \xrightarrow[\text{(-N}_2\text{)}]{\text{heat}} & \begin{array}{c} \text{R}-\ddot{\text{N}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} & \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} & \begin{array}{c} \text{R}-\ddot{\text{N}}\text{H}_2 \\ \text{+ CO}_2 \end{array} \\
 \text{អាស៊ីលក្លរួ} & & \text{អាស៊ីលអាសូ} & & \text{អ៊ីសូស្យាណាត} & & \text{អាមីន}
 \end{array}$$

លំហាត់ឧទាហរណ៍២០.៧៖ ចូរជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រល្អមួយ និងបង្ហាញពីរបៀបសម្រេចការបំប្លែងខាងក្រោម៖




## ៥. ប្រតិកម្មរបស់អាមីន

យើងបានឃើញរួចហើយអំពីប្រតិកម្មសំខាន់ជាច្រើនរបស់អាមីនក្នុងផ្នែកខាងលើ។ ក្នុងផ្នែក២០.៣ យើងឃើញប្រតិកម្មដែលអាមីនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣មានតួនាទីជាបាស។ ក្នុងផ្នែក២០.៤ យើងបានឃើញប្រតិកម្មរបស់ពួកវាជានុយក្លេអូភីលកក្នុងប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម ហើយក្នុងមេរៀនទី១៧ ជានុយក្លេអូភីលក្នុងប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម។ ក្នុងមេរៀនទី១៥ យើងបានឃើញថា ក្រុមអាមីណូមួយលើវ៉ែងអាវ៉ុម៉ាទីចមានអំពើជាក្រុមសកម្មខ្លាំងមួយ ហើយជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា។


លក្ខណៈរបស់អាមីនដែលមានប្រតិកម្មទាំងអស់នេះ ហើយដែលជាមូលដ្ឋានឱ្យយើងយល់អំពីគីមីវិទ្យា នៃអាមីនគឺលទ្ធភាពរបស់អាសូតក្នុងការដាក់រួមនូវទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយ។

### ប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាស




អាមីនមានអំពើជាបាស

### ប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម



អាមីនមានអំពើជានុយក្លេអូភីលមួយក្នុងប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម


**ប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម**



អាមីនថ្នាក់ទី១ ឬថ្នាក់ទី២មានអំពើជានុយក្លេអូភីលមួយក្នុងប្រតិកម្មអាស៊ីលកម្ម

ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើ អាមីនមានអំពើជានុយក្លេអូភីលដោយផ្តល់ទ្វេតាអេឡិចត្រុងត្រង់របស់វាទៅភ្នាក់ងារអេឡិចត្រូភីល។ ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម ទម្រង់វេស្តណង់ដែលទាក់ទងនឹងទ្វេតាអេឡិចត្រុងត្រង់អាសូតនេះធ្វើឱ្យអាតូមកាបូនមានលក្ខណៈនុយក្លេអូភីល៖

**ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូភីលអាវ៉ូម៉ាទិច**




ក្រុមអាមីនមានអំពើជាក្រុមសកម្ម ហើយជាក្រុមដៅទិសអនុ-ប៉ារ៉ាក្នុងប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូភីលអាវ៉ូម៉ាទិចលំហាត់អនុវត្តន៍២០.៨៖ រំលឹកការសិក្សារបស់អាមីនក្នុងផ្នែកខាងលើ ហើយឱ្យឧទាហរណ៍ជាក់លាក់របស់ប្រតិកម្មខាងលើ។

**អុកស៊ីតកម្មអាមីន**

អាមីនអាស៊ីតថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២រងប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម ទោះបីក្នុងករណីស្ទើរទាំងអស់ គេមិនទទួលបានផលិតផលមិនមានប្រយោជន៍។ ប្រតិកម្មបន្ទាប់បន្សំជាច្រើនតែងកើតឡើង ធ្វើឱ្យកើតនូវល្បាយសំប្លា។

អាមីនថ្នាក់ទី៣អាចរងប្រតិកម្មទៅជាអាមីនអុកស៊ីតថ្នាក់ទី៣យ៉ាងស្អាត។ ប្រតិកម្មនេះអាចកើតឡើងដោយប្រើអ៊ីដ្រូសែនពែរអុកស៊ីត ឬអាស៊ីតពែរអុកស៊ីត៖




យើងនឹងសិក្សាអំពីអុកស៊ីតថ្នាក់ទី៣របស់ប្រតិកម្មបណ្តាច់សំខាន់មួយក្នុងផ្នែកទី២០.១២ខ។

អាស៊ីតអាមីនងាយរងប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មដោយភ្នាក់ងារជាច្រើន រួមមានអុកស៊ីសែនក្នុងខ្យល់។ អុកស៊ីតកម្មមិនកំណត់តែលើក្រុមអាមីណូទេ ប៉ុន្តែក៏អាចកើតឡើងក្នុងវង់ផងដែរ (តាមរយៈលទ្ធភាពឱ្យអេឡិចត្រុងរបស់វា ក្រុមអាមីណូធ្វើឱ្យវង់សំបូរអេឡិចត្រុង ហើយងាយរងប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម)។ អុកស៊ីតកម្មលើក្រុមបង្គុំនាទីផ្សេងៗលើវង់អាវ៉ូម៉ាទិចមិនអាចកើតឡើងទេ នៅពេលក្រុមអាមីណូមួយមានវត្តមានលើវង់ពីព្រោះ អុកស៊ីតកម្មនៃវង់នឹងកើតឡើងមុន។

## ៦. ប្រតិកម្មរបស់អាមីនជាមួយអាស៊ីតនីត្រី

អាស៊ីតនីត្រី ( $\text{HO-N=O}$ ) ជាអាស៊ីតខ្សោយ មិនមានស្ថេរភាព។ វាតែងតែត្រូវបានទង្វើដោយដាក់សូដ្យូមនីត្រី ( $\text{NaNO}_2$ ) ជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតខ្លាំង៖




អាស៊ីតនីត្រីមានប្រតិកម្មជាមួយអាមីនគ្រប់ថ្នាក់។ ផលិតផលដែលយើងទទួលបានពីប្រតិកម្មទាំងនេះអាស្រ័យលើថ្នាក់របស់អាមីន និងប្រភេទអាមីនអាស៊ីតជាទិច ឬអាវ៉ូម៉ាទិច។

### ៦.១ ប្រតិកម្មអាមីនអាស៊ីតជាទិចថ្នាក់ទី១ជាមួយអាស៊ីតនីត្រី

អាមីនអាស៊ីតជាទិចថ្នាក់ទី១ប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតនីត្រីតាមរយៈប្រតិកម្មមួយហៅថា **ប្រតិកម្មឌីអាសូតកម្ម** (diazotization) បង្កើតអំបិលឌីអាសូតមួយអាស៊ីតជាទិចគ្មានស្ថេរភាពមួយ។ ទោះបីនៅសីតុណ្ហភាពទាបក៏ដោយ អំបិលឌីអាសូតមួយអាស៊ីតជាទិចបំបែកឯកឯងដោយបោះបង់អាសូតបង្កើតកាបូកាចុង។ កាបូកាចុងបន្តបង្កើតល្បាយអាសែន និងអាល់គីលអាឡូសែនដោយដកប្រូតុងមួយ ដែលជាប្រតិកម្មជាមួយទឹក និងប្រតិកម្មជាមួយ  $\text{X}^-$  ៖



**ប្រតិកម្មទូទៅ៖**



អាមីនអាស៊ីតជាទិច<sup>1</sup>

អំបិលឌីអាសូតមួយអាស៊ីតជាទិច

(គ្មានស្ថេរភាព)



អាល់សែន, អាល់កុល, អាល់គីលអាឡូសែន

- ប្រតិកម្មឌីអាសូតកម្មរបស់អាមីនអាស៊ីតជាទិចថ្នាក់ទី១មានសារសំខាន់សំយោគតិចតួច ពីព្រោះវាបង្កើត ល្បាយផលិតផល។


ប្រតិកម្មឌីអាសូតកម្មរបស់អាមីនអាស៊ីតជាទិចថ្នាក់ទី១ត្រូវបានប្រើក្នុងដំណើរការវិភាគខ្លះ ប៉ុន្តែ ដោយសារតែ ការបង្កើតអាសូតក្នុងបរិមាណច្រើន។ ពួកវាក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើត និងសិក្សាលក្ខណៈកាបូកាចុងក្នុងទឹក អាស៊ីតអាសេទិច និងធាតុរំលាយផ្សេងទៀត។

## ៦.២ ប្រតិកម្មអាវីលអាមីនថ្នាក់ទី១ជាមួយអាស៊ីតនីត្រី

ប្រតិកម្មសំខាន់របស់អាមីនជាមួយអាស៊ីតនីត្រីគឺជាងគេគឺប្រតិកម្មរបស់អាវីលអាមីនថ្នាក់ទី១។ យើងនឹង ឃើញមូលហេតុនេះក្នុងផ្នែក២០.៧។


- អាវីលអាមីនថ្នាក់ទី១មានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតនីត្រីបង្កើតអំបិលអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូម។

ទោះបី អំបិលអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូមមិនមានស្ថេរភាព ពួកវានៅតែមានស្ថេរភាពជាងអំបិលឌីអាសូញ៉ូម អាឡីផាទិច ពួកវាមិនអាចបំបែកក្នុងល្បឿនក្នុងសូលុយស្យុង នៅពេលសីតុណ្ហភាពរបស់ល្បាយប្រតិកម្មត្រូវបាននៅក្រុមសីតុណ្ហភាព  $5^{\circ}\text{C}$  ៖



ឌីអាសូតកម្មនៃអាមីនថ្នាក់ទី១កើតឡើងតាមសេរីមួយនៃដំណាក់កាល។ ក្រោមវត្តមានអាស៊ីតខ្លាំង អាស៊ីតនីត្រីបំបែកបង្កើតអ៊ីយ៉ុង  $\text{NO}^+$ ។ បន្ទាប់មកអ៊ីយ៉ុងទាំងនេះមានប្រតិកម្មជាមួយអាសូតរបស់អាមីន បង្កើតអ៊ីយ៉ុង N-នីត្រូសូអាម៉ូញ៉ូមមិនស្ថេរភាពជាអង្គធាតុកណ្តាលមួយ។ បន្ទាប់មកអង្គធាតុកណ្តាលនេះបោះបង់ប្រូតុងមួយបង្កើត N-នីត្រូសូអាមីន ដែលផ្ទុយមកវិញ តូតូមែរកម្មបង្កើតឌីអាសូអ៊ីដ្រុកស៊ីតក្នុងប្រតិកម្មមួយដែល ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រតិកម្មតូតូមែរកម្មសេតូ-អែណុល។ បន្ទាប់មក ក្រោមវត្តមានអាស៊ីត ឌីអាសូអ៊ីដ្រុកស៊ីត បោះបង់ទឹកបង្កើតអ៊ីយ៉ុងឌីអាសូញ៉ូម។


### ➤ ចលនការប្រតិកម្មឌីអាសូតកម្ម



អាឡ់គីលអាមីន $1^{\circ}$

អ៊ីយ៉ុង N-នីត្រូសូអាម៉ូញ៉ូម

N-នីត្រូសាមីន



អ៊ីយ៉ុងឌីអាសូញ៉ូម

- ប្រតិកម្មឌីអាសូតកម្មរបស់អាវីលអាមីនថ្នាក់ទី១មានសារសំខាន់សំយោគ ពីព្រោះក្រុមឌីអាសូញ៉ូម  $-\text{N}^+\equiv\text{N}$ : អាចត្រូវបានជំនួសដោយបង្កំនាទីផ្សេងៗ។



## ការសិក្សាអំពី N-នីត្រូសូអាមីន

N-នីត្រូសូអាមីនជាសារធាតុបង្កមហារីកខ្លាំង ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លាច មានវត្តមានក្នុងអាហារជាច្រើនជាពិសេសសាច់ខ្លោច ដែលត្រូវបានកកើតឡើងដោយសូដ្យូមនីត្រី។

សូដ្យូមនីត្រីត្រូវបានបន្ថែមលើសាច់ជាច្រើន (ដូចជា សាច់ជ្រូក សាច់មាន់ សាច់គោ សាច់ក្រក សាច់ប៉ាតេ...) ដើម្បីរារាំងការលូតលាស់នៃបាក់តេរី Clostridium botulinum (បាក់តេរីដែលបង្កើតជាតិពុល botulinus) ហើយដើម្បីរក្សាសាច់ក្រហមមិនឱ្យក្លាយជាឆ្នោត (ការពុលអាហារដោយជាតិពុល botulinus តែងតែអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់បាន)។ ក្រោមវត្តមានអាស៊ីត ឬក្រោមឥទ្ធិពលនៃកម្ដៅ សូដ្យូមនីត្រីមានប្រតិកម្មជាមួយអាមីនដែលមានវត្តមានក្នុងសាច់បង្កើត N-នីត្រូសូអាមីន។ ឧទាហរណ៍ សាច់ជ្រូកខ្លោចត្រូវបានបង្ហាញ ថាមាន N-នីត្រូសូឌីមេទីលអាមីន និង N-នីត្រូសូពីរ៉ូលីន។


មានការព្រួយបារម្ភថា នីត្រីពីអាហារអាចបង្កើតនីត្រូសូអាមីន នៅពេលវាមានប្រតិកម្មជាមួយអាមីន ក្រោមវត្តមានអាស៊ីតក្នុងក្រពះ។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៦ FDA បានកាត់បន្ថយបរិមាណរបស់នីត្រីដែលដាក់បន្ថែមលើសាច់ពី 200ppm ទៅ 50-125ppm។ នីត្រី (និងនីត្រាតដែលអាចត្រូវបានបម្លែងទៅជានីត្រីដោយបាក់តេរី) ក៏អាចកើតដោយធម្មជាតិក្នុងអាហារដែរ។

គេដឹងថាផ្សែងបារីក៏មាន N-នីត្រូសូឌីមេទីលអាមីន។ អ្នកដក់បារីមួយកញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃស្រួប N-នីត្រូសូ ឌីមេទីលអាមីន 0.8μg ហើយសូម្បីតែក្នុងផ្សែងបារីដែលអ្នកដក់បង្គុយចោលក៏មានដែរ។

### ៦.៣ ប្រតិកម្មរេអិកដ្វាង់ទី២ជាមួយអាស៊ីតនីត្រី


ទាំងអារីល និងអាល់គីលអាមីនថ្នាក់ទី២មានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតនីត្រីបង្កើតN-នីត្រូសូអាមីន។ N-នីត្រូសូអាមីនតែងតែញែកពីល្បាយប្រតិកម្មជាប្រេងរាវពណ៌លឿង៖

**ឧទាហរណ៍៖**



### ៦.៤ ប្រតិកម្មរេអិកដ្វាង់ទី៣ជាមួយអាស៊ីតនីត្រី

នៅពេលអាមីនអាស៊ីតទី៣ថ្នាក់ទី៣មួយត្រូវបានលាយជាមួយអាស៊ីតនីត្រី លំនឹងមួយកើតឡើងរវាងអាមីនថ្នាក់ទី៣ អំបិលរបស់វា និងសមាសធាតុ N-នីត្រូសូអាម៉ូញ៉ូម៖






ទោះបី សមាសធាតុN-នីត្រូសូអាម៉ូញ៉ូមមានស្ថេរភាពនៅសីតុណ្ហភាពទាបក៏ដោយ នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងនៅក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីត វាបំបែកបង្កើតអាល់ដេអ៊ីត ឬសេតូន។ ប៉ុន្តែ ប្រតិកម្មនេះមានសារៈសំខាន់តិចតួចក្នុងការសំយោគ។

អារីលអាមីនថ្នាក់ទី៣មានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតនីត្រូសូសមាសធាតុអាវ៉ូម៉ាទិច C-នីត្រូសូ។ នីត្រូកម្ម (nitrosation) កើតឡើងស្ទើរតែទាំងស្រុងលើទីតាំងប៉ារ៉ា បើសិនទីតាំងនេះទំនេរ ហើយបើសិនជាមិនទំនេរ វាក៏កើតឡើងលើទីតាំងអរតូ។ ប្រតិកម្មនេះ (មើលក្នុងលំហាត់អនុវត្ត៣០.៩) ជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអាវ៉ូម៉ាទិច។

**ឧទាហរណ៍៖**



**លំហាត់អនុវត្ត៣០.៩៖** គេជឿជាក់ថា ប្រតិកម្មនីត្រូកម្មប៉ារ៉ារបស់N,N-ឌីមេទីលអាណីលីន (C-នីត្រូកម្ម) កើតឡើងតាមការប្រយុទ្ធអេឡិចត្រូកីលមួយដោយអ៊ីយ៉ុង  $\text{NO}^+$ ។

- ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអ៊ីយ៉ុង  $\text{NO}^+$  ត្រូវបានបង្កើតក្នុងសូលុយស្យុង  $\text{NaNO}_2$  និង  $\text{HCl}$ ។
- ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្ម p-នីត្រូកម្មរបស់ N,N-ឌីមេទីលអាណីលីន
- អាមីនអាវ៉ូម៉ាទិចថ្នាក់ទី៣ និងផេណុលរងប្រតិកម្ម C-នីត្រូកម្ម តែស្រលាយបង់សែនស្ទើរតែទាំងអស់មិនមានប្រតិកម្មនេះទេ។ ចូរពន្យល់ពីភាពខុសគ្នានេះ។


**៧. ប្រតិកម្មជំនួសរបស់អំបិលអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូម**

- អំបិលអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូមជាអង្គធាតុមានប្រយោជន៍ក្នុងការសំយោគសមាសធាតុសរីរាង្គអាវ៉ូម៉ាទិចពីព្រោះ ក្រុមឌីអាសូញ៉ូមអាចត្រូវបានជំនួសដោយអាតូម ឬក្រុមអាតូមមួយចំនួនដូចជា -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, និង -H។

អំបិលឌីអាសូញ៉ូមតែងតែត្រូវបានទង្វើដោយប្រតិកម្មឌីអាសូតកម្មអាមីនអាវ៉ូម៉ាទិចថ្នាក់ទី១។ អារីលអាមីនថ្នាក់ទី១អាចត្រូវបានសំយោគតាមរយៈប្រតិកម្មរេដុកម្មនេះសមាសធាតុនីត្រូដែលអាចទទួលបានដោយ ងាយពីប្រតិកម្មនីត្រាតកម្ម។

**៧.១ ការសំយោគដោយប្រើអំបិលឌីអាសូញ៉ូម**


អំបិលឌីអាសូញ៉ូមស្ទើរតែទាំងអស់មិនមានស្ថេរភាពនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង  $5-10^{\circ}\text{C}$  ហើយអាចផ្ទុះនៅពេលវាស្ងួត។ ប៉ុន្តែ ជាសំណាងល្អ ប្រតិកម្មជំនួសរបស់អំបិលឌីអាសូញ៉ូមស្ទើរតែទាំងអស់មិនត្រូវការការព្រែកពួកវាចេញទេ។ យើងគ្រាន់តែបន្ថែមអាក់ទីបមួយទៀត ( $\text{CuCl}$ ,  $\text{CuBr}$ ,  $\text{KI}$  ។ល។) ទៅក្នុងល្បាយដុតកម្ដៅសូលុយស្យុងថ្នមៗ ការជំនួសកើតឡើង (ដោយមានបំពាយអាសូតផង)៖




មានតែក្នុងប្រតិកម្មជំនួសក្រុមឌីអាសូញ៉ូមដោយ -F ដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់អំបិលឌីអាសូញ៉ូមចេញ។ យើងធ្វើរបៀបនេះដោយបន្ថែម HBF<sub>4</sub> ទៅក្នុងល្បាយ ធ្វើឱ្យអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូមភ្ជុយអ័រប៉ាត ArN<sub>2</sub><sup>+</sup>BF<sub>4</sub><sup>-</sup> ស្ថេរភាព និងរលាយ តិចរងជាកក។

### ៧.២ ប្រតិកម្ម Sandmeyer: ប្រតិកម្មជំនួសក្រុមឌីអាសូញ៉ូមដោយ -Cl, -Br, ឬ -CN


អំបិលអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូមប្រតិកម្មជាមួយទង់ដែងក្លរ ទង់ដែងប្រូម និងទង់ដែងស្យាណូ បង្កើតផលិតផល ដែលក្រុមឌីអាសូញ៉ូមត្រូវបានជំនួសដោយ -Cl, -Br និង -CN។ ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅជា **ប្រតិកម្ម Sandmeyer** ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងមានដូចខាងក្រោម។ គេមិនទាន់យល់នូវចលនការរបស់ប្រតិកម្មជំនួសនេះពេញលេញទេ ប្រតិកម្មនេះទំនោងជាប្រតិកម្មរ៉ាឌីកាល់សេរី មិនមែនអ៊ីយ៉ុងទេ។






### ៧.៣ ជំនួសដោយ -I

អំបិលអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូមមានប្រតិកម្មជាមួយប៉ូតាស្យូមអ៊ីយ៉ូឌីតឆ្អើតផលិតផល ដែលក្រុមឌីអាសូត្រូវបានជំនួសដោយ -I។ ឧទាហរណ៍មួយគឺការសំយោគ p-អ៊ីយ៉ូដូនីត្រូបង់សែន៖




### ៧.៤ ជំនួសដោយ -F

ក្រុមឌីអាសូញ៉ូមអាចត្រូវបានជំនួសដោយក្លរ ដោយដាក់អំបិលឌីអាសូញ៉ូមឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតក្លរូយអ្វីប៊ែរ (HBF<sub>4</sub>)។ ឌីអាសូញ៉ូមក្លរូយអ្វីប៊ែរដែលងាកក្រវាត់ត្រូវបានញែកចេញ សំងួត ហើយកម្ដៅរហូតដល់ការបំបែកកើតឡើង។ អាវ៉ែលក្លរូយអ្វីប៊ែរកើតឡើង៖



### ៧.៥ ជំនួសដោយ -OH

ក្រុមឌីអាសូញ៉ូមអាចត្រូវបានជំនួសដោយក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីល ដោយបន្ថែមទង់ដែង(I)អុកស៊ីតទៅក្នុងសូលុយស្យុងរវាងនៃអំបិលឌីអាសូញ៉ូមដែលមានបរិមាណលើសនៃទង់ដែង (II) នីត្រាត៖



ប្រតិកម្មSandmeyer ទាំងនេះ ជាវិធីសាស្ត្រងាយជាង និងសុវត្ថិភាពជាងវិធីសាស្ត្រចាស់ៗក្នុងការ ទង្វើផលិត ដែលត្រូវការដុតកម្ដៅអំបិលឌីអាសូញ៉ូមជាមួយអាស៊ីតស៊ីលផ្សិតខាប់។

លំហាត់អនុវត្តន៍២០.១០៖ ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើនៃប្រតិកម្មឌីអាសូញ៉ូម យើងបានបង្ហាញអំពីការសំយោគដែលចាប់ផ្តើមដោយសមាសធាតុ a – d ។ ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកអាចទង្វើពួកវាពីសមាសធាតុខាងក្រោមពីបង់សែន។


- a. m-ក្លរូអាស៊ីលីន
- b. m-ប្រូមូអាស៊ីលីន
- c. o-នីត្រូអាស៊ីលីន
- d. p-នីត្រូអាស៊ីលីន

### ៧.៦ ជំនួសដោយអ៊ីដ្រូសែន៖ ដេអាមីនកម្មដោយដេអាសូតកម្ម

អំបិលអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូមមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតអ៊ីប៉ូផូស្វ៊ីក (H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub>) បង្កើតផលិតផលដែលមានក្រុមឌីអាសូញ៉ូមត្រូវបានជំនួសដោយ -H។

ដោយសារតែយើងតែងតែចាប់ផ្តើមការសំយោគមួយដោយប្រើអំបិលឌីអាសូញ៉ូម ដោយធ្វើប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មលើសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចមួយ ដែលជំនួស -H ដោយ -NO<sub>2</sub> បន្ទាប់មក ដោយ -NH<sub>2</sub> វាអាចចំលែកដែលយើងចង់ជំនួសក្រុមឌីអាសូញ៉ូមដោយ-H។ ប៉ុន្តែ ការជំនួសក្រុមឌីអាសូញ៉ូមដោយ -H អាចជាប្រតិកម្មមានប្រយោជន៍មួយ។ យើងអាចបញ្ចូលក្រុមអាមីណូចូលក្នុងវង់អារ៉ូម៉ាទិចមួយ ដើម្បីឱ្យមានឥទ្ធិពលដំណៅទិសនៃប្រតិកម្មបន្ទាប់។ ក្រោយក យើងអាចដកក្រុមអាមីណូ (គឺអនុវត្តប្រតិកម្មដេអាមីនកម្ម (deamination)) ដោយធ្វើប្រតិកម្មឌីអាសូតកម្ម ហើយដាក់អំបិលឌីអាសូញ៉ូមឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយ H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub>។

យើងឃើញឧទាហរណ៍មួយនៃអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រតិកម្មដេអាមីនកម្មក្នុងការសំយោគm-ប្រូមូតូលុយអែនខាងក្រោម។




យើងមិនអាចទង្វើ m-ប្រូមូតូលុយអែនដោយប្រតិកម្មប្រូមកម្មផ្ទាល់នៃតូលុយអែន ឬដោយប្រតិកម្មអាល់គីលកម្ម Friedel-Crafts នៃប្រូមូបង់សែន ពីព្រោះប្រតិកម្មទាំងពីរបង្កើត o- និង p-ប្រូមូតូលុយអែន (ទាំង CH<sub>3</sub>- និង Br- ជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ា)។ ប៉ុន្តែ បើសិនជាយើងចង់ចាប់ផ្តើមជាមួយ p-តូលុយអ៊ីន (ទង្វើ ដោយប្រតិកម្មនីត្រាតកម្មតូលុយអែន ញែកអ៊ីសូមែរប៉ារ៉ាចេញ និងធ្វើអ៊ុបកម្មជាក្រុមនីត្រូ) យើងអាច

ធ្វើប្រតិកម្ម បន្តបន្ទាប់ដែលបានបង្ហាញ ហើយទទួលបាន m-ប្រូម៉ូតូលុយអែនក្នុងផលិតផលខ្ពស់។ ដំណាក់កាលទី១ ជាការសំយោគ ស្រលាយ N-អាសេទីលនៃp-តូលុយឌីអ៊ីន ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលសកម្ម របស់ក្រុមអាមីណូ (បើសិនធ្វើដូចនេះទេ ទីតាំងអរតូទាំងពីរនឹងត្រូវរងប្រតិកម្មប្រូមកម្ម) ក្រោយមកក្រុម អាស៊ីលត្រូវបានដកចេញដោយប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីស។

**លំហាត់២១២១៖** ចូរឱ្យរបៀបសំយោគមួយទៀតដែលអាចទង្វើ 3,5-ឌីប្រូម៉ូតូលុយអែន។

**វិធីសាស្ត្រ និងចម្លើយ៖** ក្រុមអាមីណូជាក្រុមសកម្មខ្លាំងជាងក្រុមអាមីដូ។ បើសិនយើងធ្វើប្រូមកម្មផ្ទាល់ជាមួយវត្ថុមាននៃក្រុមអាមីណូ ជាជាងធ្វើប្រូមកម្មបន្ទាប់ពីបម្លែងអាមីនទៅជាអាមីតសិន យើងអាចធ្វើប្រូមកម្មលើទីតាំងអរតូទាំងពីរ។ យើងត្រូវតែផ្តល់បរិមាណប្រូមគ្រប់គ្រាន់។



**លំហាត់អនុវត្តន៍២០.១១៖**

- ក្នុងផ្នែក២០.៧២ យើងបានបង្ហាញការសំយោគ m-ក្លុយអ៊ីតូលុយអែន ដោយចាប់ផ្តើមពី m-តូលុយអ៊ីឌីន។ តើអ្នកអាចទង្វើ m-តូលុយអ៊ីឌីនពីតូលុយអែនតាមរបៀបណា?
- តើអ្នកអាចទង្វើ m-ក្លុយអ៊ីតូលុយអែនតាមរបៀបណា?
- តើអ្នកអាចទង្វើ m-ប្រូម៉ូតូលុយអែនតាមរបៀបណា?
- តើអ្នកអាចទង្វើ m-អ៊ីយ៉ូដូតូលុយអែនតាមរបៀបណា?
- តើអ្នកអាចទង្វើ m-តូលុយនីទ្រីល ( $m\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{CN}$ ) តាមរបៀបណា?
- តើអ្នកអាចទង្វើ អាស៊ីត m-តូលុយអ៊ីចតាមរបៀបណា?


**លំហាត់អនុវត្តន៍២០.១២៖** ដោយចាប់ផ្តើមពី p-នីត្រូអាស៊ីលីន (លំហាត់អនុវត្តន៍២០.១០d) ចូរបង្ហាញរបៀប សំយោគ 1,2,3-ទ្រីប្រូម៉ូបង់សែន។

## ៨. ប្រតិកម្មបង្កើតអ៊ីដ្រាសូញ៉ូន


អ៊ីយ៉ុងអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូនជាអេឡិចត្រូកីលខ្សោយ ពួកវាមានប្រតិកម្មជាមួយសមាសធាតុអារ៉ូម៉ាទិចប្រតិកម្មភាពខ្ពស់ ដូចជាជាមួយផេណុល និងអាវ៉ែនអាមីនថ្នាក់ទី៣ បង្កើតសមាសធាតុអាសូ។ ប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូកីលអារ៉ូម៉ាទិចនេះត្រូវបានគេហៅថា **ប្រតិកម្មបង្កើតអ៊ីដ្រាសូញ៉ូន** (diazo coupling reaction)។

**ប្រតិកម្មទូទៅ៖**


**General Reaction**




**ឧទាហរណ៍៖**




ប្រតិកម្មបង្កើតកាបូនអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូម និងផេណុលកើតឡើងហើសបំផុត ក្នុងសូលុយស្យុង បាសតិចតួច។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ បរិមាណសមស្របនៃផេណុលមានវត្តមានជាអ៊ីយ៉ុងផេណុកស៊ីត  $ArO^-$  ហើយអ៊ីយ៉ុងផេណុកស៊ីតមានប្រតិកម្មភាពចំពោះអេឡិចត្រូកីលខ្លាំងជាងផេណុលខ្លួនវា (ហេតុអ្វី?) ។ ប៉ុន្តែ បើសិនសូលុយស្យុងជាបាសខ្លាំង ( $pH > 10$ ) អំបិលអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូមមានប្រតិកម្មខ្លួនវាជាមួយអ៊ីយ៉ុង អ៊ីដ្រុកស៊ីតបង្កើតអ៊ីយ៉ុងឌីអាសូអ៊ីដ្រុកស៊ីត ឬឌីអាសូតាតមិនមានប្រតិកម្មភាពមួយ៖



បង្កគូរវាងកាចុងអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូម និងអាមីនកើតឡើងរហ័សណាស់ក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីតតិចតួច ( $\text{pH} = 5 - 7$ ) ។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ កំហាប់របស់កាចុងអាវ៉ែនឌីអាសូញ៉ូមមានកំហាប់អតិបរមានៅពេលដែលបរិមាណរបស់អាមីនលើសមួយមិនបានប្លែងទៅជាអំបិលអាមីនីញ៉ូមគ្មានប្រតិកម្មភាព។




បើសិន  $\text{pH}$  របស់សូលុយស្យុងទាបជាង 5 ល្បឿនប្រតិកម្មបង្កគូរបស់អាមីនយឺត។ ជាមួយផេណុល និងស្រលាយអាស៊ីតលីន បង្កគូកើតឡើងលើតែទីតាំងប៉ារ៉ាប៉ុណ្ណោះបើទំនេរ។ បើមិនទំនេរ បង្កគូកើតឡើងលើទីតាំងអរតូ។



សមាសធាតុអាសូតែងតែមានពណ៌ច្បាស់ ពីព្រោះតំណអាសូ (ឌីអាសែនឌីអ៊ីល) -N=N- មានវង់ អាវ៉ែនទិចធ្លាស់ពីរ។ ប្រព័ន្ធនេះធ្វើឱ្យមានប្រព័ន្ធអេឡិចត្រុង $\pi$  មិនដេកនៃង ហើយធ្វើឱ្យស្រូបពន្លឺក្នុងតំបន់មើលឃើញ។ ដោយសារតែសមាសធាតុអាសូមានពណ៌ច្បាស់ ហើយដោយសារតែពួកវាអាចសំយោគពីសមាសធាតុតម្លៃថោកជាង ពួកវាត្រូវបានប្រើជា **ល័ខ** (dyes) ។

ល័ខអាសូតែងតែមានក្រុម  $-\text{SO}_3^-\text{Na}^+$  មួយឬច្រើន ដើម្បីឱ្យវាលាយក្នុងទឹក ហើយជួយឱ្យល័ខចង់ សម្លឹងជាមួយផ្ទៃសរសៃប៉ូលែ (រោមសត្វ កប្បាស ឬនីឡុង)។ ល័ខជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតដោយប្រតិកម្មបង្កនៃណាប់ផ្ទីលអាមីន និងណាប់ផ្តុល។


ល័ខទឹកក្រូច II ដែលបានរកឃើញក្នុងឆ្នាំ១៨៧៦ ត្រូវបានបង្កើតពី 2-ណាប់ផ្តុល៖



**ល័ខទឹកក្រូច II**


**លំហាត់អនុវត្តន៍២០.១៣៖** ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសំយោគល័ខទឹកក្រូច II ពី 2-ណាប់ផ្តុល និងអាស៊ីត p-អាមីណូបង់សែនស៊ុលផួនិច។

**លំហាត់អនុវត្ត៧០.១៤៖** Butter Yellow ជាលំខមួយដែលបានប្រើដើម្បីឱ្យបំប្រែរូបរាងរុក្ខជាតិមានពណ៌។ ដោយ សារតែវាត្រូវបានគេបង្ហាញថាជាសមាសធាតុបង្កមហារីក គេមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើក្នុងអាហារទៀតទេ។ ចូរ សរសេរសមីការសំយោគ Butter Yellow ពីបង់សែន និង N,N-ឌីមេទីលអានីលីន។




Butter Yellow

**លំហាត់អនុវត្ត៧០.១៥៖** សមាសធាតុអាសូអាចរងអ្នកដកមួយជាអាមីនដោយរំលាយក្នុងទឹកផ្សេងៗ ដូចជាសំណល់ប៉ាហ្គាំងក្លរួ (SnCl<sub>2</sub>) ៖





ប្រតិកម្មអ្នកដកនេះមានសារប្រយោជន៍ក្នុងការសំយោគ ដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖




ចូរឱ្យទម្រង់របស់ផេណាសេទីន និងអង្គធាតុកណ្តាល A, B, និង C (ផេណាសេទីនតែងតែត្រូវបានប្រើជាថ្នាំផ្សះ)។

## ៩. ប្រតិកម្មរបស់អាមីនជាមួយស៊ុលផួនីលក្លរួ

អាមីនថ្នាក់ទី១ និងទី២មានប្រតិកម្មជាមួយស៊ុលផួនីលក្លរួបង្កើតស៊ុលផួនអាមីត៖



នៅពេលដុតកម្ដៅជាមួយអាស៊ីតរាវ ស៊ុលផួនអាមីតរងអ៊ីដ្រូលីសទៅជាអាមីន៖



ប៉ុន្តែ ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសនេះយឺតជាងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសរបស់កាបូកសាមីតខ្លាំងណាស់។




## តេស្ត Hinsberg


- ការកើតស៊ុលផួនអាមីតគឺជាមូលដ្ឋាននៃតេស្តអ៊ីមួយ ហៅថាតេស្ត Hinsberg ដែលអាចប្រើដើម្បីបង្ហាញថ្នាក់អាមីនជាថ្នាក់ទី១ ទី២ ឬទី៣។

តេស្ត Hinsberg មានពីរដំណាក់កាល។ ដំណាក់កាលទី១ ល្បាយមួយដែលមានបរិមាណតិចតួចនៃអាមីន និងបង់សែនស៊ុលផួនីលក្លរួត្រូវបានគ្រលែងជាមួយប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតលើស។ បន្ទាប់មក ទុកឱ្យប្រតិកម្មកើតឡើងក្នុងមួយសន្ទុះ ហើយធ្វើអាស៊ីតកម្មលើល្បាយនោះ។ ប្រភេទនីមួយៗរបស់អាមីនថ្នាក់ទី១ ថ្នាក់ទី២ ឬថ្នាក់ទី៣ ឱ្យលុតនៃលទ្ធផលបន្ទាប់ពីធ្វើប្រតិកម្មពីរដំណាក់កាលនេះ។

អាមីនថ្នាក់ទី១មានប្រតិកម្មជាមួយបង់សែនស៊ុលផួនីលក្លរួបង្កើត បង់សែនស៊ុលផួនអាមីតN-ជួស។ បន្ទាប់មកអាមីនទាំងនេះមានប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាសជាមួយប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតបង្កើតអំបិលរលាយក្នុងទឹក (ប្រតិកម្មទាំងនេះកើតឡើង ពីព្រោះអ៊ីដ្រូសែនដែលចងជាមួយអាសូតធ្វើឱ្យមានភាពអាស៊ីតដោយក្រុមទាញអេឡិចត្រុងខ្លាំង-SO<sub>2</sub>-)។ នៅដំណាក់កាលនេះ បំពង់សាករបស់យើងមានសូលុយស្យុងថ្លាមួយ។ ក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់ អាស៊ីតកម្មលើសូលុយស្យុងនេះធ្វើឱ្យស៊ុលផួនអាមីត N-ជួសមិនរលាយក្នុងទឹករងជាកករ៖



អាមីនថ្នាក់ទី២មានប្រតិកម្មជាមួយបង់សែនស៊ុលផួនីលក្លរួក្នុងប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតរាវបង្កើតស៊ុលផួនអាមីត N,N-ឌីជំនួស ដែលរងជាកករបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី១។ ស៊ុលផួនអាមីត N,N-ឌីជំនួសមិនរលាយក្នុងសូលុយស្យុងប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីត ពីព្រោះពួកវាមិនមានអ៊ីដ្រូសែនអាស៊ីត។ អាស៊ីតកម្មលើល្បាយដែលទទួលបានពីអាមីនថ្នាក់ទី២មួយមិនមានលទ្ធផលកើតឡើងទេ ស៊ុលផួនអាមីត N,N-ឌីជំនួសមិនមែនជាបាសនៅសល់ជាកករ ហើយគ្មានកករថ្មីកើតឡើងទេ៖




បើសិនអាមីនជាអាមីនថ្នាក់ទី៣ ហើយបើសិនវាមិនរលាយក្នុងទឹក គ្មានអ្វីកើតឡើងក្នុងល្បាយនៅពេលយើងគ្រលែងវាជាមួយបង់សែនស៊ុលផួនីលក្លរួ និង KOH រាវ។ នៅពេលយើងធ្វើអាស៊ីតកម្មលើល្បាយនេះ អាមីនថ្នាក់ទី៣រលាយ ពីព្រោះវាបង្កើតអំបិលរលាយក្នុងទឹកមួយ។

**លំហាត់អនុវត្ត៧០.១៦៖** អាមីន A មួយមានម៉ាសម៉ូលេគុល  $C_7H_9N$ ។ សមាសធាតុ A មានប្រតិកម្មជាមួយបង់សែនស៊ុលផួនីលក្លរួក្នុងប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតមួយបង្កើតសូលុយស្យុងថ្លាមួយ។ អាស៊ីតកម្មលើសូលុយស្យុងនេះបង្កើតកករមួយ។ នៅពេល A មានប្រតិកម្មជាមួយ  $NaNO_2$  និង  $HCl$  នៅ  $0-5^{\circ}C$  ហើយបន្ទាប់មក មានប្រតិកម្មជាមួយ 2-ណាប់ផ្តុល បង្កើតសមាសធាតុពណ៌ច្បាស់មួយ។ សមាសធាតុ A ឱ្យសម្រូបស្ទីច IR ខ្លាំងនៅ  $815cm^{-1}$ ។ ចូរគូរទម្រង់របស់ A។

**លំហាត់អនុវត្ត៧០.១៧៖** ស៊ុលផួនអាមីតនៃអាមីនថ្នាក់ទី១តែងតែត្រូវបានប្រើដើម្បីសំយោគអាមីនថ្នាក់ទី២សុទ្ធ។ ចូរឱ្យរបៀបសំយោគនេះ។

## ១០. ការសំយោគផ្លូវស៊ុលផា


ស៊ុលផាអាស៊ីឡាមីត (ថ្នាំស៊ុលផា) អាចត្រូវបានសំយោគពីអាស៊ីលីនតាមរយៈចង្វាក់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



អាសេទីលកម្មនៃអាស៊ីលីនបង្កើតអាសេតានីលីត(2) និងការពារក្រុមអាមីនពីអាក់ទីបដែលត្រូវប្រើបន្ទាប់។ ការដាក់(2) ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតក្លរួស៊ុលផួនីលធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូភីលអាវ៉ូម៉ាទិច និងបង្កើត p-អាសេតាមីដូបង់សែនស៊ុលផួនីលក្លរួ (3)។ ប្រតិកម្មបូកអាម៉ូញាក់ ឬអាមីនថ្នាក់ទី១បង្កើតឌីអាមីត (4) (ជាអាមីតនៃអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីចផង និងអាស៊ីតស៊ុលផួនីលផង)។ ចុងក្រោយ ការធ្វើរ៉ក្ខច (4)ជាមួយអាស៊ីតក្លរួឌីលូត ធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសជ្រើសសម្ព័ន្ធកាបូកសាមីត ហើយបង្កើតស៊ុលផានីលីតមួយ (អ៊ីដ្រូលីសនៃកាបូកសាមីតហ៊ែសជាងអ៊ីដ្រូលីសស៊ីផូណាមីត)។

**លំហាត់អនុវត្តន៍២០.១៨៖**

- ដោយចាប់ផ្តើមពីអាស៊ីលីន ហើយសន្មត់ថាអ្នកមាន 2-អាមីណូត្យាសុល ចូរបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកអាចសំយោគស៊ីលផាត្យាសុល។
- តើអ្នកអាចបង្កើនស៊ីលផាត្យាសុលទៅជាស៊ីស៊ីនីលស៊ីលផាត្យាសុលតាមរបៀបណា ?



**2-អាមីណូត្យាសុល**

**១១. ការវិភាគអេមីន**


**១១.១ ការវិភាគគីមី**

អាមីនត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយភាពបាសរបស់វា ដូចនេះលទ្ធភាពនេះធ្វើឱ្យវារលាយក្នុងអាស៊ីតរាវ (ផ្នែក២០.៣ក, ផ្នែក២០.៣ង)។ គេអាចប្រើក្រដាស pH សើមដើម្បីធ្វើតេស្តពីវត្តមានបង្គំនាទីអាមីនក្នុងសមាសធាតុមិនស្គាល់មួយ។ បើសិនជាសមាសធាតុនេះជាអាមីន ក្រដាសpHនឹងបង្ហាញវត្តមានបាស។ បន្ទាប់ មកអាមីនមិនស្គាល់ចាត់ថ្នាក់ទៅជាអាមីនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ដោយIRស្ទិចត្រូស្កូពី (មើលខាងក្រោម)។ អាមីនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ក៏អាចសម្គាល់ដោយប្រើតេស្ត Hinsberg (ផ្នែក២០.ក)។ អាមីនអារ៉ូម៉ាទិចថ្នាក់ទី១ តែងតែត្រូវបានសម្គាល់តាមរយៈការកើតអំបិលឌីអាសូញ៉ូម និងប្រតិកម្មបង្កើតបន្ទាប់ជាមួយ 2-ណាប័ផុល បង្កើតលីខអាសូពណ៍ច្បាស់ (ផ្នែក២០.៨)។

**១១.២ ការវិភាគដោយស្បៀង**

**ក. ស្បៀង IR**

អាមីនថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយបង់សម្រូបIR ក្នុងតំបន់ $3300-3555\text{cm}^{-1}$  ដែលបានមកពីរំញ័រទំនាញសម្ព័ន្ធ N-H។ អាមីនថ្នាក់ទី១ឱ្យបង់ពីក្នុងតំបន់នេះ (មើលរូប២០.៤) អាមីនថ្នាក់ទី២ តែងតែឱ្យបង់តែមួយ។ ដោយសារតែអាមីនថ្នាក់ទី៣មិនមានក្រុម N – H ពួកវាមិនមានសម្រូបក្នុងតំបន់នេះទេ។ បង់សម្រូបដែលបានមកពីរំញ័រទំនាញសម្ព័ន្ធទី១ C-N របស់អាមីនអាស៊ីតទី១កើតឡើងក្នុងតំបន់  $1020-1220\text{cm}^{-1}$  ប៉ុន្តែតែងតែជាពិការខ្សោយ ហើយពិបាកសម្គាល់។ អាមីនអារ៉ូម៉ាទិចតែងតែឱ្យបង់ទំនាញសម្ព័ន្ធទី១ C – N ក្នុងតំបន់  $1250-1360\text{cm}^{-1}$ ។ រូប២០.៤ បង្ហាញស្បៀង IRរបស់ 4-មេទីលអាស៊ីលីន។




**រូប២០.៤ ស្បៀងIR របស់មេទីលអាស៊ីលីន**

## ខ. ស្បៀង $^1\text{H NMR}$

អាមីនថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២បង្ហាញស៊ីញ៉ាល់ប្រូតុង N – H ក្នុងតំបន់  $\delta = 0.5 - 5$ ។ ស៊ីញ៉ាល់ទាំងនេះ ជា ស៊ីញ៉ាល់ធំ ហើយទីតាំងពិតប្រាកដរបស់វាអាស្រ័យលើធម្មជាតិរបស់អង្គធាតុរំលាយ កម្រិតសុទ្ធរបស់ភាគ សំណាក កំហាប់ និងសីតុណ្ហភាព។ ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរប្រូតុង ប្រូតុង N – H មិនធ្វើបង្កគូជាមួយប្រូតុង របស់កាបូនជាប់គ្នាទេ។ ដូចនេះ មានការការលំបាកក្នុងការកត់សម្គាល់ពួកវា ហើយពួកវាត្រូវបានសម្គាល់ ដោយរាប់ប្រូតុង ឬដោយបន្ថែមបរិមាណបន្តិចនៃ  $\text{D}_2\text{O}$  ទៅលើភាគសំណាក។ ការផ្លាស់ប្តូរដីតេរ៉ូម N–D សម្រាប់ N – H កើតឡើង ហើយស៊ីញ៉ាល់ N – H បាត់ពីស្បៀង។

ប្រូតុងនៅលើកាបូន  $\alpha$  របស់អាមីនអាស៊ីតអាចទទួលបានបាំងដោយឥទ្ធិពលនៃក្រុមទាញអេឡិចត្រុង របស់អាសូត និងស្រូបក្នុងតំបន់  $\delta$  2.2 – 2.9 ។ ប្រូតុងលើកាបូន  $\beta$  មិនបានបាំងដែរ ហើយស្រូបក្នុងតំបន់  $\delta$  1.0-1.7។


រូប២០.៥ បង្ហាញស្បៀង  $^1\text{H NMR}$  របស់ឌីអ៊ីសូប្រូពីលអាមីន។



រូប២០.៥ ស្បៀង 300MHz  $^1\text{H NMR}$  របស់ឌីអ៊ីសូប្រូពីលអាមីន

## គ. ស្បៀង $^{13}\text{C NMR}$

កាបូន  $\alpha$  របស់អាមីនអាស៊ីតអាចទទួលបានបាំងដោយអាតូមអាសូតកម្រិតអេឡិចត្រុងអវិជ្ជមានខ្ពស់ ហើយសម្រប របស់វាត្រូវបានរំកិលទៅដែនក្រោម នៅ  $\delta$  30 – 60។ ប៉ុន្តែ រំកិលនេះមិនធំដូចរំកិលរបស់កាបូន  $\alpha$  អាស់កុល មួយទេ (ប្រហែល  $\delta$  50 – 75) ដោយសារតែអាសូតមានកម្រិតអេឡិចត្រុងអវិជ្ជមានតូចជាងអុកស៊ីសែន។ រំកិលដែនក្រោមកាន់តែទាបចំពោះកាបូន  $\beta$  ហើយកាន់តែទាបទៅតាមខ្សែ ដូចរំកិលគីមីនៃកាបូនរបស់បង់ទីល អាមីនខាងក្រោម៖



## ឃ. ស្បៀងម៉ាសរបស់អាមីន


អ៊ីយ៉ុងម៉ូលេគុលក្នុងស្បៀងម៉ាសរបស់អាមីនមួយមានចំនួនម៉ាសសេស ( ទោះបីជាមានចំនួនអាតូម អាសូតក្នុងម៉ូលេគុលក៏ដោយ )។ ពិការបស់អ៊ីយ៉ុងម៉ូលេគុលតែងតែជាពិការខ្លាំងចំពោះអាមីនអារ៉ូម៉ាទិច និង អា

លីផាទីចវង់ ប៉ុន្តែជាពិកខ្សោយចំពោះអាមីនអាលីផាទីចអាស៊ីត្តិច។ បណ្តាចំរាងកាបូន  $\alpha$  និង  $\beta$  របស់អាមីន អាវ៉ូម៉ាទីជារបៀបបណ្តាចំបងមួយ។

## ១២. ប្រតិកម្មបណ្តាចំទាក់ទងនឹងសមាសធាតុអាម៉ូញ៉ូម


### ១២.១ ប្រតិកម្មបណ្តាចំ Hofmann

ប្រតិកម្មបណ្តាចំទាំងអស់ដែលយើងបានសិក្សាចមកហើយទាក់ទងនឹងអង្គធាតុមេប្រតិករណីត។ ប៉ុន្តែ ក៏មានប្រតិកម្មបណ្តាចំដែលអង្គធាតុមេប្រតិករមានបន្ទុកវិជ្ជមានដែរ។ ប្រតិកម្មសំខាន់មួយគឺប្រតិកម្ម បណ្តាចំប្រភេទ E2 ដែលកើតឡើងនៅពេលអាម៉ូញ៉ូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតថ្នាក់ទី២ត្រូវបានដុតកម្ដៅ។ ផលិតផលនៃប្រតិកម្មនេះជាអាស់សែនមួយ ទឹក និងអាមីនថ្នាក់ទី៣មួយ៖




ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានរកឃើញក្នុងឆ្នាំ១៨៥១ ដោយ August W. von Hofmann ហើយចាប់ពីពេលនេះ មកគេប្រើឈ្មោះរបស់គាត់ដាក់ឱ្យប្រតិកម្មនេះ។

អាម៉ូញ៉ូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតថ្នាក់ទី៣អាចទង្វើពីអាម៉ូញ៉ូមអាឡូសែន្នថ្នាក់ទី៣ក្នុងសូលុយស្យុងទឹក តាមរយៈការប្រើប្រាក់អុកស៊ីត ឬស៊ីនផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងមួយ (an ion exchange resin) ៖




ប្រាក់អាឡូសែន្នឯករាជ្យសូលុយស្យុង ហើយត្រូវបានដកចេញដោយច្រោះ។ បន្ទាប់មក អាម៉ូញ៉ូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតថ្នាក់ទី៣អាចទទួលបានពីការរំហួតទឹកចេញ។


ទោះបី ប្រតិកម្មបណ្តាចំស្ទើរតែទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងអង្គធាតុមេប្រតិករណីតអនុលោមន៍តាមច្បាប់ Zaitsev ប្រតិកម្មបណ្តាចំមានអង្គធាតុមេប្រតិករមានបន្ទុកតែងតែអនុលោមន៍តាមច្បាប់មួយហៅថា ច្បាប់ Hofmann ហើយប្រតិកម្មនេះ បង្កើតអាស់សែនក្រុមជួសតិចជាផលិតផលឧត្តមភាព។ យើងអាចឃើញឧទាហរណ៍នៃលក្ខណៈនេះ បើសិនយើងប្រៀបធៀបប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



មូលហេតុជាចលនការសម្រាប់ភាពខុសគ្នាទាំងនេះគឺស្មុគ្រស្មាញណាស់ ហើយមិនទាន់បានយល់ពេញលេញនៅឡើយទេ។ ការពន្យល់មួយគឺថា អន្តរភាពនៃប្រតិកម្មបណ្តាចំលើអង្គធាតុមេប្រតិករមានបន្ទុកមានលក្ខណៈជាកាប៉ាញ៉ុង។ ដូចនេះ អន្តរភាពទាំងនេះបង្ហាញលក្ខណៈដូចទៅនឹងផលិតផលអាស់សែន ហើយមិនត្រូវបានបន្ស៊ប់ដោយការកកើតសម្ព័ន្ធពីរជាន់ទេ៖



អន្តរភាពដូចកាបាញ៉ុង  
(ឱ្យដំណើរទិសតាម Hofmann)




អន្តរភាពដូចអាល់សែន  
(ឱ្យដំណើរទិសតាម Zaitsev)

ជាមួយអង្គធាតុមេប្រតិកម្មមានបន្ទុកមួយ បានប្រយុទ្ធលើអាតូមអ៊ីដ្រូសែនណាមានលក្ខណៈអាស៊ីតខ្លាំងជាងគេ។ អាតូមអ៊ីដ្រូសែនថ្នាក់ទី១មានលក្ខណៈអាស៊ីតខ្លាំងជាងគេ ពីព្រោះអាតូមកាបូនរបស់វាចងជាមួយក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុងមួយ។

### ១២.២ ប្រតិកម្មបណ្តាច់Cope


អាមីនអុកស៊ីតថ្នាក់ទី៣នៃប្រតិកម្មបណ្តាច់នៃឌីអាល់គីលអ៊ីដ្រុកស៊ីលអាមីន នៅពេលពួកវាត្រូវបានដុតកម្ដៅ។ ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានហៅថាប្រតិកម្មបណ្តាច់Cope វាជាប្រតិកម្មបណ្តាច់បែបស៊ិនមួយ ហើយដំណើរការឆ្លងកាត់អន្តរភាពវែងមួយ។



អាមីនអុកស៊ីតថ្នាក់ទី៣      អាល់សែន    N,N-ឌីមេទីលអ៊ីដ្រុកស៊ីលអាមីន

អាមីនអុកស៊ីតថ្នាក់ទី៣ត្រូវបានទង្វើយ៉ាងងាយស្រួលដោយដាក់អាមីនថ្នាក់ទី៣ជាមួយអ៊ីដ្រូសែនពែរអុកស៊ីត (ផ្នែក២០.៥ក)។


ប្រតិកម្មបណ្តាច់Cope មានសារប្រយោជន៍ក្នុងការសំយោគ។ ខាងក្រោមនេះជាការសំយោគមេទីឡែនស៊ីក្លូអិចសាន៖




### ១៣. សង្ខេបទង្វើ និងប្រតិកម្មរបស់អាមីន

#### ១៣.១ ទង្វើអាមីន


ក. ការសំយោគ Gabriel (ផ្នែក២០.៤.១)



ខ. ប្រតិកម្មបណ្តាច់អាល់គីលអាសូ (ផ្នែក២០.៤ក)




គ. ប្រតិកម្មអាមីនកម្មនៃអាល់គីលអាឡុសែន (ផ្នែក២០.៤.១)




(R = ក្រុមអាល់គីល<sup>1°</sup>)


ឃ. ប្រតិកម្មបំប្លែងនីត្រូអាវ៉ែន (ផ្នែក២០.៤.២)



ង. ប្រតិកម្មអាមីនកម្មបំប្លែង (ផ្នែក២០.៤.៣)




ច. ប្រតិកម្មបំប្លែងនីត្រីល អុកស៊ីម និងអាមីត (ផ្នែក២០.៤.៤)




ធ. ប្រតិកម្មបណ្តូរទឹតាំង Hofmann និង Curtius (ផ្នែក ២០.៤.៥)

បណ្តូរទឹតាំង Hofmann




បណ្តូរទឹតាំង Curtius





១៣.២ ប្រតិកម្មរបស់អាមីន

ក. ប្រតិកម្មជាបាស




(R, R' និង/ឬ R'' អាចជា អាត់គីល, H ឬ Ar)

ខ. ប្រតិកម្មឌីអាសូតកម្មនៃអាមីន 1° និងប្រតិកម្មជំនួស ឬ បង្កើតជាមួយ ក្រុមឌីអាសូញ៉ូម (ផ្នែក ២០.៧ និង ២០.៨)






គ. ប្រតិកម្មបង្កើនទៅជាស៊ុលផួនអាមីត (ផ្នែក២០.៩)




ឃ. ប្រតិកម្មបង្កើនទៅជាអាមីត (ផ្នែក២០.៨)




ង. ប្រតិកម្មបណ្តាច់ Hofmann និង Cope (ផ្នែក២០.១២)

បណ្តាច់ Hofmann



បណ្តាច់ Cope



\$\$\$\$\$\$\$\$\$


## លំហាត់មេរៀនទី២០

### ការហៅឈ្មោះ:

១. ចូរគូរទម្រង់សមាសធាតុខាងក្រោម៖


- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| a. បង់ស៊ីលមេទីលអាមីន         | k. ទ្រីអ៊ីសូប្រូពីលអាមីន           |
| b. N-អេទីល-N-មេទីលអាមីន      | l. m-តូលុយអ៊ីឌីន                   |
| c. 2-មេទីលពីរ៉ូ              | m. N-អេទីលពីរ៉ូឌីន                 |
| d. N-អេទីលពីរ៉ូឌីនីញ៉ូមប្រូម | n. អាស៊ីត 3-ពីរ៉ូឌីនកាបូកស៊ីលិច    |
| e. អ៊ុនដុល                   | o. អាសេតានីលីត                     |
| f. ឌីមេទីលអាមីនីញ៉ូមក្លរ     | p. 2-មេទីលអ៊ីមីដាសុល               |
| g. 3-អាមីណូប្រូប៉ាន-1-អុល    | q. តេត្រាប្រូពីលអាម៉ូញ៉ូមក្លរ      |
| h. ពីរ៉ូឌីន                  | r. N,N-ឌីមេទីល-p-តូលុយអ៊ីឌីន       |
| i. 4-មេតុកស៊ីអាស៊ីលីន        | t. តេត្រាមេទីលអាម៉ូញ៉ូមអ៊ីដ្រូស៊ីត |
| j. អាស៊ីតp-អាមីណូបង់សូអ៊ិច   | v. N-មេទីលអាស៊ីលីន                 |

២. ចូរឱ្យឈ្មោះធម្មតា និងឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធរបស់សមាសធាតុខាងក្រោម៖



### ការសំយោគអាមីន និងប្រតិកម្មភាព

៣. តើអាសូតមួយណាក្នុងសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោមនេះដែលមានកម្រិតបាសខ្លាំងជាងគេ? ចូរពន្យល់។





៤. ចូរបង្ហាញពីរបៀបទង្វើបង់ស៊ីលអាមីនពីសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោម៖






- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| a. បង់ស៊ីលអាមីន     | e. បង់សូនីទ្រីល            |
| b. បង់សាមីត         | f. បង់ស៊ីលប្រូម (ពីរ៉ូឌីន) |
| c. បង់ស៊ីលតូស៊ីឡាត  | g. បង់សាល់ដេអ៊ីត           |
| d. ផេនីលនីត្រូមេតាន | h. ផេនីលអាសេតានីមីត        |

៥. ចូរបង្ហាញរបៀបទង្វើអានីលីនពីសមាសធាតុខាងក្រោម៖

- a. បង់សែន                                      b. ប្រមូលបង់សែន                                      c. បង់សាមីត
៦. ចូរបង្ហាញការសំយោគសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោមពី 1-ប៉ូយតាណុល។
- a. ប៉ូយទីលអាមីន (មិនមានអាមីន  $2^0$  និង  $3^0$ )                                      c. ផេនីលអាមីន
- b. ប្រូពីលអាមីន                                      d. ប៉ូយទីលមេទីលអាមីន
៧. ចូរបង្ហាញពីរបៀបបម្លែងអានីលីនទៅជាសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោម (អ្នកមិនអាចប្រើដំណាក់កាល ដដែលទេ)។
- a. អាសេតានីលីត                                      b. N-ផេនីលផ្តាលីមីត
- c. p-នីត្រូអានីលីន                                      d. ស៊ុលផានីលីត
- e. N,N-ឌីមេទីលអានីលីន                                      f. ក្លរូអ័បង់សែន
- g. ក្លរូបង់សែន                                      h. ប្រមូលបង់សែន
- i. អ៊ីយ៉ូដូបង់សែន                                      j. បង់សូនីទ្រីល
- k. អាស៊ីតបង់សូអ៊ិច                                      l. ផេណុល
- m. បង់សែន



៨. ចូរឱ្យផលិតផលឧត្តមភាពសរីរាង្គពីប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



៩. តើផលិតផលណាខ្លះដែលអ្នករំពឹងថាកើត នៅពេលអាមីននីមួយៗខាងក្រោមមានប្រតិកម្មជាមួយ សូដ្យូមនីត្រី និងអាស៊ីតក្លរីឌ្រីច?

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a. ប្រូពីលអាមីន       | d. N-ប្រូពីលអាមីន |
| b. ឌីប្រូពីលអាមីន     | e. p-ប្រូពីលអាមីន |
| c. N,N-ឌីប្រូពីលអាមីន |                   |


១០.

- តើផលិតផលណាដែលអ្នករំពឹងថាកើតនៅពេលអាមីនក្នុងលំហាត់ខាងលើមាន ប្រតិកម្ម ជាមួយបង់សែនស៊ុលផ្ទួនីលក្លរួ និងសូលុយស្យុងប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត។
- តើអ្នកសង្កេតឃើញអ្វីក្នុងប្រតិកម្មនីមួយៗខាងលើ។
- តើអ្នកសង្កេតឃើញអ្វីនៅពេលសូលុយស្យុង ឬល្បាយដែលទទួលបានរងអាស៊ីតកម្ម?


១១. តើផលិតផលអ្វីដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មនីមួយៗខាងក្រោម៖



១២. ចូរឱ្យទម្រង់ផលិតផលដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



- ដោយចាប់ផ្តើមពីបង់សែន ឬតូលុយអែន ចូរសរសេរសមីការសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោមដោយ ប្រើអំបិលឌីអាសូញ៉ូមជាអង្គធាតុកណ្តាល។
- p-ក្លុយអូតូលុយអែន
- o-អ៊ីយ៉ូដូតូលុយអែន
- p-ក្រៃសុល
- m-ឌីក្លរ៉ូបង់សែន
- $m\text{-C}_6\text{H}_4(\text{CN})_2$
- m-ប្រូម៉ូបង់សូនីទ្រីល
- 1,3-ឌីប្រូម៉ូ-5-នីត្រូបង់សែន
- 3,5-ឌីប្រូម៉ូអានីលីន
- 3,4,5-ទ្រីប្រូម៉ូផេណុល
- 3,4,5-ទ្រីប្រូម៉ូបង់សូនីទ្រីល
- អាស៊ីត 2,6-ឌីប្រូម៉ូបង់សូអ៊ិច
- 1,3-ឌីប្រូម៉ូ-2-អ៊ីយ៉ូដូបង់សែន




១៣. ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មដើម្បីតេស្តគីមីងាយដែលអាចញែករវាង៖

- បង់ស៊ីលអាមីន និងបង់សាមីត
- អាលីលអាមីន និងប្រូពីលអាមីន
- p-តូលុយអ៊ីឌីន និង N-មេទីលអានីលីន
- ស៊ីក្លូអ៊ិចស៊ីលអាមីន និងពីរេរីឌីន
- ពីរីឌីន និងបង់សែន
- ស៊ីក្លូអ៊ិចស៊ីលអាមីន និងអានីលីន
- ទ្រីអេទីលអាមីន និងឌីអេទីលអាមីណ
- ទ្រីប្រូពីលអាមីនីញ៉ូមក្លរួ និងតេត្រាប្រូពីលអាម៉ូញ៉ូមក្លរួ
- តេត្រាប្រូពីលអាម៉ូញ៉ូមក្លរួ និងតេត្រាប្រូពីលអាម៉ូញ៉ូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត


១៤. ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មដែលអ្នកអាចព្រែកល្បាយនៃអាស៊ីលីន, p-ក្រេសុល, អាស៊ីតបង់សូអ៊ីច និង តូលុយអែនចេញពីគ្នាដោយប្រើអ្នកកំណត់ទីបមន្ទីរពិសោធន៍ធម្មតា។

**ចលនការប្រតិកម្ម**

១៥. ដោយប្រើប្រតិកម្មដែលបានសិក្សាក្នុងមេរៀននេះ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




១៦. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




**សំយោគទូទៅ**

១៧. ចូរបង្ហាញពីរបៀបសំយោគ អាស៊ីតβ-អាមីណូប្រូប្លនិចពីអាស៊ីតឌីតស៊ីស៊ីនិច (អាស៊ីតβ-អាមីណូ ប្រូប្លនិចត្រូវបានប្រើក្នុងការសំយោគអាស៊ីតបង់តូតែនិច ជាសមាសធាតុផ្ដើមនៃកូអង់ស៊ីមA)។




អាស៊ីតβ-អាមីណូប្រូប្លនិច      អាស៊ីតឌីតស៊ីស៊ីនិច

១៨. ការសំយោគអាស៊ីតផូលិចមានការកម្ដៅសមាសធាតុបីខាងក្រោមជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាត។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មដែលបង្កើតអាស៊ីតផូលិចនេះ។ គន្លឹះ៖ ដំណាក់កាលទី១ទាក់ទងនឹងការកើតអាមីនរវាងក្រុម  $\text{NH}_2$  ផ្នែកក្រោមនៅខាងស្តាំ របស់អាមីនអេត្រូស៊ីត្លិច និងសេតូន៖




អាស៊ីតផូលិច

១៩. ចូរឱ្យទម្រង់សមាសធាតុ ពី R – W ៖




២០. ចូរសរសេរប្រតិកម្មសំយោគអាសេទីលកូលីនអ៊ីយ៉ូដូដោយប្រើឌីមេទីលអាមីន, អុកស៊ីវ៉ាន, អ៊ីយ៉ូដូមេតាន និងអាសេទីលក្លរ ជាសារធាតុផ្ដើម៖




អានេទីលកូលីនអ៊ីយ៉ូដ

២១. អេតាណុលអាមីន  $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$  និងឌីអេតាណុលអាមីន  $(\text{OHCH}_2\text{CH}_2)_2\text{NH}$  ត្រូវបានប្រើលើទីផ្សារដើម្បីបង្កើតភ្នាក់ងារអមុលស្យុង និងស្រូបឧស្ម័នអាស៊ីត។ ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសំយោគសមាសធាតុទាំងពីរនេះ។
២២. ឌីអេទីលប្រូពីយ៉ុង (ខាងក្រោម) ជាសមាសធាតុដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺជំងឺអាហារ។ ចូរសរសេរការសំយោគឌីអេទីលប្រូពីយ៉ុងជាមួយបង់សែន និងដោយប្រើអាក់ទីបផ្សេងទៀត។



ឌីអេទីលប្រូពីយ៉ុង


២៣. ដោយប្រើសារធាតុផ្ដើម អាស៊ីត 2-ក្លរូប្រូប៉ាណូអ៊ិច អានីលីន និង 2-ណាប់ផ្ដុល ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មសំយោគណាប្រូអានីលីត ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅក្នុងវាលស្រែក្នុងអាស៊ី៖




ណាប្រូអានីលីត

### ស្ម័គ្រចត្រួតពិនិត្យ


២៤. នៅពេលសមាសធាតុ  $\text{W} (\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{N})$  ត្រូវបានដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយបង់សែនស៊ុលផូនីល និងប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត មិនមានអ្វីប្រែប្រួល។ អាស៊ីតកម្មលើល្បាយនេះបង្កើតសូលុយស្យុងថ្លាមួយ។ ស្ម័គ្រ  $^1\text{H NMR}$  របស់  $\text{W}$  ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។ ចូរឱ្យទម្រង់របស់  $\text{W}$ ។




២៥. ចូរឱ្យទម្រង់របស់សមាសធាតុ  $\text{X}$ ,  $\text{Y}$ , និង  $\text{Z}$ ៖



ស្បៀច  $^1\text{H}$  NMR របស់ X ឱ្យស៊ីញ៉ាល់ពីរ ពហុវ៉ែតនៅ  $\delta$  7.3 (5H) និង ស៊ីញ៉ែតនៅ  $\delta$  4.25 (2H) ៖ តំបន់  $680\text{-}840\text{cm}^{-1}$  នៃស្បៀច IR របស់X បង្ហាញពីកនៅ  $690$  និង  $770\text{cm}^{-1}$ ។ ស្បៀច  $^1\text{H}$  NMR របស់Y ស្រដៀងគ្នានឹងស្បៀចរបស់ X ៖ ពហុវ៉ែតនៅ  $\delta$  7.3 (5H) ស៊ីញ៉ែតនៅ  $\delta$  3.7 (2H) ។ ស្បៀច  $^1\text{H}$  NMR របស់ Z ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម៖



២៦. សមាសធាតុ A ( $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}$ ) រលាយក្នុង  $\text{HCl}$ ។ ស្បៀចសម្រប IR បង្ហាញពីកនៅតំបន់  $3300\text{-}3500\text{cm}^{-1}$ ។ ស្បៀច  $^{13}\text{C}$  របស់ A ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។ ចូរឱ្យទម្រង់របស់ A។



&&&&&&




## មេរៀនទី២១


### ផេណុល និងអេរីលអាឡូសែន

#### ១. ទម្រង់ និងការហៅឈ្មោះរបស់ផេណុល

សមាសធាតុដែលមានក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលចងជាមួយវង់បង់សែនមួយត្រូវបានគេហៅថាផេណុល។ ដូចនេះ ផេណុលជាឈ្មោះពិសេសរបស់អ៊ីដ្រុកស៊ីបង់សែន ហើយវាជាឈ្មោះទូទៅរបស់ក្រុមសមាសធាតុស្រលាយរបស់អ៊ីដ្រុកស៊ីបង់សែន៖




ផេណុល




4-មេទីលផេណុល (ផេណុលមួយ)


សមាសធាតុដែលមានក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលចងជាមួយវង់ប៉ូលីស៊ីត្តិចមានលក្ខណៈគីមីស្រដៀងគ្នានឹងផេណុល ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានគេហៅថា ណាប៉ូផុល និង ផេណង់ត្រុល។ ឧទាហរណ៍៖



1-ណាប៉ូផុល  
( $\alpha$ -ណាប៉ូផុល)




2-ណាប៉ូផុល  
( $\beta$ -ណាប៉ូផុល)




9-ផេណង់ត្រុល

#### ការហៅឈ្មោះផេណុល


យើងបានសិក្សាការហៅឈ្មោះរបស់ផេណុលខ្លះក្នុងជំពូកទី១រួចហើយ។ សមាសធាតុមួយចំនួន ផេណុល ជាឈ្មោះមូលដ្ឋាន៖



4-ក្លរូផេណុល  
(p-ក្លរូផេណុល)




2-នីត្រូផេណុល  
(o-នីត្រូផេណុល)




3-ប្រូម៉ូផេណុល  
(m-ប្រូម៉ូផេណុល)


គេតែងហៅមេទីលផេណុលថា ក្រេសុល៖



2-មេទីលផេណុល  
(o-ក្រេសុល)




3-មេទីលផេណុល  
(m-ក្រេសុល)




4-មេទីលផេណុល  
(p-ក្រេសុល)


បង់សែនឌីអុលក៏មានឈ្មោះធម្មជាតិដែរ៖



1,2-បង់សែនឌីអុល  
(កាតេកុល)




1,3-បង់សែនឌីអុល  
(រ៉េសកស៊ីណុល)




1,4-បង់សែនឌីអុល  
(អ៊ីដ្រូគីណុន)

## ២. ផេណុលកើតក្នុងធម្មជាតិ


ផេណុល និងសមាសធាតុជាច្រើនកើតក្នុងធម្មជាតិ។ ទីរ៉ូស៊ីនជាអាស៊ីតអាមីនេដែលកើតក្នុងប្រូតេអ៊ីន។ មេទីលស៊ីលីស៊ីឡាតត្រូវបានរកឃើញក្នុងប្រេងរបស់ស្មៅមួយ (Wintergrass) អ៊ីដ្រូគីណុលមាននៅក្នុងប្រេងផ្កាកាំពូ និងទីម៉ូលមានក្នុងម្ជុម (thyme) ។




L-ទីរ៉ូស៊ីន



មេទីលសាលីស៊ីឡាត




អ៊ីដ្រូគីណុល



ទីមុល

អ៊ុយរុស៊ីស (urushiols) ជាភ្នាក់ងារធ្វើឱ្យពងស្បែកមានក្នុងរុក្ខជាតិពុលម្យ៉ាង។



Urushiols

$R = -(CH_2)_{14}CH_3,$


$-(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_5CH_3,$  or

$-(CH_2)_7CH=CHCH_2CH=CH(CH_2)_2CH_3,$  or


$-(CH_2)_7CH=CHCH_2CH=CHCH=CHCH_3$  or

$-(CH_2)_7CH=CHCH_2CH=CHCH_2CH=CH_2$

អេស្ត្រាឌីអុលជាអរម៉ូនភេទស្រីមួយ និងតេត្រាស៊ីគ្លីនជាអង់ទីប្យូទិចសំខាន់មួយ៖



Estradiol



Tetracyclines

(Y = Cl, Z = H; Aureomycin)

(Y = H, Z = OH; Terramycin)

## ៣. លក្ខណៈរូបរាងផេណុល

វត្ថុមានក្រុមអ៊ីដ្រូកស៊ីតក្នុងផេណុលមានន័យថា ផេណុលដូចអាល់កុល (ផ្នែក១១.២) ក្នុងទិដ្ឋភាពខ្លះ។ ឧទាហរណ៍ ពួកវាអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនមាំរឹងគ្នា ហើយមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងអ៊ីដ្រូកាបូដែលមានម៉ាសម៉ូលេគុលដូចគ្នា។ ផេណុល (bp=182°C) មានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងតូលុយអែន (bp=110.6°C) 70°C ទោះបី


សមាសធាតុទាំងពីរនេះមានម៉ាស់មូលេគុលដូចគ្នាក៏ដោយ។ ផេណុលក៏រលាយក្នុងទឹកងាយដែរ ដោយ សារតែលទ្ធភាពរបស់ពួកវាក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនម៉ាជាមួយទឹក។

## ៤. ការសំយោគផេណុល


### ៤.១ ការសំយោគក្នុងមជ្ឈិមពិសោធន៍

ការសំយោគក្នុងទីពិសោធន៍សំខាន់ជាងគេរបស់ផេណុលគឺប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសអំបិលអាណែនឌីអាសូញ៉ូម (ផ្នែក២០.៧.៥)។ វិធីសាស្ត្រនេះល្អណាស់ ហើយលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវការសម្រាប់ដំណាក់កាលប្រតិកម្មឌីអាសូតកម្ម និងដំណាក់កាលអ៊ីដ្រូលីសគឺងាយ (mild conditions)។ នេះមានន័យថា ក្រុមផ្សេងទៀតមានវត្តមានលើវង់មិនរងឥទ្ធិពលទេ។

ប្រតិកម្មទូទៅ៖



ឧទាហរណ៍៖




2-ប្រូម៉ូ-4-មេទីលផេណុល

(80-92%)

### ៤.២ ការសំយោគក្នុងឧស្សាហកម្ម

ផេណុលគឺជាសារធាតុគីមីមានសារសំខាន់ក្នុងឧស្សាហកម្ម។ វាជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតផលពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនធំ តាំងពីអាស៊ីតរីនូរហូតដល់រូបធាតុផ្លាស្ទិក។ ការផលិតផលផេណុលទូទាំងសកលលោក (ជួនកាលក្នុងឧស្សាហកម្មគេហៅវាថា អាស៊ីតកាបូលិច) មានប្រហែល៣លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ។ វិធីសាស្ត្រជាច្រើនត្រូវបានប្រើក្នុងការសំយោគផេណុលជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម។


1. អ៊ីដ្រូលីសក្លរ៉ូបង់សែន (ដំណើរការ Dow)៖ ក្នុងដំណើរការនេះ ក្លរ៉ូបង់សែនត្រូវបានដុតកម្ដៅនៅ 350°C (ក្រោមសំពាធខ្ពស់) ជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូអ៊ីដ្រុកស៊ីត។ ប្រតិកម្មនេះបង្កើតសូដ្យូអ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលរងអាស៊ីតកម្មបង្កើតផេណុល។ ចលនការប្រតិកម្មនេះប្រហែលទាក់ទងនឹងការបម្លែងបង់សែន ទៅជាបង់ស៊ីន (ផ្នែក២១.១១.១)។



2. ពីតុយមែនអ៊ីដ្រូពែរអុកស៊ីត៖ ដំណើរនេះបង្ហាញថាគីមីឧស្សាហកម្មនៃផេណុលល្អបំផុត។ វាជាវិធី សាស្ត្រមួយសម្រាប់បម្លែងសមាសធាតុសរីរាង្គតម្លៃថោកពីរ គឺបង់សែន និងប្រូប៉ែន ទៅជាសមាសធាតុមានតម្លៃថ្លៃជាងពីរគឺផេណុល និងសេតូន។ សមាសធាតុផ្សេងទៀតដែលត្រូវប្រើគឺមានតែអុកស៊ីសែនពីខ្យល់។


ផលិតកម្មផេណុលទូទាំងសកលលោលឥឡូវនេះអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រនេះ។  
ប្រតិកម្មអាល់គីលFriedel-Craft នៃបង់សែនជាមួយប្រូប៉ែនបង្កើតគុយមែន  
**ប្រតិកម្មទី១៖**

ការសំយោគចាប់ផ្តើមពី  
(អ៊ីសូប្រូពីលបង់សែន)៖




បន្ទាប់មកគុយមែនរងអុកស៊ីតកម្មជាគុយមែនអ៊ីដ្រូពែរអុកស៊ីត៖

**ប្រតិកម្មទី២៖**




ចុងក្រោយ នៅពេលគេដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតស៊ុលផួរិច 40% គុយមែនអ៊ីដ្រូពែរ អុកស៊ីតរងប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងអ៊ីដ្រូលីទិចដែលបង្កើតផេណុល និងសេតូន៖

**ប្រតិកម្មទី៣៖**




ចលនការប្រតិកម្មនីមួយៗក្នុងការសំយោគផេណុលពីបង់សែន និងប្រូប៉ែន ឆ្លងកាត់គុយមែន អ៊ីដ្រូពែរអុកស៊ីតត្រូវការការពិភាក្សាខ្លះៗ។ ប្រតិកម្មទី១ជាប្រតិកម្មយើងដឹងរួចហើយ។ កាចុងអ៊ីសូប្រូពីល ដែលបានបង្កើតដោយប្រតិកម្មប្រូប៉ែនជាមួយអាស៊ីត ( $H_3PO_4$ ) ធ្វើអាល់គីឡាតកម្មលើបង់សែនតាមប្រតិកម្មជំនួសអេឡិចត្រូផ្នែកហ្វ្រីដែល-ក្រាហ្វត៖




ប្រតិកម្មទី២ជាប្រតិកម្មខ្សែរ៉ាំរ៉ៃកាល់សេរី។ ធាតុផ្តើមរ៉ាំរ៉ៃកាល់សេរីដកយកអ៊ីដ្រូសែនបង់ស៊ីលិច របស់គុយមែន បង្កើតរ៉ាំរ៉ៃកាល់បង់ស៊ីលិចថ្នាក់ទី៣។ បន្ទាប់មក ប្រតិកម្មខ្សែមួយជាមួយអុកស៊ី សែន ដែលមានជាឌីរ៉ាំរ៉ៃកាល់ប៉ារ៉ាម៉ាញ៉េទិចក្នុងភាពគ្រឹះ បង្កើតគុយមែនអ៊ីដ្រូពែរអុកស៊ីត៖

**ផ្ដើមខ្សែ**


**ជំណាក់កាលទី១**



**ដំណាក់កាលដំបូង**  
**ដំណាក់កាលទី២**




**ដំណាក់កាលទី៣**



ប្រតិកម្មនេះបន្តតាមដំណាក់កាល២,៣,២,៣ និងរហូត។

ប្រតិកម្មទី៣ ជាប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងអ៊ីដ្រូលីទិច ដូចគ្នាទៅនឹងប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងកាបូកាចុងដែលយើងបានសិក្សាពីមុន។ ប៉ុន្តែ ក្នុងករណីនេះ បណ្តូរទីតាំងទាក់ទងនឹងការរំកិលក្រុមផេនីលទៅ កាន់អាតូមអុកស៊ីសែនកាបូកាចុង។ ក្រុមផេនីលមានទំនោររំកិលទៅកាន់មណ្ឌលកាចុងខ្លាំងជាងក្រុម មេទីល។ សមីការខាងក្រោមបង្ហាញដំណាក់កាលទាំងអស់នៃចលនការនេះ។



ដំណាក់កាលទី២ និងទី៣របស់ចលនការនេះអាចកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នា គឺ ការបាត់បង់ទឹក និងការរំកិលក្រុម  $C_6H_5$ -អាចកើតឡើងដំណាលគ្នា។

**៥. ប្រតិកម្មផេណុលជារេស៊ីត**



**៥.១ កម្លាំងផេណុលជារេស៊ីត**

ទោះបីផេណុលមានទម្រង់ស្រដៀងគ្នានឹងអាល់កុលក៏ដោយ ពួកវាជាអាស៊ីតខ្លាំងជាងអាល់កុល។ តម្លៃ  $pK_a$  របស់អាល់កុលស្ទើរតែទាំងអស់ស្ថិតក្នុងលំដាប់១៨។ ប៉ុន្តែ ដូចដែលយើងឃើញក្នុងតារាង២១.១ តម្លៃ  $pK_a$  របស់ផេណុលតូចជាង១១។

**តារាង២១.១ ថេរអាស៊ីតរបស់ផេណុល**

| ឈ្មោះ         | pKa<br>(ក្នុង H <sub>2</sub> O នៅ 25°C) | ឈ្មោះ                                    | pKa<br>(ក្នុង H <sub>2</sub> O នៅ 25°C) |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ផេណុល         | 9.89                                    | 3-នីត្រូផេណុល                            | 8.25                                    |
| 2-មេទីលផេណុល  | 10.20                                   | 4-នីត្រូផេណុល                            | 7.15                                    |
| 3-មេទីលផេណុល  | 10.01                                   | 2,4-ឌីនីត្រូផេណុល                        | 3.96                                    |
| 4-មេទីលផេណុល  | 10.17                                   | 2,4,6-ទ្រីនីត្រូផេណុល<br>(អាស៊ីតពីត្រិច) | 0.38                                    |
| 2-ក្លរូផេណុល  | 8.11                                    | 1-ណាប់ផុល                                | 9.31                                    |
| 3-ក្លរូផេណុល  | 8.80                                    | 2-ណាប់ផុល                                | 9.55                                    |
| 4-ក្លរូផេណុល  | 9.20                                    |                                          |                                         |
| 2-នីត្រូផេណុល | 7.17                                    |                                          |                                         |

ចូរប្រៀបធៀបសមាសធាតុស្រដៀងគ្នាពីរ គឺស៊ីក្លូអិចសាណុល និងផេណុល៖




ទោះបីជាផេណុលជាអាស៊ីតខ្សោយមួយ បើប្រៀបធៀបជាមួយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច ដូចជាអាស៊ីតអាសេទិច (pKa=4.76) ផេណុលជាអាស៊ីតខ្លាំងជាងស៊ីក្លូអិចសាណុលខ្លាំងណាស់។

លទ្ធផលពិសោធន៍ និងទ្រឹស្តីបានបង្ហាញថា កម្រិតអាស៊ីតធំរបស់ផេណុលបណ្តាលមកពីវាមានរបាយបន្ទុកអគ្គីសនី ដែលបណ្តាលឱ្យអុកស៊ីសែន -OH កាន់តែវិជ្ជមាន ដូចនេះប្រូតុងចងមិនសូវមាំទេ។ ជាឥទ្ធិពលវែងបង់សែនរបស់ផេណុលមានអំពើជាក្រុមទាញអេឡិចត្រុង បើប្រៀបធៀបជាមួយវ៉ង់ស៊ីក្លូអិចសានរបស់ស៊ីក្លូអិចសាណុល។

យើងអាចយល់អំពីឥទ្ធិពលនេះដោយកត់សម្គាល់ថា អាតូមកាបូនដែលចងជាមួយក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលក្នុងផេណុលមានអ៊ីប្រីត sp<sup>2</sup> ប៉ុន្តែអាតូមកាបូនក្នុងស៊ីក្លូអិចសានមានអ៊ីប្រីត sp<sup>3</sup>។ ដោយសារតែលក្ខណៈអរម៉ូនីកលំដាប់ s របស់វាច្រើនជាងអាតូមកាបូនអ៊ីប្រីត sp<sup>2</sup> មានកម្រិតអេឡិចត្រុវិជ្ជមានខ្លាំងជាងអាតូមកាបូនអ៊ីប្រីត sp<sup>3</sup> (ផ្នែក ៣.៨.១)។


កត្តាមួយទៀតដែលជះឥទ្ធិពលលើរបាយអេឡិចត្រុង អាចជារបាយបង្កើតអ៊ីប្រីតអសូណង់ផេណុលដែលបង្កើតដោយទម្រង់ 2-4 ។ កត់សម្គាល់ថា ឥទ្ធិពលនៃទម្រង់ទាំងនេះគឺឥទ្ធិពលទាញអេឡិចត្រុងពីក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីល និងធ្វើឱ្យអុកស៊ីសែនវិជ្ជមាន៖



ទម្រង់អសូណង់របស់ផេណុល

ការពន្យល់មួយទៀតអំពីកម្រិតអាស៊ីតខ្លាំងរបស់ផេណុលធៀបនឹងស៊ីក្លូអ៊ីចសាណុលអាចអាស្រ័យលើទម្រង់វេស្យូណង់ស្រដៀងគ្នារបស់អ៊ីយ៉ុងផេណុកស៊ីត។ មិនដូចទម្រង់វេស្យូណង់របស់ផេណុល 2-4 ទម្រង់វេស្យូណង់របស់អ៊ីយ៉ុងផេណុកស៊ីតមិនទាក់ទងនឹងការព្រែកបន្ទុកទេ។ យោងតាមទ្រឹស្តីវេស្យូណង់ ទម្រង់ទាំង នេះអាចធ្វើឱ្យអ៊ីយ៉ុងផេណុកស៊ីតមានស្ថេរភាពជាងទម្រង់ 2-4 របស់ផេណុល (តាមពិត គ្មានទម្រង់វេស្យូណង់ ដែលអាចសរសេរសម្រាប់ស៊ីក្លូអ៊ីចសាណុល ឬអ៊ីយ៉ុងរបស់វាទេ)។ បន្ទាប់នៃអ៊ីយ៉ុងផេណុកស៊ីត (បាសឆ្លាស់) ធំជាងផេណុល (អាស៊ីត) មានឥទ្ធិពលបង្កើនកម្លាំងអាស៊ីតមួយ។

**លំហាត់អនុវត្តន៍ ២១.១** ៖ បើសិនជាយើងមើលលើតារាង ២១.១ យើងឃើញថាមេទីលផេណុល (ក្រេសុល) ជាអាស៊ីតខ្សោយជាងផេណុល។ ឧទាហរណ៍៖




លក្ខណៈនេះកំណត់លក្ខណៈថាផេណុលចង់ក្រុមឱ្យអេឡិចត្រុង។ ចូរពន្យល់។

**លំហាត់អនុវត្តន៍ ២១.២** ៖ បើសិនជាយើងមើលតារាង ២១.១ យើងឃើញថាផេណុលមានក្រុមទាញអេឡិចត្រុង (Cl- ឬ O<sub>2</sub>N-) ភ្ជាប់លើវ៉ង់បង់សែនជាអាស៊ីតខ្លាំងជាងខ្លួនវា។ ចូរពន្យល់ការសង្កេតនេះដោយអាស្រ័យលើផលអាំងឌុចទីវ និងផលវេស្យូណង់។ ចម្លើយរបស់អ្នកក៏អាចពន្យល់អំពីឥទ្ធិពលបង្កើនភាពអាស៊ីតរបស់ក្រុមនីត្រូដែលជាឥទ្ធិពលមួយ ដែលធ្វើឱ្យ 2,4,6-ទ្រីនីត្រូផេណុល (អាស៊ីតពីត្រិច) មានកម្រិតអាស៊ីត (pKa=0.38) ខ្លាំងជាងអាស៊ីតអាសេទិច (pKa=4.76)។


## ៥.២ ការព្រែកភាពខុសគ្នា និងព្រែកផេណុលឆ្លុះពីអាល់កុល និងអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច

ដោយសារតែផេណុលជាអាស៊ីតខ្លាំងជាងទឹក ប្រតិកម្មខាងក្រោមមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសូដ្យូមផេណុកស៊ីតរលាយក្នុងទឹក៖



(រលាយតិចក្នុងទឹក)

ប្រតិកម្មនៃ 1-អ៊ីចសាណុលជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតមិនកើតឡើងទេ ពីព្រោះ 1-អ៊ីចសាណុល ជាអាស៊ីតខ្សោយជាងទឹក៖



(រលាយតិចក្នុងទឹក)

ការពិតដែលផេណុលរលាយក្នុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត តែគ្រប់អាល់កុលដែលអាតូមកាបូន៦ ឬច្រើនជាង មិនរលាយក្នុងទឹក ផ្តល់ឱ្យយើងជាមធ្យោបាយងាយស្រួលក្នុងការសម្គាល់ និងព្រែកផេណុលចេញពី អាល់កុលស្ទើរ




តែទាំងអស់ ( អាល់ដែលមានអាតូមកាបូន៥ ឬតិចជាង រលាយល្អណាស់ក្នុងទឹកមិនកំណត់ ដូចនេះពួកវារលាយក្នុងសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត ទោះបីពួកវាមិនត្រូវបានបម្លែងទៅជាសូដ្យូមអាល់កុកស៊ីតក្នុងបរិមាណសមស្របក៏ដោយ ) ។

ប៉ុន្តែស្ទើរតែគ្រប់ផេណុលមិនរលាយក្នុងសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត (  $\text{NaHCO}_3$  ) ប៉ុន្តែអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិចរលាយ។ ដូចនេះសូលុយស្យុង  $\text{NaHCO}_3$  ផ្តល់ជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់ញែកភាពខុសគ្នា និងញែកផេណុលស្ទើរតែទាំងអស់ចេញពីអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច។

**លំហាត់អនុវត្ត២១.៣** ៖ អ្នកទទួលបានល្បាយមួយនៃ 4-មេទីលផេណុល, អាស៊ីតបង់សូអ៊ិច និងតូលុយអែនពីគ្រូមន្ទីរពិសោធន៍។ សន្មត់ថា អ្នកមានអាស៊ីត បាស និងធាតុរំលាយគ្រប់គ្រាន់ ចូរពន្យល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចញែកល្បាយទាំងនេះដោយប្រើកម្រិតរលាយខុសគ្នានៃភាគផ្សំរបស់ល្បាយ។

### ៦. ប្រតិកម្មផ្សេងទៀតរបស់ក្រុម O-H របស់ផេណុល


ផេណុលមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច និងក្លរូបង្កើតអេស្តែរ។ ប្រតិកម្មទាំងនេះស្រដៀង គ្នាទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់អាល់កុលណាស់ ( ផ្នែក១៧.៧ ) ។




### 📌 ផេណុលក្នុងការសំយោគ Williamson

ផេណុលត្រូវបានបម្លែងជាអេទែរតាមការសំយោគ Williamson ( ផ្នែក១១.១១២ ) ។ ដោយសារតែ ផេណុលជាអាស៊ីតខ្លាំងជាងអាល់កុល ពួកវាអាចបម្លែងជាសូដ្យូមផេណុកស៊ីតដោយប្រើសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត ( មិនមែនសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត ឬលោហៈសូដ្យូម ដែលជាអ្នកកំណត់ត្រូវការដើម្បីបម្លែងអាល់កុលទៅជាអ៊ីយ៉ុង អាល់កុកស៊ីត ) ។

**ប្រតិកម្មទូទៅ៖**



**ឧទាហរណ៍៖**




អាស៊ីសុល ( មេតុកស៊ីបង់សែន )




## ៧. បណ្តាច់អាល់គីលអេរីលអេនេរ

យើងបានសិក្សាក្នុងផ្នែក១១.១១ក រួចហើយថា នៅពេលឌីអាល់គីលអេនេរត្រូវបានដុតកម្ដៅជាមួយ HBr ឬ HI ខាបលើស អេនេរត្រូវបានផ្តាច់ ហើយអាល់គីលអាឡូសែនត្រូវបានបង្កើតពីក្រុមអាល់គីលទាំងពីរ៖




នៅពេលអាល់គីលអេនេរមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតខ្លាំង ដូចជា HI និង HBr ប្រតិកម្មបង្កើត អាល់គីលអាឡូសែនមួយ និងផេណុល។ ផេណុលមិនរងប្រតិកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតអាស៊ីតអាឡូសែនទេ ពីព្រោះសម្ព័ន្ធកាបូន-អុកស៊ីសែនរបស់ផេណុលជាសម្ព័ន្ធមាំ ហើយដោយសារតែកាចុងផេនីលមិនងាយកើតទេ។

**ប្រតិកម្មទូទៅ៖**




**ឧទាហរណ៍៖**



## ៨. ប្រតិកម្មនៃវ៉ង់បង់សែនរបស់ផេណុល


### ៨.១ ប្រតិកម្មប្រូមកម្ម

ក្រុមអ៊ីដ្រុកស៊ីលជាប្រភេទសកម្មខ្លាំងមួយ ហើយជាក្រុមដៅទិសអរតូ-ប៉ារ៉ាមួយ ក្នុងប្រតិកម្មជំនួស អេឡិចត្រូភីលអាវ៉ូម៉ាទិច។ ផេណុលមានប្រតិកម្មជាមួយប្រូមក្នុងសូលុយស្យុងបង្កើត 2,4,6-ទ្រីប្រូម៉ូផេណុល ក្នុងបរិមាណខ្ពស់។ ចូរកត់សម្គាល់ថា គេមិនត្រូវការអាស៊ីតឡើយសម្រាប់ធ្វើប្រតិកម្មប្រូមកម្មលើវ៉ង់សកម្មខ្លាំង បែបនេះទេ៖



2,4,6-ទ្រីប្រូម៉ូផេណុល (~100%)

ប្រតិកម្មម៉ូណូប្រូមកម្មអាចធ្វើឡើងបានដោយធ្វើប្រតិកម្មនេះក្នុងកាបូនឌីស៊ីលផ្ទុកនៅសីតុណ្ហភាពទាបជាលក្ខខណ្ឌដែលអាចកាត់បន្ថយសកម្មភាពអេឡិចត្រូភីលរបស់ប្រូម។ ផលិតផលឧត្តមភាពគឺអ៊ីសូមេរ៉ាម៉ា៖




p-ប្រូម៉ូផេណុល


(80 – 84%)

### ៨.២ ប្រតិកម្មនីត្រាតកម្ម

ផេណុលមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតនីទ្រិចរាវបង្កើតល្បាយ o- និង p-នីត្រូផេណុល៖




ទោះបីជាទិន្នផលទាបក៏ដោយ (ដោយសារអុកស៊ីតកម្មរឹង) អ៊ីសូមេរអរតូ និងប៉ារ៉ាអាចត្រូវបានញែកពីគ្នាដោយបំណិតចំហាយ។ o-នីត្រូផេណុលជាអ៊ីសូមេរហើរជាង ពីព្រោះការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន (មើលទម្រង់ខាងក្រោម) ជាការធ្វើតាមបែបអ៊ិនត្រាម៉ូលេគុល (ខាងក្នុងម៉ូលេគុល)។ p-នីត្រូផេណុលមានកម្រិត រំហើរតិចជាង ពីព្រោះការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអន្តរម៉ូលេគុលរបស់វាបណ្តាលឱ្យមានការផ្គុំគ្នារវាងម៉ូលេគុលរបស់វា។ ដូចនេះ o-នីត្រូផេណុលក្លាយជាចំហាយមុន ហើយ p-នីត្រូផេណុលនៅសល់ក្នុងកែវបំណិត។



o-នីត្រូផេណុល

(ហើរជាងដោយសារការចង  
សម្ព័ន្ធ អ៊ីដ្រូសែនអ៊ិនត្រាម៉ូលេ)




p-នីត្រូផេណុល

(ហើរតិចជាងដោយសារការចង  
សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអន្តរម៉ូលេគុល)

### ៨.៣ ប្រតិកម្មស៊ីលីកូនកម្ម


ផេណុលមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតស៊ីលីកូនិចខាប់បង្កើតផលិតផលអរតូស៊ីលីផូណាតជាផលិតផល ឧត្តមភាព បើសិនប្រតិកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសីតុណ្ហភាព 25°C ហើយទទួលបានផលិតផលប៉ារ៉ាស៊ីលីផូណាត នៅ 100°C។ នេះជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការត្រួតពិនិត្យស៊ីនេទិច និងទែម៉ូឌីណាមិចរបស់ប្រតិកម្មមួយ (ផ្នែក ១៣.១០.១) ៖





ផលិតផលឧត្តមភាពក្រោម  
ការត្រួតពិនិត្យស៊ីនេទិច

ផលិតផលឧត្តមភាពក្រោម  
ការត្រួតពិនិត្យទែម៉ូឌីណាមិច


លំហាត់អនុវត្តន៍ ២១.៤ ៖ ចូរឱ្យផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖






### ៩. ប្រតិកម្មបណ្តុរទីតាំង Claisen


ការដុតកម្ដៅអាលីលផេនីលអេទែររហូតដល់សីតុណ្ហភាព  $200^{\circ}\text{C}$  មានឥទ្ធិពលដល់ប្រតិកម្មអ៊ីនត្រា ម៉ូលេគុលមួយ ហៅថាប្រតិកម្មបណ្តុរទីតាំង Claisen។ ផលិតផលនៃប្រតិកម្មបណ្តុរទីតាំងនេះគឺ o-អាលីលផេណុល៖



ប្រតិកម្មនេះកើតឡើងដោយឆ្លងកាត់បណ្តុរទីតាំងតន្រ្តី (concerted rearrangement) ដែលសម្ព័ន្ធចន្លោះ C3 របស់ក្រុមអាលីល និងទីតាំងអរតូរបស់វ៉ង់បង់សែនដែលកើតក្នុងពេលដំណាលគ្នាដែលសម្ព័ន្ធកាបូន-អុកស៊ីសែនរបស់ផេនីលអេទែរដាច់។ ផលិតផលប្រតិកម្មបណ្តុរទីតាំងនេះជាអង្គធាតុកណ្តាលគ្មាន ស្ថេរភាពមួយ ដូចអង្គធាតុកណ្តាលគ្មានស្ថេរភាពក្នុងប្រតិកម្ម Kolbe (ផ្នែក ២១.៨) រងការរំកិលប្រូតុងមួយ (តូតូមែរកម្មសេត-អែណុលមួយ មើលផ្នែក ១៨.២) ដែលបង្កើតជា o-អាលីលផេណុល៖




មានតែ C3 របស់ក្រុមអាលីលដែលអាចចងសម្ព័ន្ធជាមួយវ៉ង់បង់សែនត្រូវបានបង្ហាញដោយធ្វើបណ្តុរទីតាំងជាមួយអាលីលផេនីលដែលមាន  $^{14}\text{C}$  លើ C3។ ផលិតផលទាំងអស់របស់ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានដាក់ ស្លាកអាតូមកាបូនលើវ៉ង់៖




**លំហាត់អនុវត្ត ២១.៥** ៖ ការពិសោធន៍ស្លាកដែលទើបតែបានបរិយាយខាងលើមិនបានបង្ហាញចលនការមួយដែលអាលីលផេនីលអេទែរបំបែកបង្កើតកាចុងអាលីលមួយ (ផ្នែក ១៣.៤) និងអ៊ីយ៉ុងផេណុកស៊ីតមួយ ដែលបន្ទាប់មករងប្រតិកម្មអាលីលកម្ម Friedel-Crafts (ផ្នែក ១៥.៦) បង្កើត o-អាលីលផេណុល។ ចូរពន្យល់ពីរបៀបចលនការនេះអាចត្រូវបានរាប់ចូលដោយបង្ហាញផលិតផលមួយ ឬច្រើន ដែលទទួលបានពីវា។

លំហាត់អនុវត្ត២១.៦ ៖ តើសមាសធាតុ A និង B ក្នុងលំដាប់ប្រតិកម្មខាងក្រោម?




ប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងClaisenក៏បានកើតឡើង នៅពេលអាស៊ីលវីនីលអេទ្រីត្រូវបានដុតកម្ដៅ។  
ឧទាហរណ៍៖



អាស៊ីលវីនីលអេទ្រីត អន្តរភាពអារ៉ូម៉ាទិច 4-ប៉ង់តែណាល់

អន្តរភាពរបស់ប្រតិកម្មបណ្តូរទីតាំងClaisenទាក់ទងនឹងវដ្តមួយមានអេឡិចត្រុង៦។ មាន៦អេឡិចត្រុង ឆ្លើយតប ឆ្លើយ ថា អន្តរភាពមានលក្ខណៈអារ៉ូម៉ាទិច (ផ្នែក១៤.៧)។ ប្រតិកម្មផ្សេងទៀតនៃប្រភេទទូទៅមួយត្រូវបានគេ ស្គាល់ ហើយត្រូវបានគេហៅថាប្រតិកម្មបរិវដ្ត (pericyclic reactions)។ ប្រតិកម្មបរិវដ្តស្រដៀងគ្នាមួយទៀត ជាប្រតិកម្ម បណ្តូរទីតាំងCope បង្ហាញខាងក្រោម៖



3,3-ឌីមេទីល-1,5-អិបសាឌីអែន អន្តរភាពអារ៉ូម៉ាទិច 2-មេទីល-2,6-អិបសាឌីអែន


ប្រតិកម្ម Diels-Alder (ផ្នែក១៣.១១) ក៏ជាប្រតិកម្មបរិវដ្តមួយដែរ។ អន្តរភាពរបស់ប្រតិកម្ម Diels-Alder ក៏ទាក់ទងនឹង៦អេឡិចត្រុងដែរ៖



អន្តរភាពអារ៉ូម៉ាទិច

## ១០. គីណូន

អុកស៊ីតកម្មនៃអ៊ីដ្រូគីណូន (1,4-ប៉ង់សែនឌីអុល) បង្កើតសមាសធាតុមួយត្រូវបានគេស្គាល់ថា p-ប៉ង់សូគីណូន។ ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មនេះអាចធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មខ្សោយ ហើយជាសរុបប្រតិកម្ម អុកស៊ីតកម្មនេះទាក់ទងនឹងការដកទ្វេតាអេឡិចត្រុង(2e) និងប្រូតុងពីអ៊ីដ្រូគីណូន (មធ្យោបាយ មួយទៀត ដើម្បីបង្ហាញប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មនេះ គឺនៅពេលការបាត់បង់ម៉ូលេគុលអ៊ីដ្រូសែនមួយH:Hធ្វើឱ្យវាង ប្រតិកម្មដេអ៊ី ដ្រូសែនកម្មមួយ)។




ប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មអាចត្រលប់ទៅវិញទៅមក។ p-បង់សូគីណូនរងអ៊ុកស៊ីដងាយដោយភ្នាក់ងារអ៊ុកស៊ីដខ្សោយទៅជាអ៊ីដ្រូគីណូន។


ធម្មជាតិប្រើប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម-អ៊ុកស៊ីដអាចត្រលប់ទៅវិញទៅមកនេះច្រើនណាស់ ដើម្បីដឹកនាំអេឡិចត្រុងមួយគូពីសមាសធាតុមួយទៅសមាសធាតុមួយទៀតក្នុងប្រតិកម្មកាតាលីករអង់ស៊ីមមួយ។

សមាសធាតុសំខាន់ក្នុងទិដ្ឋភាពនេះជាសមាសធាតុដែលហៅថាអ៊ុយប៊ីគីណូន (ubiquinones) (មាននៅក្នុងភ្នាសមីតូកុងឌ្រីរបស់កោសិកាការវិសទាំងអស់)។ អ៊ុយប៊ីគីណូនក៏ត្រូវបានគេហៅថាកូអង់ស៊ីម Q (CoQ)ផងដែរ។

អ៊ុយប៊ីគីណូនជាខ្សែអ៊ីសូប្រេនវែងមួយ។ ឯកតាអ៊ីសូប្រេន១០មានវត្តមាននៅក្នុងអ៊ុយប៊ីគីណូនរបស់មនុស្ស។ ផ្នែកនេះប៉ូលែខ្លាំង វាធ្វើអ៊ុយប៊ីគីណូនរលាយក្នុងប៊ីស្រទាប់អ៊ីដ្រូផូបរបស់ភ្នាសក្នុងមីតូកុងឌ្រី។ កម្រិតរលាយក្នុងបរិស្ថានភ្នាសនេះជួយឱ្យមានការបន្សាយពីភាគផ្សំមួយនៃខ្សែដឹកនាំអេឡិចត្រុង ទៅភាគផ្សំមួយទៀត។ ក្នុងខ្សែដឹកនាំអេឡិចត្រុង គួរដឹងអ៊ុយប៊ីគីណូនគឺទទួលអេឡិចត្រុងពីរ និងអាតូមអ៊ីដ្រូសែនពីរក្លាយជាអ៊ីដ្រូគីណូនមួយ។ អ៊ីដ្រូគីណូនដែលកើតជីកនាំ២អេឡិចត្រុងទៅកាន់អ្នកទទួលបន្ទាប់ក្នុងខ្សែនេះ៖




វីតាមីនK<sub>1</sub>ជាអាហារសំខាន់មួយដែលជាឧបករណ៍ធានាឱ្យមានលក្ខណៈកំណករបស់ឈាម ដែលមានទម្រង់1,4-ណាប់ផ្ទូគីណូន៖



លំហាត់អនុវត្ត២១.៧៖ p-បង់សូគីណូន និង 1,4-ណាប់ផ្ទូគីណូនមានអំពើជាឌីអែណូក្លីលក្នុងប្រតិកម្មDiels-Alder។ ចូរឱ្យទម្រង់របស់ផលិតផលនៃប្រតិកម្មខាងក្រោម៖

- a. 1,4-ណាប់ផ្ទូគីណូន + ប៊ុយតាឌីអែន
- b. p-បង់សូគីណូន + ស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែន


លំហាត់អនុវត្ត២១.៨៖ ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម៖




## ១១. អារីលអាឡុយមីន និងប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីលអាវ៉ូម៉ាទិច

- អារីលអាឡុយមីនធម្មតា ដូចជាវីនីលអាឡុយមីន (ផ្នែក៦.១៤ក) មិនមានប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីល ក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលអាចឱ្យប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីលជាមួយអាល់គីលអាឡុយមីនធូរៗ។

ឧទាហរណ៍ ក្លរូបង់សែនអាចត្រូវបានដុតកម្ដៅឱ្យពុះជាមួយសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតក្នុងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃដោយ មិនបង្កើតបរិមាណសម្គាល់បាននៃផលិតផល(ឬសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីត)។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ នៅពេលវីនីលត្រូវបាន ដុតកម្ដៅជាមួយសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីត គ្មានការជំនួសកើតឡើងទេ៖




យើងអាចយល់អំពីកង្វះប្រតិកម្មភាពនេះអាស្រ័យលើមូលដ្ឋានជាច្រើន។ រីឯបង់សែនរបស់អារីលរាវាងមិន ឱ្យការប្រយុទ្ធពីផ្នែកខាងក្រោយក្នុងប្រតិកម្ម  $\text{S}_{\text{N}}2$ ៖



កាចុងផែនីលមិនមានស្ថេរភាពទេ ដូចនេះប្រតិកម្ម  $\text{S}_{\text{N}}1$  មិនកើតឡើងទេ។ សម្ព័ន្ធកាបូន-អាឡុយមីនរបស់ អារីល (ឬវីនីល) អាឡុយមីនខ្លីជាង និងមាំជាងសម្ព័ន្ធរបស់អាល់គីល អាលីល និងបង់ស៊ីលអាឡុយមីន។ សម្ព័ន្ធ កាបូន-អាឡុយមីនមាំជាងមានន័យថាការដាច់សម្ព័ន្ធតាមចលនការ  $\text{S}_{\text{N}}1$  និង  $\text{S}_{\text{N}}2$  ត្រូវការថាមពលបន្ថែម ទៀត។

ឥទ្ធិពលពីរធ្វើឱ្យសម្ព័ន្ធកាបូន-អាឡុយមីនរបស់អារីល និងវីនីលអាឡុយមីនខ្លីជាង និងមាំជាងគឺ៖ (១) កាបូន របស់អាឡុយមីនទាំងពីរប្រភេទកាបូនអ៊ីប្រីត  $\text{sp}^2$  ដូចនេះ អេឡិចត្រុងរបស់អរីតាល់កាបូននៅជិតណ្វៃយ៉ូជាង អេឡិចត្រុងរបស់កាបូន  $\text{sp}^3$ ។ (២) វេស្តណង់នៃប្រភេទដែលបានបង្ហាញខាងក្រោមពង្រឹងសម្ព័ន្ធកាបូន-អាឡុយមីន ដោយឱ្យមានលក្ខណៈសម្ព័ន្ធពីរជាន់៖



និយាយដូចខាងលើនេះ យើងនឹងឃើញក្នុងផ្នែកពីរបន្ទាប់ថា អារីលអាឡុយមីនអាចក្លាយជាមានប្រតិកម្ម ភាពចំពោះនុយក្លេអូភីលបើសិនពួកវាចងក្រុមជួស ឬនៅពេលយើងឱ្យពួកវាមានប្រតិកម្មក្រោមលក្ខខណ្ឌពិសេស។


### ១១.១ ប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីលអាវ៉ូម៉ាទិចដោយមូក-បណ្តាច់៖ ចលនការ $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$

ប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីលរបស់អារីលអាឡុយមីនមិនកើតឡើងទេ នៅពេលកត្តាអេឡិចត្រុងធ្វើឱ្យកាបូន អារីលចង់សម្ព័ន្ធជាមួយអាឡុយមីនអាចទទួលការប្រយុទ្ធនុយក្លេអូភីល។

- ប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូភីលអាវ៉ូម៉ាទិចអាចកើតឡើងនៅពេលក្រុមទាញអេឡិចត្រុងខ្លាំងស្ថិតនៅលើទី តាំងអរតូ ឬប៉ារ៉ាធៀបទៅនឹងទីតាំងអាឡុយមីន៖







ស្ថេរភាពពិសេស


(បន្ទុកអវិជ្ជមានទាំងពីរស្ថិតលើអាតូមអុកស៊ីសែន)

លំហាត់អនុវត្ត៍២១.៩៖ 1-ក្លរូអ័រ-2,4-ឌីនីត្រូបង់សែនមានប្រតិកម្មភាពខ្លាំងចំពោះប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូក្លីលតាមចលនការ  $S_NAr$  ។ តើផលិតផលណាដែលកកើតនៅពេល 1-ក្លរូអ័រ-2,4-ឌីនីត្រូបង់សែនមាន ប្រតិកម្មជាមួយសមាសធាតុខាងក្រោម៖

- a. EtONa
- b.  $NH_3$
- c.  $C_6H_5NH_2$
- d. EtSNa


**១១.២ ប្រតិកម្មជំនួសនុយក្លេអូក្លីលអ័រ៉ូម៉ាទិចតាមចលនការប្រតិកម្មបណ្តាច់-បូក៖ បង់ស៊ីន**

ទោះបីជាអាវីលអាឡូសែនដូចជាក្លរូបង់សែន និងប្រូម៉ូបង់សែនមិនមានប្រតិកម្មជាមួយស្ទើរគ្រប់នុយក្លេអូក្លីលក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតាក៏ដោយ ពួកវាមានប្រតិកម្មក្រោមលក្ខខណ្ឌបង្ខំខ្លាំងៗ ។ ក្លរូបង់សែនអាចត្រូវបានបម្លែងជាផេណុលដោយការដុតកម្ដៅវាជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូអ៊ីដ្រូកស៊ីតក្នុងអែក់ទ័រសំពាធខ្ពស់មួយនៅ  $350^{\circ}C$  (មើលផ្នែក២១.៤.២) ៖



ផេណុល

ប្រូម៉ូបង់សែនមានប្រតិកម្មជាមួយបានខ្លាំងបំផុត ដូចជា  $NH_2$  ក្នុងអាម៉ូញាក់រ៉ាវ៖



អានីលីន


- ប្រតិកម្មទាំងនេះកើតឡើងតាមចលនការប្រតិកម្មបូកបណ្តាច់ដែលទាក់ទងនឹងការកកើតអង្គធាតុកណ្តាលមិនមានស្ថេរភាព ហៅថា **បង់ស៊ីន (ដេអ៊ីដ្រូបង់សែន)** ។

យើងអាចបង្ហាញចលនការប្រតិកម្មនេះដោយប្រតិកម្មនៃប្រូម៉ូបង់សែន និងអ៊ីយ៉ុងអាមីដ្យូ ។ ក្នុងដំណាក់កាលទី១ (មើលចលនការខាងក្រោម) អ៊ីយ៉ុងអាមីដ្យូផ្ដើមប្រតិកម្មបណ្តាច់មួយដោយដកប្រូតុងអរតូមួយ ពីព្រោះវាមានភាពអាស៊ីតខ្លាំងជាងគេ។ បន្ទុកអវិជ្ជមានដែលកកើតលើកាបូនអរតូត្រូវបានបន្ស៊ប់ដោយផល អាំងឌុចទីវរបស់ប្រូម។ បន្ទាប់មកអាញ៉ុងបោះបង់អ៊ីយ៉ុងប្រូម។ ប្រតិកម្មបណ្តាច់នេះបង្កើតបង់ស៊ីនប្រតិកម្មភាព និងមិនមានស្ថេរភាព។




បន្ទាប់មក បង់ស៊ីនមានប្រតិកម្មជាមួយនុយក្លេអូហ្វីលីណាមួយដែលមានវត្តមាន (ក្នុងករណីនេះ អ៊ីយ៉ុងអាមីដូមួយ) ដោយប្រតិកម្មបូកពីរដំណាក់កាលបង្កើតអានីលីន។

➢ ចលនការប្រតិកម្មបណ្តាច់-បូកបង់ស៊ីន



យើងអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈប្រតិកម្មភាព និងគ្មានស្ថេរភាពរបស់បង់ស៊ីន បើសិនយើងពិចារណាលើទិដ្ឋភាពនៃទម្រង់អេឡិចត្រុងរបស់វា។




រូប២១.១ (a) គំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចគណនារបស់បង់ស៊ីន បង្ហាញបន្ទុកអវិជ្ជមានខ្ពស់ (ពណ៌ក្រហម) លើជ្រុងរបស់វង់ ត្រូវទៅនឹងដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងពីសម្ព័ន្ធន៍ក្នុងបង់ស៊ីន។  
(b) តំណាងអរីតាល់ម៉ូលេគុលជាមួយសម្ព័ន្ធន៍ក្នុងបង់ស៊ីន។

គំរូប៉ូតង់ស្យែលអេឡិចត្រូស្តាទិចរបស់បង់ស៊ីនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូប២១.១(a) បង្ហាញបន្ទុកអវិជ្ជមានធំ នៅលើជ្រុងរបស់វង់ ត្រូវគ្នានឹងដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុងពីសម្ព័ន្ធន៍។ រូប២១.២ បង្ហាញតំណាង អរីតាល់រួមនឹង សម្ព័ន្ធន៍។ យើងអាចឃើញពីគំរូនេះថា អរីតាល់របស់សម្ព័ន្ធន៍ ក្នុងបង់ស៊ីនសណ្តែកក្នុងប្លង់ដូចវង់កែងទៅនឹងអ័ក្ស របស់ប្រព័ន្ធអ្វាម៉ាទិច។ យើងក៏អាចឃើញក្នុងរូប២១.១ថា ដោយសារតែវង់កាបូនមិនមែនជាធាតុកោណនិយ័ត មួយដូចក្នុងបង់សែន មានលំដាប់កម្រិតទម្រង់បង់ស៊ីននេះ។ ចម្ងាយរវាងកាបូននៃសម្ព័ន្ធន៍ក្នុងបង់ស៊ីនខ្លីជាងចម្ងាយ រវាងកាបូនផ្សេងទៀត ហើយមុំសម្ព័ន្ធរបស់វង់ត្រូវបានកែប្រែមិនដូចមុំដើមទេ។ លទ្ធផល គឺថាបង់ស៊ីនមិនមាន ស្ថេរភាព និងមានប្រតិកម្មភាពខ្ពស់។ ជាយថាហេតុ គេមិនអាចព្រែកបង់ស៊ីនជាសមាសធាតុសុទ្ធមួយទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវ បានចាប់សម្គាល់ និងបង្ស៊ាងក្នុងមធ្យោបាយផ្សេងៗ។


តើមានអ្វីជាកត្តាបញ្ជាក់ថាចលនការប្រតិកម្មបណ្តាច់-បូកទាក់ទងនឹងបង់ស៊ីនក្នុងប្រតិកម្មជំនួស នុយ ក្លេអូហ្វីលអ្វីម៉ាទិចខ្លះ?

ភស្តុតាងទី១ជាការពិសោធន៍របស់ J. D. Roberts (ផ្នែក៩.១០) ក្នុងឆ្នាំ៩៥៣ ការពិសោធន៍មួយដែលជា ចំណាប់ផ្តើមនៃការសិក្សាអំពីបង់ស៊ីន។ Roberts បានបង្ហាញថា នៅពេលក្លរូបង់ស៊ីនស្លាក<sup>14</sup>C (C\*) ត្រូវបានដាក់ ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីយ៉ុងអាមីដូក្នុងអាម៉ូញាក់វា អានីលីនដែលកើតមានបំណែងចែកស្លាកស្មើគ្នារវាងទីតាំង


1 និង 2។ លទ្ធផលនេះគាំទ្រដោយចលនការប្រតិកម្មបណ្តាច់-បូកខាងក្រោម ប៉ុន្តែជាការពិត មិនមែនគាំទ្រទាំងអស់ដោយការជំនួសផ្ទាល់ ឬដោយចលនការប្រតិកម្មបណ្តាច់-បូកទេ (ហេតុអ្វី?)។



ការបង្ហាញមួយទៀតមាននៅក្នុងប្រតិកម្មខាងក្រោម។ នៅពេលស្រលាយអត្ថ1 ត្រូវបានដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូមអាមីដ ផលិតផលសរីរាង្គតែមួយដែលទទួលបានគឺ m-(ទ្រីក្លុយអ័រ៉ូមេទីល)អាមីនីល៖



បន្ទាប់មកបង់ស៊ីនបូកអ៊ីយ៉ុងអាមីដតាមផ្លូវដែលបង្កើតកាបាញ៉ុងស្ថេរភាព3 មិនមែនកាបាញ៉ុងគ្មានស្ថេរភាព4ទេ។




**កាបាញ៉ុងស្ថេរភាព (បន្ទុកអវិជ្ជមាន  
នៅជិតក្រុម ទ្រីក្លុយអ័រ៉ូមេទីលកម្រិត  
អេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខ្ពស់**

បន្ទាប់ពីកាបាញ៉ុង3ទទួលប្រូតុងមួយពីអាម៉ូញាក់បង្កើត m-(ទ្រីក្លុយអ័រ៉ូមេទីល)អាមីនីល។

កាបាញ៉ុង3មានស្ថេរភាពជាង4 ពីព្រោះអាតូមកាបូនដែលមានបន្ទុកអវិជ្ជមាននៅជិតក្រុមទ្រីក្លុយអ័រ៉ូមេទីលទាញអេឡិចត្រុងខ្លាំង។ ក្រុមទ្រីក្លុយអ័រ៉ូមេទីលបន្ស៊ីបបន្ទុកអវិជ្ជមានតាមផលអាំងឌុចទីវ (ផលរេសូណង់មិនមានសារៈសំខាន់ទេពេលនេះ ពីព្រោះអរីប៊ីតាល់  $sp^2$  ដែលមានទ្វេតាអេឡិចត្រុងមិនគ្របដណ្តប់ជាមួយអរីប៊ីតាល់  $\pi$  របស់ប្រព័ន្ធអារ៉ូម៉ាទិច)។


អង្គធាតុកណ្តាលបង់ស៊ីនត្រូវបានបង្កើតតាមរយៈការប្រើប្រតិកម្មDiels-Alder។ វិធីសាស្ត្រងាយដើម្បីបង្កើតបង់ស៊ីនជាប្រតិកម្មឌីអាសូតកម្មនៃអាស៊ីតអង់ត្រានីលិច (អាស៊ីត2-អាមីណូបង់សូអ៊ិច) អនុលោមន៍ ដោយប្រតិកម្មបណ្តាច់នៃ  $\text{CO}_2$  និង  $\text{N}_2$ ៖



**អាស៊ីតអង់ត្រានីលិច**

**បង់ស៊ីន**


ក្នុងការអនុវត្តន៍គីមីវិទ្យាម្ចាស់-ភ្ញៀវ (គឺជាការសិក្សាដែលឧបត្ថម្ភដោយ D. Cram ដោយប្រើរង្វាន់ណូបែលផ្នែកគីមីក្នុងឆ្នាំ១៩៨៧របស់គាត់) បង់ស៊ីនខ្លួនវាត្រូវបានបង្កើតនៅសីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំងខាងក្នុងម៉ូលេគុលមួយហៅថា អេមីកាសេរ៉ាន់ (hemicarcarand)។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ R. Warmuth និង D. Cramបានឃើញថា បង់ស៊ីនដែលបានបង្កើតត្រូវបានបន្ស៊ប់ សម្រាប់កត់ត្រាស្ទីច  $^1\text{H}$ NMR និង  $^{13}\text{C}$ NMR (រូប២១.២) មុនពេលវាមានប្រតិកម្ម Diels-Alder ជាមួយម៉ូលេគុលដែលបង្កើតវា។



រូប២១.២ ក្រាហ្វិកម៉ូលេគុលរបស់បង់ស៊ីន (បៃតង)ក្នុងអេមីកាសេរ៉ាន់មួយ រូបភាពនៃទិន្នន័យ  $^{13}\text{C}$  NMR ពីបង់ស៊ីន និងប្រតិកម្មមួយដែលប្រើដើម្បីសំយោគវា ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរង្វង់។

### ១១.៣ ផេនីលកម្ម

ប្រតិកម្មដែលទាក់ទងនឹងបង់ស៊ីនមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធភូល-កាបូនទៅកាន់ក្រុមផេនីល (ដំណើរការមួយហៅថាផេនីលកម្ម (phenylation))។ ឧទាហរណ៍ ប៊េស៊ីនអេស្ត្រាអាសេតូអាសេទិចត្រូវបានដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយប្រូម៉ូបង់ស៊ីន និងសូដ្យូមអាមីដ២២ម៉ូល ប្រតិកម្មផេនីលកម្មរបស់អេស្ត្រាអាសេតូអាសេតាតកើតឡើង។ ប្រតិកម្មសរុបមានដូចខាងក្រោម៖



អេស្តែរម៉ាឡូនិចអាចរងប្រតិកម្មផេនីលកម្មក្នុងផ្លូវស្រដៀងគ្នានេះ។ ដំណើរការនេះគឺការបំពេញបន្ថែម មានប្រយោជន៍មួយលើប្រតិកម្មអាស់ត្រីលកម្មនៃអេស្តែរអាសេតូអាសេទិច និងម៉ាឡូនិច ដែលយើងបានសិក្សាក្នុង មេរៀនទី១៨ ពីព្រោះ អង្គធាតុមេប្រតិកម្មដូចជាប្រូប៉ូមបង់សែនមិនអាចរងប្រតិកម្ម $\text{S}_{\text{N}}2$  ទេ។

**លំហាត់អនុវត្តន៍២១.១០ ៖** នៅពេល $\alpha$ -ក្លរូតូលុយអែនរងនូវលក្ខខណ្ឌដែលបានប្រើក្នុងដំណើរការ Dow (គឺ សូលុយស្យុង $\text{NaOH}$  នៅ $350^\circ\text{C}$ នៅសំពាធខ្ពស់) ផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មនេះជា  $\alpha$ -ក្រេសុល និង $m$ -ក្រេសុល តើ លទ្ធផលនេះលើកឡើងអំពីអ្វីក្នុងចលនការរបស់ដំណើរការDow ?

**លំហាត់អនុវត្តន៍២១.១១ ៖** នៅពេល2-ប្រូម៉ូ-1,3-ឌីមេទីលបង់សែនដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូមអាមីដ្យូក្នុង អាម៉ូញាក់វាគ្មានប្រតិកម្មជំនួសកើតឡើងទេ។ លទ្ធផលនេះអាចត្រូវបានបង្ហាញដោយផ្តល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពី ចលនការប្រតិកម្មពណ្តាច់-បូក។ ចូរពន្យល់អំពីការបកស្រាយខាងលើ។

**លំហាត់អនុវត្តន៍២១.១២ ៖**

- ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មផេនីលកម្មនៃអេស្តែរអាសេតូអាសេទិចដោយប្រូម៉ូបង់សែន និង សូដ្យូម អាមីដ្យូក្នុងម៉ូល (ហេតុអ្វីត្រូវប្រើសូដ្យូមអាមីដ្យូក្នុងម៉ូល ? )
- តើផលិតផលណាដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីស និងដេកាបូកស៊ីលកម្មនៃអេស្តែរអាសេតូអាសេ ទិចដែលរងផេនីលកម្ម ?
- តើអ្នកអាចទង្វើ អាស៊ីត 2-ផេនីលប្រូប៉ាណូអ៊ិចពីអេស្តែរម៉ាឡូនិចតាមវិធីណា ?

## ១២. ការវិភាគស្បៀងរបស់ផេណុល និងអាវីលអាឡូសែន

### ១២.១ ស្បៀងរំលងប្រាកដ

ផេណុលបង្ហាញបង់សម្រូប (ជាធម្មតាជាបង់ធំ) ដែលបានមកពីទំនាញ $\text{O-H}$ ក្នុងតំបន់ $3400-3600\text{cm}^{-1}$  ផេណុលនិងអាវីលអាឡូសែនក៏បង្ហាញស្បៀងដែលបានមកពីបង់សែនរបស់ពួកវាដែរ(មើលផ្នែក១៤.១១.៣)។

### ១២.២ ស្បៀង $^1\text{H}$ NMR

ប្រូតុងអ៊ីដ្រូស៊ីលរបស់ផេណុលមានរបាំងតិចជាងអាស់កុល ដោយសារតែភាពជិតគ្នានៃចរន្តរង់អេឡិចត្រុង  $\pi$ បង់សែន។ ទីតាំងពិតប្រាកដរបស់ស៊ីញ៉ាល់ $\text{O-H}$  អាស្រ័យលើទំហំនៃការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន និងអាស្រ័យលើការ ចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអន្តរម៉ូលេគុល ឬអ៊ីនត្រាម៉ូលេគុល។ ទំហំនៃការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន អាស្រ័យលើកំហាប់របស់ ផេណុល ហើយជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើទីតាំងរបស់ស៊ីញ៉ាល់ $\text{O-H}$ ។ ឧទាហរណ៍ក្នុងផេណុលទីតាំងរបស់ស៊ីញ៉ាល់  $\text{O-H}$  ប្រែប្រួលពី  $\delta$  2.55 សម្រាប់ផេណុលសុទ្ធ ទៅ  $\delta$  5.63 នៅកំហាប់ 1% ក្នុង $\text{CCl}_4$ ។ ផេណុលដែលមានការចង សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្លាំង ដូចជាសាលីស៊ីឡាមីត បង្ហាញស៊ីញ៉ាល់ $\text{O-H}$  ចន្លោះ $\delta$  0.5-1.0 ហើយទីតាំងរបស់ស៊ីញ៉ាល់ នេះខុសគ្នាតិចតួចទៅតាមកំហាប់។ នៅពេលប្រូតុងផ្សេងទៀត ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ (ផ្នែក៩.១០) អត្តសញ្ញាណនៃ ប្រូតុង  $\text{O-H}$  របស់ផេណុលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយការ បន្ថែម  $\text{D}_2\text{O}$  ទៅលើភាគសំណាក។ ប្រូតុង  $\text{O-H}$  របស់

ផេណុលមួយអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងរហ័សដោយដីតេរីយ៉ូម ហើយសិប្បិញ្ចាស់ប្រក្នុងត្រូវបានបាត់បង់។ ប្រក្នុងអារ៉ូម៉ាទិចរបស់ផេណុល និងអារ៉ូម៉ាទិចស្រទ្វីស្ទសិប្បិញ្ចាស់ក្នុងតំបន់ ៨ 7 – 9 ។

### ១២.៣ ស្បៀង<sup>13</sup>CNMR

អាតូមកាបូនរបស់អារ៉ូម៉ាទិចរបស់ផេណុល និងអារ៉ូម៉ាទិចស្រទ្វីស្ទក្នុងតំបន់ ៨ 135 -170។

### ១២.៤ ស្បៀងម៉ាស


ស្បៀងម៉ាសរបស់ផេណុលតែងតែបង្ហាញពិកអ៊ីយ៉ុងម៉ូលេគុល $M^{+}$ ។ ផេណុលដែលមានអ៊ីដ្រូសែនបង់ស៊ីលិចមួយបង្កើតពិក  $M^{+}+1$  ដែលអាចធំជាងពិក  $M^{+}$ ។

## ១៣. ការសិក្សាអំពីអារីលអាឡូសែន៖ បម្រើបម្រាស់ និងបញ្ហាបរិស្ថាន

### ១៣.១ អារីលអាឡូសែនជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

សត្វល្អិត ជាពិសេសមូស ចៃផ្តែ (fleas) និងចៃមនុស្ស (lice) មានការពាក់ព័ន្ធការស្លាប់មនុស្សឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ជម្ងឺហើមក្រលៀន (bubonic plague) ឬ black death ដែលសម្លាប់ប្រជាជនអឺរ៉ុបជិតមួយភាគបីបណ្តាលមកពីចៃផ្តែ។ គ្រុនចាញ់ និងគ្រុនឈាមដែលបណ្តាលមកពីសត្វមូសបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ក្នុងសតវត្សទី២០។

សមាសធាតុមួយដែលគេដឹងជាទូទៅថាមានលក្ខណៈសម្លាប់សត្វល្អិត និងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានគឺ DDT (1,1,1-ទ្រីក្លរ៉ូ-2,2-ប៊ីស(4-ក្លរ៉ូផេនីល)អេតាន)។



DDT  
[1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane]

ចាប់ពីដើមទសវត្សឆ្នាំ១៩៤០ រហូតដល់ ១៩៧០ នៅពេលបម្រើបម្រាស់របស់វាត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច បរិមាណជាច្រើននៃDDTត្រូវបានបាញ់លើផ្នែកជាច្រើននៃពិភពលោកដើម្បីសម្លាប់សត្វល្អិត។ ការប្រឹងប្រែងនេះធ្វើឱ្យមានការថយចុះនូវជំងឺឆ្លងដែលបណ្តាលមកពីសត្វល្អិត ជាពិសេសជំងឺគ្រុនចាញ់ គ្រុនឈាមជំងឺងងុយដេក (sleeping sickness) (បណ្តាលមកពីពងសត្វរុយម្យ៉ាង) និងជំងឺគ្រុនរោល (typhus)។ ទោះបីជាជំងឺគ្រុនចាញ់បានលេចឡើងជាថ្មីមុនឆ្នាំ១៩៧០ វាត្រូវបានគេលុបបំបាត់យ៉ាងជំរេញពីការ អភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក។ ដោយយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ National Academy of Sciences ការប្រើ DDTក្នុងពេលនោះអាចការពារជីវិតមនុស្សពីការស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនចាញ់បានច្រើនជាង៥០០លាននាក់។




DDT

ជាយថាហេតុ វាកាន់តែច្បាស់ដែលការប្រើប្រាស់ DDT ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសារផលប៉ះពាល់ របស់វា។ អារីលអាឡូសែនជាសមាសធាតុស្ថេរភាពខ្ពស់ ដែលអាចបំបែកយឺតៗបំផុតដោយដំណើរការធម្មជាតិ។ ដូចនេះ ពួកវា


នៅសល់ក្នុងបរិស្ថានក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំ ដែលឥឡូវនេះយើងហៅថា ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឆន់ (persistent insecticides) ឬថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតរឹង (hard insecticides)។ ភ្នាក់ងារបរិស្ថានអាមេរិចបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើ DDT នៅដើមឆ្នាំ១៩៧៣។

អារីលអាឡូសែនក៏ជាសារធាតុរលាយក្នុងខ្លាញ់ ហើយទំនោរប្រមូលផ្តុំក្នុងជាលិកាខ្លាញ់របស់សត្វស្ទើរតែទាំងអស់។ ចង្វាក់អាហារដែលចេញពីប្លង់តុងទៅត្រីតូច ទៅសត្វស្លាប និងទៅសត្វធំ រួមទាំងមនុស្សផងទំនោរនឹងបង្កើនកំហាប់អារីលអាឡូសែនក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ។

ក្លរីអ៊ីដ្រូកាបូ DDT ត្រូវបានទង្វើពីសារធាតុផ្ដើមតម្លៃថោក គឺក្លរីបង់សែន និងទ្រីក្លរីអាសេតាល់ដេអ៊ីត។ ប្រតិកម្មរងកាតាលីករអាស៊ីត ដូចបង្ហាញខាងក្រោម។




ក្នុងធម្មជាតិផលិតផលបំបែកចំបងរបស់DDT គឺ DDE ៖



ការប៉ាន់ស្មានបញ្ជាក់ថា DDTជិត១កោដិផោនត្រូវបានរាយប៉ាយលើប្រព័ន្ធអេកូចំរុះរបស់ពិភពលោក។ ផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានមួយរបស់ DDE បន្ទាប់ពីបម្លែងមកពី DDT គឺប៉ះពាល់ដល់កំណសំបកស៊ីតរបស់សត្វស្លាបជាច្រើន។ DDE រារាំងអង់ស៊ីម កាបូនិចអាស៊ីដ្រាស ដែលត្រួតពិនិត្យបរិមាណកាល់ស្យូមផ្តល់ទៅឱ្យកំណសំបកស៊ីត។ ដូចនេះ សំបកស៊ីតក្លាយជាផ្ទុយស្រួយ ហើយមិនអាចនៅបានរហូតដល់ញាស់ទេ។ ក្នុងកំឡុងចុងទសវត្ស 19៤០ ចំនួនសត្វតន្រ្តីយ៍ ស្វាំង និងក្លែងបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំង។ គេបានសង្ស័យថា DDTជា មូលហេតុចំបង។ DDE ក៏ប្រមូលផ្តុំក្នុងជាលិកាខ្លាញ់របស់មនុស្សដែរ។ ទោះបីមនុស្សមិនមានការប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយកម្រិតមធ្យមនៃDDEក៏ដោយ ក៏គេមិនអាចកំណត់ពីឥទ្ធិពលរយៈពេលវែងរបស់វាដែរ។

### ១៣.២ អាឡូសែនូសរីកាឡាដាវ៉ាសម្លាប់ស្មៅ


សមាសធាតុសរីរាង្គកម្មផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលាយជាថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ (herbicides)។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ពីរ គឺ 2,4-D និង 2,4,5-T។



R=H ជា 2,4-D (អាស៊ីត 2,4-ឌីក្លរូផេណុកស៊ីអាសេទិច)  
R=Cl ជា 2,4,5-T (អាស៊ីត-2,4,5-ទ្រីក្លរូផេណុកស៊ីអាសេទិច)



បរិមាណជាច្រើននៃសមាសធាតុទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រើក្នុងល្បាយ1:1ជាភ្នាក់ងារជំរុះស្លឹកទឹកក្រូច (defoliant Agent orange) ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាម។ ភាគសំណាក 2,4,5-T ខ្លះត្រូវបានបង្ហាញជាភ្នាក់ងារធ្វើឱ្យ ខូចរូបរាងគត់ ហើយវាត្រូវបានហាត់ឃាត់មិនឱ្យប្រើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច។




2,3,7,8-តេត្រាគ្រូឡីបង់សូឌីអុកស៊ីន  
( TCDD )

ឌីអុកស៊ីននេះក៏ជាសារធាតុស្ថេរភាពខ្ពស់ដែរ វាធននឹងបរិស្ថាន ហើយដោយវាលាយក្នុងខ្លាញ់ វាត្រូវបាន បញ្ជូនទៅក្នុងចង្វាក់អាហារ(Food Chain)។ ក្នុងបរិមាណមួយវាអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺស្បែកហៅថាជំងឺមុនក្លរ ( chloracne )។

### ១៣.៣ ប៉ូលីគ្រូប៊ីផេនីល ( PCBs )

ល្បាយនៃប៉ូលីគ្រូប៊ីផេនីលត្រូវបានបង្កើត និងប្រើនៅលើទីផ្សារតាំងពីឆ្នាំ១៩២៩។ ក្នុងល្បាយនេះបីផេនីល ដែលមានអាតូមក្លរនៅលើទីតាំងដែលបានបង់លេខ (មើលទម្រង់ខាងក្រោម) អាចមានវត្តមាន។ សរុបមកអាច មានសមាសធាតុទាំងនេះប្រហែល២១០។ ល្បាយលើទីផ្សារអាចមានPCBs៥០ខុសគ្នា។ ល្បាយនេះត្រូវបានចាត់ ថ្នាក់អាស្រ័យលើបរិមាណក្លររបស់ពួកវា ហើយល្បាយប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មស្ទើរតែទាំងអស់មានបរិមាណក្លរពី ៤០% ទៅ៦០%។



បីផេនីល


ប៉ូលីគ្រូប៊ីផេនីលមានបម្រើបម្រាស់ច្រើនណាស់៖ ជាភ្នាក់ងារកម្ដៅក្នុងត្រង់ស្ទួរ ក្នុងកាប៉ាស៊ីទ័រទែម៉ូស្ត្រា និង ប្រព័ន្ធអ៊ីដ្រូលិច ជារូបធាតុផ្លាស្ទិចក្នុងពេងកាហ្វេប៉ូលីស្ទីរ៉េន កញ្ចប់អាហារផ្អែម ផ្លាស្ទិចបំប៉ង និងស្រទាប់ផ្លាស្ទិចលើ ដបទារក។ ពួកវាត្រូវបានប្រើក្នុងទឹកថ្នាំបោះពុម្ព ក្នុងក្រដាសកាបូន និងជាក្រមួនសម្រាប់ចាក់ពុម្ពលោហៈ។ ក្នុង ចន្លោះឆ្នាំ ១៩២៩ និង១៩៧២ PCBsប្រមាណ 500000 តោនត្រូវបានផលិតផល។

ប៉ូលីគ្រូប៊ីផេនីលមានភាពធន់ខ្ពស់ក្នុងបរិស្ថាន ហើយរលាយក្នុងខ្លាញ់ទំនោរនឹងប្រមូលផ្តុំក្នុងចង្វាក់អាហារ។ PCBs ត្រូវបានរកឃើញក្នុងទឹកភ្លៀង ក្នុងប្រភេទត្រីខ្លះ សត្វស្លាប និងសត្វផ្សេងទៀត (រួមទាំងខ្លាឃ្មុំទឹកកក) ក្នុង សាកលលោក និងក្នុងជាលិកាមនុស្សផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ ត្រីដែលចិញ្ចឹមក្នុងទឹកមាន PCBsមានកម្រិតPCB ពី1000-100,000 ដងច្រើនជាងត្រីក្នុងទឹកធម្មជាតិ ហើយបរិមាណនេះកើនឡើងថែមទៀត ក្នុងសត្វដែលចិញ្ចឹម ដោយប្រើចំណីជាត្រីនេះ។ កម្រិតពុលរបស់ PCBs អាស្រ័យលើបរិមាណនៃភាគផ្សំរបស់ល្បាយនីមួយៗ។


មកដល់ចុងឆ្នាំ១៩៧៥ បញ្ហាឧស្សាហកម្មគឺការបង្កប់PCBs ចូលទៅក្នុងទន្លេHudson។ ក្នុងឆ្នាំ២៩៧៧ EPAបានហាមឃាត់មិនឱ្យបង្កើតកាកសំណល់ PCBs ចូលទៅក្នុងផ្លូវទឹក ហើយចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ការផលិត ដំណើរ ការ និងការចែកចាយ PCBs ត្រូវបានហាមឃាត់។ ក្នុងឆ្នាំ២០០០ EPAបានកំណត់ផ្នែកជាក់លាក់នៃទន្លេHudson ដែលត្រូវសំអាត PCBsចេញ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ គម្រោងសំអាត PCBs ពីទន្លេ Hudson ដោយបូម ភក់ចេញត្រូវបាន ធ្វើឡើង។

**១៣.៤ ប៉ូលីប្រូម៉ូប៊ីផេនីល និងប៊ីផេនីលអេទែរ (PBBs និង PBDEs)**

ដូចប៉ូលីក្លរ៉ូប៊ីផេនីលដែរ សមាសធាតុអាហ្វ័រម៉ាទីចប៉ូលីប្រូម៉ូត្រូវបានប្រើក្នុងឧស្សាហកម្ម ដោយសារតាំងពីសតវត្សទី២០។ ឧទាហរណ៍ លក្ខណៈពន្លឺតភ្លើងនេះរបស់ប៉ូលីប្រូម៉ូ និងប៉ូលីក្លរ៉ូប៊ីផេនីលអេទែរធ្វើឱ្យគេយកពួកវាទៅប្រើក្នុងសម្ភារៈសំណង់ គ្រឿងសង្ហារឹម សម្លៀកបំពាក់ និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែ ក្នុងទសវត្សឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៧០ ក្នុងប្រទេសមីស៊ីកែនរបស់ប៉ូលីប្រូម៉ូប៊ីផេនីល (PBBs) ក្នុងចំណីសត្វចិញ្ចឹម និងក្នុងសាច់ និងផលិតផលទឹកដោះគោ ធ្វើឱ្យមានការផ្អាកប្រើ PBBs ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩។



ប៉ូលីប្រូម៉ូប៊ីផេនីល (PBBs)



ប៉ូលីប្រូម៉ូប៊ីផេនីលអេទែរ (PBDEs)

(x និង y បញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃប៉ូលីជំនួសប្រូមលើវ៉ង់នីមួយៗ)

ដូចនេះហើយមានការព្រួយបារម្ភអំពីប៉ូលីប្រូម៉ូប៊ីផេនីលអេទែរ (PBDEs)។ ទោះបីជាការប្រើ PBDEs អាចជួយសង្គ្រោះជីវិត និងទ្រព្យសម្បត្តិពីអគ្គិភ័យក៏ដោយ សមាសធាតុទាំងនេះឥឡូវរីករាលដាលក្នុងបរិស្ថាន ហើយការសិក្សាបាននាំឱ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពពុលរបស់ពួកវាលើមនុស្ស និងសត្វផ្សេងទៀត។ ដូចPCBsដែរ ប៉ូលីប្រូម៉ូប៊ីផេនីល និងប៉ូលីប្រូម៉ូប៊ីផេនីលអេទែរមិនងាយបំបែក (ធន់) ក្នុងបរិស្ថាន និងប្រមូលផ្តុំក្នុងជាលិកាខ្លាញ់។ PBDEs ត្រូវបានរកឃើញក្នុងបក្សី ត្រី និងទឹកដោះម្តាយ។ ឥឡូវនេះ ពួកវាត្រូវ បានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើក្នុងតំបន់មួយចំនួនធំ។






\$\$\$\$\$\$\$\$



## លំហាត់មេរៀនទី២១

### លក្ខណៈរូប

១. ចូររៀបសមាសធាតុទាំងនេះតាមលំដាប់កើនឡើងនៃកម្រិតអាស៊ីត៖



២. ដោយមិនប្រើតារាង ចូរជ្រើសរើសអាស៊ីតខ្លាំងជាងពីគូនីមួយៗខាងក្រោម៖

- 4-មេទីលផេណុល និង 4-ក្លុយអ៊ីដ្រូផេណុល
- 4-មេទីលផេណុល និង 4-នីត្រូផេណុល
- 4-នីត្រូផេណុល និង 3-នីត្រូផេណុល
- 4-មេទីលផេណុល និង បង់ស៊ីលអាល់កុល
- 4-ក្លុយអ៊ីដ្រូផេណុល និង 4-ប្រូមូផេណុល

៣. តើផលិតផលអ្វីខ្លះដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាសខាងក្រោម៖







- សូដ្យូមអេតុកស៊ីតក្នុងអេតាណុល + ផេណុល  $\rightarrow$
- ផេណុល + សូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត  $\rightarrow$
- សូដ្យូមផេណុកស៊ីត + សូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រីច  $\rightarrow$
- សូដ្យូមផេណុកស៊ីត +  $\text{H}_2\text{O}$  +  $\text{CO}_2 \rightarrow$








៤. ចូរបរិយាយតេស្តគីមីងាយដែលអាចត្រូវប្រើប្រែកកាតត្នាវាងគូសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោម៖

- 4-ក្លរូផេណុល និង 4-ក្លរូ-1-មេទីលបង់សែន
- 4-មេទីលផេណុល និង អាស៊ីត 4-មេទីលបង់សូអ៊ីច
- 4-មេទីលផេណុល និង 2,4,6-ទ្រីនីត្រូផេណុល
- អេទីលផេនីលអេទែរ និង 4-អេទីលផេណុល








### ប្រតិកម្មទូទៅ


៥. ចូរបំពេញសមីការខាងក្រោម៖






៦. ចូរឱ្យផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖






### ចលនការប្រតិកម្ម និងការសំយោគ

៧. ការសំយោគ toliprolol ចាប់ផ្តើមពីប្រតិកម្មមួយរវាង 3-មេទីលផេណុល និងអេពីក្លរូអ៊ីដ្រីន។ ការសំយោគនេះបង្ហាញខាងក្រោម។ ចូរឱ្យទម្រង់របស់អង្គធាតុកណ្តាល និង toliprolol។




៨. p-ក្លរូបង់សែនត្រូវបានឱ្យធ្វើប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូម 2,6-ឌីមែទែ-ប៊ុយទីលផេណុកស៊ីតក្នុងគោល បំណងបង្កើតឌីផេនីលអេទែរ 1។ ផលិតផលប្រតិកម្មនេះមិនមែន 1 ទេ ប៉ុន្តែវាជាអ៊ីសូមែរមួយរបស់ 1 ដែលនៅតែមានក្រុមអ៊ីដ្រូកស៊ីលផេណុលដែរ។




តើផលិតផលនេះជាអ្វី? ហើយតើវាកើតរបៀបណា?

៩. នៅពេល m-ក្លរូតូលុយអែនត្រូវបានដាក់ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញាក់រាវ ផលិតផលរបស់ ប្រតិកម្មនេះជា o-, m-, និង p-តូលុយអ៊ីឌ្រីន (គឺ o-CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>NH<sub>2</sub>, m-CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>NH<sub>2</sub> និង p-CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>NH<sub>2</sub>)។ ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មនេះ។


១០. ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ 2,4-D អាចត្រូវបានសំយោគពីផេណុល និងអាស៊ីតក្លរូអ៊ីដ្រីន។ ចូរសរសេរ សមីការប្រតិកម្មដែលទាក់ទង។




១១. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




១២. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



១៣. ចូរសរសេរចលនការប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




១៤. ចូរឱ្យផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



### ស្ម័គ្រច្រើន

១៥. សមាសធាតុ X ( $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}$ ) រលាយក្នុងសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីត ប៉ុន្តែមិនរលាយក្នុងសូលុយស្យុងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាត។ សមាសធាតុ X មានប្រតិកម្មជាមួយប្រូមក្នុងទឹកបង្កើតស្រលាយឌីប្រូម មួយគឺ  $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{Br}_2\text{O}$  ។ ស្ទីច IR តំបន់  $3000\text{-}4000\text{cm}^{-1}$  របស់ X បង្ហាញពិក្ខន្ធមួយនៅ  $3250\text{cm}^{-1}$  តំបន់  $680\text{-}840\text{cm}^{-1}$  បង្ហាញពិក្ខន្ធខ្លាំងនៅ  $830\text{cm}^{-1}$ ។ ស្ទីច  $^1\text{H NMR}$  របស់ X ឱ្យពិក្ខន្ធចូចតទៅ៖ ស៊ីញ៉ាល់នៅ  $\delta$  1.3 (9H), ស៊ីញ៉ាល់នៅ  $\delta$  4.9 (1H) និងពហុវ៉ែតនៅ  $\delta$  7.0 (4H)។ ចូរឱ្យទម្រង់របស់ X។

១៦. សមាសធាតុ Z ( $\text{C}_5\text{H}_{14}\text{O}$ ) បង្កើតពណ៌ប្រូមក្នុងកាបូនតេត្រាគ្លូរ។ ស្ទីច IR របស់ Z បង្ហាញពិក្ខន្ធមួយ ក្នុងតំបន់  $3200\text{-}3600\text{cm}^{-1}$ ។ ស្ទីច  $^1\text{H NMR}$  របស់ Z ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។ ចូរឱ្យទម្រង់របស់ Z។



~~~~~

ផែនទីបញ្ញត្តិ

ខ្សែសំយោគរបស់ផេណុល និងសមាសធាតុរ៉ាំរ៉ៃ

Reactions of benzene related to phenol synthesis:


- Nitration and nitro-group reduction
- Friedel-Crafts alkylation
- Sulfonation
- Chlorination (X = Cl)

Synthesis of phenols:

- Laboratory: via diazonium salts
- Industrial synthesis of phenols
 - (1) Via cumene hydroperoxide
 - (2) Dow process (via benzyne)

Reactions of phenols:

- Acylation
- Alkylation (Williamson ether synthesis)
- Electrophilic aromatic substitution



Other reactions:

- Substitution of diazonium salts
- S_NAr (Nucleophilic aromatic substitution—requires electron-withdrawing groups on ring)
- Substitution via benzyne
- Claisen rearrangement of allyl aryl ethers

មេរៀនទី២២

ការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាបូន-កាបូន និង ប្រតិកម្មផ្សេងៗទៀតរបស់សមាសធាតុសរីរាង្គលោហៈឆ្លង

១. សេចក្តីផ្តើម

ប្រតិកម្មបង្កើតសម្ព័ន្ធភាបូន-កាបូនកាតាលីករលោហៈឆ្លងជាច្រើនត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ឡើងជាឧបករណ៍ មានប្រយោជន៍ខ្លាំងចំពោះការសំយោគសរីរាង្គ។ ផលប្រយោជន៍ខ្ពស់របស់ប្រតិកម្មកាតាលីករលោហៈឆ្លង មួយចំនួនគឺថា ពួកវាផ្តល់ជាមធ្យោបាយក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធរវាងក្រុមដែលមានកម្រិតបំផុត ប្រហែលជាគ្មាន ប្រតិកម្មបង្កើតសម្ព័ន្ធភាបូន-កាបូនអាចកើតឡើង។ ឧទាហរណ៍ ដោយប្រើកាតាលីករលោហៈឆ្លង យើងអាច បង្កើតសម្ព័ន្ធរវាងអង្គធាតុមេប្រតិករអាល់សែនីល (វីនីល) ឬអាវីល និងកាបូនអ៊ីប្រីត sp^2 ឬ sp របស់ប្រតិករ ផ្សេងទៀត។ យើងនឹងឱ្យឧទាហរណ៍នៃវិធីសាស្ត្រទាំងនេះពីបី រួមមានប្រតិកម្មHeck-Mizoroki, ប្រតិកម្មបង្ក គូSuzuki-Miyaura, ប្រតិកម្មបង្កគូStille និងប្រតិកម្មបង្កគូ Sanogashira។ ប្រតិកម្មទាំងនេះជាប្រភេទ ប្រតិកម្មបង្កគូខ្វែង ដែលប្រតិករពីរមានទម្រង់សមស្របត្រូវបានបង្កគូដោយសម្ព័ន្ធភាបូន-កាបូនថ្មីមួយ។

មេតាតេស៊ីសអូលេកីន (Olefin metathesis) ជាប្រភេទប្រតិកម្មមួយទៀត ដែលក្រុមរបស់ប្រតិករ អាល់សែនពីរផ្លាស់ប្តូរទីតាំងគ្នា។ យើងនឹងសិក្សាប្រតិកម្មមេតាតេស៊ីសអូលេកីនដែលបានជំរុញដោយកាតាលីករ Grubb។

ប្រតិកម្មបង្កើតសម្ព័ន្ធភាបូន-កាបូនកាតាលីករលោហៈឆ្លងមួយទៀត ដែលយើងនឹងសិក្សាគឺប្រតិកម្ម Corey-Posner, Whitesides-Hourse។ ដោយប្រើប្រតិកម្មនេះ អាល់គីលអាឡូសែនមួយត្រូវបានបង្កគូ ជាមួយក្រុមអាល់គីលពីអ័រ៉ាក់ទីបលីចូមឌីអាល់គីលគូប្រាត (lithium dialkyl cuprate reagent) (គេ តែងហៅថាអ័រ៉ាក់ទីបGilman)។ ប្រតិកម្មនេះមិនមានចលនការប្រតិកម្មប្រើកាតាលីករទេ។


ប្រតិកម្មទាំងនេះទាក់ទងនឹងលោហៈឆ្លងដូចជាឡាដូម ទង់ដែង និងរុយតេញ៉ូម ដែលតែងតែស្ថិតក្នុង កំណើតជាមួយលីកង់ផ្សេងៗ។ បន្ទាប់ពីយើងដឹងអំពីការអនុវត្តន៍នៃប្រតិកម្មបង្កើតសម្ព័ន្ធភាបូន-កាបូនហើយ យើងនឹងសិក្សាអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅខ្លះនៃទម្រង់កំណើតលោហៈឆ្លង និងដំណាក់កាលតំណាងក្នុងចលនការ ប្រតិកម្មកាតាលីករលោហៈឆ្លង។ យើងនឹងសិក្សាឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងមួយអំពីចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែន កម្មកាតាលីករលោហៈឆ្លងដោយប្រើកំណើតរ៉ូដូមមួយហៅថាកាតាលីករWilliamson និងចលនការប្រតិកម្ម Heck-Mizoroki។

២. ប្រតិកម្មបង្កគូកាតាលីករលោហៈឆ្លង


២.១ ប្រតិកម្ម Heck-Mizoroki

ប្រតិកម្ម Heck-Mizoroki ទាក់ទងនឹងការបង្កគូអាល់សែនមួយជាមួយអាល់សែនីល ឬអាវីលអាឡូ សែនកាតាលីកររ៉ូដូម។ ផលិតផលអាល់សែនតែងតែជាត្រង្សដោយសារតែដំណាក់កាលបណ្តាច់-1,2 ក្នុងចលនការប្រតិកម្ម។


ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍៖



លំហាត់អនុវត្តន៍២២.១ ៖ តើផលិតផលអ្វីដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មខាងក្រោម?




លំហាត់អនុវត្តន៍២២.២៖ តើសារធាតុផ្ដើមណាខ្លះដែលត្រូវប្រើដើម្បីសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោមដោយប្រតិកម្មHeck-Mizoroki?




២.២ ប្រតិកម្មបង្គុំគូ Suzuki-Miyaura

ប្រតិកម្មបង្គុំគូSuzuki-Miyaura ផ្គុំអាល់សែនីល ឬអារីលបរ៉ាតជាមួយអាល់សែនីល ឬអារីលអាឡូសែន្ន ក្រោមវត្តមានកាតាលីករប៉ាឡាដ្យូម។ ស្តេអេត្រីមីរបស់ប្រតិករអាល់សែនីលត្រូវបានរក្សាក្នុងប្រតិកម្មបង្គុំគូនេះ។

ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍៖




បុមប៊ីកុល

(អរម៉ូនកេទបញ្ចេញដោយដង្កូវនាងញី)

លំហាត់អនុវត្តន៍២២.៣ ៖ តើផលិតផលនៃប្រតិកម្មបង្កើត Suzuki-Miyaura ខាងក្រោមជាអ្វី?




លំហាត់អនុវត្តន៍២២.៤៖ តើសារធាតុផ្ដើមណាខ្លះដែលត្រូវប្រើដើម្បីសំយោគសមាធាតុខាងក្រោមដោយប្រតិកម្មបង្កើត Suzuki-Miyaura?




២.៣ ប្រតិកម្មបង្កើត Stille និងការប្រើប្រាស់

ប្រតិកម្មបង្កើត Stille ជាប្រតិកម្មបង្កើតខ្លាំងដែលទាក់ទងនឹងអាក់ទីបសរីរាង្គសំណប៉ាហាំងជាអង្គធាតុប្រតិកម្ម។ ក្រោមវត្តមានកាតាលីករប៉ាឡាឌ្យូមសមស្រប ប្រតិករអាល់សែនីល និងអារីលសំណប៉ាហាំង អាចរងបង្កើតជាមួយអាល់សែនីលទ្រីផ្លាត, អាល់សែនីលអ៊ីយ៉ូដួ និងអាល់សែនីលប្រូម រួមទាំងអាល់គីលក្លរ និង អាស៊ីតក្លរូផងដែរ។


ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍៖




គេអាចសំយោគសេតូនដោយប្រតិកម្មបង្កើត Stille ផ្សេងៗ ដែលទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មបង្កើតក្រោមវត្តមាន កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត។ ប្រតិកម្មខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍មួយ។



លំហាត់អនុវត្តន៍២២.៥ ៖ តើផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មនីមួយៗខាងក្រោមជាអ្វី?




លំហាត់អនុវត្តន៍២២.៦ ៖ តើសារធាតុផ្ដើមណាខ្លះដែលត្រូវប្រើដើម្បីសំយោគសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោមដោយប្រតិកម្មបង្ក្រាប Stille?




២.៤ ប្រតិកម្មបង្ក្រាប Sonogashira

ប្រតិកម្ម Sonogashira ផ្គុំអាល់គីនមួយជាមួយអាល់សែនីល ឬអាវីលអាឡូសែនមួយក្រោមវត្តមានកាតាលីករប៉ាឡាដ្យូម និងទង់ដែង។ ទង់ដែងអាល់គីនត្រូវបានបង្កើតជាអង្គធាតុកណ្តាលក្នុងប្រតិកម្មនេះ (នៅពេលគេមិនប្រើប៉ាឡាដ្យូម ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានគេហៅថាប្រតិកម្មបង្ក្រាប Stephens-Castro ហើយប្រតិកម្មនេះមិនមែនជាប្រតិកម្មកាតាលីករទេ)។ ក្រៅពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្គុំអាល់គីនជាមួយរង្វង់អាវ៉ូម៉ាទិចមួយ ប្រតិកម្មបង្ក្រាប Sonogashira ផ្តល់ជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការសំយោគអែនីន។



ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍៖



លំហាត់អនុវត្តន៍២២.៧ ៖ ចូរឱ្យផលិតផលរបស់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖




លំហាត់អនុវត្តន៍២២.៨ ៖ តើសារធាតុផ្ដើមណាខ្លះដែលត្រូវការសម្រាប់សំយោគសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោមដោយប្រតិកម្មបង្កើត Sonogashira ?




៣. មេតាតេស៊ីសអូលេហ្វីន៖ កំន្លិចការបែងចែករុយតេត្រាម៉ែត និងកាតាលីក័រ Grubbs

គូសម្ព័ន្ធពីរជាន់អាល់សែនអាចផ្លាស់ប្តូរចុងសងខាងជាមួយគ្នាក្នុងប្រតិកម្មមួយហៅថា **មេតាតេស៊ីសអូលេហ្វីន** (olefin metathesis) (ពាក្យក្រិក meta = ប្តូរ , thesis=ទីតាំង) ។


ប្រតិកម្មសរុបមានដូចខាងក្រោម៖



វដ្តកាតាលីក័រសម្រាប់ប្រតិកម្មនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយ Yves Chauvin ហើយគេបានជឿជាក់ថាទាក់ទងនឹងអង្គធាតុកណ្តាលមេតាឡូស៊ីតូប៊ុយតានដែលបានមកពីប្រតិកម្មលោហៈអាល់គីលីដែន (ឬហៅថាលោហៈកាប៊ែន) ជាមួយអាល់សែន។ កាតាលីក័រជាលោហៈអាល់គីលីដែនខ្លួនវា។ វដ្តកាតាលីក័រ Chauvin នៃប្រតិកម្មមេតាតេស៊ីសអូលេហ្វីនត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម។




Richard Schrockបានអង្កេតលក្ខណៈរបស់កាតាលីករទី១ខ្លះរបស់ប្រតិកម្មមេតាតេស៊ីសអូលេក្លីន។ ការងាររបស់គាត់បញ្ចូលកាតាលីករដែលទង្វើពីតង់តាលូម ទីតាញ៉ូម និងម៉ូលីបដែន។ ប៉ុន្តែកាតាលីករទាំងនេះដែលគេនិយមប្រើសព្វថ្ងៃគឺកាតាលីកររុយតេញ៉ូមបង្កើតដោយRobert Grubbs។ កាតាលីករដែលត្រូវបានហៅថាកាតាលីករជំនាន់ទី១ និងកាតាលីករជំនាន់ទី២របស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម៖



Grubbs, 1995

កាតាលីករ Grubbsជំនាន់ទី១




Grubbs, 1999

កាតាលីករ Grubbsជំនាន់ទី២

(មានលក់នៅលើទីផ្សារ)


ប្រតិកម្មមេតាតេស៊ីសអូលេក្លីនត្រូវបានគេបង្ហាញថាជាមធ្យោបាយខ្លាំងមួយក្នុងការសំយោគ ដែលរង្វាន់ណូបែលឆ្នាំ២០០៥ផ្នែកគីមីត្រូវបានប្រគល់ទៅឱ្យChauvin, Grubbs, និង Shrock សម្រាប់កិច្ចការការងារ របស់ពួកគាត់លើប្រតិកម្មនេះ។ ការប្រើការអនុវត្តរបស់វាបញ្ចូលទៅក្នុងការសំយោគភ្នាក់ងារប្រឆាំងមហារីក ជាច្រើនក្នុងក្រុមអេប៉ូលីទ្យូន ដោយ Danishefsky, Shinzer, Sinha និងអ្នកផ្សេងទៀតជាឧទាហរណ៍បង្ហាញ ខាងក្រោម៖



ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺប្រតិកម្មប៉ូលីមែរកម្មមេតាតេស៊ីសអូលេក្លីនបើកវង់ (ROMP) ដែលត្រូវបានប្រើ ដើម្បីសំយោគប៉ូលីប៊ុយឌីអែនពី 1,5-ស៊ីក្លូប៊ុយតាឌីអែន។




លំហាត់អនុវត្ត២២.៩ ៖ តើផលិតផលណាខ្លះដែលកកើតនៅពេលសមាសធាតុនីមួយៗខាងក្រោមមានប្រតិកម្មជាមួយ $(\text{PCy}_3)_2\text{Cl}_2\text{Ru}=\text{CHPh}$ ដែលជាកាតាលីករ Grubbs មួយ?




៤. ប្រតិកម្ម Corey-Posner, Whitesides-House

ប្រតិកម្ម Corey-Posner, Whitesides-House ទាក់ទងនឹងការបង្កើតប៉ូលីមែរអាល់គីលគូប្រាត (ហៅថា អាល់គីលគូប្រាត) ជាមួយអាល់គីល អាល់សែនីល ឬអាល់សែនីល ឬអាល់សែនីល ឬអាល់សែនីល ក្រុមអាល់គីលរបស់អាល់គីល លីចូមឌីអាល់គីលគូប្រាតអាចថ្នាក់ទី១ ទី២ ឬទី៣។ ប៉ុន្តែ អាឡូសែនីលដែលជាដៃគូអាល់គីលគូប្រាត ត្រូវតែជាអាល់គីលអាឡូសែនីលថ្នាក់ទី១ ឬអាល់គីលអាឡូសែនីលថ្នាក់ទី២ បើសិនជាវាមិនមែនជាអាល់សែនីល ឬ អាល់សែនីល។

ប្រតិកម្មទូទៅ៖




ឧទាហរណ៍៖




លីច្យូមឌីមេទីលគូប្រាត 75%

វ៉ែអាក់ទីបលីច្យូមឌីមេទីលគូប្រាត (Gilman) ដែលត្រូវការត្រូវតែសំយោគពីដំណើរការពីដំណាក់កាលពី អាល់គីអាឡូសែនដែលត្រូវគ្នា ដូចខាងក្រោម៖

ការសំយោគសមាសធាតុសរីរាង្គលីច្យូម




ការសំយោគវ៉ែអាក់ទីបលីច្យូមឌីអាល់គីលគូប្រាត (Gilman) ៖



គ្រប់វ៉ែអាក់ទីបក្នុងប្រតិកម្ម Corey-Posner, Whitesides-House ត្រូវបានប្រើតាមមេគុណស្តីសូមទ្រឹ។ ចលនការប្រតិកម្មមិនទាក់ទងកាតាលីករទេ ដូចក្នុងប្រតិកម្មផ្សេងទៀតនៃលោហៈឆ្នុងដែលយើងបានសិក្សា។

លំហាត់អនុវត្តន៍ ២២.១០ ៖ ចូរបង្ហាញពីរបៀបបង្កើន 1-ប្រូម៉ូប៊ុយតានទៅជាវ៉ែអាក់ទីប Gilman លីច្យូមឌីប៊ុយទីលគូប្រាត និងបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកអាចប្រើវាដើម្បីសំយោគសមាសធាតុខាងក្រោម៖



៥. មូលដ្ឋានគ្រឹះខ្លះលើធាតុ និងកំន្លិចលោហៈឆ្នុង

បន្ទាប់ពីយើងបានឃើញអំពីឧទាហរណ៍សំខាន់ខ្លះទាក់ទងនឹងលោហៈឆ្នុងរួចហើយ យើងសិក្សាពីទិដ្ឋភាពនៃទម្រង់អេឡិចត្រុងរបស់លោហៈទាំងនេះ និងសមាសធាតុកំន្លិចរបស់ពួកវា។

លោហៈឆ្នុងត្រូវបានកំណត់ថាជាធាតុដែលមានស្រទាប់អេឡិចត្រុងក្នុងអរប៊ីតាល់ d ឬ f ទាំងក្នុងភាពជាធាតុ ឬជាសមាសធាតុ។ លោហៈឆ្នុងដែលទាក់ទងនឹងគីមីសរីរាង្គជាងគេជាធាតុស្ថិតក្នុងផ្នែកពណ៌លឿង និងពណ៌បៃតងនៃតារាងខួបក្នុងរូប G.1 ខាងក្រោម ដែលរួមទាំងលោហៈឆ្នុងទាំងអស់ដែលយើងបានសិក្សារួចហើយ។

រូប២២.១ ធាតុឆ្លងសំខាន់ៗត្រូវបានបង្ហាញក្នុងផ្នែកពណ៌លឿង និងពណ៌បៃតង។

ពណ៌បៃតង

ពណ៌លឿង

	1/IA												2/IIA												
1	1	H																							
		1.00797																							
2	3	Li	4	Be																					
		6.941		9.01218																					
3	11	Na	12	Mg	3/IIIB	4/IVB	5/VB	6/VIB	7/VIIB	8/VIIIB	9/VIIIB	10/VIIIB	11/IB	12/IIA											
		22.98977		24.305																					
4	19	K	20	Ca	21	Sc	22	Ti	23	V	24	Cr	25	Mn	26	Fe	27	Co	28	Ni	29	Cu	30	Zn	
		39.098		40.08		44.9559		47.90		50.9414		51.996		54.9380		55.847		58.9332		58.71		63.546		65.38	
5	37	Rb	38	Sr	39	Y	40	Zr	41	Nb	42	Mo	43	Tc	44	Ru	45	Rh	46	Pd	47	Ag	48	Cd	
		85.4678		87.62		89.9059		91.22		92.9064		95.94		98.9062		101.07		102.9055		106.4		107.868		112.40	
6	55	Cs	56	Ba	57	La	72	Hf	73	Ta	74	W	75	Re	76	Os	77	Ir	78	Pt	79	Au	80	Hg	
		132.9054		137.34		138.9055		178.49		180.9479		183.85		186.2		190.2		192.22		195.09		196.9665		200.59	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Valence electrons																								

លោហៈឆ្លងមានប្រតិកម្មជាមួយម៉ូលេគុល ឬក្រុមផ្សេងៗ ហៅថាលីហ្គង់ (ligands) បង្កើតសមាសធាតុកំផ្លិចលោហៈឆ្លង។ ក្នុងការបង្កើតកំផ្លិចមួយ លីហ្គង់ឱ្យអេឡិចត្រុងទៅអរបីតាល់ទំនេរបស់លោហៈឆ្លង។ សម្ព័ន្ធរវាងលីកង់ និងលោហៈអាចជាសម្ព័ន្ធខ្សោយខ្លាំងទៅមាំខ្លាំង។ សម្ព័ន្ធទាំងនេះជាសម្ព័ន្ធក្លាំឡង់ ប៉ុន្តែតែងតែត្រូវបានចាត់ទុកថាប៉ូលែ។

ឧទាហរណ៍ រ៉ូដ្យូមអាចបង្កើតកំន្លិចជាមួយលីហ្គង់ក្នុងកុងក្រីក្យរ៉ាស្យុងមួយហៅថា **ប្លង់ការេ** (square planar) ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត រ៉ូដ្យូមក៏អាចបង្កើតកំន្លិចជាមួយលីកង់៥ ឬ៦ដែលជាប៊ីពីរ៉ាមីតត្រីកោណ (trigonal bipyramidal) ឬ អដ្ឋមុខ (octahedral) ។ ទម្រង់ទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម ដែលអក្សរ L ប្រើដើម្បីសម្គាល់លីហ្គង់មួយ។

ប្លង់ការព
កំណត់រដ្ឋបាល

**ប៊ីធីរ៉ាមីតត្រីកោណ
កំផ្លិចរូបរាង**

**អង្គមុខ
កំផ្លិចរូងជ្រូម**



- នៅពេលលោហៈរបស់កំផ្លិតលោហៈឆ្លងមួយមាន១៨អេឡិចត្រុងវ៉ាន់ គេនិយាយថាវាមានស្រទាប់ផ្នែកកូអរឌីណាស្យុង (coordinatively saturated) ។

ដើម្បីរាប់អេឡិចត្រុងវ៉ាន់របស់លោហៈឆ្លងក្នុងកំផ្លិតមួយ យើងយកចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាន់សរុបរបស់លោហៈក្នុងភាពជាធាតុ (មើលរូប២២.១) ហើយដកចំនួននេះដោយចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់លោហៈក្នុងកំផ្លិត វិធីនេះអាចហៅថា ការរាប់អេឡិចត្រុងdតាងឱ្យ d^n ។ ចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់លោហៈជាបន្ទុកដែលស្ថិតនៅ ខាងឆ្វេងលោហៈ បើសិនលីហ្គង់ទាំងអស់ (តារាង២២.១) ត្រូវបានដកចេញ។

$$d^n = \text{ចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាន់សរុបរបស់ធាតុលោហៈ} - \text{ចំនួនអុកស៊ីតកម្មលោហៈក្នុងកំផ្លិត}$$


បន្ទាប់មក ដើម្បីរាប់ចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាន់របស់លោហៈក្នុងកំផ្លិត យើងប្តូរ d^n ជាមួយចំនួនអេឡិចត្រុងដែលផ្តល់ឱ្យដោយលីហ្គង់ទាំងអស់។ តារាង៦.1ឱ្យចំនួនអេឡិចត្រុងដែលផ្តល់ដោយលីហ្គង់សំខាន់ៗមួយចំនួន។

$$\text{ចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាន់សរុបរបស់លោហៈក្នុងកំផ្លិត} = d^n + \text{អេឡិចត្រុងឱ្យដោយលីហ្គង់}$$

តារាង២២.១ លីហ្គង់សំខាន់ៗក្នុងកំផ្លិតលោហៈឆ្លង		
លីហ្គង់	រាង	ចំនួនអេឡិចត្រុងផ្តល់ឱ្យ
លីហ្គង់អវិជ្ជមាន		
អ៊ីដ្រូ, H	H^-	2
អាល់កន្ន, R	R^-	2
អាឡុយីន, X	X^-	2
អាញ់ដាមីល		4
អាញ់ដាស៊ីក្លូប៉ង់តាឌីអែនីល, Cp		6
លីហ្គង់ណឺត		
កាបូនីល (កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត)	$:C \equiv O:$	2
ផូស្វ័រ	$R_3P: \text{ or } Ph_3P:$	2
អាល់សែន		2
ឌីអែន		4
បង់សែន		6

ចូរសង្កេតមើលការរាប់អេឡិចត្រុងក្នុងឧទាហរណ៍ពីរ៖

ឧទាហរណ៍ A: គេមានដែកប៉ង់តាកាបូនីល $\text{Fe}(\text{CO})_5$ ជាសារធាតុរាវពុល ដែលកើតនៅពេលកំទិចដែក មានប្រតិកម្មជាមួយកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត។



ពីរូប G.1 យើងឃើញថា អាតូមដែកក្នុងភាពជាធាតុមាន៨អេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់។ យើងមកដល់ចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់ដែកក្នុងដែកប៉ង់តាកាបូនីលដោយកត់សម្គាល់ថា បន្ទុកនៅលើកំផ្លិចទាំងមូលស្មើសូន្យ (វាមិនមែនជាអ៊ីយ៉ុង) ហើយបន្ទុកលើលីហ្គង់ CO គឺសូន្យដែរ។ ដូចនេះ ដែកមានចំនួនអុកស៊ីតកម្មស្មើសូន្យ។


ដោយប្រើចំនួនទាំងនេះ ឥឡូវយើងគណនា d^n ដែលជាចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់សរុបរបស់ដែកក្នុងកំផ្លិចនេះ។

$$d^n = 8 - 0$$

$$\text{ចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់សរុប} = d^n + 5(\text{CO}) = 8 + 5(2) = 18$$

យើងឃើញថា ដែករបស់ $\text{Fe}(\text{CO})_5$ មានអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់ ១៨ ដូចនេះ វាមានកម្រិតផ្ដែតកូអរឌីណាស្យុង។

ឧទាហរណ៍ B: គេមានកំផ្លិចរ៉ូដ្យូម $\text{Rh}[(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{P}]_3\text{H}_2\text{Cl}$ ។ កំផ្លិចនេះ ដែលយើងនឹងឃើញពេលក្រោយ ជាអង្គធាតុ កណ្តាលក្នុងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មអាល់សែន។



ចំនួនអុកស៊ីតកម្មរ៉ូដ្យូមក្នុងកំផ្លិចនេះគឺ +3 [(អាតូមអ៊ីដ្រូសែនពីរ និងក្លរីនីមួយៗរាប់ជា -1) ហើយបន្ទុក នៅលើលីហ្គង់ទ្រីផេនីលផូស្វ័រនីមួយៗស្មើសូន្យ។ ការលីហ្គង់ទាំងអស់បន្សល់អ៊ីយ៉ុង Rh^{3+})]។ ពីរូប G.1 យើង រកឃើញថា ក្នុងភាពជាធាតុ រ៉ូដ្យូមមានអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់៩។ យើងអាចគណនា d^n របស់រ៉ូដ្យូមក្នុងកំផ្លិចនេះ។

$$d^n = 9 - 3 = 6$$

លីហ្គង់ទាំង៦នីមួយៗរបស់កំផ្លិចឱ្យ២ អេឡិចត្រុងទៅអាតូមរ៉ូដ្យូមក្នុងកំផ្លិច ដូចនេះ ចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់សរុបរបស់រ៉ូដ្យូមគឺ ១៨។ រ៉ូដ្យូមនៅក្នុង $\text{Rh}[(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{P}]_3\text{H}_2\text{Cl}$ មានកម្រិតផ្ដែតកូអរឌីណាស្យុង។


$$\text{ចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់សរុបរបស់រ៉ូដ្យូម} = d^n + 6(2) = 18$$

៧. ដំណាក់កាលចលនាការក្នុងប្រតិកម្មរបស់កំផ្លិចលោហៈឆ្នួងខ្លះ


យើងអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការសិក្សាគីមីនៃសមាសធាតុលោហៈឆ្នួងសរីរាង្គ បើសិនយើងអាចអនុលោមន៍តាមចលនាការប្រតិកម្មដែលកើតឡើង។ ស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់ ចលនាការទាំងនេះមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រៅពីចង្វាក់ប្រតិកម្មមួយ ដែលប្រតិកម្មនីមួយៗតាង *ប្រភេទប្រតិកម្មគ្រឹះដែលត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈឱ្យកំផ្លិចលោហៈឆ្នួង*។ ឥឡូវនេះ ចូរពិចារណាលើប្រភេទប្រតិកម្មគ្រឹះបី។ ក្នុងប្រតិកម្មនីមួយៗ យើងនឹងប្រើដំណាក់កាលដែលកើតឡើងនៅពេលអាល់សែនមួយរងអ៊ីដ្រូសែនកម្មដោយប្រើកាតាលីករមួយហៅ

ថាកាតាលីករ Wilkinson ។ ក្នុងផ្នែកទី៧ យើងនឹងឃើញចលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មទាំងស្រុង។ ក្នុងផ្នែកទី ៨ យើងនឹងឃើញពីរបៀបដែលប្រភេទប្រតិកម្មស្រដៀងគ្នាទាក់ទងនឹងប្រតិកម្ម Heck-Mizoroki។

១. ការផ្គុំ-បំបែកលីហ្គង់ (ផ្លាស់ប្តូរលីហ្គង់)៖ កំន្លិចលោហៈឆ្លងមួយអាចបាត់បង់លីហ្គង់មួយ (ដោយបំបែក) និងផ្គុំជាមួយលីហ្គង់មួយផ្សេងទៀត (ដោយផ្គុំ)។ ក្នុងដំណើរការនេះ វាអាចប្តូរលីហ្គង់។ ឧទាហរណ៍ កំន្លិចរ៉ូដ្យូមដែលយើងបានឃើញក្នុងឧទាហរណ៍ B ខាងលើអាច មានប្រតិកម្មជាមួយអាល់សែនមួយ (ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ ប្រតិកម្មជាមួយអេតែន) ដូចខាងក្រោម៖



ដំណាក់កាលត្រូវបានពាក់ព័ន្ធ។ ក្នុងដំណាក់កាលទី១ លីហ្គង់ទ្រីផេនីលផូស្វ័នផ្តាច់ចេញ។ ប្រតិកម្មនេះធ្វើឱ្យកំន្លិចមួយដែលមានរ៉ូដ្យូមមានតែ១៦អេឡិចត្រុងក្លាយជាផ្នែកកូអរឌីណាស្យុង។




កំន្លិចរ៉ូដ្យូម និងអាល់សែនត្រូវបានគេហៅថា កំន្លិច π ។ ក្នុងកំន្លិចនេះ អេឡិចត្រុងត្រង់២ត្រូវបាន ផ្តល់ដោយអាល់សែនទៅឱ្យរ៉ូដ្យូម។ គេតែងហៅអាល់សែននេះថា អ្នកឱ្យ π (π donor) ដើម្បីឱ្យពួកវា ខុសពីអ្នកឱ្យ σ ដូចជា $\text{Ph}_3\text{P:}$, Cl^- ។ល។

ក្នុងកំន្លិច π មួយ ដូចជាកំន្លិចខាងលើ ក៏មានការផ្តល់អេឡិចត្រុងពីអរប៊ីតាល់ d របស់លោហៈមួយទៅឱ្យអរប៊ីតាល់ π^* ទំនេរបស់អាល់សែនដែរ។ ប្រភេទនៃការផ្តល់អេឡិចត្រុងបែបនេះត្រូវបាន គេហៅថា ការចងសម្ព័ន្ធទៅវិញ (back-bonding) ។


២. ប្រតិកម្មបញ្ចូល-ប្រតិកម្មដកចេញ (insertion-desinsertion)៖ លីហ្គង់មិនផ្អែតមួយដូចជាអាល់សែន អាចរងប្រតិកម្មបញ្ចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធមួយរវាងលោហៈរបស់កំន្លិចមួយ និងអ៊ីដ្រូសែន ឬកាបូន មួយ។ ប្រតិកម្មនេះអាចត្រលប់ទៅវិញទៅមក ហើយប្រតិកម្មត្រលប់វិញត្រូវបានហៅថា ប្រតិកម្មដកចេញ។

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នៃប្រតិកម្មបញ្ចូល-ប្រតិកម្មដកចេញ៖



ក្នុងដំណើរការនេះ សម្ព័ន្ធ π មួយ (រវាងរ៉ូដ្យូម និងអាល់សែន) និងសម្ព័ន្ធមួយ (រវាង រ៉ូដ្យូមនិងកាបូន និង រវាងកាបូននិងអ៊ីដ្រូសែន) ។ អេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់របស់រ៉ូដ្យូមថយចុះ ពី១៨ ទៅ១៦។

ប្រតិកម្មបញ្ចូល-ប្រតិកម្មដកចេញកើតឡើងក្នុងមធ្យោបាយស្តេវេអូដាក់លាក់មួយ ដូច ជាប្រតិកម្មបូកស៊ុននៃឯកតា $M-H$ ទៅលើអាល់សែន។




៣. ប្រតិកម្មបណ្តាច់អេដិកម្ម-ប្រតិកម្មបូកអុកស៊ីតកម្ម (Oxidative Addition-Reduction Elimination) កំផ្លិចលោហៈមិនឆ្អែតកូអរឌីណាស្យុងអាចរងប្រតិកម្មបូកអុកស៊ីតកម្មលើអង្គធាតុមេប្រតិករផ្សេងៗ តាមមធ្យោបាយខាងក្រោម។



អង្គធាតុមេប្រតិករ $A-B$ អាចជា $H-H$, $H-X$, $R-X$, $RCO-H$, $RCO-X$ និងសមាសធាតុ ជាច្រើនទៀត។

ក្នុងប្រតិកម្មបូកអុកស៊ីតកម្មប្រភេទនេះ លោហៈរបស់កំផ្លិចកើននូវចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់ និង ចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់វា។ ជាឧទាហរណ៍ ចូរពិចារណាលើប្រតិកម្មបូកអុកស៊ីតកម្មនៃអ៊ីដ្រូសែន លើកំផ្លិចរ៉ូដ្យូមខាងក្រោម ($L=Ph_3P$)។




ប្រតិកម្មបណ្តាច់អេដិកម្មជាប្រតិកម្មត្រលប់នៃប្រតិកម្មបូកអុកស៊ីតកម្ម។ ជាមួយមូលដ្ឋានគ្រឹះ នេះ យើងអាចសិក្សាអំពីចលនាការនៃការអនុវត្តពីរបស់កំផ្លិចលោហៈឆ្លងក្នុងការសំយោគសរីរាង្គ។

៨. បលនការប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មស្មើសាច់៖ កាតាលីករ Wilkinson


ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មកាតាលីករដែលយើងបានសិក្សាក្នុងជំពូកមុន ជាដំណើរការកាតាលីករមិនស្មើសាច់។ ផាសពីរត្រូវបានពាក់ព័ន្ធ៖ ផាសរឹងរបស់កាតាលីករ (Pt , Pd , Ni , ។ល។) ដែលស្រូបអ៊ីដ្រូសែន និង ផាសរាវនៃសូលុយស្យុង ដែលមានសមាសធាតុមិនឆ្អែត។ ក្នុងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មស្មើសាច់ដោយប្រើកំផ្លិចលោហៈឆ្លងដូចជា $Rh[(C_6H_5)_3P]_3Cl$ (កាតាលីករWilkinson) ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មកើតឡើងក្នុងផាសតែមួយ គឺថាក្នុងសូលុយស្យុង។

នៅពេលកាតាលីករWilkinson ត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មនៃអាល់សែនមួយ ដំណាក់កាលខាងក្រោមកើតឡើង ($L=Ph_3P$)។


ដំណាក់កាលទី១




ដំណាក់កាលទី២




ដំណាក់កាលទី៣




ដំណាក់កាលទី៤



ដំណាក់កាលទី៥



ដំណាក់កាលទី៦



ដោយសារតែដំណាក់កាលទី៤ ប្រតិកម្មបញ្ចូលលីហ្គង់ និងដំណាក់កាលទី៥ ប្រតិកម្មបណ្តាច់អ៊ុកស៊ីដង់ជាប្រតិកម្មស្តេអែអូដាក់លាក់ លទ្ធផលសរុបនៃប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មដោយប្រើកាតាលីករWilkinsonជាប្រតិកម្មបូកស៊ុននៃអ៊ីដ្រូសែនលើអាស់សែន។ ឧទាហរណ៍ខាងក្រោម (D_2 ជំនួសឱ្យ H_2) បង្ហាញទិដ្ឋភាពនេះ។



៩. បលនការសម្រាប់ឧទាហរណ៍មួយនៃប្រតិកម្មបង្គំគូខ្លះ៖ ប្រតិកម្ម Heck-Mizoroki

ទិដ្ឋភាពនៃចលនការប្រតិកម្ម Heck-Mizoroki ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងដំណាក់កាលរបស់ប្រតិកម្មបង្កើតខ្វែងផ្សេងទៀតផងដែរ ទោះបីមានភាពខុសគ្នា និងដំណាក់កាលជាច្រើនដែលដាក់លាក់សម្រាប់ខ្លួនវា នីមួយៗ ហើយមិនមែនដំណាក់កាលទាំងអស់ខាងក្រោមត្រូវបានពាក់ព័ន្ធ ឬបម្រើគោលបំណងដូចគ្នាក្នុងប្រតិកម្មបង្កើតខ្វែងផ្សេងទៀត ទេ។

$$\text{Ar}-\text{X} + \text{CH}_2=\text{CH}-\text{R} \xrightarrow[\text{Base (an amine)}]{\text{Pd catalyst}} \text{Ar}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}$$
[illegible]


១០. វីតាមីន B₁₂៖ ជីវមូលេគុលលោហៈឆ្នុងមួយ

វីតាមីន B₁₂ ត្រូវបានរកឃើញក្នុងឆ្នាំ១៩២៦ និងត្រូវបានព្រែកចេញពីថ្លើមក្នុងឆ្នាំ១៩៤៨។ ទម្រង់វិមាត្របីពេញលេញរបស់វីតាមីន B₁₂ (រូប G.2a) ត្រូវបានបង្ហាញច្បាស់ក្នុងឆ្នាំ១៩៥៦ តាមការសិក្សាដោយការស្ទើ-X ដោយ Dorothy Hodgkin (រង្វាន់ណូបែលឆ្នាំ១៩៦៤) និងក្នុងឆ្នាំ១៩៧២ ការសំយោគមូលេគុលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ R. B. Woodward (សាកលវិទ្យាល័យ Harvard) និង A. Eschenmoser (វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសស្វីស) ការសំយោគនេះចំណាយពេល១១ឆ្នាំ ហើយទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មច្រើនជាង៩០។ គម្រោងនេះត្រូវការសហការី ច្រើនជាង១០០នាក់។

វីតាមីន B₁₂ ជាជីវមូលេគុលដែលមានសម្ព័ន្ធកាបូន-លោហៈ។ ក្នុងទម្រង់ស្ថេរភាពវីតាមីននេះលើទីផ្សារក្រុមស្យាណូចងសម្ព័ន្ធជាមួយកូបាល់ ហើយកូបាល់មានចំនួនអុកស៊ីតកម្មស្មើ +3។ ផ្នែកកណ្តាលនៃមូលេគុល វីតាមីន B₁₂ ជាឯកតារងរង់កូរីនមួយ ដែលមានអាតូមអាសូតមួយចងសម្ព័ន្ធកូអរឌីណាស្យុងជាមួយកូបាល់។ លីហ្គង់ទី៦ (ខាងក្រោមរង់កូរីនក្នុងរូប G.2a) ជាអាសូតនៃក្រុមអេតេរ៉ូស៊ីគ្លីចដែលបានពី 5,6-ឌីមេទីលបង់ស៊ីមីដាស៊ីល។

កូបាល់របស់វីតាមីន B₁₂ អាចរងអុកស៊ីតកម្មទៅជាចំនួនអុកស៊ីតកម្ម +2 ឬ +1 ។ នៅពេលកូបាល់មានចំនួនអុកស៊ីតកម្ម +1 វីតាមីន B₁₂ (ហៅថា B_{12s}) ក្លាយជានុយក្លេអូកីលមួយខ្លាំងជាងមេតាណុល 10¹⁴ ដង។

មានអំពើជានុយក្លេអូកីល វីតាមីន B₁₂ មានប្រតិកម្មជាមួយអាដេនីនទ្រីផូស្វាតបង្កើតទម្រង់សកម្មជីវសាស្ត្រនៃវីតាមីន (រូប G.2c)។



រូប G.2 (a) ទម្រង់របស់វីតាមីន B₁₂ ក្នុងទម្រង់លើទីផ្សារនៃវីតាមីន (ស្យាណូកូបាឡាមីន), R = CN

(b) ប្រព័ន្ធរង់កូរីន

(c) ក្នុងទម្រង់សកម្មជីវសាស្ត្ររបស់វីតាមីន (5-ដេអុកស៊ីអាដេណូស៊ីលកាបាល់មីន) អាតូមកាបូន 5' នៃ 5-ដេអុកស៊ីអាដេណូស៊ីនចងសម្ព័ន្ធកូអរឌីណាស្យុងទៅអាតូមកូបាល់

&&&&&&

តារាងតម្លៃ pK_a របស់អាស៊ីត-បាស

កម្លាំងអាស៊ីតមួយចំនួន និងបាសឆ្លាស់របស់វា				
	អាស៊ីត	pK_a	បាសឆ្លាស់	
អាស៊ីតខ្លាំងបំផុត ↑ កម្លាំងអាស៊ីតកើន ↓ អាស៊ីតខ្សោយបំផុត	$HSbF_6$	< -12	SbF_6^-	បាសខ្សោយបំផុត ↓ កម្លាំងបាសកើន ↑ បាសខ្លាំងបំផុត
	HI	-10	I^-	
	H_2SO_4	-9	HSO_4^-	
	HBr	-9	Br^-	
	HCl	-7	Cl^-	
	$C_6H_5SO_3H$	-6.5	$C_6H_5SO_3^-$	
	$(CH_3)_2\overset{+}{O}H$	-3.8	$(CH_3)_2O$	
	$(CH_3)_2C=\overset{+}{O}H$	-2.9	$(CH_3)_2C=O$	
	$CH_3\overset{+}{O}H_2$	-2.5	CH_3OH	
	H_3O^+	-1.74	H_2O	
	HNO_3	-1.4	NO_3^-	
	CF_3CO_2H	0.18	$CF_3CO_2^-$	
	HF	3.2	F^-	
	$C_6H_5CO_2H$	4.21	$C_6H_5CO_2^-$	
	$C_6H_5NH_3^+$	4.63	$C_6H_5NH_2$	
	CH_3CO_2H	4.75	$CH_3CO_2^-$	
	H_2CO_3	6.35	HCO_3^-	
	$CH_3COCH_2COCH_3$	9.0	$CH_3COCHCOCH_3$	
	NH_4^+	9.2	NH_3	
	C_6H_5OH	9.9	$C_6H_5O^-$	
	HCO_3^-	10.2	CO_3^{2-}	
	$CH_3NH_3^+$	10.6	CH_3NH_2	
	H_2O	15.7	HO^-	
	CH_3CH_2OH	16	$CH_3CH_2O^-$	
	$(CH_3)_3COH$	18	$(CH_3)_3CO^-$	
	CH_3COCH_3	19.2	$^-CH_2COCH_3$	
	$HC\equiv CH$	25	$HC\equiv C^-$	
	$C_6H_5NH_2$	31	$C_6H_5NH^-$	
	H_2	35	H^-	
	$(i-Pr)_2NH$	36	$(i-Pr)_2N^-$	
	NH_3	38	$^-NH_2$	
	$CH_2=CH_2$	44	$CH_2=CH^-$	
	CH_3CH_3	50	$CH_3CH_2^-$	

តារាងបង្កំនាទីសរីរាង្គ

ឧត្តមភាពបំផុត បង្កំនាទីផ្សេងៗ នៅក្រោមអត្ថបទនេះ បញ្ចប់ដោយ អាន	ក្រុម	បុព្វបទ	បង្កើបបទ	ឧទាហរណ៍
	អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច 	កាបូកស៊ី-	-អាស៊ីត ...កាបូកស៊ីលិច - អាស៊ីត.....អ៊ុត	អាស៊ីតអេតាណូអ៊ីច
	អេស្តេរ 	(R)-អ៊ុតកាបូនីល	អ៊ុត	មេទីលអេតាណូអ៊ុត
	អាស៊ីតក្លរ 	អាឡូកាបូនីល	អ៊ុតអាឡូសែន	អេតាណូអ៊ុតក្លរ
	អាមីត 	កាបូកស៊ីអ៊ុត	កាបូកស៊ីអ៊ុតអាមីត	អេតាណូអ៊ុត
	នីត្រីល 	ស្យាណូ	នីត្រីល	អេតាណូនីត្រីល
	អាល់ដេអ៊ីត 	ផរមីល	អាល់កាបាល់ដេអ៊ីត	អេតាណាល់
	សេតូន 	អុកសូ	អុកសូ	ប្រូប៉ាណូន
	អាល់កុល 	អ៊ីប្រូកស៊ីល	អុល	អេតាណុល
	ត្យុល 	.មេកាប៉ូតូ	ត្យុល	មេតានត្យុល
	អាមីន 	អាមីណូ	អាមីន	មេទីលអាមីន
	អាល់សែន 	អាល់សែនីល	អែន	ប្រូប៉ែន
	អាល់ស៊ីន 	អាល់សែនីល	អ៊ីន	ប៊ុយទីន
	អាល់កាន 	អាល់គីល	អាន	អេតាន
	អេទ័រ 	អាល់កុកស៊ី	អាន	មេតុកស៊ីតមេតាន
	អាល់គីលអាឡូសែន -F, -Cl, -Br, -I	អាឡូ	អាន	ប្រូមីប៊ុយតាន
	នីត្រូ 	នីត្រូ	អាន	នីត្រូអេតាន

តារាងសម្រួបស្ស៊ីម IR

របស់បង្កំនាធិសំខាន់ៗ

សម្រួបកាំស្មើអាំងប្រាក្រហមនៃក្រុមបង្កំនាធិសំខាន់ៗ		
ក្រុម	ចន្លោះប្រេងកង់ (cm^{-1})	អាំងតង់ស៊ីតេ
A. ក្រុមអាល់គីល $\text{C} - \text{H}$ (ទាញ) $\text{អ៊ីសូប្រូពីល} - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$ $\text{ទែប៊ុយទីល} - \text{C}(\text{CH}_3)_3$	$2853 - 2962$ $1380 - 1385$ និង $1365 - 1385$ $1385 - 1395$ និង ~ 1365	មធ្យម - ខ្លាំង ខ្លាំង ខ្លាំង មធ្យម ខ្លាំង
B. ក្រុមអាសែនីល $\text{C} - \text{H}$ (ទាញ) $\text{C} = \text{C}$ (ទាញ) $\text{R} - \text{CH} = \text{CH}_2$ $\text{R}_2\text{C} = \text{CH}_2$ $\text{cis-RCH} = \text{CHR}$ $\text{trans-RCH} = \text{CHR}$	$3010 - 3095$ $1620 - 1680$ $985 - 100$ និង $905 - 920$ $880 - 900$ $675 - 730$ $760 - 975$	មធ្យម ប្រែប្រួល ខ្លាំង ខ្លាំង ខ្លាំង ខ្លាំង ខ្លាំង
C. ក្រុមអាសែនីល $\equiv \text{C} - \text{H}$ (ទាញ) $\text{C} \equiv \text{C}$ (ទាញ)	~ 3300 $2100 - 2260$	ខ្លាំង ប្រែប្រួល
D. អារ៉ូម៉ាទីច $\text{Ar} - \text{H}$ (ទាញ) $\text{C} = \text{C}$ (ទាញ) ប្រភេទក្រុមជួសអារ៉ូម៉ាទីច ($\text{C} - \text{H}$ បត់ក្រៅប្លង់) ម៉ូណូជំនួស o-ឌីជំនួស m-ឌីជំនួស	~ 3030 $1450 - 1600$ $690 - 710$ និង $730 - 770$ $735 - 770$ $680 - 725$	ប្រែប្រួល មធ្យម ខ្លាំងណាស់ ខ្លាំងណាស់ ខ្លាំង ខ្លាំង

p- ឌីជីន្ទស	និង 750 – 810 800 - 860	ខ្លាំងណាស់ ខ្លាំងណាស់
E. អាល់កុល ផេណុល និងអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច O – H (ទាញ) អាល់កុល , ផេណុល (សូលុយស្យុងរាវ) អាល់កុល , ផេណុល (ចងសម្ព័ន្ធជាមួយ H) អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច (ចងសម្ព័ន្ធជាមួយ H)	 3590 – 3650 3200 – 3550 2500 - 3000	ស្រួច ប្រែប្រួល ធំ ខ្លាំង ធំ ប្រែប្រួល
F. អេមែរ, អាល់កុល និងអេស្ទែរ C – O (ទាញ)	1020 – 1275	ខ្លាំង
G. អាល់ដេអ៊ីត សេតូន អេស្ទែរ អាមីត អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច C – O (ទាញ) អាល់ដេអ៊ីត សេតូន អេស្ទែរ អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច អាមីត	 1630 -1780 1690 – 1740 1680 – 1750 1735 – 1750 1710 – 1780 1630 - 1690	ខ្លាំង ខ្លាំង ខ្លាំង ខ្លាំង ខ្លាំង ខ្លាំង
H. អាមីន N – H (ទាញ)	3300 – 3500	មធ្យម
I. នីត្រីល C ≡ N	2220 - 2260	មធ្យម

ឯកសារយោង

1. *Organic Chemistry*, Graham Solomon, Graig Fryhle, Scott Snyder, © 2014, 11th Edition, John Willey & Sons, INC.
2. ORGANIC CHEMISTRY, Jonathan **Clayden**, Nick **Greevs**, Stuart **Warren**, Peter **Wothers**, **Copyrighted materials**.
3. Fundamentals of General, Organic and Biological Chemistry, John McMurry, David S. Ballantine, Carl A. Hoeger, Virginia E. Peterson, 7th Edition, © 2013, PERSON.



តារាងឧបនៃធាតុគីមី

Periodic table of elements

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ

ដេប៉ាតឺម៉ង់ គីមី

ឧប

ក្រុម

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IA																		VIII A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1 H 1.008 1s ¹ អ៊ីដ្រូហ្សែន		3 Li 6.941 2s ¹ លីត្យូម		4 Be 9.012 2s ² បេរីល្យូម		11 Na 22.99 3s ¹ សូដ្យូម		12 Mg 24.30 3s ² ម៉ាញ៉េស្យូម		19 K 39.09 4s ¹ ប៉ូតាស្យូម		20 Ca 40.07 4s ² កាល់ស្យូម		21 Sc 44.96 4s ² 3d ¹ ស្កង់ដ្យូម		22 Ti 47.87 4s ² 3d ² ទីតាន		23 V 50.94 4s ² 3d ³ វ៉ាណាដ្យូម		24 Cr 51.99 4s ¹ 3d ⁵ ក្រូម		25 Mn 54.938 4s ² 3d ⁵ ម៉ង់កាណែស		26 Fe 55.85 4s ² 3d ⁶ ដែក		27 Co 58.93 4s ² 3d ⁷ កូបាល់		28 Ni 58.69 4s ² 3d ⁸ នីកែល		29 Cu 63.55 4s ¹ 3d ¹⁰ ទង់ដែង		30 Zn 65.39 4s ² 3d ¹⁰ ស្លង់ស៊ី		31 Ga 69.72 4s ² 4p ¹ ហ្គាល់ល្យូម		32 Ge 72.64 4s ² 4p ² ហ្សឺរម៉ាញីយ៉ូម		33 As 75.92 4s ² 4p ³ អាសេនីត		34 Se 78.96 4s ² 4p ⁴ សេលេនីយ៉ូម		35 Br 79.90 4s ² 4p ⁵ ប្រូម		36 Kr 83.80 4s ² 4p ⁶ គ្រីបតុង																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2 He 4.00 1s ² អេលីយ៉ូម		10 Ne 20.18 2s ² 2p ⁶ នេអុង		18 Ar 39.95 3s ² 3p ⁶ អាគូប		36 Kr 83.80 4s ² 4p ⁶ គ្រីបតុង		54 Xe 131.29 5s ² 5p ⁶ សេណុង		86 Rn 222.02 6s ² 6p ⁶ រ៉ាដូន		118 Og 294.114 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		132 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		154 Ts 289.101 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		176 Uu 348.077 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		198 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		210 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		222 Rn 222.02 7s ² 7p ⁶ រ៉ាដូន		238 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		254 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		276 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		298 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		310 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		322 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		334 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		346 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		358 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		370 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		382 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		394 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		406 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		418 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		430 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		442 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		454 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		466 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		478 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		490 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		502 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		514 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		526 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		538 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		550 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		562 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		574 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		586 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		598 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		610 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		622 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		634 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		646 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		658 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		670 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		682 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		694 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		706 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		718 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		730 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		742 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		754 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		766 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		778 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		790 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		802 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		814 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		826 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		838 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		850 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		862 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		874 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		886 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		898 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		910 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		922 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		934 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		946 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		958 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		970 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		982 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		994 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1006 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1018 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1030 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1042 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1054 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1066 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1078 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1090 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1102 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1114 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1126 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1138 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1150 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1162 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1174 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1186 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1198 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1210 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1222 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1234 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1246 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1258 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1270 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1282 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1294 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1306 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1318 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1330 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1342 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1354 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1366 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1378 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1390 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1402 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1414 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1426 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1438 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1450 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1462 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1474 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1486 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1498 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1510 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1522 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1534 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1546 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1558 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1570 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1582 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1594 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1606 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1618 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1630 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1642 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1654 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1666 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1678 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1690 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1702 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1714 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1726 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1738 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1750 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1762 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1774 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1786 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1798 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1810 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1822 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1834 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1846 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1858 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1870 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1882 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1894 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1906 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1918 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1930 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1942 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		1954 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		1966 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		1978 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		1990 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		2002 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		2014 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		2026 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		2038 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		2050 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		2062 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		2074 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		2086 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		2098 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		2110 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		2122 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		2134 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		2146 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		2158 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		2170 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		2182 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		2194 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		2206 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		2218 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		2230 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		2242 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		2254 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		2266 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		2278 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		2290 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		2302 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		2314 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		2326 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		2338 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		2350 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		2362 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		2374 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		2386 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		2398 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		2410 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		2422 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		2434 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		2446 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា		2458 Og 400.158 7s ² 7p ⁶ អូហ្គេស្ទូន		2470 Lv 260.103 7s ² 7p ⁶ លីវីរ៉ូស្គី		2482 Nh 289.101 7s ² 7p ⁶ ណីហ្គីម		2494 Ts 348.077 7s ² 7p ⁶ តេស្តា	

សំគាល់៖ ម៉ាសអាតូមិចស្រង់ក្នុងតារាង ជាតម្លៃលេខដាក់លាក់ដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ក្នុងការគណនាដោយប្រើប្រទេស Allred-Rochow ថាមពលអ៊ីយ៉ុងកម្មទី១សម្រង់ចេញពី៖ C.E. Moore. Ionization potentials and limits derived from the analyses of optical spectra, NSRDS-NBS34, National bureau of Standards, Washington, DC, 1970. W.C. martin, L. Hagan, J. Reador and J. Sugar, J, Phys. Chem. Ref. Data, 1974(3-771) and J. Sugar, J. Opt, Soc. Am, 1975(65-1366)

រៀបរៀងដោយ៖ លោកសាស្ត្រាចារ្យ គុជ ហ៊ុត